BULLETIN GÉNÉRAL

THÉRAPEUTIQUE

MÉDICALE, CHIRURGICALE
OBSTÉTRICALE ET PHARMACEUTIQUE



FONDÉ PAR MIQUEL

BILLETIN GÉNÉRAL, DUJARDIN-BEAUMETZ

1873-1895.

DE

THÉRAPEUTIQUE

MÉDICALE. CHIRURGICALE, OBSTÉTRICALE

ET PHARMACEUTIOUE

DIRECTEUR SCIENTIFIOUR

ALBERT ROBIN

MEMBRE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINI MÉDECIN DE L'ESPITAL DE 14 PITIÉ PROFESSEUR AGRÉGÉ A LA FACULTÉ DE MÉDECINE



H. HALLOPEAU Médecin de l'hôpital Szint-Louis Professeur agréze a la Faculté de médecine.

6. BOULLY G. POUCHET Verabre de l'Academie de médecine. Chirur, deu de l'hôpital Cachin. Membre de l'Academie de médecine. Professeur agrégé

Professeur de pharmacologie et de matière medicale à la Faculté de méderina. à la Faculte de medecine. RÉDACTEUR EN CHEF

G. BARDET

ANDESTANT DE THÉRAPEUTIQUE A L'HÔPITAL DE LA PITIÉ PECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA MOCIÉTÉ DE TRÉCAPEUTIQUE

TOME CENT QUARANTE ET UNIÈME

90014 PARIS

OCTAVE DOIN. ADMINISTRATEUR-GÉRANT

PLACE DE L'ODÉON, 8

1901



BULLETIN 1



A l'Académie des sciences, M. Gauthier communique une note de M. Bra sur l'étiologio du cancer. L'élément infectioux no serait pas une levure mais un véritable champiquon du cancer se reproduisant par spores. Et à l'appui de cotto opinion sont déposés des dessins marquant les étapes de l'évolution de ce champignon

A la Société de chirurgie, M. Nélaton se déclare absolument opposé à l'opération de Farthrotomie dans les luxations anciennes de l'épaute. Si la luxation irréductible par les procédes ordinaires permet des mouvements assez étendus du membre, il s'abstient de toute intervention, sauf qu'il mobilise et masse; si les mouvements du membre sont réduits au minimum, il résèque la tête humérale. Cette dernière opération doit, somble-l-il, être absolument substituée à l'arthrotomie car alle donne des résultats incontestablement meilleurs. Et M. Delbet partage de tous points les idées de M. Nélaton.

M. Loison communique une observation d'intervention chirurgicale dans un cas de péritonite par perforation intestinale au cours d'une fièrer uphoide; il s'agissait d'un jussoldat arrivé au seixiene jour de sa fièrre et présentant subitement tous les sixiene d'une perforation. La laparotomie pratiquée, la perforation est obturée par la suture et la cavité

TOME CXXXXI. 1re LIVE.

2 DITTIETIN

abdominale lavée et drainée. La fièvre typhoide suivit son cours, mais une pleurésic purulente intercurrente nécessita l'ouverturo de la cavité pleuréale avec résection costale. La guérison ne survint pas moins.

M. Pothorat rapporte l'observation d'un homme qui avait requ une balle de recolver dans la région latéralo du thorax et qui alla se loger dans la fosso sous-épineuse, aimsi que lo montra la radiographie; des phénomènes de monoplégie indivent que la balle avait dit léser le plexus brachial. M. Potherat alla à la recherche de ces lésions et trouva un noyau fibreux englobant et enserrant la veine axiliaire, le brachial cutané interne, le cubital et la racine interne du médian. Il libèra ces différents organes et les phénomènes paralytiques disparurent aussitót.

A la Société médicale des hôpitaux, MM. Barbier et Lebon, présentant un cas de mgopathie progressire, sigualent dans la famillo de cette malade la coexistence de deux types cliniques de myopathie, dont l'un comprend à la fois des caractères de la paralysie pseudo-hyperthrophique, de l'atrophio héréditaire de Duchonne et du typo facio-scapulo-huméral.

MM. Linessier et Barjon ayant inoculé dans la voine auriculairo d'un lapin, de 1,820 grammes, 305 contimètres cubes
de liquide extrait par penciton d'un kgate hydeatique du foie,
n'ont pas constaté les phénomènes d'intoxication que Dufour
avait signalés. Ce résulta n'égatif ne saurait toutofois constituer un argument décisif contre l'opinion des auteurs qui ont
trouvé des ptomatines ou des toxalbumines dans les kystes
hydatiques; il est possible, en effet, que les hydatidos no
sécrètent des toxines qu'à une phaso déterminée do leur évolution. Il est également possible q'un liquide inoffensif pour
le lapin soit toxique pour l'houmo.

A la Société de biologie, MM. Mairet et Ardin-Delteil rendent compte d'expériences entreprises sur la toxicité de la sueur des épileptiques. La suour interparoxystique a proBULLETIN 3

duit les mêmes esfets physiologiques que la sueur de l'hommo normal et ne s'est jamais montrée toxique. La sueur paroxystique a, au contraire, toujours provoqué la mort de l'animal; eette mort a été immédiate dans six cas sur luit. Dans deux cas où la sueur avait été recueillie quatre ou cinq heures heures après l'attaque, la toxicité a été moindre et la mort n'est survenue que vingt heures et trois jours après l'injection.

A la Société de médecine de Rouen, MM. Halipré ot Nicolle lisent l'observation d'une femme de quarante-deux aus qui, à la suite d'une petite plaie de la face probablement due à une piqûre de monche, a présenté des accidents septiciniques d'une gravité extréme, accidents terminés par la mort. L'oxamen bactériologique fait à différentes repriseo, des le début de la mainde et plus tard, ne permit de dévauvrir aucun microbe anaérobic. La bactéridic charbonneuse, les vibrions septiques n'étaient pas en cause. Dans le pus et dans les abecs des viscères on trouva toujours un même staphylecoque. Une culture inoculée au lapin a donné la mort en seize jours.

A la Société impériale-royale des médecins de Vienne,
M. Neuman a présenté une femme ayant une singulière
affection des glandes sudoripares. Son tronc est couvert de
petites tumeurs dures sous-cutanées dont le volume no depasse pas celui d'un pois. Sur une section transversale on
voit qu'il s'agit de kystes à contenu colloide qui communiquent avec les glandes sudoripares. Plusieurs de ces tumeurs
ont disparu, mais elles ont été remplacées par de nouvelles.
M. Neumann 'ao beservé iusuréi en tervio sas semblables.

SOCIÉTÉ DE THÉRAPEUTIQUE

SÉANCE DU 28 DÉCEMBRE 1900

PRÉSIDENCE DE M. HUCHARD.

Le procès-verbal de la derniére séance est lu et mis aux voix est adepté.

A l'occasion du procès-verbal.

M. Barr. — Jo veux répondre sommairement aux arguments apportés à la dernière séance contre ma communication sur l'importance de l'hypoacidité urinaire et son traitement par l'acide phosphorique M. Cautru répondra de son côté; puisquo nous sommes d'accord sur le plus grand nombre des points, je le laisse traiter la question elinique, car il a plus d'avadrience une moi sur ce terrain.

On nousa reproché d'avoir employé des méthodes médiocres; je ne puis répondre qu'une chose, c'est que si M. Joulie, et moi à sa suite, nous avons renencé aux anciennes méthodes, c'est parco que nous les trouvions plus mauvaïses que celle choisie par l'éminent chimistic. En réalité les procédés acidimétriques de l'urine sent tous défectueux, qu'on nous en donne un bon et nous l'accepterens.

On m'a fait observer que, centrairement à men epinion, le plus grand nombro des dyspeptiques hyperchlorhydriques étaient des hyperacides urinaires. S'il en est ainsi, jo me suis grossièrement trompé, mais je suis persuadé du contraire. La seule divergence apparente entre mes contradicteurs oi mi, c'est que, mal satisfait des interprétations des analyses, j'ai accepté avec reconnaissance la façon de procéder de M. Joulie, qui rapporte l'acidité à une donnée fixe, la densité, et non pas seulement au litre ou aux vingt-quatro heures. Cette dernière donnée no vaut absolument rien, attendu qu'il y a relation outre l'acidité et les matières fixes de l'urine. Or ceux qui parleut do normalo d'acidité sans foumir une relation, un rapport, en un mot une comparaison, ne me persuadent pas du tout, car jo ne comprends pas la valeur du chiffre qu'ils me donnent, faute de guide.

M. Albert Robin m'a dit jadis: "La densité est un mauvais point do comparaison pour établir un rapport, proner l'extrait ou l'azote total ». J'accopto volonitiers cette critiquo, car elle est très juste, mais je réponds que, dans ses recherches, M. Joulie et uno imme aprèse lui, nous nous sommes appliqués à fournir un guide au praticien; or celui-ci est aussi incapable do faire un extrait urinairo qu'un dosage d'azote, il lui faut avoir recours à un chimiste et il n'en a pas toujours sous la main. En outre, J'ai constaté que sij prenais ces bases rationelles, J'obtensia des résultats qui différaiont assez peu de ceux qui me sont fournis par le rapport à l'excès de densité préconisé par M. Joulie; en effet, si je compare les résultats d'une analyse faite au moyen des trois procèdés (en raumenant ensuite, par correction, pour aveir des chiffres comparables), je trouve :

Rapport	acidité	au litre	à excès de densit à excès see à azoto total	ė 3,7
	_	_	à excès see	3,2
_	_	_	à azoto total	3.4

or, au peint de vue clinique, ces chiffres so rapprochent singulièrement, ear ils m'indiquent tous que la normale étant autour de 4.5, le sujet qui feurnit 3.2 ou 3.7 est sensiblement hypoacide.

Devant ces résultats, je trouve que le procédé Joulie, qui est fort simple, satisfait très suffisamment le clinicien.

En un mot, les arguments qui m'ont été fournis ne me paraissent pas suffisants pour me faire renoncer à la conviction à laquelle je suis arrivé à la suite d'une longue série d'expérionces, pratiquées depuis deux ans.

Un mot encore et j'ai fini, 'M. Hirtz a rappelé des expériences qui lui font supposer que l'acide phosphorique peut amener la stéatose du foie, mais la lecture de la note de notre collègne ne m'a point convaineu, car les faits me semblent douteux peur l'acide phosphorique, tandis qu'ils sont concluents pour le phosphore, comme il était naturel de s'y attondre. Or, est certainement à l'était de phosphate de soude que l'acide phosphorique ingéré passe dans les humeurs, et je ne sache point que les phosphates, lesquels font partie intégrante de presque tous les aliments, qui sont journellement administrés comme purgatifs (sel de soude) aient jamais étà accusés de produiro la stateses. Pinsiste done sur la nécessité d'expériences prolongées pour qu'il soit permis de formuler une opinion motives sur cette question.

M. Currau. — Dans la dernière séance, divers points de la question ont été touchés et je tiens à répondre à quelques objections faites à la méthode d'analyses et de traitement que je préconise pour rétablir l'équilibre de l'acidité du sang.

M. Linossier a incrimine la méthodo qui consisto à n'opérer que sur l'urino du matin. Simple convention, dit-il; et il ajoute que l'examen de cette urine ne met pas à l'abri des errours dues à l'influence alimentaire.

Convention, soit, mais copendant basée sur ce que l'urint des 21 heures varie constamment comme acidité, ce qui fausse le résultat (l'ídéal en effet sorait d'examiner l'urine le plus vite possible après son émission). Et puis cette urine du matin est bien toujours égale à elle-même chez lo même malade quand on rapporte son acidité à sa densité. Elle indique incontestablement l'état humoral du sujet, car, quelle que soit l'affection dont il est atteint, son type urinaire ne varie pas, tant que la santé n'est pas revenue. Le neurasthémique, le tuberenleux, le sujet atteint de maladie infectuses, otc., seront toujours hypocatées 305 jours par an Il y

a des malades que je suis depuis 3 ans et qui ont toujours le même type urinaire, plus ou moins rapproché de la normale, selon leur état d'amélioration.

Or une méthode qui, à l'encontre des autres, donne toujours les mêmes résultats dans les mêmes maladies doit être prise en considération, malgré ses imperfections. M. Robin, M. de Floury trouvent des résultats très différents dans la neurestaténie, par exemple; ils trouvent que chez le même malade l'acidité varie à chaque instant et M. Linossier a dit, dans l'avant-dernière séance, que « ce qui caractérise l'urine des neuratshéniques, c'est a variabilité.

Or M. Joulie et moi nous disons que ce n'est pas la composition du sang qui change, mais la quantité d'eau excrétée et que si, n'en tenant aucun compte, on rapporte l'acidité à l'excès de densité de l'urine sur l'eau, on trouve un type unique dour chauce manifestation morbide.

Au XVIII* Congrès de médecine, mon rapport était basé sur 800 analyses cuviron; j'en ai plus de 1,000 aujourd'hni sur lesquelles 150 analyses de neurasthéniques. Parmi ces derniers, tous les vrais neurasthéniques, atteints de la maladie de Beard, sout hypoacides urinaires à jeun (le plus grand nombre d'entre oux sont atteints d'hyperchlorhydrie d'origine contrale); parmi les autres, les neurasthéniques secondaires à un trouble de la nutrition d'origine gastrique, à peine 10 0/0 sont hyperacides.

Et maintenant, sans suivre M. Linossier dans son intéressante interprétation des phénomènes digestifs, je lui demanderai seulement pourquoi il refuso d'accorder à la notion acidité ce qu'il accorde à la notion albumine et sucre, les cliniciens prenant toujours l'urine à jeun pour se rendre compte si l'albuminurio ou le diabéte sont d'origino organique ou alimentaire. Je veux bien lui accord-èr que la première urine du mafin d'un malade qui n'a uriné qu'en se couchant est influencée par le repas du soir; mais, outre que l'idèal est difficile à obtenir en clinique, rien n'empéche chaque fois que cela sera possible, de prendre la seconde urine du matin, quitte à retarder le petit déjeuner du malade ou à l'on priver ce jour-là.

MM. Robin et Mathieu pensent que si les hyperelhorhydriques qui vomissent peuvent à la rigueurêtre hypoacides
urinaires, ceux qui ne vomissent pas, qui résorbent leur
acide chlorhydrique, sent le plus seuvent hyperacides. Corest vrai certainement, puisque les matires le disent, mais seulement lorsqu'ils se servent des méthodes habituelles d'analyse et qu'ils opérent sur l'urine des 21 heures. Le système
Joulie sur l'urine à jeun m'a denné, sur 34 hyperchlorhydriques, 3 hyperacides seulement; les autres étaient hypeacides, et 5 d'entre eux avaient des urines alcalines.
Presque tous se sont fort bien trouvés de la médication phesphorique. Pas un de ces34 malades n'était atteint de vomissements centius; 2 ou 3 seulement vemissaient var crises,
sements centius; 2 ou 3 seulement vemissaient var crises,

Pour répondre à M. Hirtz, je dirai tout d'abord qu'il me semble impossible de faire jouer le même rôle au phosphore et à l'acide phesphorique, pas plus qu'en ne peut comparer l'azote à l'acide azotique, le soufre à l'acide sulfurique.

L'empoisonnement par le phosphore amêne la stéatose du foie, c'est vrai, mais cela n'empèche pas que le phosphore à dose thèrapeutique (1 à 4 milligrammes) pout donner de bens résultats; tels le calemel et les autres composés morcuriels, excellents à petites doses, toxiques à hautes doses. Il serait intéressant de savoir à quelle dose par kilogramme d'animal M. Hirtz a employè le phosphore, et encore pourrait-on conclure de l'animal à l'homme?

Plusieurs de mes malades depuis un an prennent en moyenne un jour sur deux 1 à 2 milligrammes de phosphere seus forme d'huile phosphorée en piqures, et leur urée est normale.

Pour l'acide phosphorique, il est plus que problable, et M. Burdet est de mon avis, qu'il se change en phesphate de soude. En teut cas, ben nombre de mes malades en prenpent depuis 1 à 3 ans (M. Jeulie en prend depuis plus do 3 ans, tous les jours, de 2 à 10 grammes) et leur foie paraît très normal, car les déjections sont parfaites et l'urée n'a pas diminud dans les urines.

Pour finir, je dirai à M. Bardet que je suis entièrement de son avis au sujet de la neurasshénie. Il no faut pas confondre, en elfet, la neurasthénie vraie, névrose, maladie de Béard, avec des états dits neurasthéniques et qui ne sont que des annifestations d'hyponutrition d'origine digestivo. Anssi, jo conclus avec lui que l'équilibre de l'acidité sanguino est beaucoup plus facile à obtenir quand on se fait aider d'un régime approprié ; je dis méme que saus celui-ci la médication phosphorique ne donne pas de résultat durable. Je dirai cependant quo le régime seul n'est pas suffisant chez les hypoacides invétères, surtout lorsqu'ils sont hypophosphatiques of que les phosphates et l'acide phosphorique sont absolument indispeusables nour réabilir féculière physiologique.

J'ai observé comme M. Bardet et M. Le Gendre, des cas de diarrhée dus à l'emploi de l'acide phosphorique. Ces diarrhées se produisent chez certains apentiques dont l'estemac se vide tron vite dans l'intestin et chez les malades atteints de lésions anciennes du foie ou de l'intestin (certaines entérites muco-membrancusos, tuberculeuses ou non). J'ai énuméré ailleurs les contre-indications do la médication, je n'y reviens pasici. Et pour merésumer en quelques mots, je dirai que, laissant de côté provisoirement l'interprétation clinique et physiologique, peutètre encore obscure sur certains points de la questien, si je me place sur le terrain parement' clinique, je puis affirmer après une observation de plus de trois ans, d'un très grand nombre de cas de toutes sortes, que 90 0/0 des malades chroniques se trouvent bien de la médication phosphorique. Celleci agit lentement et doit être continuée longtemps. En outre des états diathésiques hypoacides (arthritisme et ses manifestations : diabète, dyspensie, dermatose, rhumatismo chronique, lithiases rénale et hépatique - neurasthènie primitive ou secondaire — tuberculese locale ou générale — cancer — affections chroniques de l'apparell circulatoire — chlorese, dats cachectiques, etc.), en dehors, disjé, de ces états chroniques, l'hypeacidité se rencontre dans toutes les maladies infectiouses aigués (grippe, fièvre typhédie, scarlatine, etc.) dans le cours desquelles je conseillerais volentiers de remplacer les limenades sulfarique, citrique et autres par la limenade phesphorique; l'hypeacidité se rencentre encere dans la grossesse, et fai pu donner l'acide phesphorique a plus de fix fommes, pendant leur grossesse, sans inconvénient, même chez celles qui avaient des traces d'albumine internsitueto. Les résultats, tant au point de vue de la grossesse que de l'accouchement et surtent au peint de vue de la lactation, ent été surrencants.

Jo terminerai en disant que beauceup de gens qui se disent bien portants deviennent très fréquenment hypocaides pour le plus léger surnonage et je me range à l'avis de M. Joulic, à saveir que l'humanité dégénère par hypocacidité héréditaire ou acquisc, le surmenage nerveux et une alimentation insuffisante en acide o hespherique étant la récle autourl'hui.

M. Laxossura. — Jo n'ajouterai que quelques mots : une prelongation de cette discussion ne me somble, en effet, ne pouvoir étre que stérile, tant qu'on n'appertera pas à cette discussion la centribution de neuvelles expériences. Je tiens seulement à faire remarquer qu'il n'a rien été répondu aux critiques que J'ai formulées relativement au choix de l'urine du réveil comme témein de la réaction générale de l'organisme. S'il existe des difficultés à mesurer l'acidité totale de l'urine des vingt-quatre heures, à cause de l'altération rapide de l'urine dreys l'émission, il faut chercher à réaliser la benne conservation de l'urine jusqu'à l'analyse, ce qui n'est pas impossible. J'ai dit que l'urine du révoil subti l'influence de la digestion du repas du seir. M. Cautru le reconnait; et répond qu'il fait analyser, quand il le peut, l'urine des premières heures de la journées, l'atlieurs, beaucoup de sujets,

ajoute-t-il, s'oveillent la nuit pour urinor, ce qui fait porter l'analyse sur une période plus éloignée du repas que lorsqu'ils ne font qu'un seul somme. Mais il me semble alors que les conditions de la recherche ne sont plus les mêmes chez les différents sujets et il y a la un rice de la méthode.

Un autre est que l'acidité normale, dans les conditions spéciales où s'est placé M. Joulie, n'a pas été déterminée d'une manière suffisamment exacte. Il y a vraiment trop d'hypoacides et l'état normal paraît être tout à fait exception-nal. Cela donne à penser que le chiffre considéré comme normal par M. Joulie est trop élevé.

L'argument que le bon effet de la thérapeutique par l'acide phosphorique est une démonstration de l'insuffisance d'acidité des sujets traités ne me semble pas démonstratif. Cet acide peut agir par un tout autre mécanisme qu'en relevant l'acidité. M. Cantru obtient, nous dit-il, la disparition de la glycosurie diabétique par l'acide phosphorique; or sa disparition par les alcalins est un fait d'observaton presque quotidienne. La même arguméntation nous ferait douc conclure chez les mêmes malades à l'hypo et à l'hyperacidité.

Comme conclusion, il y a, dans les recherches qui nous sont présentées, un grand nombre d'inconnues et il scrait prudent actuellement de se contenter d'enregistrer les résultats thérapeutiques obtenus et d'attendre pour édifier des théories de pouvoir les étayer sur des faits plus nombreux et plus démonstratifs.

MM. Le Gendre et Barbier présentent également quelques observations sur la même question et l'on passo à l'ordre du jour. (Le secrétaire n'ayant pas reçu les notes précédentes n'a pu les insérer.)

Communications.

Le sulfate de quinine dans la thérapeutique utérine.

Par M. Paul Dalcuk.

1

Au cours d'une précédente séanee, M. Huchard, parlant du sulfate de quinine, vous a signalé les propriétés hémostatiques de ce médicament, et a insisté sur les indications de son emploi contre les hémorrhagies utérines.

Guéneau de Mussy recommandait le sulfate de quinine dans le traitement des métrorrhagies en deliors de toute infection malarienne, et c'est bien ainsi que l'entend M. Huchard.

Tout récemment, Lancereaux est revenu sur ee sujet à propos des hémorrhagies névropathiques, et pour lui eneore la quinine, dans ce cas, demeure le remède de choix.

Mais avant ces auteurs, et depuis longtemps, la quinine était employée en pathologie utérine; Tilt, Sandras, et d'autres, en ont usé fréquenment, Delioux de Savignac, surtout, est revenu à plusiours reprises sur ce point de thérapeutique en ses écrits (Bulletin de Thérapeutique, 1871. — Dietionnaire de Dechambre).

J'emploie le met de pathologie utérine à dessein, car nous voyons le reméde tour à tour préconisé contre les métrorrhagies, contre l'aménorrhée, la dysménorrhée, en obstétrique à propos des accouchements, et en usage externe contre la leucorrhée.

Les opinions les plus contradictoires sont émises sur son efficacité. Delioux de Savignac - fait surfout des réserves au sujet de la métrorrhagie, lorsqu'il est si bien acquis que le sulfate de quinine est susceptible de la produire, et de déterminer d'autres genres d'hémorrhagies. - Sandras, traitant - une d'spunion-rhécique par le sulfate de quinine à haute dose, fut obligé de renoneer, parce que l'écoulement menstruel devenait si abondant qu'il fallut donner l'ergot de seigle ». Tout récemment dans le Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques, je relève l'opinion du D' Dampeiron (Egypto) qui défend systèmatiquoment la quinine durant la période des règles, parce qu'il a vu des hémorrhagies effroyables, mortelles mêmes, dues à l'administration de co médicament pendant cette période.

L'accord no semble done pas fait. Pour ma part, je donne parfois volontiers do la quinine en thérapeutique gynécologique, et, si vous me lo permettez, nous pouvons envisager deux points:

- A. Dans quels eas sommos-nous autorisés à prescrire de la quinino ?
 - B. Comment et à quelles doses ?

II

Je ne parlerai point iei de l'emploi de la quinine en obstétrique ni de son usage externe dans le traitement de la leucorrhée.

Métrorrhagies. — La quinine me paraît surtout indiquée eontro les métrorrhagies d'origine fluxionnaire.

Trousseau et Pidoux ont écrit: « Dans la ménorrhagie qui ne dépend pas de quelque madalie organique de l'utérus, le quinquina en poudre, donné deux ou trois fois dans l'intervalle des régles, tempère très efficacement l'hémorrhagie. « En dehors de toute affection de la marice, la quinne, judieux-sement presertie, mo semble bonne contre certaines pertes, non soulement lorsque ees pertes surviennent dans l'intervalle des règles (intervrhagies), mais au cours de règles par trop profuses (ménorrhagies).

Cet élément fluxionnaire, nous le trouvons quelquefois à l'époque do la puberté, très souvent au moment de la ménopause. Durant la vie génitale, nous le constatons chez des prédisposées, des diathésiques, chez ces femmes qui font des hémorrhagies névropathiques, comme les appello M. Lancoreaux, et qui appartiennent à la classe des nerveuses, dos arthritiques, des herpétiques, des gouteuses, des rhumatisantes chroniques, etc., etc. Dans d'autres cas, la fluxion qui se porte sur l'utérus relève de troubles qui siègent sur divers organes, hémorrhoides, accidents dyspeptiques on hépatiques, la malade est une fausse nitérine, et quelquefois alors, mais pas tonjours, la perte devient susceptible de subir une heureuse modification par la quinine.

S'il existo une lésion de la matrice, lo reméde conserve beaucoup moins d'efficacité; ce que nous savons en physiologie thérapentique de l'action des sels do quinine sur les capillaires et le muscle utérin explique cette différence sans qu'il nous soit besoin d'insister.

Mais, ne l'oublions pas, un élément fluxionnaire peut se greffer sur une maladie de la matrico, poussée congestive sur une métrite chronique, à la ménopause par exemple, et la quinine reprend quelques avantages. Les états pathologiques sont loin de toujours se présenter à nous d'une façon nette, tranchée, iselée.

Oysménorrhée. — Si la quinine tempére la poussée fluxionnaire qui se porte sur les organos génitaux de la femme, il en résulte qu'elle doit étre utile contre certaines dysménorrhées congostives, contre cortaines douleurs menstruelles qui relèvent d'une hyperémie trop brusque et trop violente

système utére-ovarien. La dysménorrhée accempagne assez souvent l'éruption d'un flux cataménial abondant.

Chex de nombreuses malades, au contraire, les douleurs d'origine neustruolles resortissent à des névralgies; c'est là un fait que l'ou a pus assex mis en relief. Dans la périodo intercalaire, la femme conservo des points de névralgie lombe-abdominale, plus ou moins sensibles, au niveau de le région ovarienne, de la ligne blanche, de la grande levre, de Porifice du canal inguinal, de l'épine et de la créte illiaques;

arrive une époque de règles, la souffrance s'exaspère au point d'atteindre les plus violents paroxysmes, et endolorit toute la règion. J'ai vu de malheureuses névropathes absolument martyrisées par cette exaspération périodique d'une névralgie qui ne disparaît jamais complétement dans l'intervalle des mois. Dans ces cas, la quinine reste encore indiquée, réussit et échoue tour à tour comme tous les médicaments en pareillo circonstance. Du reste, je ne conseillerai jamais alors d'avoir recours isolément à la seule quinine, au moins contre la dysménorrhée enn paludique.

Aménorrhée. — Enfin, ee médicament est-il un emménagogue, comme on l'a prétendu? Parce que des préparations de quinquina ont ramené les règles ehez des chlorotiques, cela ne me semble pas suffisant pour attribuer à la quinine des propriétés emménagognes; elle ne serait, d'ailleurs, qu'un emménagogue indirect comme tous les toniques.

Cependant, son action qui réveille la contractilité de l'utérus et des vaisseaux utéro-ovariens pourrait bien stimuler un appareil génital, une ovulation paresseux ou endormis. On ne court aucun péril à l'essayer.

ш

Jamais je n'ai observé les aecidents qui ont effrayé Sandras, Delioux de Saviguac et d'autres auteurs; eependant, bien loin de les nier, il est bon de se rappeler que l'emploi de quinine a paru dangereux à quelques médecins, au moins pou. en suspendre la preseription si la perte, au lieu de s'atténuer, s'exaspérait d'une façon manifeste.

Souvent le sulfate de quinine est ordonné, seul, à la dose de 0sr,50 à 1sr,50. Il a fourni, de la sorte, d'excellents résultats à Lancereaux, à Gueneau de Musy, à M. Huchard, etc.

Je ne dirai pas eomme Dolioux do Savignae: « Puisque nous avons des hémostatiques plus ecrtains, il est d'un médioere intérêt pour la pratique d'insister sous ce rapport. » Mais très volontiers j'associe le sulfate de quinine à de fidèles auxiliaires, la digitale, l'ergotine, ensomble ou séparément. Pignore si, comme je l'ai eutondu direà certains domes maîtres, la combinaison de plusieurs médicaments, dans des circonstances données, les rend plus actifs à des doses relativoment plus faibles, mais il me parait indiscutable que l'association du sulfate de quinine, à l'ergotine et à la digitale, par exomple, devient fort utile dans la médication hémostatique. Cela n'est pas pour nior les propriétés du sulfate de quinine isolé, bien au centraîre.

Classification des dyspepsies et chimisme de l'estomac. Par M. Frémont

La note que j'ai présentée à la Société de thérapeutique le 23 mai visait un double but : 1º faire cessor une erreur, si possible, erreur qui fait tort à la science en arrétant ses progrès depuis trop longtemps; 2º proposer une classification des dyspepsies plus simple. Car il existe au moins une classification si compliquée que des hommes très instruits, s'occupant de l'estomas avec suces, on treuoneé à la comprendre.

La discussion qui s'en est suivie fut des plus intérresantes par le savoir de ceux qui y prirent part. Cependant, pour uno raison ou pour une autre, personue n'a voulu vérifier si, oui on non, oe que j'avançais était exact; c'est-4 dire, si ce qu'on désigno sous le nom de C, acide chlorhydrique combiné, est di simplement à une action chimique ou à une action digestre. Cette vérification aurait permis de mieux saisir ma pensée; le point de départ devenant commun, on serait sans doute arrivé à la môme conclusion. On anrait compris que je no niais ni l'importance du C, ni celle de la chlorhydrie; que jo voulais seuloment faire attribuor au C une valeur plus exacte.

Dans eette discussion, plusieurs appréciations m'ont parues dignes d'attontion. Elles m'ont démontré que j'avais eu tort do ne pas rappeler certaines idées que J'avais traitées jadis à diverses reprises. Jo vais donc vous les énoncer en quelques lignes pour établir d'une façon évidente que, loin de les ignorer, ainsi qu'on a paru une le reprocher, J'avais été un des promiers, parfois même lo premier, à en affirmer et à en propager l'importance.

UTILITÈ DE L'ANALYSE DU SUC GASTRIQUE

Le 29 avril 1892, j'ai soumis à la Société médicale des hôpitaux de Paris un mémoire intitulé : « Analyse du sue gastrique. Variations du chimisme d'un estomac ». Dès cette époque, j'ai écrit : « L'analyse du suc gastrique, avec toutes les particularités quo j'ai signalées, ne demando pas plus d'une demi-heuro de travail; c'est dire que le moyen est à la portée de tous les médecins qui voudront bien se donner la peine de l'apprendre. Or, je penso que ce moven est aussi précieux pour le diagnostic de certaines maladies de l'estomac que la constatation de la tumeur ou de l'hématémèse : mais comme ees deux signes, il ne suffit pas à faire la certitude sur la nature de la maladie stomacale. Cependant, l'analyse bien interprétée, éclaire toujours le médecin et, assez souvent, fait la lumière d'une manière absoluc. Pour seigner les maladies de l'ostomac, il ne suffit pas de savoir faire une analyse de suc gastrique; il faut être un médecin très instruit et de jugement droit; tenir compte des antécédents héréditaires du malade, du milieu dans lequel il a vécu, de la manière dont il s'est alimenté, des maladies qu'il a éprouvées, etc. Tout cela est indispensable; l'analyse du suc gastrique n'est qu'un moyen do plus d'arriver au diagnostic. Non seulement elle renseigne le médecin sur la nature de la maladie; mais elle lui est encore un guide précieux dans les meyens thérapeutiques qu'il doit employer pour traiter les malades. »

Depuis cotte époque, je n'ai cessé de m'occuper de l'estomac et tout ce que j'ai publié a confirmé l'utilité de l'analyse du sue gastrique.

PERFECTIONNEMENT DE LA TECHNIQUE : ASPIRATION DU SUC AU LIEU D'EXPRESSION

Au début, M. Winter retirait le suc gastriquo par expression en appuyant sur l'estomac du malade, des que la sonde avait été introduite. J'ai supprimé ce moyen, désagréable pour le patient et pour l'opérateur.

Désagréable pour le patient, car il est tout à fait pénible de se sentir appuyer sur l'épigastre lersqu'on est déjà gèné par une sonde stomacale.

Désagréable pour l'opérateur, parce que souvent, malgré les pressions les plus énergiques, l'estomac atonique ne renvoie aucun suc.

J'ai romplacé l'expression par l'aspiration en créant mon appareil pour l'estomac (1). Cet appareil a eu la bonno fortuno de plaire rapidement; aujourd'hui, tout le monde l'emploie pour extraire lo suc gastrique.

Il se compose essentiellement d'une sende percée de trois orifices disposés de manière à éviter le pincement de la muquouse gastrique, d'un tube de verre et d'une poire en caoutelloue.

La poire étant presséo, on pinco lo tube au-dessous : l'aspiration so produit. On recommence autant de fois qu'on le juge utile. Par la manœuvre contraire, on peut insuffler l'estomac, on remplace la poire par un tube avec entonnoir.

Présenté à l'Académie de médecine par M. Dujardin-Beaumetz en 1891.

CLASSIFICATION DES DYSDEPSIES REPAS

En 1892, j'ai proposé le repas d'épreuve suivant :

20 grammes de blane d'œuf euit; do pain saus sel: d'eau distillée. 250

Co ropas se composo de 1/3 d'albuminoïdes et do 2/3 d'hydrocarbures comme doit l'être un repas normal; il y a done liou de penser qu'il fait travailler l'estemae dans le même sons.

Le pain et l'eau ne renferment pas de sel pour que le dosage du eblore ait toute sa signification. Enfin. l'eau est prise à la température de la chambre, ee qui évite les influences de température que présente une autre boisson souvent employée : le thé.

ACIDES DE FERMENTATIONS ORGANIQUES

Alors qu'on se contentait d'établir l'aeidité totale du suc gastrique, j'ai pris soin de doser exactement les acides organiques dus aux fermentations.

Au mois d'avril 1892, j'écrivais : « Le dosage oxact de l'acidité due aux acides organiques est un très grand progrès dans l'analyse du sue gastrique, paree que ees aeides jouent un rôle considérable dans la symptomatologie de l'ostomac. et qu'il existe assez souvent des aeides organiques autres que les acides lactique, acétique et butyrique qu'on a l'habitude do rechercher sans les doser toutefois ». A la même époque. j'avançais que les aeides de fermentation sont fréquents chez les hyperchlorhydriques, neuf fois sur dix qu'ils v sont abondants, tandis qu'ils sont rares et presque toujours peu eonsidérables ehez les hypochlorhydriques, sauf dans le eas d'obstacle mécanique ou de cancer (1).

⁽¹⁾ Dyspepsie, ses modifications par la cure de Vichy (présenté, en 1892 à l'Académie de médecine).

Cette affirmation de la fréquence des acides organiques chez les hyperchlorhydriques était absolument contraire à ce qu'on enseignait alors, parce qu'on croyait que l'acide chlorhydrique avait une actien autisentique absolue.

Peu après furent connues les belles recherches microbiologiques de M. Lesage qui vit la flore microbienne beaucoup plus riche dans le suc gastrique des hypers que dans celui des hypos.

Aujourd'iui, il me semble bien qu'en accerde l'impertance voulue aux acides de fermentatien et que l'on a reconnu l'exactitude de mon énoncé sur leur fréquence, leur abondance clez les hypers et leur rareté, leur petite quantité chez les hyons

DOSAGE EXACT

La nécessitó de doser très exactement les divers principes rencontrès dans le suc gastrique ne sauvait faire l'objet d'une discussion; c'est l'évidence même. Pour ma part, je l'ai si bien cempris que j'ai indiqué un procédé colorimétrique très exact pour doser l'acide chlorhydrique dit libre par erreur, car il est légèrement combiné et qu'on désigne encore par la lettre II. Je me suis toujeurs servir de cette méthode ou de celle de M. Winter pour doser le II. J'ai pris soin de faire des calcinations à la lampe à alcool, au meufle, au bec de bunsen, pour vérifier les pertes en chlorures produites par la calcination des matières organiques avec ces sources de chaleur : en 1892, j'ai publié les résultats obtenus dans mon mémoire sur l'antière du sue gastrique.

J'ai toujours employé la méthode d'analyse de M. A. Gautier. « Dans le suc gastrique doscr l'acidité totale At; puis le chlore total, T; évaporer, calciner; reprendre par l'eau, l'alcalinité trouvée donne la quantité d'acides organiques ». Je ne sache pas qu'on ait janais élevé la meindre objection centre la riqueur absolue de cette méthods.

IMPORTANCE DU CHIMISME DE L'ESTOMAC

Teut ce que j'ai fait, tout eo quo j'ai écrit a centribué à preuver l'impertance du chimisme de l'estemac.

Le 11 mai 1898, ici mėme, vous m'avez entendu affirmer: » Dės que la scerticia de l'estemac est dévice, exagérée ou diminuée, il y a de grandes chances pour voir le spasme pylorique entrer en jeu; d'où contractions impuissantes de l'estemac, dilatation, fermentations, etc. On peut avoir un fort mauvais chimisme de l'estomac et digérer hien parce qu'il yasques des suppléances qui peuvent étre assez parfaites pour masquer les inconvénients qui résultent de cette sécrétion stomacele viciée : mais ce n'est pas saus importance.

« L'observation ne permet pas de dire que la sécrétion de l'estomac est insignifiante au point de vue du traitement et du prenostic. Des sujots au chimisme stemacal troublé, peuvent avoir l'air bieu pertants, mais ils ne le sent pas plus que ne le sent des sujots atteints d'insuffisance mitrule ou aertique à la période de compensation. Le médecin qui veut tre utile aux dyspenţiques doit tenir compte de leur état nerveux, de la musculature de l'estomae et de leur sécrétion ».

l'ajeuto que cette impertance du chimisme de l'estemac, je l'ai preuvée cemme veut tieu le preclamer M. Mattieu par les bienfaits de la gastérine chez les hypochlorhydriques n'ayant aucun trouble moteur de l'estomac. Enfin, je creis si bien à l'impertance du chimisme de l'estomac quo j'ai étudié l'action du viu et des amers sur l'estomac isolé chez 14 animaux (I).

On a recennu avec mei que les dyspeptiques ent des variatiens du chimisme et qu'il faut accorder de l'impertance seu-

Action de quelques médicaments sur l'estomac. Congrès de médecine de Montpellier, 1898, p. 453.

lement aux chiffres nettement au-dessus ou au-dessous de la normale. Pernettez-moi d'insister sur na formule : les variations sont d'autant moins grandes que l'estomac est plus malade ». En offet, une muqueuse vraiment malade ne peut se modifier du jour au lendemain. Ainsi, dix analyses du suc gastrique d'un de nos confrères très hypochlorhydrique, faites en sept années, sout toutes semblables, à quelques miligrammes près.

Jo no puis m'expliquer comment on a eru quo jo n'accordais pas de valeur à la chlorhydric, étant donné que je propose de diviser les dyspeptiques en hypers et en hypochlorhydriques.

La chlorhydrie est d'une importance extrême.

C'est pour cette raison qu'il y a lieu de porter toute votre attention sur mon affirmation qu'un des membres de la chlorhydrie; l'acide chlorhydrique fortement combiné ou C, n'a nas la valeur que lui a attribuée M. Havem.

Pour lui « cette valeur C, mesure cu quelque sorte l'intensité de la peptonisation et donne la véritable mesure du travail utile do l'estonace. Il ne serait done pas illogique de la prendre, cu raison de son rôle prépondérant, comme base de classification. Ello représente des composés chloro-organiques qui jouent un rôle considérable dans l'appréciation de la gravité des dyspepsies. Ainsi « lo type le plus grave est celui où C est le plus netit et Il o plus grand », etc.

Eli bien, l'affirme que cela est faux, par la raison que le C se forme par une action chimique et non digestive. La preuve, je la donne évidente, facile à vérifier par tous ceux qui voudront le faire. Mettez de l'acide chlorhydrique quelconque en contact avec du jus de viande, du sang défibriné, du blanc d'out, il so forme instantamément de C, c'est-à-dire do l'acide chlorhydrique fortement combiné qui résiste à l'évaporation au bain-marie prolongée à siecité pendant une heure.

Loin do prétendro que cette nouvelle façon de comprendro

la formation de l'acide chlorhydrique fortement combiné C lui enlève toute signification, je pense, au contraire, qu'elle doit modifier nos idées sur sa valeur.

A coup sûr, elle ne mesure pas le travail utile de l'estomac; mais, par exemple, nous comprenons son abondance lors de stase, d'hémorragie stomacale, etc. Il y aurait lieu de chercher quelles sont les nouvelles interprétations que nous devons attribuer aux variations de C maintenant que nous eonnaissons mieux sa formation. Mais cela m'entrainerait' trop loin; ce sera du reste le travail de tous les chercheurs. Actuellement, ce qui est important, c'est de décider si oui ou non la preuvo que je donne de la formation chimiquo du C est juste. Le silence de ceux qui croient avoir intérêt à prouver le contraire ne suffit pas à décider si j'ai raison ; il faut que la société de thérapeutique le disc. Ainsi que l'a déclaré si justement M. Mathieu, la thérapeutique dérive de nos idées théoriques. Je proposo donc que M. le Président nommo une Commission qui sera chargée de dire ceci : l'acide chlorhydrique quelconque mis en contact avec une substance albuminoïde formo-t-il du C, e'est-à-dire se combine-t-il de manière à résister à l'évaporation à 100°? oui ou non.

Chaeun de vous pourra ensuite tirer de cette nouvelle notion les conclusions qu'il jugera bon.

Messieurs, Jai été obligé de vous rappeler que j'ai contribué à l'étude des dyspepsies par mon appareil pour l'estomae qui a substitué l'aspiration à l'expression, par mon repas d'épreuve qui a la proportion d'un repas normal, par l'exeditude de mes dosages, par mes expériences sur l'estomae humáin, puis sur les estomaes isolés des animaux, par la démonstration de l'utilité do la gastérine dans l'hypochlorhydrio. Dans quelques jours, J'aurai l'honneur de vous soumettre mes recherches sur la digestion de l'eau tiéde, chaude, froide, sur la digestion du houillon, sur l'action du bieurbonate de soude. Enfin, je vous dirai un mot des soi-disant gastrites médica-

menteuses en vous parlant de l'action du bromhydrate de quinine.

Cotto énumération, jo vous l'ai faite, pour vous prouver que jo m'intéresso passionnément à toutes les choses de l'estomac.

J'ai cru dovoir vous signaler qu'en so trompait sur la valour C du sue gastrique, parco que je suis convaincu que cetto erreur entraine des conséquences fâcheuses qui nous retardent dans notro marche vors le but commun. la vérité.

Élections

M. Cadiot, professeur à l'Ecole vétérinaire d'Alfort, est nommé membre titulaire dans la section des vétérinaires (Unanimité des présents).

M. Ernet Labbée est nommé membro honorairo à mains levées.

M. Barbary, do Nice, est nommé correspondant national. Etaient présonts à la séance :

Titulaires. — MM. Barbior, Bardet, Benjamin, Boymond, Bologuesi, Brun, Catillon, Cautru, Champigny, Courtade, Crée, quy, Crinon, Dalché, de Crésantigues, Deldego, Déssengues, Desnos, Dignat, Duchesno, Gallois, Huchard, Joanin, Josias, Lo Geudre, Lépinois, Loreddo, Moreigne, Mouquet, Musolier, Patoin, Pouchot, Sevostre, Soupault, Triboliet, Vogt.

Correspondants. — MM. Bouloumié, Dubois, Duhourcau, Linossier, Schmitt.

La Société se constituo en Assemblée générale de fin d'annéo, conformément aux statuts.

La séance est levée à 5 heures trois quarts

Le Secrétaire, Vogt.

PEVUE DES TRAVAUX FRANÇAIS ET ÉTRANGERS

Gynécologie.

Les vægetations chez les femmes enceintes, — On a discuté bien souvent la question de l'opportunité d'opferer les végétations chez les femmes enceintes, et les opinions ont été longtemps fort partagées Actuelloment copendant, en présouce des succès obtonus dans les grandes opérations abdominales, comme l'ablation des ovaires pendant la grossesso, on est fixé sur l'innocuité de cette intervontion qui peut devenir une nécessité. M. le D' Lefer, qui vient d'étudier cette question dans sa thèse, nontre que, udépendamment des mulliples inconvénients que présentent les végétations pour la femme enceinte, l'enfant peut souffrir aussi beaucoup de leur persistance.

Les accidents les plus graves peuvent être causés par les végétations qui siègent dans le vagin ou sur le col de l'utérus; or cellesci ne sont le plus souvont que consécutives aux végétations vulvaires, et c'est là que la grossesso joue un rôle prépondérant en amenant la confluence et l'augmentation de volume des végétations.

La grossesse, en effet, tend à hypertrophior tous les tissus de l'organtisme, mais principalemont cux qui occupent la zone génitale: elle hypertrophio non sculement les tissus sains, mais atussi les tissus pathologiques; les réseaux veinoux de la vulve et du vagin subissont un accroissement considérable, le volume des fibromes utérins est triplé et quadruplé, les tumours érectiles et en général tous les néo-plasmes subissent une hypertrophie quelquefois extraordinaire.

Aussi faut-il intervenir : les topiques penvent suffire, mais le plus souvent il faut intervenir ehirurgicalement. L'exesion avec les ciseaux courbes suivie d'une cautérisation au nitrate d'argent pour arrêter le sang et d'un pansement occlusif est le moyen le plus simple à employer; mais il est fort douloureux et il est nécessaire d'auesthésier les malades avec le ehloroformo sans chercher à faire do l'anesthésie locale qui est insuffisante.

Les bains salés chauds centre les troubles de la ménause (zem. méd., juin 1900). — D'après M. le doctour Gotschalk, privatdocent de gynécologie à la Faculté de médecine de Berlin, les bains salés à la température de 40º environ, d'une durée de vingt minutes et administrés chaque soir au moment du couclier, constitueraient un excellent moyen pour combattre les bouffées de chaleur ot les transpirations nocturnes dout souffrent beaucoup de femmes à l'occasion de la ménopause naturelle eu onératoire.

Dans les observations de notre confrère, les effets favorables de la balnéation chaude — qui, en dilatant les vaisseaux périphériques, abaisso la pression sanguine, toujours augmentée peudant quelquo temps après la suppression des règles — so sont généralement manifestés au bout d'une semaine, et vingt-six ou virget-luit bains ont suffi pour faire cesser définitivement tous les troubles. Nombre de patientes, guéries de la sorte, avaient été sounises antérieurement à l'opothérapie ovarienne sans le moindre résultat.

L'hypodermoelyse ferrique dans le traitement de l'aménorrhée. — C'est, en réalité, l'injection sous-eutanée de sérum physiologique contenant un sel ferrique.

M. Henrotay (d'Anvers) après plusieurs essais s'arrète au glyérophosphate de fer qui donne une solution l'impide; quant au chlorure sodique, il utilise des comprimés de 3 grammes nour 500 d'eau et 1 gramme du sel ferrique. L'endroit choisi pour l'injection est le tissu cellulaire sous le scin. On ajoute de 250 à 350 grammes de solution une fois par semaine.

Dans deux cas ainsi traités, après quelques mois, le résultat fut merveilleux. L'avenir nous réserve de faire connaître la part qui rovient au sérum et celle du fcr.

La manœuvre de Bounaire dans la dystoele par rigidité anatomique du cel. — Dans un cas de dystoele par rigidité anatomique du cel, chez une primipare de trente aus, infectée, en travail depuis trois jours, avec poche des eaux rompue et tête engagée en occipito-liaque droite postérieure, M. Chaleix (de Bordoaux), afin de terminer rapidement l'accouchement, procéda de la facon suivante.

La patiente une fois anesthésiée et mise dans la position obstétricale, M. Chaleix pratiqua un lavage vulçaire et vaginal soigneux avec une solution de permanganate de potasse à 1 p. 1000, préférant en raison de l'état de faitgue de la parturiente cet antispetique aux sels hydrargyriques. Puis is unit en devoir d'obtenir une dilatation suffisante du col par application patiente de la maneuevre de Bonnaire.

Plaçant à la fois dans le col l'index et le médius droit et gauche, il fi jouer à ces quatre doigts adossés par la face dors sale, le rolte de pince dilatrice. Peu à peu ces doigts furen rejoints par los annulaires et les auriculaires. Mais cotto manœuvro devenant faitgante, M. Clalacix compléta la dilatation en introduisant profondément dans le cel sa main droite tout entière, sauf le pouce, et lui imprima des mouvements prolongés de circumduction. Il obtint ainsi, au bout d'une deui-heure, uno dilatation compléte et termina l'accouchement par une application de forcepa.

M. Chaleix estime qu'en pareille circonstance la manouvre de Bonnairo est bion supérieuro aux dilatateurs, aux ballons et surtout aux incisions de Dübrssen.

Médecine générale.

Emploi des vibrations musicales avant et après le sommeil (J. Léonard Corning, Revue internationale d'électrothérapie, 1899, p. 210). - La musique a toujours été considérée, même par les anciens, comme un moyen de traiter les désordres du système nerveux. Elle erée en nous des dispositions dépendant de l'état organique, des états émotifs, sur lesquels l'intelligence brode à plaisir suivant les dispositions individuelles. A l'état do veille, les idées fixes, mélancoliques ou hypocondriaques empéchent les malados do subir l'influenco des mélodies tristes ou gaies. L'auteur eut l'idéo d'exposer les malades à l'influence des impressions musicales pondant leur sommoil ou dans la périodo qui le précède, pensant, qu'en l'absence de la pleine conscience, l'esprit serait plus ouvert à la puissance suggestive des impressions, et que, d'autre part, les vibrations communiquées au cerveau par l'intermédiaire de l'appareil acoustique pourraient avoir un but thérapeutique agissant comme un appareil vibratoire.

Pour mettre ces idées en pratique, il fit construire un capuchon accoustique, qui envelope la tête du malade, et qui est en communication avec un phonographe Édison. Le malade, coiffé du capuelon, est couché, et la tendance au sommeil est provoquée chez lui, soit par de légers hypnotiques, soit par la fixation d'un objet brillant tournant rapidement.

L'autour a constató les plus houroux offets de ces vibrations musicales pendant le sommeil sur des personnes atteintos d'atonio physique et mentale : la dépression matinale, les maux de tóto ne dépendant que d'un désordre physique disparaissent rapidement.

L'harmonie est plus effective que la mélodie pour le traitement vibratoire; certaines compositions de Wagner sont excellentes.

Quand les vibrations musicales sont employées pendant l'état de veille qui précède le sommeil, l'auteur y associe des images chromatoscopiques. Le malade, couché sur le dos, coiffé du bonnet acoustique, voit projetées sur un écran placé au piod de sou lit des images dont les fornics, toujours changeantes et la beauté capricieuse retiennent son attention avec un enchantement ineffable.

Sous l'influence de ces impressions auditives et optiques associées, le découragement perd son acuité, les souvenirs s'éveillent spontanément, les idées mélancoliques disparaissent.

Maladies du cœur et des voies respiratoires.

Traitement des hémoptysies par l'ean exygénec ($Gaz.des h\phi p$., juillet 1900). — M. André Jousset, interne des hopitaux, a eu l'occasion d'observer dans, le service de son maître, M. Chauffard, un malade atteint d'hémoptysies abondantes et robelles à tous les traitements classiques, qui fat traité avec un plein succès par les injections intrapulmonaires d'eau oxygénée. Chez ce malade, jeune homme d'une vingtume d'années atteint d'une tuberculose à forme congestive et de date récente, nettement localisée au sommet d'roit, on employa successivement, et sans tari ni même amender l'hémoptysie, l'ergotine, l'ipéca, l'acide gallique, le taunin en y combinant la réfrigération externe et les injections sous-cutanées de gélatine.

En présence des dangers imminents d'une syncope, le malade étant presque complètement exsangue, M. Jousset se décida à employer l'eau oxygénée, dont l'application était facilitée par la localisation précise du foyer de l'hémorragie. Il fit done dans le deuxième espace intercostal droit, un peu en dedans de la verticale mamelonnaire et à 3 centimétres de profondeur, une injection intraparenchymateuse d'un centimètre cube d'eau oxygénée à 12 volumes. L'hijection poussée très lentement à l'aide d'une longue aiguille capillaire fut bien supportée. Doux minutes après, le malade accusa une légére brêlure qui cossa rapidement. L'hémoptysie

tomba de 200 grammes, moyenne quotidienne, à quelques crachats sanguinolents et s'arrêta définitivement le surlendemain, après une deuxième injection réclamée par le malade.

Outre l'intérêt thérapeutique présenté par cette intervention, il est bon de signaler les modifications anatomiques qu'elle occasionne : les râles humides disparurent pour faire place à un souffie intense dépendant vraisemblablement d'induration tuberculeuse, comme aussi de sclerose pulmonaire cette dérnière interprétation justifiée par des constatations expérimentales faites par l'auteur sur des animaux. L'eau expérimentales faites par l'auteur sur des animaux. L'eau expérimentale faites par l'auteur sur des animaux. L'eau expérimentale faites par l'auteur sur des animaux au sur l'auteur de l'a

Saus croire que cette méthode soit susceptible d'une application bieu couranté, M. Jousset estime qu'elle pourra s'adapter à certains cas médicaux exceptionnels eû l'origine de l'hémorragie sera possible à préciser et surtout peut-étre dans les hémotysies chirurgicales.

Maladies du tube digestif.

L'élixir de Stoughton dans la dyspepsie hypochlorydrique.

— M. Liégeois attire l'attention sur une ancienne préparation datant du xvm* siècle, et connue sous le nom d'élixir de Stoughton, dont vaici la formule :

Sommités riches d'absinthe

Chamaledris	àà 25 grammes.
Aloés du Cap Ecorce de cascarille Alcool à 60°	àà 5 grammes. 1.000 grammes.

Cot élixir est donc une teinture à la fois d'amers purs et d'amers aromatiques, et sa composition explique pourquoi il donne de bons résultats dans la dyspepsie hypochlorhydrique des chlorotiques aménorrhéiques ou leucorrhéiques, dans la dyspepsie de la convalescence des maladies aigués, dans la dyspensie hypocquique des neurasthéniques. L'élixir de Stoughton se preservit à la doss d'excitation gastrique : une cullière à cafe une demi-heure avant le d'ipque, le dinor et le souper, ou une cuiller à dessert une demiheure avant le repas de midi et du soir. Après cinq ou six jours, on cosse deux ou trois jours et l'on reprend la mixture. Il faut alterner avec les légères dosse de bicarbonate de soude avant les repses ou d'acide muritatique après.

Les adeuspathies errice-faciales d'origine dentaire. (Mainguy, Gaz. Med., de Nantes, 28 avril 1900.) — Parril les désordres de voisinage que sont susceptibles de produire les affections du système dentaire, il faut compter les adénites de la face et du cou. L'étologie de ces fésions est trop souvent méconnue par les médocins et rattachée par cux à une maldic générale ou autre. Il est de la plus grande importance d'examiner toujours et très soigneusement l'état de la cavité buccale et du système dentaire en particulier, car un diagnostic rapide et une intervention précoce éviterout certainement aux malades des cientrices indélébiles, et peut-être, dans les cas d'origine tuberreuleuse, la généralisation de l'infection. Si l'adénopathic est de date récente, deux cas se présentent : dans le premier, la suppuration ne s'est pas faite à

ton tanempanne est te date recent, teats as se presentent : dans le premier, la suppuration no s'est pas finite à l'extérieur, et alors les accidents disparaitront rapidement à la suite de l'interveution buccale et suns laisere de trace; dans le second, la lésion a complété son évolution, le pus s'est ouvert une voie à l'extérieur, l'intervention ici amènera la rétrocession des accidents, unais il persistera une cicatrice indétébile. Enfin, lorsque l'adémopathio est de date déjà ancienne, une ou plusieurs années, non suppurée et sans réaction, il sera souvent nécessaire de faire porter le truitement, à la fois sur la cause et sur l'effet en joignant au traitemont buccal le curettare du ranziloft.

Le riz dans l'alimentation des sujets porteurs d'ulcère de l'estomae Bourget (Sem. Méd., juillet 1900). — Nourrir le malade sansirriter la plaie gastrique, telle est l'indication capitale du traitement de l'uleère de l'estomae, et e'est au régime lacté absolu qu'on a d'ordinaire recours pour la remplir. Or, d'après M. le docteur L. Bourget, professeur de clinique médicale à la Faculté de médecine de Lausanne, le lait est loin d'être l'aliment idéal dans l'affection dont il s'agit, bien qu'il calme pour quelques instants la douleur. Il est vrai qu'en diluant le suc gastrique, il en diminue l'acidité; mais ce résultat est si passager que trois ou quatre heures après l'ingostion de lait, lo contenu stomaçal renfermo de 0.4 à 0.50/0 d'acide chlorhydrique libre. En outre, pour peu qu'il existe du spasme du pylore, lo lait devient la cause de fermentations gastriques. Enfin, chez les sujets soumis au régime lacté exclusif, l'estomae ne contient pas de substances protéiques en quantité suffisante pour neutraliser l'acide chlorhydrique libre, qui vient alors irriter la muquouse.

Co dernier fait, que M. Bourget a pu vérifier maintes fois, a déterminé notre confrère à substituer au régime lacté absolu l'alimentation par le riz euit au lait, pendant toute la durée de la période aiguê de l'affection.

Voici comment il conseille de préparer l'aliment en question :

On fait bouillir durant plusieurs heures 50 grammes de riz dans un litre de lait, puis on laisse lo mélange au bain-marie jusqu'à ce qu'il prenne la consistance d'une bouillie épaisse. On obtient de la sorte une préparation très nourrissante, qui n'irrite pas l'estomac et qui neutralise faeilement l'acide ehlorhydrique libre sans séjourner trop longtemps dans la cavité gastrique. Cette bouillie ne doit contenir, au début, ni sel, ni suere; mais on peut la suerer ou la saler, suivant le goût du malade, des que la cicatrisation de l'ulcère paraît assurée.

L'Administrateur-Gérant: O. DOIN.



A la Société médicale des hôpitaux, M. Lamy rapporte une observation très euricuse où l'on a le syndrome migraine ophtatmophégique comme première manifestation dans un cas de syphilis cérebrale. Le traitement spécifique eut un succès complet et rapide. Les faits de ce genro ne sont pas communs; mais on les connaît. Ils rentront dans les fausses migraines périodiques décrites par Ballot, symptomatiques de lésions cérébrales on ménincées.

M. Letulle a observé récomment un eas d'angine de Vincent répondant à la description qu'en a donnée ce dernier. Chez co, malade, il existait en même temps une stomatite ul céro-menbraneuse. L'examen bactériologique démontra au niveau de la stomatite commo au niveau de l'amygdalite la présence du bacille-fusiforme et des spirilles de Vincont. Ces deux germes ne sont done pas exclusifs à l'amygdalite d'autant que M. Lotulle les a renecontrés dans d'autres affections méreruses ; de plus, le bacille fusiforme de Vincent s'est montré mobile, contrairement à ce qu'avait affirée éet auteur

M. Wiener (de Vienne) signale à la Société de biologie l'action antimicrobienne du sérant des animaux truités par l'arsenie et la créosote. Le sérum ratiré dans le cours du traitement s'est montré préventif et curaiff vis-à-vis des diverses infections microbiennes. Son pouvoir bactéricide disparaît par le chandiage à 55°, mais l'action immunisante persiste. Il est probable que les substances médicamenteuses ne font ici qu'exagérer la production des substances protectrices que l'organisme fabrique normaliement.

34 BULLETIN

A propos d'une observation adressée à la Société de chirurgie par M. Letoux (de Vannes), ainsi initiale: Inondation périlonéale par rupture de grossesse extra utérine probable, M. Tuffier repousse l'idéed une grossese tubaire, pour admettre la simple rupture d'un follieule de Graaf et c'est là précisément, selon lui, ee qui fait surtout l'intérêt de cette observation. La malade était une femme de vingt-quatre ans pour laquelle M. Letoux fut appélé vingt heures après le début de coliques violentes. La laparotomie fit découvrir un épanchement considérable de sang dans le péritoine. L'utérus et les annexes gauches ne présentaient rien d'anormal. Par courte, l'ovaire droit étant largement déchiré constituit incontestablement la source de l'hémorrhagie: les annexes de ce cété ayant été ellevés, la malade guérit.

M. Chapot-Prevost (de Rio-de-Janeiro) communique un procédé d'hémostase da foie auquel il a eu recours dans la séparation du monstre thoraco-xiphopage qu'il a récemment prèsenté à l'Académie. Il consiste dans la transfixion du foie et des deux lèvres de l'incision abdominale par une série de doubles fils de grosse soie serrès et noués au niveau des téguments sur des bourdonnats de gaze. On peut passer autant de fils qu'il est nécessaire pour assurer l'hémostase dans foute l'étendue du tissu hépatique sectionné. Ce procédé, tout comme les sutures enclevillées, est indiqué dans les cas de moignous épais, vasculaires et friable.

M. Pauchet (d'Amiens), dans un cas de fistule stercorale se trouvant dans l'impossibilité ou du moins jugeant daugereux de décoller les adhérences voisines de l'orifice fistuleux intestinal pour pratiquer l'avirennent et l'oblitération directe de cet orifice, prit le parti d'inciser l'ausse intestinale voisine et de suturer bord à bord estte ineision à l'orifice fistuleux. Le suces de l'opération fut parfait.

M. Chaput a procédé à l'extraction au bout de sept ans d'une compresse de gaze oubliée dans le ventre et passée dans l'intestin. Cette compresse avait servi à pratiquer un tamponneVariété 35

ment abdominal pour combattre une hémorrhagie. Ce fait de migration, dans l'intestiu, d'une compresse oubliée dans la cavité abdominale n'est pa unique; il en existe plusieurs autres dans la science qui tous a'expliquent par pé-étration consécutive à la compression et à l'ulcération des tuniques intestinales.

A la Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux. M. Fromaget présente une malade agée de cinquante ans qui, pour un raste épithélioma de la face ayant envalui les deux paupières, l'œil et l'orbite, la partie supérieure de la joue et la base du nez, onérée deux fois sans succès, a été traitée par la pâte arsénicale à 1/15. Il a été fait einq applications successives, a quinze jours d'intervalle, de cette pâte et chaque fois des tissus nécrosés, après une violente réaction, se sont éliminés. A la suite de ce traitement, l'orbite s'est comblée et une peau superbe en ferme l'entrée. Les fosses nasales ouvertes à la suite de la elute des os de la base du nez sont entourées. par une peau absolument souple qui ne présente pas la moindre induration. La réparation continue, elle sera bientôt totale et s'il est nécessaire de combler une brêche, au niveau de la base du nez, par exemple, une autoplastie sera des plus faciles. En présence d'un pareil succès, M. Fromaget estime qu'à l'heure actuelle, on ne devrait avoir recours au traitement chirurgica qu'aprés insuccès du traitement médical.

VARIÉTÉ

L'histoire de la goutte et du rhumatisme à propos du livre de M. Armand Delpeuch.

Par M. Albert Robin

On ne s'est guère occupé dans les trente dernières années de l'histoire de la médecine. Mais, récemment, le magnifique 36 VARIÉTÉ

ouvrage consacré par Nicaiso à Guy de Chauliac et celui do M. Triaire sur Récamier ont commencé la réaction contre ce systématique abandon de la médecine du passé.

systemanque abandon de la medecine du passe.

Lo très remarquablo ouvrage quo M. Armand Delpeuch,
médecin de l'hôpital Cochin, vient d'écriro sur l'histoire de la
zoutte et du rhumatisme arrivo donc bien à son houre,

La médecino contemporaine a fait presquo table rase de tout le passé; elle no tient aucun compte des vérités indiscutables qui out été acquises par une séculaire observation, et c'est pour cela que, dans la théorie comme dans la pratique, on voit d'incessants retours à des erroments condanués par l'expérience et la résurrection de vicilles idées oubliées dont on fait attant de nouveautés.

M. Armand Delpeucla a bien raison de dire quo de toutes los scionces la médocine est celle qui est le plus oubliouse de son passé et où l'on a le plus d'injustice pour les devanciers. Elle a hâte de considèrer commo définitifs des rèsultats dont ello escompte d'avance les bienfaits et de rejeter les tentatives qui n'ont pas immédiatement réalisé ses espérances. Son histoire est pleine d'engouements suivis de déceptions.

Quand on songe à l'énorme chaos des travaux hàtifs qui encombrent les publications médicales et celles des sociétés avantes à notre époque et qu'on voit combien peu il reste de tout cela après quelques années, sinon quelques mois, on so prend à regretter l'esprit patient et un peu lent de nos anciens.

Lo livre de M. Armand Delpouch montre la solidarité qui lio la médicine d'aujourd'hia avec celle de nos ancétres les plus lointains et les plus humbles. Qu'il s'agisso de théorie ou de pratique, notre époque n'a pas inventé grand'chose : les mots ont claugé, voilà tout.

Le régimo et la prophylaxie de la goutte n'ent pas beaucoup varié dopuis l'école hippocratique; quant à la thérapeutique, elle est aussi insuffisante aujourd'hui qu'au temps des Asclépiades, car, comme le dit parfaitement M. Armand variété 37

Delpeuch : « la goutte est une maladie sociale plus encore qu'individuelle; à ce titre, elle échappe en partie au médecin pour relever du moraliste et du législateur. »

L'ouvrage de M. Armand Delpeuch comprend 21 chapitres. Les IX premiers comprennent l'histoire de la goutte jusqu'à Galien. Les ehapitres X à XV conduisent jusqu'à Ambroise Paré, le dernier galéniste, à Paracelse avec ses maladies tartaréennes, et à la chimiatrie de Sylvius de le Boë dont les opinions constituent le chapitre XVI. Le chapitre XVII est intitulé : « Le rhumatisme avant Baillou ». Le chapitre XVIII relate les évolutions des idées de Baillou, qui emprunte le mot «rhumatisme » au vulgaire et la théorie de la maladie à Galien. Le chapitre XIX est consacré à la fin de l'humorisme et aux débuts de la période d'histoire elinique. Le chapitre XX est intitulé : « La goutte et le colchique d'automne. - Les Hermodactes ». Enfin, le chapitre XXI est une manière de conclusion. - « La médecine ancienne a fait pour la goutte plus et mieux que pour toute autre maladie; elle en a connu les origines lointaines, les causes, la marche, les retours et le terme dernier; elle en a défini avec une justesse admirable le traitement et la prophylaxie. Et pourtant elle n'a nu en arrêter, en ralentir les progrès ». Peut-on dire que notre époque ait été plus heureuse?

Il est difficile de rendre compte du livre de M. Armand Dolpeuch: c'est à la fois une ceurce de médecin et de philologue. Toutes les fois que cela était nécessaire, il est remonté aux sources et n'a pas craint de traduire directement sur le texte gree ou latin les pages dont il n'existe aueune version autorisée. Je le recommande vivement aux lecteurs du Bulletin de thérapeutique; ils auront d'abord le phaisir de lire une œuvre de haut style et de saîne philosophie, — ce qui est assez rare dans la littérature médicale contemporaine, — et puis, ils verront combien ce retour vers un passé qui ne lut pas sans gloire donne à reflechir et de quel ceprit à la fois élevé et scoptique on doit considèrer les systèmes doctri-

naux aux allures infloxibles qui ont eu et qui ont encore l'enfantino prétention de façonner à leur image les lois des évolutions morbides.

GYNÉCOLOGIE

Traitement des métrites

Par M. L. BEURNIER
Chirurgien des hôpitaux.
(Suite)

Il est de connaissance ancienne, et tous les cliniciens bons observateurs l'ont constaté depuis longtemps, que les femmes attientes de métrite sont, en général, pales, anémices, dans cette situation qu'on a qualifiée et qu'on qualifie souvent, sans plus de développements, de mauvais état général. De plus, elles sont très fréquemment atteintes de cette affection dont on a certes beaucoup abusé dans ces derniers temps, souvent pour cacher et pour déguiser certaines ignorances faciles à deviner, mais qui n'en existe pas moins très souvent, surtout chez les malades atteints d'affections chroniques et chez les convalescents : nous avons indiqué la neurasthénie. La plupart des femmes atteintes de métrite sont acaritàres, irritables, excitables; elles ont souvent des symptômes hystériformes ou même hystériques; en tout eas, elles, sont suivant l'expression vulgaire, nerveuses, et detto nervosité est incontestablement due à leur maladie, à leur métrite. Ce sont des phénomènes à ne pas oblier et à ne pas dédaigner chez les métritiques, car ils sont au moins aussi génants que les signes euxmèmes inhèrents à la métrie, et il y a lieu, par conséquent, de diriger contre eux un truitement des plus actifs.

Peui-ctre, comme le dit M. Lutaud, n'a-t-on pas, depuis la découverte et la propagation des nouvelles méthodes chirurgicales, laissé au point de vue de la thérapeutique une part assez grande à ces manifestations médicales; peuttère a-t-on été trop précoeupé de la médecine opératoire dans le traitement des métrites et l'esprit des praticiens a-t-il été presque uniquement rempli par ces idées de procèdés divers et d'interventions variées. Ce traitement opératoire est certes nécessaire; loin de nous la pensée de nier ce fait, que nous considérons comme un axiome et sur lequel nous avons assez insisté pour n'être pas suspect à ce point de vue; le chirurgien doit sans hésitation le proposer, l'instituer et l'imposer; mais il faut absolument lui adjoindre le traitement médical

On ne saurait mieux dire sur ce sujet que M. Lutand, dans les quelques lignes que nous avons citées ci-dessus, et il n'y a rien à ajouter aux préceptes si précis et si judicieux qu'il nous donne. Il faut, en effet, traiter activement dès le début l'état général et y songer de suite; il faut combattre et essayer d'enrayer immédiatement tous ees troubles connus et englobés sous le nom d'accidents réflexes provenant de l'utérus; sans quoi, après la guérison de la métrite, ect état général reste défectueux pendant une longue période de temps; et, outre que sa persistance a causé un retard dans la cure de l'affection causale, il est un obstacle absolu au retour plein et entier de la nalade à une santé parfaite. On se trouve dans une sorte de cercle vicieux, d'où on ne peut sortir qu'en dirigeant le traitement de façon à soigner en même temps l'état local et l'état grinéral.

Comme le dit fort exactement M. Lutaud, les toniques sont ici la base du traitement général. Les produits constituant ce régime ont été très audélorés pendant ces denières années. Les meilleurs que nous possédions actuellement sont les préparations de kola, de coca, de quinquina, de quinium et les glyécrophosphates. La vieille et excellente liqueur de Fowler est toujours très utilement administrée, ainsi que sa très proche parente la liqueur de Pearson.

L'hydothérapie est aussi très nécossaire, nous n'hésitons pas à dire même indispensable; mais, pour qu'elle soit réellement utile et bienfaisante, il faut avoir recours à des principes raisonnés dans son administration et ne pas prescrire cette hydrothérapie sans les plus grandes précautions, afin de l'adapter au tempérament de chaque malade. Nous disons le tempérament, car ce mot, qui paraît être et qui est en effet trie du vocabulaire des vieux auteurs, est encore bien vrai et le sera toujours, en dépit des critiques ironiques de quelques novateurs désireux de changer les vraies et justes notions de l'ancienne chinique et plus préoccupés des découvertes scientifiques que de l'intérêt de la malade et des indications de la maladie.

Il est bien certain que, si on prescrit à une famme métritique, nous pourrions presque dire à un sujet quelconque, des douches froides sans qu'elle ne soit janais auparavant soumisc à ce régime, il y a des chances pour qu'elle ne les supporte pas d'emblée. Certainement, ce serait le meilleur traitement à opposer à la défectuosité de son état général, et le praticien qui lui ordonne ce régime croît avec entière raison faire une œuvre excellente. Mais, si sa malade éprouve pendant ces douches ou à leur suite des troubles qu'elle ne peut notoirement attribuer qu'à ce traitement, des accidents dyspnéques, des phénomènes congestifs généraux ou seulement locaux du côté de sa matrice et de son bas-ventre, il est évident qu'elle renoncera de suite à cette thérapeutique, qu'on lui avait cependant aunoncé devoir être souveraine, et qu'elle se refusera désormais à faire aucune tentative dans cet ordre d'idées curatrices. Aussi faut-il procéder avec la plus extrême prudence

chez ces femmes excitables au suprême degré et influencées outre mesure par un traitement hydrothérapique un peu énergique dès l'abord.

Si elles n'ont pas encore usé de l'hydrothérapie et n'ont pas encore subi la douche froide, il fant leur ordonner la douche tiède, puis recommander d'abaisser peu à peu et très doucement, à mesure qu'on en verra la possibilité, la température de la douche jusqu'à oc qu'on arrivera à la véritable douche froide. Il est et reste bien entendu que la graduation devra être lentement progressive et que l'abaissement de la température demandera de longs jours, quelquefois même plusieurs semaines : sans quoi, on n'arrivora, au lieu du but proposé, qu'à ce résultat de provoquer chez les malades une répugnance absolue pour ce zerne de traitement.

Telle est la conduite thérapeutique qu'on doit faire suivre et cela nécessairement, à toutes les femmes atteintes de métrite chronique. Mais encore, me dira-t-on, quelle est la variété de douches que le praticien doit prescrire et qui doivent être employées?

Ici, une grande distinction est à faire. S'agit-il du traitement général à instituer contre la métrite chronique ellemême, concurrement avec le traitement local, ou de la thérapeutique consécutive à la guérison chirurgicale de la métrite? Les indications sont, dans l'un ou l'autre eas, absolument différentes.

En effet, pendant la cure chirurgicale de la métrite chronique, une des indications les plus pressantes, les plus nécessaires, les plus urgentes, celle que le chirurgien doit exiger d'une façon péremptoire et absolue, sous peine de ne pas entreprendre le traitement, est le repos complet au lit asna sueune dérogation à cette promesse. Done, pendant ce temps, il existe une impossibilité matérielle pour la malade d'entreprendre une cure hydrothérapique quel-conque.

Ce repos absolu au lit, sans permission de so lever sous quelque prétexte que ce soit, est-il toujours nécessaire? Ne peut-on permettre à la malade de s'écarter de cette prescription essentielle dans quelques rares circonstances? Nous répondrons hardiment, et sans crainte d'être démenti par aueun praticien soucieux de l'intérêt des malades confiées à ces soins, que cette position horizontale permanente est la condition primordiale, sine qua non, de la possibilité de la gréirison.

Nous ne pouvons plus eroire, comme nos ancêtres, à l'efficacité de certains traitements, qui permettaient aux patientes de se lever et de marcher; nous savons, et nous evoyons l'avoir démontré amplement par les considérations dans lesquelles nous sommes entrée, qu'il ne suffit pas, pour guérir d'une métrite, d'aller trois fois par semaine chez un médecin qui applique des tampons et de mener dans l'intervalle sa vie ordinaire. Ce temps, qui nous semble à juste titre préhistorique, est passé, et fort heureusement, car toutes les femmes métritiques n'étaient nullement débarrassées de leur métrite; au bout de longs mois, elles étaient aussi malades qu'avant leurs courses multiples chez leur médecin, en admettant même que, par un bonheur excep-

tionnel, l'inflammation n'ait pas progressé et n'ait pas envahi les trompes et qu'à la métrite primitive ne se soit pas surajoutée le salpingite avec tous ses dangers et toute sa gravité.

Où il y a métrite, pourrait-on poser en axiome, il y a indication chirurgicale, et tout autre traitement médical ne peut qu'amener, et encore si toutes les chances heurruses se mettent de la partie, une légère amélioration des signes objectifs, qui fait croire à la malade qu'elle est en voie de guérison.

Donc, point de cure hydrothérapique ou thermale lorsque la métrite existe encore, lorsque le chirurgien n'a pas encore passé par là et n'a pas dit son dernier mot au point de vue du traitement et de l'entière et complète guérison. C'est là, pour nous comme pour tous les praticiens, qui ont traité des métrites, une vérité absolument dépontrée. Jamais une cure hydrothérapique ou thernale n'a guéri une métrite qui était eucore en puissance, qui n'était pas absolument éteinte : c'est là une opinion acquise, juste et vraie.

En effet, il faut avoir l'imagination bien douée et bien vive pour concevoir que des caux quelconques, quelle que soit leur valeur, quelle que bienfaisante que soit leur action, puissent avoir une influence curative sur les lésions de l'endounètre. Au moins, je ne saisis pas comment cette idée a pu faire son chemin et je ne comprends pas comment cette opinion a pu un seul instant être soutenue et considérve comme admissible.

Toute autre est la question lorsqu'il s'agit de métrites pour lesquelles le chirurgien a eu à intervenir et qu'il a traîtées jusqu'à guérison. Que s'est-il passé, en effet? Le chirurgien a pratiqué le curettage ou la dilatation avec les soins consécutifs, suivant les variétées de métrites et aussi suivant ses opinions et suivant ses vues personnelles. Somme toute, il a institué et pratiqué un traitement efficace contre la métrite, et il s'adresse ensuite, pour compléter l'action de ce traitement et prévenir le retour de la maladie, à l'action bienfaisante de certaines eaux. Dans ces conditions, rien de mieux, et nous verrons tout à l'heure comment ces eaux agissent et quels effets elles produisent.

Pour le moment, quelles sont les stations dont les ci-devant métritiques peuvent bénéficier?

Certains auteurs recommandent Salins du Jura et Salies de Béarn. D'autres préférent Néris ou Luxeuil. Il est possible et même certain, quoique les observations en font foi, que dans quelques cas les eaux de Salins du Jura ou celles de Salies de Béarn aient en un heureux effet chez certaines femmes atteintes antérieurement de métrite. Toutefois, il nous a semblé que ces eaux ne doivent être employées chez ces sortes de malades qu'avec une extrême prudence, parce qu'assez fréquemment elles ont produit une congestion assez fâcheuse de l'appareil utéro-ovarien. Aussi, ie crois que, dans les cas de métrites, il ne faut recommander ces deux stations qu'avec certaines réserves; et, pour ma part, je présère de beaucoup Néris ou Luxeuil. J'ai obtenu notamment des caux de Luxcuil d'excellents résultats. Elles sont éminemment décongestionnantes et utiles au premier chef après les manœuvres opératoires nécessitées par les métrites.

Dans tous les cas, les femmes qui ont été atteintes de cette affection et traitées consciencieusement suivant les règles que nous avons indiquées plus haut bénéficieront largement d'une saison dans cette station. En effet, à la suite du traitement, l'utérus reste souvent pendant quelques mois un peu gros, un peu congestionné. Ces phénomènes finissent, il est vrai, par s'atténuer, puis par disponitre pour ainsi dire d'eux-mémes; mais, pour que co yésultat

soit obtenu, un assez long temps est nécessaire. Au contraire, une saison à Luxeuil a souvent suffi pour les guérir dans un très court espace de temps.

Toutefois, nous avons toujours eru prudent de conseiller à nos aneiennes malades de retourner encore l'annés suivante à Luxeuill et d'y renouveler leur saison, ne fût-ce que par prudence. Celles qui ont suivi mon conseil s'en sont toujours et toutes bien trouvées, et il en est certaines qui y sont même retournées une troisième année. Il est vrai que celles-là accomplissaient ee troisième pèlerinage plutôt par reconnaissance pour ees eaux qui avaient parachevé leur gruérison que par nécessité ou même par utilité.

Je erois qu'au point de vue de l'utilité des eaux, dans les conditions que nous avons déterminées d'une facon précise. pour les femmes précédemment atteintes de métrites, tous les chirurgiens sont d'accord aujourd'hui. Delbet, dans son important article, résume l'opinion générale en disant : « Les eaux thermales et avant tout les eaux ehlorurées sodiques rendent de grands services. A côté de leur action sur la santé générale qui est incontestable, elles paraissent agir sur les congestions viscérales pour les diminuer. Jointes au repos sexuel absolu, elles sont peut-être eapables de guérir certaines métrites eatarrhales légères (ce que. nous l'avons dit, nous ne eroyons pas et ee qui ne rentre absolument pas dans nos opinions). En tout cas, elles sont un bon moyen adjuvant des autres méthodes thérapeutiques; et, après guérison de la métrite, elles font merveille pour amener la régression de l'utérus et pour rétablir l'état général souvent fort délabré. »

On sait qu'il n'est pas rare d'observer, après le traitetement chirurgical de la métrite ou en même temps qu'il est pratiqué, des phénomènes de cystite qui génent considérablement les femmes. Cette cystite peut être due à des causes diverses. Tout d'abord, il est assez fréquemment nécessaire de sonder les femmes au cours du traitement, soit à cause de la présence des tampons vaginaux qui pressent plus ou moins sur l'urêthre, soit à cause d'une sorte de paresse naturelle, de parésie de la tunique musculaire vésicale observée souvent chez certains sujets après une manœuvre quelconque, opératoire ou non, mais surtout opératoire, pratiquée dans cette région sur les organes génitaux ou sur le rectum. On sait combien ce phénomène est fréquent.

Le cathétérisme répété, même avec toutes les précautions antiseptiques d'usage, peut produire un certain degré de cystite; à plus forte raison, s'il n'est pas pratiqué d'une façon absolument aseptique. Dans d'autres cas, cette cystite se manifeste sans qu'il ait été à aucun moment fait usage du cathétérisme. On a admis, dans ces circonstances, qu'elle peut être causée tout simplement par l'irritation de voisinage provoquée par les pansements et par les différents liquides antiseptiques plus ou moins irritants employés pour les injections et dont quelques gouttes peuvent même arriver, par mégarde bien entendu, à l'orifice du canal uréthral ou même un peu plus loin dans son calibre.

Quoi qu'il en soit, cette cystite cède le plus souvent aux moyens les plus simples, notamment à la térébenthine prise à l'intérieur ou au henzoate de soude; parfois même, elle disparaît sans traitement. On est cependant quelque-fois obligé d'avoir recours aux lavages véniaux; mais, en tout cas, bien que nofés agyions presque toujours vu ces troubles être passagers et se terminer très rapidement sans laisser de traces et sans dausger de retour, ces phénomènes de cystite peuvent quelquefois durer aseze longtemps et nécessiter des soins un peu prolongés. Ils paraissent, eux aussi, justiciables des eaux de Luxeuil, car une saison à cette station en a déterminé la guérison complète chez plu-

sieurs malades qui étaient atteintes de cet inconvénient et que nous y avons envoyées.

Reste un dernier symptôme de voisinage à combattre énergiquement chez les femmes atteintes de métrite, c'est la constipation.

Presque toutes les femmes, en effet, dont l'utérus est le siège d'une inflammation de nature quelconque, souffrent cruellement en allant à la garde-robe par l'ébranlement que l'effort nécessaire déterminé sur l'utérus. Aussi, elles évitent le plus possible de se livere à la défécation et retardent cet acte physiologique autant qu'il est en leur pouvoir, de façon que la constipation s'établit peu à peu et finit par devenir dans certains cas presque invincible et par être une véritable complication de leur état.

Bien entendu, nous ne parlons que des métritiques à utérus ayant la position et la direction normales et non pas des malades chez lesquelles l'utérus, récemment ou depuis longtemps dévié, est en rétroversion ou en rétroflexion, pese sur le rectum et obstrue plus ou moins complètement son calibre, surtout pendant les périodes de congestion de la matrice. C'est là un point de vue absolument à part et une affection qui nécessite un traitement tout particulier, dont nous n'avons pas à parler ici. Mais celles-là même qui ont l'utérus en situation normale sont souvent, nous le répétons, en proje à des douleurs très intenses du côté du rectum au moment des selles. Ces doulcurs rappellent, d'après ce que nous ont dit maintes fois les malades, les souffrances provoquées par les fissures à l'anus et se manifestent par une contracture atrocc, abominable du sphincter et par des douleurs irradiées remontant le long du rectum et se propageant dans tout le petit bassin. Les malheureuses qui en sont les victimes éloignent le plus possible le moment de la défécation, et c'est pour cette raison, dit très justement M. Lutaud, bien plus que par

suite de la compression de l'utérus sur le rectum qu'elles deviennent des constinces habituelles.

On devra donc combattre de suite ce symptôme et lutter activement contre lui, quel que soit d'ailleurs le traitement local que l'on choisisse contre la métrie. En effct, il est important, pour éviter ces troubles, que tous les organes du petit bassin soient dans l'état le plus voisin possible de leur état nornal. Done, il faut à tout prix, nous le répétons, empêcher l'obstruction intestinale et la congestion pelvienne et obtenir l'antisepsie intestinale la plus rapprochée de la nerflection.

Pour remplir la première indication, nous avons vu que M. Lutaud nous dit que l'on a dans l'arsenal purgatif un assez grand choix, mais qu'il recommande particulièrement l'emploi des eaux minérales laxatives prises le matin à jeun à petite dose (un verre à bordeaux environ) et les ovules à la glycérine appliqués dans le rectum. Bien entendu, comme pour tous les purgatifs et les laxatifs, il faudra changer de temps en temps le produit que l'on emploiera, afin que l'intestin n'ait pas le loisir de s'y hobituer, et ne cesse pas de réagir sous son influence : c'est là un principe de thérapeutique générale, qu'il suffit de vappeler et sur lequel nous n'avons pas à insister ici.

Ces mesures sont-elles suffisantes? Nous ne le croyons pas. Nous pensons, avec la plupart de nos confrères, qu'il est non seulement bon, mais absolument nécessaire d'ajouter à ce régime purgatif ou plutôt laxatif des agents destinés à désinfecter et à asoptiser l'intestin, tels que le napitholo ul c salicylate de bismuth.

Quant aux laxatifs, il ne suffit pas de preserire des eaux minérales purgatives; il faut encore s'informer si elles sont supportées par la malade, et il est nécessaire d'appliquer ici pratiquement ce précepte théorique de la médecine générale, que, lorsque on veut agir sur le tube digestif, pour le débarrasser de son contenu, il est important ou bien de savoir quel est le genre de laxalif ou de purgatif qui convient au malule s'il en a déjà usé, ou bien, s'il n'en a pas encore employé, d'essayer plusieurs agents de ce genre, jusqu'à ce qu'on ait trouvé ceux qui paraissent convenir le mieux au temoferament de l'intéressé.

Nous ne citerons que pour mémoire, en terminant, les diverses ceintures et les appareils orthofédiques variés qu'on a imaginés pour immobiliser l'utérus dont les mouvements sont douloureux. Ces appareils et ces ceintures peuvent rendre des services, quelquefois considérables, dans les déviations utérines, surtout lorsqu'elles sont inopérables ou que les malades ne veulent pas se soumettre à l'intervention. Nous ne voyons pas en quoi ils seraient utilisables dans les cas de métrites; aucune indication n'en autorise ici l'application. C'est pourquoi nous nous bornons à les signaler pour en repousser l'usage d'une façon absolue, comme étant complétement inefficaces et inutiles.

D'après ce que uous venons d'exposer, on voit que le traitement général est de la plus grande importance chez les femmes atteintes de métrite. Il vient apporter le plus puissant secours au traitement local dont nous avons indiqué les principes et précisé les règles. Pour guérir ces sortes de malades, si nombreuses et si malheureuses, il est uécessaire, lorsque leur situation le permet au chirurgien, d'instituer et d'assurer les trois traitements, local, général et thermal, ou plutôt de faire suivre le premier du troisième et de ne négligier le second à aucun moment. C'est seulement à ce prix qu'on obtient la guérison complète et durable uni est le but et le troimble du chirurgien.

Nous ajouterons seulement quelques mots pour ce qui a trait à un traitement qui a été préconisé par certains médecins, qui, certainement, s'ils en avaient vu les effets et s'ils y avaient réfléchi un instant, s'en seraient immé-

diatement départis et, au lieu de le recommander, l'auraient sévèrement proscrit ; nous voulons parler du séjour au bord de la mer avec les bains d'eau de mer. Or, nous sommes tout ce qu'il y a de plus absolu à ce point de vue ; non seulement les bains de mer, mais même un séjour prolongé sur les bords de la mer est tout ce qu'il y a de plus nuisible aux malades qui sont ou qui ont été atteintes de métrites. En effet, les malades qui sont en proje à cette affection, qu'elles aient été soignées ou non antérieurement. ou bien étaient auparavant des nerveuses et le sont restées, ou bien elles le sont devenues. Or, nous savons tous ce qu'il advient des nerveuses dans les climats maritimes et quels sont les troubles qu'elles y éprouvent. Tout va parfaitement bien comme santé générale pendant dix ou douze jours; au bout de ce temps, l'appétit diminue, le caractère devient irritable, elles maigrissent, perdent le sommeil, souffrent de névralgies, soit intercostales, soit faciales, soit viscérales; et, si elles persistent à séjourner dans ce milieu, tous ces phénomènes vont chaque jour en s'accentuant. Il arrive souvent que, sous cette influence. des femmes qui n'ont jamais souffert du bas-ventre jusqu'à ce moment sont prises de névralgies pelviennes et tubo-ovariennes. A plus forte raison, celles qui ont eu à un moment quelconque de leur existence des lésions de l'appareil génital ou qui v sont prédisposées et qui les ont. pour ainsi dire, en puissance voient-elles leur maladie renaître ou se manifester à l'état aigu. Le climat maritime ne convient donc nullement à ces sortes de malades, non seulement pour leur état utérin et annexiel, mais pour leur état général, car on n'ignore pas combien les femmes atteintes antérieurement ou actuellement d'une lésion quelconque de l'appareil génital sont, par cela même, prédisposées à des troubles névropathiques.

Il ne faudra donc jamais non seulement conseiller, mais

même permettre à des malades de cette variété un séjour prolongé au bord de la mer; il faudra, au contraire, lo prosrire et le défendre d'une façon absolue. Il va sans dire que les hains de mer ont une influence encore plus désastreuse.

Il en est iei de même pour beaucoup d'enfants, dont le tempérament, comme on disait autrefois, et souvent avec bequeoup de raison, ne supporte pas l'air de la mer. On n'a malheureusement aucun signe clinique qui permette jusqu'ici de différencier les enfants qui peuvent en bénéficier de eeux auxquels il est nuisible. Aussi, je pense que. lorsqu'une famille vous demande conseil pour savoir si elle doit emmener son enfant au bord de la mer, il est prudent de tenir la conduite que j'ai toujours coutume d'observer et de dire : « C'est votre enfant lui-même qui sera le baromètre ; ie ne puis rien vous affirmer à ce point de vue, Si, au bout de dix ou douze jours, il ne mange pas, maigrit, devient irritable et méchant, s'il ne dort pas, emmenez-le de la plage et conduisez-le dans la montagne. Sinon, c'est que le climat maritime lui conviendra: il lui fera alors le plus grand bien, et tâchez de l'y garder le plus longtemps possible. » Il y a toutesois cette différence, e'est qu'aucune métritique, soit en puissance, soit récente, soit ancienne, non seulement ne bénéfice de ce séjour maritime, mais même ne le supporte; elle en retirerait, vous pouvez le dire hardiment et le prévoir à coup sûr, les plus grands inconvénients.

Arrivés maintenant à la fin de cet article, nous tenons à présenter les conclusions qui découlent naturellement de tous les faits que nous avons exposés au lecteur, de toutes les opinions que nous avons développées et discutées devant lui et de toutes les controverses que nous avons cru nécessaire d'indiquer, étant donné l'importance de la question traitée et la fréquence de la métrite et des diverses circonstances dans lesquelles le praticien se trouve aux prises avec elle. Nous tâcherons d'être le plus bref possible dans ces conclusions, qui résumeront nos opinions sur le traitement de la métrite et de ses nombreuses variétés, demandant pardon au lecteur si parfois nous avons été un peu long et si notre sujet nous a entraîné souvent un peu loin, mais nous avons cru indispensables à la compréhension du sujet les développements que nous avons donnés et qui seuls, à notre avis, pouvaient justifier, pour l'esprit du lecteur, les principes formels que nous énonçous maintenant :

1º La métrite aiguē doit être traitée, dans sa période phlogistique, par le repos absolu, les cataplasmes ou la glace à demeure sur le ventre, les tampons glycérinés ou vaselinés et les injections chaudes jusqu'à cessation des phénomènes inflammatoires aigus. Lorsqu'elle sera arrivée, si possible, à l'état froid, comme nous disons aujourd'hui en chirurgie, on lui appliquera le traitement de la métrite chronique (puisqu'elle sera devenue effectivement chronique), adapté à sa nature et à sa variété. Dans les cas très rares où il paraîtrait y avoir un danger imminent pour la vie de la malade, ce danger vient non pas de la métrite elle-même, mais d'une complication qui est toujours et ne peut être que la suppuration des annexes, c'est-à-dire des trompes d'un seul côté le plus souvent et quelquefois des deux côtés. Dans ces conjonctures de salpingite suppurée aiguë unilatérale ou bilatérale, on devra, d'une façon absolue, et c'est là la seule règle chirurgicale raisonnable et admissible, se garder d'ouvrir le ventre; on se bornera à dilater l'utérus, de préférence lentement, extemporairement s'il en est un besoin urgent, et à pratiquer des lavages et des pansements intra-utérins. Cette simple intervention, plus ou moins prolongée, sera le plus souvent suffisante pour assurer l'évacuation des trompes et la sortie

du pus qui y est contenu. Toutefois, cette opération minime ne servira, dans l'immense majorité des cas, qu'à conjurer le péril imminent, et il ne faudra jamais manquer de prévenir la famille de la malade que plus tard, à une époque plus ou moins lointaine, lorsque tous les phénomènes aigus seront calmés, il y aura peut-être, probablement même, lieu d'intervenir par une laparotomie pour enlever des annexes chroniquement enflammées qui donneraient lieu, pendant toute la vie de la malade, à des phénomènes gênants et douloureux et qui provoqueraient même une impotence partielle ou totale. Quelquefois cependant, comme dans plusieurs exemples qui nous sont propres et que nous avons rapportés, la guérison est définitive après la simple dilatation et les pansements intra-utérins, et il n'est nullement nécessaire de pratiquer plus tard l'ablation des annexes: mais il ne faut pas oublier que c'est là une exception fort rare.

curettage, qui est le seul moyen efficace à employer contre elle et qui donne des résultats, au moins immédiats, satisfaisants et complets; mais il faut bien se souvenir que, malgré cette opération, malgré les cautérisations, les lavages et les pansements appliqués consécutivement pendant un temps plus ou moins long, les récidives ne sont pas très rares, et il ne faut pas manquer, sous peine d'être taxé d'ignorance ou de mauvais opérateur, d'en prévenir les intéressés:

2º La métrite hémorrhagique doit être traitée par le

3° La métrite chronique simple doit être traitée par la dilatation lente et large, pratiquée dans les conditions que nous avons indiquées et longuement développées, les lavages et les applications intra-utérines de pansements et de topiques modificateurs, sur la nature desquels nous avons suffisamment donné et motivé nos préférences : teinture d'iode pure, nitraté d'argent, acide chromique, chlorure

de zinc, etc. La patience prolongée est un élément essentiel de ce traitement, presqueautant d'ailleurs pour le chirurgien que pour la malade; mais nous espérons avoir démontré qu'il est le seul efficace;

4° La métrite chronique purulente, dont nous avons discuté longuement le traitement, est justiciable des mêmes moyens dans la grande majorité des cas. Cependant, il est bon de savoir et d'avoir toujours cette notion présente à l'esprit que, dans certaines circonstances, lorsque le parendyme de l'utérus est envahi par l'inflammation dans sa totalité, surtout depuis longtemps, les altérations sont trop enracinées pour pouvoir être guéries par les moyens ordinairement employés, et il est alors nécessaire de supprimer cet utérus, qui est définitivement malade sans espoir de retour à l'état sain et normal et qui, d'ailleurs, ne peut et ne pourrait plus jamais remplir ses fonctions physiologiques;

5º Le traitement des métries par l'électricité n'a pas cneore donné de résultats suffisants pour qu'il puisse être érigé en méthode. Il ne pourra être, jusqu'à plus ample informé, employé que dans des cas particuliers dépendant des nécessités qu'impose parfois à la malade sa situation sociale. Il en est de même du traitement par les vapeurs de brome, qui, lui aussi, n'a pas encore fait suffisamment ses preuves;

6º Les opérations complémentaires sur le col (amputation, opération de Schroeder, etc.) sont le plus souvent nécessaires pour obtenir un succès durable et définitif dans la guérison des métrites, parce que les lésions du col, à cause même de la disposition anatomique des tissus de cette partie de l'utérus et surtout de sa maqueuse, sont d'habitude trop profondes pour être justiciables des pansements ou des attonchements et même de la curette:

7° La métrite des vierges doit être traitée par les instillations intra-cervicales et intra-utérines de teinture d'iode

, 1

pure ou d'une solution de nitrate d'argent au cinquantième au moyen de la seringue de Braun. Les dispositions anatomiques ne peuvent guère permettre d'autre traitement, et celui-là est le plus souvent suffisamment efficace;

8º Les métrites diathésiques ne comportent pas d'indications spéciales ou de mode de traitement qui leur soit particulier.

Elles sont justiciables des traitements employés contre la métrito ordinaire dans ses diverses variétés; mais on ne pourra espérer obtenir des suecès complets que si l'état général (tuberculose, scrofule, rhumatisme) est amélioré ou guéri par la médication appropriée;

10º Le curettage a été détourné de ses applications primitives. Récamier l'avait mis en usage et préconisé contre les rétentions placentaires et les fongosités hémorrhagiques. C'est là que doivent se borner ses indications, et il est regrettable que son emploi ait été généralisé à toutes les métrites sans distinction. Dans les métrites chroniques ordinaires ou purulentes il est inefficace et peut occasionner des complications sérieuses et même graves:

11° Il ne faut pas oublier qu'un utérus qui a été antériourement atteint de métrite, quelle qu'en puisse être la variété, qui a été guéri et qui est revenu à son état normal à la suite du traitement, reste toujours délicat et exposé non pas à des récidives, mais à une nouvelle métrite. Cet organe doit donc être constamment l'objet de soins lygéiniques assidus et de précautions et de ménagements sur lesquels il est inutile d'insister et que tout le monde comprend suffisamment;

12º D'après la cure chirurgicale de la métrite, letraitement hydrothérapique à Néris ou à Luxeuil est de la plus grande utilité pour parfaire et maintenir la guérison. Le plus souvent il sera bon de faire deux ou même trois saisons dans ces stations balheáires; 13º Le traitement général par les purgatifs, les laxatifs, les désinfectants de l'intestin, les toniques et les médieaments anti-spa-smodiques et anti-neuresthéniques ne dévajamais être négligé, car il est indispensable. Les bains de mer et même un séjour prolongé au bord de la mer devront être proserits (1).

THÉRAPEUTIQUE CHIRURGICALE

Traitement Chirurgical des hémorrhoïdes,

Par le D. A. Bolognest Ancien interne des Höpitaux de Paris.

(Suite,)

II. - MANUEL OPÉRATOIRE DE M. DELORME.

Le manuel opératoire de M. Delorme n'est pas très différent de celui de Whitehead. L'opération telle qu'il la pratique semble au premier abord d'une extrême facilité. Mais quand on en suit avec attention tous les détails, on yoit

⁽¹⁾ Au moment où nous ferminous cet article, nous recevons d'un inventeur un échanillon de tige dilatatrice qu'il propose de substituer à la laminaire. Cette tige est formée d'une fiechle fortement comprimée et noturier d'une ouche de malère résiseuxe. Cette composition empéchant absolument toute stérifisation à la température no puis que prosertire l'emploi de cette lies dilatatrice.

qu'elle nécessite des précautions un peu spéciales, l'habitude de s'y reconnaître dans une région dont les plans sont masqués par le sang. L'opérateur ne doit pas chercher à aller vite; il faut une grande attention, surtout pour les vieilles hémorrhoïdes, sans quoi un coup de bistouri ou de ciseaux donné imprudemment expose à la lésion dusphineter, lésion dont les consequences postérieures pourraient être des plus graves, irréparables même.

Avant de les opérer, M. Delorme « prépare » ses malades.

A cet effet, durant les 4 ou 5 jours qui précèdent l'opération, le malade est purgé deux fois. La région du pubis et de l'anus est rasée l'avant-veille de l'opération ; la verge est l'objet d'un soin tout particulier au point de vue de la propreté et la région anale ainsi que les parties voisines sont recouvertes d'un pansement au sublimé. Egalement l'avant-veille de l'opération, plusieurs lavements boriqués; la veille on donne un bain et de nouveaux lavements boriqués; le matin même, trois lavements boriqués et un lavement de vaseline boriquée. Grâce à ces lavages antisentiques qui, au premier abord, peuvent paraître exagérés, on est assuré ainsi de la propreté du tube digestif et le chirurgien est sûr d'éviter l'infection de la plaie par les matières fécales. Il est arrivé plusieurs fois à M. le professeur Delorme, au cours de l'opération, d'avoir une issue assez abondante de matières fécales qui n'avaient pas été rendues avec les derniers lavements, mais grâce à ces précautions préliminaires les selles étaient assez antiseptiques pour que ce contre-temps n'ait pas compromis la réunion par première intention.

Si, d'une façon générale, un bon chloroformisateur est un auxiliaire précieux au chirurgien, ici il lui est indispensable, car les efforts de vomissement augmentent la quantité de sang qui gène surfout pendant le premier temps de simple.

l'opération, et pourrait exposer à la blessure du musclesphincter et plus tard à la déchirure de la muqueuse. Le rellachement le plus parfait doit être obtenu; aussi M. Delorme n'hésite-t-il pas à suspendre momentanément son opération dès que l'hypnose semble ne plus être complète.

Le malade est placé dans la position de la taille, le siège relevé par des draps repliés. Certains chirurgiens ont pour ces opérations maintenu leurs patients dans cette attitude au moyen de bras articulés, analogues à ceux de table de gynécologie. M. Delorme se contente de ses aides. C'est du reste là un principe de ce chirurgien, de ne jamais compliquer l'instrumentation, et d'opérer de la façon la plus

Le malade étant couché, les fesses débordant la table d'opération, deux aides appuient solidement sur les épines iliaques antérieures et supérieures et doux autres tiennent les jambes fléchies sur les cuisses, lesquelles sont également fléchies sur le bassin et portées en abduction avec une légère rotation en delors.

L'opérateur est assis en face de la région où va porter l'intervention; il n'y a qu'un aide placé à sa gauche.

L'opération comprend 4 temps :

1º Dilatation du sphincter :

2º Incision circulaire de la muqueuse au pourtour de l'anus et dissection du manchon muqueux jusqu'au-dessus du bord supérieur du sphincter interne;

3º Incisions longitudinales pour former 4 lambeaux;

4º Sutures de la muqueuse à la peau.

1º Dilatation du sphineter. — Ce premier temps est alsolument indispensable pour pénétrer dans l'anus et surtout pour décoller la muqueuse. M. Delorme la pratique avec les deux pouces introduits dans l'orifice anal et ceartés progressivement, mais avec force, l'un de l'autre. Pour être sûr d'avoir une dilatation bien complète il pratique une seconde fois la distension. Il n'est pas rare de voir le patient. qui semblait cependant bien endormi, faire alors des mouvements assez violents. Le sphineter étant paralysé par cette énergique traction sur ses fibres, la muqueuse et les veines variqueuses pourront être facilement attirées en bas. Bien mieux, dans certains eas d'hémorrhoïdes encore peu anciennes, c'est-à-dire n'avant pas amené d'altérations très profondes de la muqueuse et des adhérences de celle-ci avec les plans sous-jacents, on voit le paquet hémorrhoïdaire prolaber spontanément. Le plus souvent ee paquet augmente; il peut même arriver que, chez certains opérés chez lesquels les hémorrhoïdes externes étaient à peine visibles et les hémorrhoïdes internes peu sensibles au toucher, on ue se rende bien compte de l'étendue et du volume des lésions qu'après eette dilatation.

Nons rapportons plus loin une observation qui montre bien l'utilité de cette dilatation. Il s'agit d'un jeune soldat porteur d'hémorrhoïdes internes volumineuses et procidentes. Or, au moment de l'opération le paquet variqueux ne paraissant pas, un certain nombre des auditeurs du professeur Delorme parurent étonnés qu'on pratiquat une opération sur un anus qui semblait absolument sain. Mais aussitôt que la dilatation eut été pratiquée, un bourrelet hémorrhoïdaire du volume d'une mandarine vint faire hernie entre les lèvres de l'anus. Ce fait est tellement typique que nous avons tenu à le citer; il nous dispense de tout commen-

taire I

2º Incision circulaire de la muqueuse. — Cette incision est faite soit au niveau même du l'imbe muqueux, soit plutôt un peu en dehors, c'est-à-dire empiétant de quelques millimètres sur la peau; tout dépend du volume des hémorrhoïdes externes et de l'état de la peau péri-anale. Quand celle-ei est altérée, mince, doublée, soulevée par des paquets

hémorrhoidaires externes procidents, M. Delorme ne craint pas de porter l'incision externe aux limites de la peau altérée pour être bien sûr d'éviter toute récidive. Cependant, le sacrifice de la peau ne dépasse jamais guêre 5 à 6 millimètres. Un point intéressant à noter, écst qu'il est utile de commencer l'incision circulaire par une hémisection intéreure ou par la partie la plus basse d'une hémisection latérale. De cette façon, étant moins gêné par le sang, on n'est pas exposé à pratiquer une section irrégulière comme on le ferait si on commençait autrement son incision. Est-il besoin de faire observer qu'ici plus qu'ailleurs, cu raison de la peau doublée le plus souvent d'hémorrhoides externes, il est nécessaire de la bien tendre avant de la sectionner. L'écoulement de sang qui résulte de la section est rarement considérable.

L'incision faite, le temps difficile de l'opération va maintenant commencer. Il s'agit de décoller le manchon muqueux des muscles sphincters externe et interne. Toute l'attention du chirurgien doit se porter vers le sphincter qu'il ne faut pas licesser. C'est un point d'une haute importance sur lequel out insisté Whitehead, Pilcher, et sur lequel M. Delorme attirait récemment encore l'attention de ses élèves (1). Ce sphincter, en effet, qui, avant distension, formait un anneau facile à reconnaître, perd parfois, en certains points, ses caractères apprès dilatation.

La dilatation du sphincter ne consiste donc pas simplement à introduire les deux pouces dans l'anus et à les écarteravec force. Il faut savoir règler le travail des doits, autrement on s'expose à provoquer dans les muscles des délabrements tels que l'opérateur ne pourra plus le distinguer sous la muqueuse et le coupera probablement avec le bis-

⁽¹⁾ Ed. Delorme, Clinique chirurgicale (inédite).

touri ou les ciscaux. M. Delorme s'est même demandé s'il ne serait pas préférable, au lieu de s'adresser à la dilatation, de recourir à l'incision portée en arrière, quitte à auturer les 2 surfaces cruentées après l'opération avec un ou deux fils à anses.

En principe, d'après Whitehead, la séparation de la muqueuse doit se faire sans le secours de l'instrument tranchant. Théoriquement, la chose semble vraie et rien ne paraît plus facile que de passer entre la muqueuse et le sphincter externe. Mais il n'en est pas toujours ainsi et M. Delorme a du recourir puiseiure fois à l'instrument tranchant.

a du recourr puiseurs fois a l'instrument tranchant. En général, le chirurgien comunence à séparer le manchon muqueux sur le bord antéro-latéral droit de l'anus. Par de petits coups de pointes de ciseaux, il dégage le tissu hémortholdaire de la surface et du bord interne du sphinicter externe. Quand il est arrivé là, il met de côté l'instrument tranchant et se sert soit de ses doigts, soit de l'extrémité mousse des ciseaux, pour achever le décollement.

La séparation de la muqueuse de la face postérieure de l'anus est un peu moins facile que celle des autres points, soit que les adhérences plus intimes, soit que l'attitude du chirurgien vicanent compliquer ce temps de l'opération.

Au fur et à mesure que la maqueuse est libérée, elle est saisie par une pince à forcipressure et quand le décollement est pratiqué sur tout le pourtour de l'anns, 12 à 15 pinces sont appendues à l'extréunité inférieure du mancton maqueux.

nuqueux.

Ainsi, incision circulaire, libération immédiate de la muqueuse à ce niveau, telles sont les premières phases du 2° temps de l'opération. Il faut maintenant séparer la muqueuse du muscle jusqu'au-dessus du bord supérieur du sphincter interne. C'est ici le lieu de remarquer que celui-dise distingue du sphincter externe par la coloration blanc

rosé et la direction circulaire de ses fibres épaisses de quelques millimétres sealement; comme il est appliqué plus directement sur le manchon rectal, il faut en suivre de très près la paroi pour éviter de le blesser. Son dégagement s'effectue ordinairement avec l'extrémité mousse des ciseaux, les pinces dérapant si on s'en sert pour attirer la murueuxe.

Pour ne pas blesser le muscle ou tout au moins pour diminuer les chances de le blesser, il est bon de diriger l'extrémité de l'instrument tranchant, non du côté du muscle, mais du côté du manchon muqueux. Il faut déchirer sur celui-ci les tractus qui le réunissent au muscle; à cet effet, un doigt de la main gauche, l'index, est introduit dans l'anus, le pouce tient la portion de la inuqueuse déjà libérée et la tend sur la pulpe de l'index sur laquelle elle se réfléchit.

Le chirurgion a ainsi sous les yeux le champ opératoire et peut donner de petits coups de ciseaux d'une façon beaucoup moins aveugle.

L'hémorrhagie n'est notable que pendant le dégagement du sphinoter externe. Après elle est insignifiante. La perte de sang n'est donc jamais bien considérable, et commo il serait impossible à l'opérateur d'arrêter le sang sans le gêner pour son opération, le mieux est de passer outre, à moins que le sang ne provienne d'une veine volumineux ou d'une artère dont les jets sont visibles, auquel cas des pinces seraient appliquées sur les vaisseaux.

C'est surtout dans les cas de vieilles hémorrhoïdes que l'hémorrhagie est à craindre; les veines variqueuses à parois particulièrement friables se rompent d'autant plus facilement qu'elles ont contracté des adhèrences plus profondes. Nous necroyons pas que la simple torsion puisse toujours arrêter le sang, comme le pensait Whitehead. La chose est vraie pour une hémorrhagie artérielle, mais elle n'est plus exacte pour ces veines qui restent béantse et réclament la ligature. Cependant, la muqueuse, peu à peu détachée des sphincters, armée à son extrémité inférieure d'une série de pinces, est attirée hors de l'anus sous forme d'un manchon presque régulier mais tomenteux, congestionné, érectile à sa face externe.

La séparation de la muqueuse est moins laborieuse au niveau du sphincter interne qu'au niveau du sphincter externe. Du reste, l'explication en est facile; grace à la distribution anatomique des veines, l'abondance des hémorrhoïdes est moins considérable dans la partie supérieure que dans la partie inférieure de l'anus.

A quel moment doit-on arrêter le décollement de la muqueuse? Certains auteurs seraient d'avis de cesser dès ou'on arrive au niveau du bord supérieur du sphincter interne. M. Delorme s'y arrête d'habitude; mais quelquefois il ne voit aucun inconvénient à remonter à 1 ou 1 centimètre 1/2 au-dessus. Il procède de la sorte quand, après inspection de la muqueuse, il constate que celle-ci est altérée au-dessus des limites du bord supérieur de ce sphincter. Avant tout, en effet, il faut obtenir un manchon rectal assez. résistant pour que les fils ne puissent altérer la muqueuse, ce qui nuirait à la solidité et à la régularité de l'adhérence du manchon muqueux à la peau. Si, comme dans les cas d'hémorrhoïdes anciennes, mal soignées, procidentes, irréductibles, compliquées de rectite, on est obligé, malgré soi, de s'arrêter au-dessous du sphincter interne, en pleine muqueuse malade, on est obligé pour obtenir cette adhérence que les altérations de la muqueuse rendent difficile. de s'adresser à une petite modification opératoire qui permet de se mettre à l'abri de l'ulcération par les fils et du dérapement de la muqueuse.

3º Incisions longitudinales pour former 4 ailerons et sections transversoles de ces derniers.— Quand le décollement du manchon est bien assuré, l'aide et l'opérateur prennent dans leur mains des pinces à forcipressure qui sont placées à l'extrémité du manchon, les écartent, et le rectum prolabé prend un aspect infundibuliforme.

On pourrait à ce moment réséguer la partie de la mugueuse qui sort hors du sphincter externe. Mais ce procédé opératoire n'aurait que des inconvénients, car la muqueuse ainsi sectionnée remonterait; et pour la ressaisir, non sans difficulté, on serait obligé d'appliquer des pinces hémostatiques au-dessus et au niveau de la surface de section qui contusionneraient la région et compromettraient l'exacte réunion à la peau. Aussi, pour parer à cet accident, il est indiqué de couper le manchon rectal en 4 parties bien égales qui, rabattues, forment 4 ailerons. Les sections sont faites aux extrémités de deux diamètres antéro-postérieur et latérolatéral de l'anus. Ces sections s'exécutent après l'application de 2 pinces hémostatiques placées de chaque côté du point où doit porter l'incision. Ces pinces saisissent la muqueuse entre leurs mors jusqu'à quelques millimètres du sommet du manchon rectal. La muqueuse est coupée avec les ciseaux entre les deux pinces, et quand les 4 ailerons sont ainsi formés, 8 pinces à forcipressure pendent encore à l'orifice anal. Ces ailerons sont : deux antérieurs et deux postérieurs.

La création de ces ailerons s'accompagne souvent d'une petite hémorrhagie. Il y a en effet, en général, 4 à 5 petites artérioles qui sont coupées; or, si elles n'ont pas été suffisamment serrées entre les mors de la pince avant la section de la muqueuse, le sang peut s'échapper, incident qui ne rétarde en rien Poérétaio.

4º Suture de la muqueuse à la peau. — Ces sections faites, l'opérateur place alors 4 fils de soie en anse à quelques millimètres en arrière de la terminaison de chaque incision longitudinale. Ces fils, qui prennent appui sur la peau et sur la muqueuse, sont des fils de sirveté qui ne risquent pas, comme les fils à points passés, d'ulcèrar la muqueuse et qui résisteront sùrement aux efforts de traction du releveur de

résisteront sûrement aux efforts de traction du releveur de l'anus.

Voici comment ces fils en anse sont appliqués: L'aide saisissant les pinces placées de chaque côté de la section médiane supérieure attire le manchon muqueux. L'une des deux aiguilles montées sur le même fil de soie traverse la muqueuse de dedans en dehors, à quelques millimètres en arrière de la ligne d'incision et au-dessus des pinces, puis elle perfore la peau en un point symétrique, en évitant de traverser le sphincter. La deuxième aiguille reproduit la même maneuvre et le selex chées du fil sont noués sur la même maneuvre et le selex chées du fil sont noués sur la

arrière de la ligne d'incision et au-dessus des pinces, puis elle perfore la peau en un point symétrique, en évitant de traverser le sphincter. La deuxième aiguille reproduit la même manœuvre et les deux chofs du fil sont noués sur la peau. Les autres fils en anse sont disposés de la même façon à la base de la section médiane postérieure et à la base des sections latérales. M. le professeur Delorme attribue avec juste raison une grande importance à cette suture. C'est une sorte de suture profonde qui renforce d'une façon considérable les sutures superficielles. Mais, fait important, les fils de cette suture ne doivent absolument pas traverser le sphincter. Ils glissent dans l'espace muco-unsculaire. Dans certains cas d'idemorrhoïdés pou anciemnes, à muqueuse encore saine, on pourrait peut-être se dispenser de cette suture. (Nous ne voyons du reste pas pourquoi on n'aurait pas toujours recours à ce α temps de sărctè s qui

ne prolonge pas l'opération d'une minute.)

En tous cas, il est incontestable que dans les vieilles hémorrhoïdes qui ont amené une friabilité spéciale de la muqueuse, qui se coupe facilement sous le fil de ligature, l'affrontement oitenu par les sutures superficielles serait insuffisant. Le moindre effort de toux ou de défécation intempestif ferait rompre un certain nombre de points de suture; la muqueuse remonterait partiellement dans l'anus suture; la muqueuse remonterait partiellement dans l'anus

et la guérison s'obtiendrait par la formation de tissu de cicatrice, résultat absolument opposé à celui qu'on se propose dans cette opération. Et ec que nous disons de cette friabilité de la maqueuse n'est pas une simple vue de l'esprit; elle a été constatée chez un opéré de M. Delorme, et sûrement sans les sutures profondes d'appui, jamais la guérison parfaite sans cicatrice, que nous avons constatée 2 mois 1/2 après l'intervention, n'aurat un etre obtenue.

Quand les fils de la suture profonde ont été solidement serrés, le chirurgien attirant l'alleron avec les pinces placées sur ses bords, traverse avec 5 à 6 fils la peau à 3 ou 4 millimètres en dehors de la section. Ces fils pénètrent la muqueuse de dehors en dedans en des points symétriques à 3 ou 4 millimètres en deçàdu point où celle-ci sera réséquée. Les fils étant étendus, l'opérateur résèque la muqueuse aux ciseaux ou au histouri.

Il est procédé de la sorte pour les trois autres ailerons.

Il est toujours nécessaire de placer quelques sutures superficielles supplémentaires, surtout au niveau des points où se terminent sur la muqueuse les incisions longitudinales dont il a été parlé plus haut.

Les fils de suture étant coupés et la toilette de la région faite, un nouvel auns totalement différent se présente au chirurgien. La muqueuse est rose, offre même dans certains cas des plis radiés, car à la fin de l'opération le sphinc-

ter commence déjà à revenir sur lui-même. Ce résultat immédiat est excellent.

Le résultat définitif est non moins bon.

Nous ne pouvons rien dire d'exact au point de vue de la durée de l'opération. M. Delorme met en moyenne une heure pour pratiquer cette cure radicale.

En somme, l'opération consiste dans la section circulaire de la muqueuse au pourtour de l'anus; dans l'ablation du manchon rectal doublé de ses hémorrhoïdes, surtout au niveau du sphincter externe avec conservation întégrale de ce sphincter et du sphincter interne; dans la réunion exacte de la muqueuse rectale sectionnée au-dessus du sphincter avec la peau. Cette réunion est effectuée par des sutures à arase et à points passés.

PANSEMENT

Le pansement de M. Delorme est un pansement très soigné, très solide, qui doit être maintenu peudant 12 à 15 jours au moins en place, car, nous le verrons tout à l'heure, un des points sur lequel insiste tout particulièrement ce chirurgien est la constipation opiniatre à laquelle il soumet ses opérès et sans le moindre préjudice, cela va sans dire, pour leur santé.

Le champ opératoire étant d'abord enduit de vaseline iodoformée, des compresses de gaze iodoformée et sublimée sèche sont appliquées en quantité notable sur la région de l'anus. Le bassin, le ventre, la racine des cuisses sont englobés dans une épaisse couche de ouate stérilisée et un vaste bandage en T maintient le tout en place. Cet appareil est constitué par deux bandages de corps auxquels est lixée une large compresse qui, rabattue d'arrière en avant, recouvre le périnée, la face antéro-interne des cuisses et adhère en avant aux bandages de corps. Au niveau du point dé merge la verge, une toile imperméable percée d'un orifice central est fixée aux bandages de corps par des épingles. Elle a pour but d'empécher les dernières gouttes d'urine de traverser le pansement essentiellement fixe.

Comme le malade pourrait, par des mouvements intempestifs des membres inférieurs, produire des tiraillements sur les points de suture, M. Delorme s'assure d'une immobilité quasi-complète de ces membres en rapprochant les deux zenoux et en les assuitéissant ainsi que les iambes par un handage ouaté. Le patient ne pourra faire que des mouvements simultanés de flexion et d'extension des cuisses sur le bassin, mouvements qui risqueront bien moins d'amener la rupture des points de suture que des mouvements alternitis d'élévation et d'abduction.

CONSTIPATION DE L'OPÉRÉ

Dès que le malade est réveillé, on lui fait prendre une potion avec 40 gouttes de laudanum. Le 1er tiers de la potion est pris sur-le-champ; le 2º tiers vers le milieu de la journée : enfin, le dernier tiers, le soir. Le lendemain. une potion avec 30 gouttes de laudanum est prise encore en trois fois. Le surlendemain on donne 20 gouttes de laudanum, puis on continue pendant dix à douze jours à administrer quotidiennement 15 à 20 gouttes de laudanum. Nous savons par constatation que les malades supportent très facilement cette constipation. Ils ont quelquefois, le deuxième jour qui suit l'intervention, des coliques dues à la rétention des gaz. Ces coliques cèdent à une dose un peu plus forte de laudanum. Aucune modification thermique ne se produit et les courbes de température que nous aurions pu joindre à notre travail montrent que le thermomètre oscille constamment entre 37 degrés et 37°,5; à peine une fois ou deux a-t-on noté 38 degrés le soir de l'intervention. Du reste, cette constipation si redoutée des médecins, en général, n'est pas, pour M. Delorme, un danger. Le chirurgien du Val-de-Grace constipe systématiquement tous ses opérés de l'abdomen et n'a jamais eu à déplorer sa manière de faire. Malgré cette constipation intense à laquelle il soumet ses opérés, il ne craint point de les alimenter. Le régime carné est institué presque aussitôt après l'opération. Pendant deux jours seulement le patient est mis au bouillon et au lait.

Le laudanum doit être préféré aux pilules d'extrait d'opium qui ne déterminent pas une constipation aussi complète.

Il est cependant arrivé, que malgré les doses assez élcvées et continues de laudanum, M. Delorme n'a pas pu obtenir chez tous ses opérés la constipation qu'il aurait désirée.

Chez l'un d'eux, des coliques assex vives suivies de selles liquides se montrèrent au quatrième jour. Le pansement fut refait, la région soignousement lavéc; le laudanum administré de nouveau assura la constipation pendant dix jours encore et la guérison fut parfaite. Chez un autre malade une selle survint au cinquième jour, nécessitant un nouveau pansement; l'administration du laudanum à la dose quotidienne de 20 gouttes assura de nouveau la constipation pendant une dizaine de jours. Chez le dernier des opérés de M. Delorme, les selles spontanées se montrèrent dès le sixième jour. On ne cherclia pas à les arrêter et ce chirurgien put même, sans compromettre le succès de son opération, enlever les fils de suture dès le huitième jour. La réunion était parfaite.

C'est ordinairement douze jours après l'opération que M. Delorme défait le pansement. Celui-ci en génèral est resté sec; la région anale ne présente une très légère rougeur que chez les opérés atteints de rectite. Un certain nombre de fils sont tombés spontanément et fixés au pansement. Il peut arriver que la section des fils persistants soit rendue un peu délicate, parce que l'orifice anal a repris at tonicité et que le chirurgien veut éviter toute désunion on dilatant l'anus. Il y a aussi une dernière cause; c'est l'attraction légère de la surface cutanée anale du côté du roctum, laquelle rond le sière plus profond.

Le résultat constaté à la levée du pansement est des plus satisfaisants : la muqueuse est très exactement réunie au bord de la section de la peau sur laquelle elle tranelle par sa coloration foncée. L'orifice anal a ses dimensions normales; les plis radiés se dessinent bien et il est impossible de dire si une opération a été pratiquée sur la région. L'anus est souple et dilatable et le plus souvent le sphincter se contracte bien sur le doigt : il a done repris sa tonicité.

Il pourrait se faire cependant, qu'à la suite de la rupture de quelques points de suture pendant les efforts de défécation, la réunion ne se fit pas sur toute la circonférence mucocutanée d'une façon aussi intime que le souhaiterait Popérateur.

La rupture d'un ou deux fils de suture n'a pas beaucoup de gravité. Le fait s'est produit chez un opéré de M. Delorme et n'a nullement compromis le succès de l'opération. Au niveau des points où les fils avaient lèché, la peau et la muqueuse étaient réunies par un tissu muqueux mince analogue à celui qui tapisse les trajets des fistules anales incisées et traitées par le procédé ancien de la mèche.

Du moment où le pansement est enlevé, l'administration du laudanum est suspenduc. Des lavements à la glycérine: ou à la vaseline sont alors donnés au malade pour faciliter les selles. Celles-ei peuvent même se produire spontanchent le douzième ou le treizième jour après la cossation pure et simple de la potion laudanisée. Mais c'est là un fait exceptionnel. Il faut en général, pendant quelques jours, aider par des lavements l'évacuation des matières fécales. La défécation est quelquefois douloreuse au début, fait bien naturel, soit que la cieatrisation ne soit pas absolue, soit que le lo l'écal, trop volumineux et trop dur, distende d'une façon exagérée les parois de l'anus restauré. En général, à partir du cinquième jour après

l'ablation du pausement, les malades vont à la selle d'une façon régulière.

Dans uu cas une incontinence passagère des matières fécales a été notée chez un opéré. Il s'agissait d'un vieil hémorrholdaire dont les tumeurs sanguines étaient volumineuses et formaient un véritable tissu érectile. La dilatation anale avait dû être portée au maximum pour permettre à l'opérateur un décollement relativement facile de la muqueuse du sphincter sous-jacent. Cette incontinence ne peut être imputée à l'opération même. Elle est le résultat de la dilatation sphinctérienne. Du reste, n'est-il pas fréquent de voir cette incontinence se montrer chez les sujets dont la fissure à l'anus a été traitée par la distension des

A partir du jour où les selles se font librement, les opérés sout considérés comme guéris. Eux-mêmes, du reste, sont les premiers à se considèrer comme tels, tant la différence est grande entre leur état actuel et la situation dans laquelle les tenait autrefois leur affection. Tous regrettent de n'avoir pas eu plus tôt recours à la cure radicale.

De nombreux chirurgiens, en France, emploient actuellement le procédé de Withehead plus ou moins modifié, et dans la longue discussion qui eut lieu à la Société de chirurgie, chaque auteur a présenté son procédé comme étant le meilleur.

Nous les décrivons en quelques lignes pour chaque chirurgien. Ayant suffisamment insisté sur les détails en donnant le procédé du professeur Delorine.

Voici comment procède M. Monod :

fibres du sphincter.

Le malade préparé et endormi, il procède à la dilatation, puis pédiculise le plus possible chaque bourrelet et sur le pédicule il place une pince parallèlement à l'axe du rectum et le plus haut possible. Cela fait et après avoir mis un catgut à la partie supérieure, il fait la section avec un bistouri ou avec des ciseaux. Les lèvres de la plaie sont ensuite réunies avec des fils de catgut. Chaque bourrelet hémorrhoïdaire est traité de la même façon; une mèche de gaze est introduite dans le rectum et le pansement ordinaire est appliqué. Les suites de l'opération sont en général très simples. Le malade est purgé le cinquième jour et rapidoment guéri. En général, il n'y a pas de complications; on ne note que quelqueſois de la rétention d'urine et le gonflement des hémorrhoïdes extornes, auxquelles M. Monod ne touche nas d'habitude. Il n'va a inanis de récidive.

M. Reclus a décrit il y a quelques années une méthode qui diffère peu de celle-ci et qu'il emploie couramment. Après avoir purgè le malade et fait la dilatation, qui n'est même pas nécessaire si les bourrelets sont bien en debors, il fait saillir davantage ces bourrelets en les tenant avoc une pince et il sectionne successivement chacun d'eux en ayant soin de ne pas toucher à la peau. Des fils de catgut sont, au fur et à mesure de l'ablation, placés sur chaque section. Une mèche de gaze enduite d'une pommade anti-septique dans laquelle entre de l'orthoforme qui calme les douleurs, recouvre la plaie suturée. Quant aux hémorrhoides externes, M. Reclus a l'habitude de les enlever. Quelquefois, à la suite de l'opération, il y a de la rétention d'urine. Jamais M. Reclus à observé de récilive.

Voici comment procède M. Quénu:

Le malade purgé trois jours avant l'opération et constipé la veille ; il fait procéder à la dilatation digitale, puis, après incision à l'union de la maqueuse et de la peau dans la demi-circonférence anale, il dissèque la muqueuse jusqu'au bord inférieur du sphincter. Comme la maqueuse est menue et friable, il évite de placer dessus des pinces, qui par leur action pressurante, comprometritaien la réunion. Il passe des fils de catgut aux extrémités de l'incision, ou même en nombre plus grand, en les faisant pénétrer audessus du point où la muqueuse sera sectionnée et par ce moyen, il s'oppose à l'ascension de la muqueuse, alors que la section a eu lieu.

as section à et ince. Les fils sont serrés et l'opération est terminée. De semblables manœuvres sont exécutées de l'autre côté. Un léger tampon est placé pendant quelques heures sur la plaie et lorsqu'il est retiré, un pansement ordinaire la recouvre. Il est nécessaire de le renouveler chaque jour à cause du saintement sanguin et des sécrétions glaireuses qui s'écoulent parfois. A la suite de l'opération, il n'y a pas de douleur en général, et la moyenne de la guérison est de quinze à sècie jours.

D'après les différents avis émis par les chirurgiens, le traitement chirurgieal des hémorrhoïdes doit nécessairement varier suivant les conditions présentées par les porteurs d'hémorrhoïdes et par les hémorrhoïdes elles-mêmes. De là à vouloir proscrire une méthode qui a donné de nombreux et durables résultats, il y a loin. On peut encore citer parmi les partisans de la méthode de Withehead, MM. Berger, Tuffier, Delbet, Schwartz qui l'emploie rarement, Poirier qui en est un des plus chauds défenseurs, Potherat qui emploie le procédé de Delorme; Picqué qui considère le Withehead comme le meilleur procédé, à la condition d'employer une antisensie rigoureuse et d'avoir soin de prolonger la dissection de la muqueuse bien au-dessus des parties malades. M. Piequé a fait 23 fois cette opération; il a toujours obtenu la réunion dans un laps de temps variant entre huit et treize jours, Le Dr Véron, dans sa récente thèse sur le traitement chirurgieal, et en partieulier sur la eure sanglante des hémorrhoïdes, procédé de Witheliead, juge ainsi la question :

Parmi les procédés chirurgicaux, la dilatation anale rend de réels services dans les eas d'hémorrhoïdes peu volumineuses compliquées de fissures avec contractures splinctériennes. Elle sera pure et simple au cours des crises de turgescence et d'étranglements hémorthoïdaires et elle sera forcée, quand on devra avoir recours aux divers types d'ablation partielle employés en présence d'hémorthoïdes externes peu développées ou bien circonscrites. Pour les hémorrhoïdes en bourrelet externe ou interne et les hémorrhoïdes totales à double hourrelet annulaire, provoquant des accidents hémorrhoïques, inflammatoires, douloureux et de prolapsus, on emploiera l'exérèse totale; c'est aussi notre manière de voir. La technique opératoire est celle suivie par M. Lejars qui comprend cinq temps:

1º Dilatation du sphineter; 2º incision circulaire de la muqueuse sur le pourtour de l'anus; 3º dissection du manchon muqueux ano-rectal; 4º incision longitudinale de la muqueuse à sa partic antérieure en anse au-dessus de l'extrémité supérieure de l'incision; 5º section progressive de la moitié droite du manchon muqueux et suture nuco-cutanée de cette hémisection, section progressive de la moitié gauche de la muqueuse disséquée et sa suture à la peau.

Les résultats immédiats se traduisent ainsi : le pansement enlevé le huitième jour, le malade peut se lever le quinzième et quitter l'hôpital le vingitème. Les résullats éloignés sont aussi excellents : c'est à peine s'il reste quelques traces de l'opération aussi bien au point de vue local m'an point de vue rénéral.

Les principales objections contre ce système portent sur les points suivants :

1º De présenter des difficultés techniques, principalement pour la suture cutanéo-muqueuse et le maintien de l'asepsie au niveau de la région; 2º d'entraîner de vivos douleurs; 3º d'exposer à la rétention d'urine; 4º d'être très

sanglante; 5° d'affaiblir les sphincters; 6° d'exposer au rétrécissement cicatriciel de l'anns.

A la première objection, on peut répondre qu'il n'y a qu'à faire une suture à points passés, précédée d'une suture antérieure en anse, qui sort de suture de repère.

Pour ce qui est du maintien de l'asepsie au niveau de la région, il n'y a qu'à se mettre dans des conditions d'antisepsie ou d'asepsie suffisantes. La constipation de l'opéré est, en tous les cas, indispensable. Pour éviter les vives douleurs, on n'a qu'à faire la dilatation suffisante et à n'introduire aucuen mèche ni d'arin dans l'anus.

La rétention d'urine peut se produire dans toutes les opérations sur le rectum; et elle n'est pas plus fréquente à la suite des exérèses sanglantes qu'à la suite des cautérisations. Quant à la perte de sang, elle n'est pas abondante si l'extirpation totale de la muqueuse anale est exécute convenablement. De plus, il est facile de respecter les sphineters et, en général, après la période de constipation de six à sept jours, la tonicité est revenue et l'incontinence partielle, si parfois elle existe, dure très pou.

Enfin, avec la réunion de la peau à la muqueuse, on n'est jamais exposé au rétrécissement cicatriciel de l'anus, Reste maintenant à examiner si la cure sanglante mérite le nom de cure radicale et si la récidive s'observe aurès elle.

La muqueuse malade étant entièrement supprimée, il est hors de doute que cette méthode est fertile en excellents résultats et on peut sans contredit la considérer comme une cure radicale.

L'observation montre, en outre, que beaucoup de malades ont été revus plus de trois et quarre aus après leur intervention, et aucun ne portait trace de récidive. Ils semblent donc bien à l'abri de toute nouvelle production hémorrhoidaire et on ne peur pas en dire autant de la dilatation forcée seule, de l'ignipuneture et de l'exi rèse partielle.

REVUE DES TRAVAUX FRANÇAIS ET ÉTRANGERS

Gynécologie.

Injections de sérum artificiel dans les Infections puerpérates (Cong. de mèd. 1900). — Dans les cas d'infection puerpérale, les injections hypodermiques de sérum artificiel ont non seulement pour but de relever la résistance vitale de l'organisme, mais, en vertu de leur action biologique sur les fibres lisses de l'utérus, elles réveillent sa contractilité et aident ainsi à débarrasser sa cavité des matières septiques source de l'infection puerpérale.

Cortes, l'écouvillonnage, les injections intra-utérines nicrolicides et à plus forte raison le curettage ont plus de prise sur la cause de l'infection, mais ces dernières interventions, en delors des inconvénients et même des dangors qui leur sont propres, étant parfois impraticables à cause des circonstances défavorables où se trouve l'accouchée, les injections l'hypoderniques du sérum peuvent parfois leureusunent les suppléer et, dans tous les cas, il n'y a que des avantages à attendre en les loignant au truitement utérins.

Enfin, il y aura à mettre à contribution les effets contractiles du sérum artificiel sur le muscle utérin en cas d'inertie de co dernier durant le travail, de même que dans Intonie post-partum les injections vaginales chaudes seront heureusement secondées par les injections hypodermiques de sérum artificiel

Le décubitus ventral permanent dans le traitement de la fistule vésleo-vaginale (Cong. de méd. 1900). — M. Junior Vitrac (Bordenux). — Dans de nombreuses expériences j'ai cherché à fixer le rôle joué par les diverses positions du corps dans l'écoulement des urines à travers l'orifice de la vessie fistuleuse.

Dans les cas les plus fréquents (fistule de la zone vaginule de la vessie), le décubitus dorsal a pour conséquence l'issue totale, ou presque totale de l'urine; le décubitus latéral permet déjà une continence plus marquée; le décubitus ventral est la position la plus favorable. Grâce au décubitus ventral, en effet, une malade atteinte de fistule vésico-vaginale, se trouve dans des conditions semblables à celle d'une malade opérèc de taille hypogastrique et maintenue couchée sur le dos, or, on le sait la plaie suspubienne guérit alors avec une suprenante facilité.

Théoriquement, il est done illogique d'employer le décubitus dorsal, le décubitus ventral est au contraire indiqué dans tous les cas; a, fistule vésico-vaginale petite, récente, et qu'on veut guérir sans opération; b, fistule vésico-vaginale qui vient d'être oaérée.

Pratiquement, le décubitus ventral a donné un beau cas de guérison sans opération. Je ne l'ai employé ou vu employer après opération que dans des cas tres défavorables qui ont cependant donné des résultats encourageants. Il seruit nécessaire avant l'opération d'habituer peu à peu les malades à garder cette position.

Le décubitus latéral est théoriquement moins utile; pratiquement il est d'un emploi plus simple que le décubitus ventral. A coup sûr il doit êtro préféré au décubitus dorsal.

La suspension de la paroi vaginale de la vessie à la paroi rectale du vagin, pout être utiloment ajoutée au décubitus ventral comme moyen de soustraire la fistule ouverte ou suturée, au contact et à la pression des urines.

Maladies des enfants.

L'antiseptie intestinale chez les cufants (Cong. de méd. 1900). — M. lo professeur F. Fede et M. J. Gallo de Tommasi. - L'antisensie intestinale, essavée d'abord chez les

adultes, dans la fievre typhoïde, est entrée bientôt dans la thérapeutique médicale des enfants.

Nous avons voulu établir la valeur curative des antisentiques chimiques introduits par la bouche. Nous nous sommes servis des trois substances suivantes :

Salol: 5-10 centigrammes à la fois, jusqu'à 0,50-1 gramme par jour;

Teinture d'iode : X-XV gouttes, selon les différents àges dans une potion gommeuse, une cuiller à café toutes les

deux heures: Calomel, à doses fractionnées : 1-2 centigrammes à la fois,

jusqu'à 12 centigrammes par jour. De nos recherches eliniques et expérimentales, on peut conclure :

1º Dans les infections et les intoxications gastro-intestinales, il est toujours utile d'employer quelques antiseptiques internes; et, il faut préférer, parmi ceux que nous avons

employés, le calomel. 2º Pour mieux assurer l'antisepsie médicale, dans le cours de ces maladies et des troubles fonctionnels, il faut intervenir de bonne heure, c'est-à-dire lorsque les toxines n'ont pas encore envalui tout l'organisme.

Nous avons observé, après l'emploi du calomel, la diminution de la virulence des cultures obtenues des matières fécules des enfants et la diminution des acides sulfo-conjugués également après l'administration de l'antiseptique.

De la giveosurie alimentaire chez les nourrissons (Cong. de méd. 1900). - M. Terrier rapporte les résultats de 42 examens de glycosurie alimentaire chez des nourissons atteints de gastro-entérite. Pour obtenir des résultats comparables il est nécessaire de se conformer à une technique toujours identique (nature de suere employé, solution, mode d'administration).

La giveosurie alimentaire ne survient dans l'état physiolo-

gique chez le nourrisson qu'avec des doses élevées de sucre : 5 grammes au moins de glucose pure, 4 grammes de lactose pure par kilogramme de poids du corps.

Dans la gastro-entérite elle survient avec des doses de 3º,50 et souvent moins. La glycosurie alimentaire s'observe alors dans prés de la moitié des cas, elle est en relation directe avec deux facteurs : la diarrhée et l'amaierissement.

On pourrait peut-être de ces résultats tirer une conclusion et affirmer l'insuffisance fonctionnelle du foie dans la gastroentérite. Mais é'est là un point que l'auteur ne veut pas aborder, et il se borne à constater ce fait : la fréquence de la glycosurie alimentaire dans la gastro-entérite des nourrissons.

Maladies du larynx, du nez et des oreilles.

Pathogéaio et traitement de la paresthésie laryugée (Cong. de méd. 1900). — M. Ricardo Botey (Barcelone). — Il existe assez souvent des cas où des troubles transitoires et peu maryués disparaissant après le repas, donnent lieu à une moindre sécrétion des glandes de la muqueuse, que les malades traduisent par une sensation de sécheresse au fond de la gorge, le pharyux étant réellement moins humide qu'à l'état normal.

Cetto sensation de géne dont se plaignent ces malades, résido principalement sur l'épiglotte et les aryténoides, malgré que cette sensation soit difficile à préciser. L'auesthésie locale par la cocaine augmente considérablement la paresthésie pharyago-laryngienne, caractère pathagnomonique qui la différencie de toutes les causes organiques ou inflammatoires locales qui peuvent engendrer des sensations.

Si lo malade fait une laryngite ou une amygdalite aigues la paresthésie disparaît. La thérapeutique est donc complétement opposée à celle, admise généralement. Au lieu des brouures, des vaso-dilnatateurs et des toniques, localement, des attouchements irritants avec la glycérine thymolée et de légers effleuvements de l'épigotet et des aryténoïdes avec la pointe du galvane-cautère. L'irritation locale produit une hyperhémic avec transsudation et sérosité qui agit comme stimulates sur la ensaibilité générale de la nauqueus plus ou moins émoussée, et celle-ci acquiert le tonus à peu près normal, si nous n'avons pas dépassé les limites d'une inflammation très modérée. En agissant ainsi on obtient presque toujours une amélioration considérable de la paresthésie. Néanmoins, il existe des cas où il faut administer de so bromures à l'intérieur, le traitement local légérement irritant restant le même.

Pharmacologie.

Maile de Croton. — K. Bond (Ther. Grazette, 15 mars 1900) passe en revue la pharmacologie de ce médicament et attribue les préjudices qu'il a souvent causés à son dosago insuffisant et à ce fait que les préparations d'huile de croten varient souvent cemme composition. L'avantage de oe remède existe en l'effet qu'occasionnent de très petites doses, de plus, il est rarement rejeté par l'estemae. C'est, en somme, un purgatif de grande valeur qui, diffère des autres cathartiques en ce qu'il possède une action locale irritante sur l'intestin, propriété qui le fait réusir dans des ces d'atonie en tous les autres purgatifs échonent. L'auteur recommande de n'employer que 1/6 de goutte qui suffit si le remède est fraichement préparé et s'il est de bonne qualité. A la dose de I goutte entière, il agit très violemment, en déprimant le peuls, en abaissant la température.

L'Administrateur-Gérant: O. DOIN.



A la Société de chirurgie, M. Lejars préconise l'intervention pour perforation intestinale dans la fièvre tuphoïde. Et cela en raison des 16 succès qu'il a pu relever dans la littérature médicale sans compter ceux plus récents dus à MM. Legueu et Loison. Appelé lui-même plusieurs fois à intervenir en pareille circonstance, il n'a pas eu la chance do sauver ses malades, mais il a retiré de ces opérations faites in extremis la ferme conviction que s'il avait été appelé plus tôt ses interventions auraient été suivies de succès. Il faut, en effet, opérer des que le diagnostic de perforation intestinalo est fait. Sans doute co diagnostic est parfois délicat; cependant il est en général facile de l'établir, et d'emblée en s'appuvant sur la douleur abdominale brusque, plus ou moins bien localisée d'ailleurs: sur la dureté du vontre en rapport avoc l'intensité de la défense musculaire; sur l'écart de la température qui monte ou descend presque subitement d'un dogré à un degré et demi. Au resto, dans les cas même douteux de perforation intestinale au cours de la fiévro typhoïde. il vaut mieux opérer le plus tôt possiblo.

M. Hartmann, revenant sur la question du cancer de l'estomac, apporto de nouvelles prouves à l'appui de l'opinion qu'il a soutenne sur la valeur seméiologique de l'examen du sang dans cette affoction. Il rappelle avoir insisté sur ce point qu'un certain degré d'anémie, caractériséo par la diminution de l'hémoglobine ot l'augmentation do la leuocevtose, sont des 82 BULLETIN

signes d'une grande valeur au peint de vue du diagnostic de cancer stomacal.

A l'occasion d'une observation de plaie de l'abdomen par coup de couteau, présentée par M. Morestin, M. Chaput résume comme suit les indications chirurgicales. Pénétration douteuse : laparotomie large. Hémorrhagio pariétale : débridement pour l'hémostase, laparotomie en bon lieu. Présomptions de blessures des organes situés sur la ligno médiane : laparotomie sur la ligno blanche. Présomptions de blessures des organes situés latéralement : laparotomie latérale. Hémorrhagie abdominale grave provenant des erganes médians et constatée par la laparotemie latérale : laparotomie médiane complementaire.

A la Société d'obstétrique, MM. Cha vane et Faure Miller signalent un cas de diabète insipide et grossesse. Il s'agit d'une nervouse urinant 5 à 6 litres à l'état normal, mais qui, une fois enceinte, émet 15 à 18 litres d'urine en vingt-quatre heures. Peu de temps après l'accouchement le taux des urines retombe à 5 ou 6 litres. On ne constate ni albumine, ni sucre, mais les urines sont peu chargées en principes minéruux. L'état général est toujours excellent, et à part une soif très violente, on peut considèrer cette femme comme étant bien portante.

A la Société médicale des hópitaux, M. Barié attire l'attention sur les fistules ano-rectates prémonitoires de la tuberculose pulmonaire. Ces fistules clez les tuberculeux, peuvent précéder d'un tomps quelquefois fort long, pendant des années même, l'apparation des premières manifestations pulmenaires; elles font suite à des abcés, nés, le plus souvent, d'une façon insidieuse, mais qui peuvent, dans cortains cas, succéder à un traumatisme.

A la Société de médecine interne de Berlin, M. Sarfert déclaro que le meilleur traitement chirurgical des carernes pulmonaires censiste à pratiquer, au-dessus de la seconde BULLETIN 83

cote, une ineision qu'on prolonge jusque dans le creux axillaire; on lie tes artérioles et les veinules qui saignent, on soctionne les nuscles, on dénude la cote, on la réseque et on ouvre la caverne au thermo-cautère. Par ce procédé on ne risque pas de blesser les grox vaisseaux, ni de pénétrer dans la cavité pleurale, car les doux feuillets de la séreuse sont soudés par des adhérences solides, lorsqu'il s'agit de cavernes anciennes et superficielles, lesquelles sont justiciables de l'intervention chirurgicale. Dans lo cas uniquo où M. Sarfort a opéré de la sorte, la fiévre ne tarda pas à disparaite, la caverne se détergea et diminua de volume; mais après cette amélioration, qui dura deux mois, la malado succomba à une poussée de granulie aigué.

A la Société belge de neurologie, M. Crocq signale un cas de mal perforant amèlioré d'abord, puis complètement guéri, semble-t-il, pas les courants faradiques. Le malade dont il s'agit eut, en 1873, la jambo prise dans un engrenage. La plaie guerit bien. Le sujet qui était typographe continua d'exercer son métier jusqu'à il y a six ans; il devint cocher et so fractura la malléole externe en descendant de son siège. Quelque temps après un mal perforant plantaire se déclara et persista avec des rémissions fort courtes iusqu'il y a deux mois. Quand le malade entra à l'hôpital, en décembre 1899, il portait une ulcération sous le cinquième métatarsien, avec troubles trophiques. On fit des pansements ichtyolés et l'on prutiqua la faradisation avec une électrode à la malléole interne, l'autre près de l'ulcère. Le malade sortit guéri le 12 janvier. Mais son mal avant récidivé, on lui prêta une machine électrique et après quelquo temps une amélioration se produisit; depuis deux mois la guérison est complète.

SOCIÉTÉ DE THÉRAPEUTIQUE

SÉANCE DU 9 JANVIER 1901

Présidence de MM. Huchard et Albert Robin

Le procès-vorbal de la dernière séance, lu et mis aux voix, est adopté.

Correspondance

En outre des imprimés ordinairement adressés à la Société, la correspondance comprend :

1º Une lettre de M. Balzer, médecin de l'hôpital Saint-Louis, qui se porte candicat à l'une des deux places vacantes dans la section de médecine:

2º Deux travaux de M. le professeur Senator, de Berlin, correspondant, intitulés : Sur quelques formes rares d'hydropisie et Diagnostie et traitement de l'anémie;

3º Le compte rendu des travaux de la Faculté impériale de médecine du Japon :

4º Des lettres de remerciement de MM. Cadiot et Barbary, nommés dornièrement, titulaire et correspondant national.

M. le Président. — J'ai le plaisir d'annoncer à mes collègues que M. Cadiot, membro de la section de médecine vétérinaire, assiste pour la première fois à nos séances et je lui souhaite la bienvenue.

Déclaration de vacance

Il est déclaré vacance à deux places, devenues libres dans la section de médecine, par suite du passage à l'honorariat de M. Labbée et de la démission de M. Launois. Les candidats ont jusqu'au 13 mars pour faire valoir leurs titres.

Présentation

M. Duhourcau donne lecture, au nom de M. de Rey-Pailhade, eorrespondant national, du travail suivant:

Rôle du philothion dans le mécanisme de l'action des médicaments spéciaux de la nutrition.

Par M. J. DE REY-PAULHADE.

(Correspondant national.)

Les considérations que nous allous développer, nous ont été inspirées par la lecture du Précis de Thérapeutique de M. X. Arnozan, professeur de thérapeutique à la Faculté de médecine de Bordeaux. Ce traité doit avoir deux volumes ; le premier seul a paru.

M. Arnozan, s'inspirant des dernières conquêtes de la science, a écrit son livre dans un cadre nouveau, parfaitement logique et rationnel.

Ce traité pourrait s'intituler Précis de physiologie pathologique et de matière médicale, tant on comprend que l'auteur, aime, possède à fond et se complait dans les harmonies de la physiologie.

Le premier volume, de 551 pages, est uniquement consacré aux « généralités, thérapeutique des maladies infectieuses et des maladies de la nutrition «. Ce titre montre que l'auteur, se plaçant à un point de vue élevé, attache la plus grande valeur à la thérapeutique préventive, aux régimes dont l'importance est reconnue depuis la plus haute autiquité. Le chapitre III de la 3° partie. — les médicaments spéciaux de la nutrition, — est parueunerement intéressant, car dans toute maladie il est toujours sage do penser aux troubles physiologiques subis par les cellules qui composent nos tissus.

Les agents médicamenteux indiqués par M. Arnozan sont : l'oxygène, le fer, le chlorure de sodium, les alcalins, le phosphore, le soufre, l'iode et l'arsenic.

Nous allons montrer que l'action de la plupart de ces substtances peut s'expliquer du moins en partie, par leur affinité pour l'hydrogène du philothion. Cette substance, de nature diastasique, découverte par nous en 1888, existe dans tous les tissus animant virants: elle est caractérisée par de l'hydrogène très faiblement uni an noyau de la molécule albuminoïde. Cet hydrogène se combine au soufre à froid en donnant de l'hydrogene suffuré.

D'après les travaux les plus récents, ou peut concevoir de la manière suivante la constitution d'une cellule vivante : Tout élément histologique vivant renferme plus ou moins abondanment: 1º des matières réductrices, c'est-à-dire capables de fixer de l'oxygène. Le philothion en est certainement une des principales, car il absorbe l'oxygène libre à froid; 2º des oxygitases, autrement dit des matières chargées de faciliter l'oxydation des substances réductrices précédentes. Ces oxydases jonent le rôle d'agents intermédiaires entre l'oxygène extérieur et les matières qui, en s'oxydant définitivement, entretiennent la chaleur et la vic des cellules.

Il est certain qu'il doit y avoir des affections qu'on pourrait appoler hypophiluthionie, hyperphiluthionie, et hypoxydaxie et hyperoxydaxie. Jusqu'à présent, à notre connaissance, on n'a précisé aucun de ces ens. Le procédé si ingénieux d'analyses spectivosophique de M. Hénocque pour l'examen du sang, pourra peut-êtro un jour permettre de préciser davantago ces idées.

Quand, par exemple, un sujet consomme moins d'oxygène que la normale, sans qu'aucun obstacle s'oppose à la pénétration de ce gaz et que le sang est en quantité normale avec des globules sains, il y a tout lieu de penser soit à une hypophilothionie, c'est-à-dire à une diminution des matières susceptibles d'absorber l'oxygeno, soit à une hypoxyfasie, autrement dit diminution des porteurs d'oxygene de la collute.

Examinons maintenant en détail le mécanisme de l'action des divers médicaments de la nutritien :

1º Le Soufre. — Nous rappelens d'abord que c'est l'étude de l'action de ce métalloïdo sur les tissus qui nous a fait découvrir le philothion.

Dés son introduction dans la bouche et pendant tout son trajet dans le tube digestif, le soufre se combine à l'hydrogène du piliothion des cellules épithéliales et produit de l'hydrogène sulfuré. L'équation suivante peut servir à représenter le phénomène :

$$2RH + S = 2R + H^2S$$
.

L'oxcitation chimique du soufre, par soustraction d'hydregéne aux cellules épithéliales explique parfaitement l'effot purgatif de ce corps pris à l'intérieur à haute dose.

L'hydrogone sulfuré fermé dans l'intestin pénetre dans le sang qui le transporte à toutes les cellules de l'organisme. Cet ll'S dans les liquides exygénés de l'être vivant subit la transformation bien connue des chimistes : l'acide sulfiyedique H'S est décomposé aver régénération du soufre libredique H'S est décomposé aver régénération du soufre libredans un état de division extréme, suivant l'équation H'S + O = H²O + S. Co soufre agissant de nouveau sur le philothion de toutes les cellules, produit une stimulation générale et salutaire. Ce cycle so répétant un certain nombre do fois, il suffit de pou de soufre pour obtenir un effet marqué. Une partie du soufre s'échappe par le poumon à l'état d'hydrogene sulfuré et une autro partie s'oxyde à l'état d'acide sulfurique.

M. Arbuthnot Lane, chirurgien à Londres, qui a employé avec grand succès le seufre en chirurgie, a constaté que l'action do ce corps est assez puissante pour produire le sphacèlo des tissus. Son rôle en chirurgie est doublé : il agit comme excitant des tissus et comme antiseptique par l'hydrogène sulfuré formé.

L'emploi du soufre contre la gale et les dermatoses parasitaires dérive encore de cette production de H²S si toxique pour les organismes inférieurs.

Cette action du soufre sur l'hydrogène du philothion est des plus remarquables. Elle va nous montrer que l'effet d'autres médicaments éveplique très bien par un méeanisme analogue. Elle prouve aussi d'une manière évidente que les substances ingérées par les animaux ne subissent pas seulement des sydations, mais qu'avant d'arviver à leur terme ultime, elles peuvent contracter des hydrogénations faibles permettant un ca-et-cient de l'agent médicamenteux qui peut ainsi activer chimiquement toutes les collules de l'organisme.

2º L'Ozugene. — Nous avons montré par des expériences nombreuses que l'oxygéne libre détruit le philothion. Ce gaz est done un exeitant chimique de la cellule par l'hydrogéne qu'elle lui soustrait. On conçoit des lors qu'une respiration forcée ou des inhalations d'oxygéne en agissant plus énergiquement sur le philothion de la cellule contribuent à lui donner plus d'activité vitale.

Nous devons faire remarquer avec soin que la chimie n'a oncore découvert dans les organismes vivants qu'un petit nombre de matières définies absorbant l'oxygène libre à la température de 40°. L'hémoglobine, quelques toxines et le philothion sont de ce nombre. Il en résulte que l'action de l'oxygène sur le philothion, qui fait partie intégrante de l'élément histologique a une importance vraiment considérable.

La gymnastique respiratoire qui a donné de si beaux résultats à notre collègne le D^r Maurel (de Toulouse), est un des meilleurs procédés pour faire de la suralimentation oxygénée.

3º Le Phosphore. — Le D' Noé, en se fondant sur les propriétés du philothion a étudié le phosphore blane libre et a reconnu que ce métalloïde, sans avoir besoin d'être dissous, se combine avec le philothion des tissus vivants en produisant de l'hydrogène phosphoré. Le phosphore libre est donc un excitant chimique de la cellul. par soustraction d'hydrogène. Lo gaz hydrogène phosphoré produit pénètre dans le sang et se répand dans toutes les parties de l'organisme, oi il subit une transformation analogue à celle de l'hydrogène sulfuré. Il y a décomposition avec régénération de phosphore libre qui peut recommencer plusieurs fois lo cycle, en produisant une excitation de toutes les cellules de l'ètre.

Une preuve de l'exactitude de cos phénomènes est fournie par l'usago du phosphure de zine qui, d'après Vigier, est décomposé par le sue gastrique et pénétre dans la circulation sous formo d'hydrogene phosphoré, où il agit comme le phosphore et est un excitant du systéme nerveux.

Les composés oxygénés du phosphore ayant une grande stabilité chimique, ne sont pas sans douto décomposés et agissent par conséquent par un autro mécanismo.

4º L'Iode. — Ce métalloide a uno affinitó si grande pour l'hydrogène, qu'on ne saurait mottre en doute son action sur le philothion. Il est facile de le prouver expérimentalement. En ajoutant un peu d'empois d'amidon à une liqueur de phichtion, puis de l'iode, on aperçoit une teinte bleue qui disparait do suite. C'est que l'iode s'empare de l'hydrogène du philothion et d'autres corse en les détruiset.

Cortains sujets, — nous en sommes personnellement un cosemple, — ne supportent pas les iodures atealins. Au bout de doux ou trois jours, on ressont dans la gorge une très désagréable saveur d'iode qui indique nettement une déconposition de l'iodure avec mise en liberté d'iode libre. On arrive à supporter cet agent médicamenteux en prenant en même temps de l'eau de Vielly. L'hypothèse de Binz de la décomposition des iodures avec mise en liberté d'iode nissant paraît être exacte dans cortains cas. Une certaine quantité d'iode pourrait ainsi agir plusieurs fois sur l'hydrogène des cellules.

Le chlore et le brome détruisent aussi le philothion et un grand nombre d'autres corps par déshydrogénation; mais leurs composés alcalins ne paraissent pas décomposés par l'organisme. On ne voit apparaître de l'acide chlorhydrique que dans le suc gastrique.

5º L'Arsenie. — Il y a quelques mois, nous avons prouve expérimentalement (1) qu'une solution fluorée autiseptique de philothion transforme l'arséniate de soude en arsénite de soude. Sans avoir pu démontrer absolument que cet effet est du au philothion, il y a cependant tout lieu de le croire, de sorte que la réduction de l'arséniate de soude est provoquée par l'hydrogène du philothion, du moins en partie; si, d'autre part, on remarque la transformation inverse démontrée par Sciulz et Binz, c'est-à-dire l'oxydation de l'arsénite en arseniate, on voit que l'action de l'arseniate est produite par un ozed-c'entet analogue à celui du soufre.

6º Les alcalins. — Les sels alcalins qui sont des médicaments de la nutrition agissent en facilitant les réactions, Pour le philothion notamment, nous avons constaté que les sels alcalins augmentent la rapidité de l'absorption de l'oxygéne.

Te Le fer et le chlorure de sodium. — Nous n'avons aucune donnée précies sur les actions réciproques de ces corps avec le philothiou. Les principes constitutifs des éléments histologiques sont si nombreux et si variés, que nous ne les connaissons pas encore tous. Le fer et le chlorure de sodium agissent peut-être chimiquement sur une de ces substances encore inconnues.

En résumé, les agents médicamenteux classés par M. Arnozan dans les Médicaments spéciaux de la nutrition, ont presque tous une affinité chimique pour l'hydrogéne faible-

Sur le philothion ou hydrogénase dans Bull. soc. histoire naturelle de Toulouse, 1900.

ment combiné du philothion, matière inhérente à la cellule vivante. Ils produisent par la soustraction d'hydrogène une excitation qui augmente la vitalité de l'élément histologique. La classification de M. Arnozan dictée par l'expérience clinique se trouve être parfaitement d'accord avec les expé-

riences chimiques in vitro.

Depuis quelques années, on a introduit en thérapeutique le bleu de méthylène comme un antiseptique. Cette belle

le blou de méthylène comme un antiseptique. Cette belle matière colorante jouit de la propriété de se combiner à l'hydrogène du philothion, en formant une substance incolore qui repreud très rapidement sa teinte bleue sous l'influence de l'oxygène libre de l'air.

Nous pensons que cette action déshydrogénante est suffisante pour tuer les organismes ou les cellules qui se laissent pénéture par cette matière. Il faut, en effet, noter certaines particularités qui peuvent expliquer des actions différentes Ainsi, la levure de bière cieante n'hydrogéne pas les alliindigotate de sodium, tandis que la levure tuée ou la liqueur de philothion produit cette hydrogénation avec facilité, même en présence de l'oxygène libre de l'air. Le bleu de méthylene, au contraire, est hydrogéné rapidement par la levure de bière cieante et morie. Il faut fair l'expérience dans un flacon plein et bien bouché. Quand la teinte bleue a disparu et qu'on agite le contenu à l'air, la teinte bleue reparaît immédiatement.

Tout ce qui précède autorise à penser que le bleu de méthylène pris à très petites doses fractionnées pendant un temps assez long, pourrait rendre des services, comme stimulant général de l'organisme.

Enfin, nous ferons observer que dans les aliments ordinaires de l'homme, on ne trouve pas de philothion; mais qu'on fournit, au contraire, ce principe immédiat aux malades, en leur faisant prendre, soit de la viande crue, soit de la levure de bière. Nous ignorons d'ailleurs complètement si cette matière conserve dans le torrent circulatoire les propriétés qui lui ont été reconnues in citro. Quoi qu'il en soit, les principes, modifiés ou non, fournis à l'être vivant par l'usago de la levure de bière et des viandes crues ont produit de très bons résultats. Il est certain qu'il puise dans ces aliments des matières très instables, comme le philothion, assimilables aru un très faible effort.

Communications

Influence des métaux lourds sur la formation de l'hémoglobine.

Par le Professeur Cervello (Palerme).

Mo trouvant en ce moment à Paris, j'ai cru de mon devoir d'assister à cette réunion de la Société de thérapeutique afin de vous exprimer, messieurs, toute ma reconnaissance pour l'honneur que vous m'avez fait en me nommant membre d'unc compaguie dont l'autorité est si universellement reconnue. Permettez-moi donc de vous donner, en signe d'hommage et de gratitude, communication de certaines études qui ont été faites dans mon École sur les métants lourds.

Dès l'année 1870, je me suis occupé de l'action physiologique du for, spécialement en ce qui a trait à son absorption, à ses transformations chimiques dans l'organisme, ainsi qu'à son action vaso-constrictrice (1), et j'ai bien souvent cesayé de rechercher le mécanisme intime qui permet au fer de reconstituer le sang, vu qu'à mon sens aucune des théories duises jusqu'à ce jour sur ce sujet ne repose sur des bases solides.

Sur l'action physiologique des chlorures de fer. Archivio per scienze mediche, 1880. – Absorption du fer et ses transformations chimiques. Archivio di Farmacol. e Terap., vol. IV, page 157.

Pendant le cours de ces études, men attention fut souvent attirée par quelques observations recueillies çà et là dans la littérature médicale et se rapportant à l'augmentation du nombre des globules du sang produite par l'influence des divers métaux. Notamment en ce qui concerne le mercure, ce fait a été formellement affimé. — Galliard, en administrant le sublimé et le protoiodure de mercure à des anémiques, non syphilitiques, a observé l'augmentation de l'appétit, du poids du corps, de l'hémoglobine et des globules rouges. — Robin a romarqué l'augmentation des hématies après l'usage du mercure, aussi bien chez les individus sains que chez les syphilitiques. Plusieurs expérimentateurs, tels que Bonnet, L'iégeois, etc., ont observé l'augmentation du poids du corps et du nombre des globules rouges chez les chiens et cliez les lapins auxquels on donnait de très petites doses de sublimé.

Le pouvoir hématogène n'est donc pas une propriété exclusive du fer, mais il appartient aussi au mercure qui, pharmaceutiquement, est si éloigné du fer.

Dans la pensée que cette propriété était probablement commune à tous les métaux lourds, je résolus alors de soumettre mon idée au contrôle de l'expérience et je publiai en 1894 mon premier mémoire sur ce sujet (1). Les expériences fuent faites sur deux séries différentes de coqs et de chiens. Aux animaux de la première série, je donnais la nourriture labituelle en quantité constante et je mesurais journellement l'hémoglobine avec l'hémomètre de Fleischi; quand les chiffres se maintenaient invariables, j'administratux maintenus dans des conditions normales. Eh bien, dans ce cas, le cuivre, le zinc, le manganées et le mercure détermierent une augmentation de quelques degrés de l'hémomètre.

Sur le pouvoir hématogène des métaux pesants. Arch. di Farmacol. e Terap., vol. II, page 545.

Cette augmentation fut plus marquée encore dans uno seconde série d'expériences dans laquelle es animaux recevaient, autant qu'il est possible de le faire, une alimentation exempte de fer. Cette nourriture exempte de fer se composait d'amidon, d'ablumine d'œuf, de gleitane, de sucre, de carbonate de sodium, de chlorure de sodium et de phosphates de potassium, de calcium et de magnésium. Cependant des traces de fer furent constatées dans l'amidon et dans l'albumine. Comme boissen on donnait de l'eau distillée dans laquelle étatient dissous du chlorure et du sulfate de sodium et des carbonates de calcium et de magnésium, tous sels exemus de fer.

Dans ces conditions, on provoqua une anémie artificielle : le taux de l'hémoglobine diminua rapidement et notablement ainsi que le poids des animaux dont les conditions générales ne se maintinrent pas florissantes en raison de l'alimentation irrationnelle

Il est digne de remarque que dans ces conditions défavorables on obtint toujours une augmentation de l'hémoglobine par l'emploi des métaux pesants. Cependant on ne peu pas tenir longtemps les animaux en expérience parce qu'ils dénérissent.

Ĉe résultat uno fois obtenu, J'en voulus faire la preuve thérapeutique et J'employai le sulfate de cuivre jusqu'à 6 centigrammes en deux fois pendant les repas; cette doso peut être portée bien au delà sans aucun danger, pourvu qu'elle soit augmentée graduellement. N'ayant pas à ce moment dans mon service hospitalier des cas de chloro-anémie, je fis des expériences sur quelques formes d'anémie consecutive à la malaria chronique. Les malades étaient soumis à un régime constant; ils ne prenaient aucun médicament en dehors du sulfate de cuivre, et on constata chez eux une augmentation de l'hémoglobine plus grande encore que clez les animaux (1)

⁽¹⁾ De l'influence du cuivre dans les anémics. Arch. di Farm. e Terap. Vol. II, p. 441.

M'étant trouvé dans l'impossibilité de poursuivre ces recherches initiales, elles furent reprises et en partie amplifiées par quelques-uns de mes élèves, aussi bien dans les laboratoires que dans les cliniques.

Savoca (I) essaya le sulfate de zinc dans quelques cas de chlore-anémie et dans un cas d'anémie consécutive à la malaria chronique; il l'administra à la dose de 1 à 6 centigrammes en deux fois pendant les repas et il constata que le shiffre de l'hemoglobine se doublait en peu de temps.

Scarpinato (2) étudia l'action du cupro-hémol, corps présentant un certain intérêt parce qu'il résulte de l'union de l'hémol et du cuivre, substances qui, toutes deux, sont retenues pour hématogènes (3); il obtint le méme résultat tant hez les animaux que chez quelques individus anémiques. Il remarqua aussi l'augmentation du nombre des globules rouges. Comme conclusion de ses expériences, il recommanda dans la praique médicale le cupro-hémol qui, contenant le cuivre à l'état de combinaison organique, n'a aucune action irritante sur le tube gastro-intestinal; selon Merck, on en peut élever la dose de 0,1 à 0,5 grammes trois fois par jour. D'autres expériences furent tentées par Guagenti (4) avec

le sulfate de cuivre, le sublimé et le calomel ; et ces trois sels se montrérent d'actifs régénateurs du sang.

Le travail de Mercadante (5) mérite une mention spéciale. Cet auteur trouva d'abord que l'hémol n'a pour ainsi dire

Le zinc dans les anémies. Arch. di Farm. e Terap. Vol. III, p. 218.

⁽²⁾ Sur le pouvoir hématogène du cupro-hémol, Arch. di Farm. e Terap. Vol. III, p. 557.

⁽³⁾ Selon l'expérience de Mercadante rapportée plus loin, l'hémot n'a pas de pouvoir hématogène.

Sur le pouvoir hématogène des métaux lourds. Arch. di Farm. e Therap. Vol. IV, p. 361.

⁽⁵⁾ Etude comparative sur le pouvoir hématogère de quelques hémols et de quelques métaux pesants. Arch. di Farm. e Therap. Vol. V, p. 521.

aucune action par lui-même, ainsi que l'iodo-hémol et le bromo-bémol qui sont également inactifs : cependant, quand il entre un métal pesant dans la molécule de l'hémol, le corps qui en résulte (ferro-hémol, cupro-hémol, zinco-hémol) acquiert un pouvoir hématogène bien marqué. En même temps il observa que l'on peut obtenir les mêmes effets avec les sels inorganiques des métaux pesants et peut-être même en un temps plus court. Chez les animaux sains, on constate même une légère angmentation du nombre des globules rouges augmentation qui n'est pas proportionelle à celle de l'hémoglobine. Il semble donc que celle-ci subit dans le globule une plus grande concentration. Cependant, dans les formes d'anémie dans lesquelles les hématies diminuent, les hémols métalliques, ainsi que les sels inorganiques des mêmes métaux non seulement régénérent l'hémoglobine, mais augmentent parallèlement le nombre des hématies.

Dans un récent travail, Pitini et Messina (1) ont aussi reconnu des propriétés hématogènes au nickel et au cobalt. Ces auteurs ont fait des expériences sur des coqs, des lapins et des chiens, et ils ont constaté que dans les animaux sains, l'augmentation des globules rouzes est netité.

Les recherches effectuées par les différents expérimentateurs de 1894 à ce jour, sur les hommes aussi bien que sur les animaux, me semblent être assez nombreuses pour me permettre d'affirmer que le pouvoir hématogéne n'appartient pas seulement au fer; ce dernier partage cette propriété avec tous les métaux pesants. De ce fait, on peut tirer des déductions théoriques et pratiques que je crois être d'un certain intérêt. En effet, en ce qui concerne la théorie de l'action du fer, nous ne pouvons certainement pas admettre que la régénération de l'hémoglobium se produit par la pénértation

⁽¹⁾ Sur le pouvoir hématogène du nickel et du cobalt. Arch. de Farm. e Terap., Vol. VII p. 1.

du fer médicinal dans sa moléculo, parce qu'alors i faudrait paroillement admettre que le cuivre, le xine, le mercure, etc., agissent par le même mécanisme, c'est-à-dire que de même qu'il y a l'hémoglobine à base de fer, il s'en forme d'autres à base de cuivre, de zine, de mercure, etc., qui Jouent le même rôle physiologique dans l'organisme animal. Cette conception est très hasardée et n'est pas actuellement admissible. Mais ce n'est pas le moment de m'arrêter à discuter cet argument, au sujet duquel J'ai des études en cours.

Pour ce qui regarde la pratique médicale, je crois qu'on peut retirer de ces recherches des applications utiles et que la thérapeutique hématique acquerra de nouveaux médicaments. Seul, un examen comparatif long et minutieux permettra de déterminer auquel des métaux pesants on doit donner la préfèrence à l'exclusion, bien entendu, de ceux qui conduisent à un empoissonmemt chronium.

Comme il s'agit de travaux de laboratoire et de clinique poursuivis dans mon école, je serais heureux qu'ils fussent pris en examen par mes collègues, et l'apprécie hautement l'honneur qui m'est donné aujourd'hui de les communiquer à des savants oui illustrent le nom francais.

La cure photothérapique du lupus érythémateux Par le D' Leredde.

On se rappelle quel retentissement ont eu les travaux et les communications du professeur Nils R. Finsen, relatifs à une méthode thérapeutique nouvelle, fondée sur l'utilisation des rayons chimiques du spectre. Dans le traitement de la variole, Finsen supprime toute action de ces rayons sur les régions découvertes de la peau, par l'emploi continu de verres rouges; dans ces conditions, la suppuration est nulle ou presque nulle, les cicatrices sont insignifiantes. Dans le traitement d'affections microbiennes graves, rebelles, Finsen utilise ces rayons, dont l'action bactéricide a été déterminée par de nombreux observateurs, les concentre sur la peau

au moyen de lentilles en cristal de roche, en les recueillant soit du soleil, soit d'une lampe à arc de 60-80 ampères. Depuis plusieurs années, il s'est consacré presque exclusivement à la cure du lupus tuberculeux vulgaire et est arrivé à des résultats merveilleux. Par la méthode photothérapique, indolente, sans danger, agissant plus profondément que tous les procédés connus jusqu'ici. Finsen fait disparaitre complètement et définitivement des lésions de date ancienne, essentiellement rébelles, et dans une statistique récente, communiquée au Congrès de dermatologie de Paris, il déclare avoir soigné près de 600 malades sur lesquels il n'a eu que 2 ou 3 p. 100 d'insuccès. Pour qui connaît la gravité du lupus tuberculeux et a eu à soigner des malades atteints de cette terrible affection, c'est là un résultat extraordinaire; pour qui a vu des malades atteints de lupus étendu de la face, ulcérés et défigurés, c'est un réel progrès social.

Parmi les maladies graves de la peau, atteignant les régions découvertes, d'autres sont susceptibles d'être guéries par la photothérapie. Finsen, a soigné avec succès des cas de pelade, d'épithéliome de la face, d'acné rosée et vulgaire, de nævi vasculaires plans. J'ai moi-même obtenu des résultats encourageants chez un malade atteint de rhinophyma et dans un cas de sycosis de la lèvre supérieure. Le nombre des malades atteints de ces affections et soumis à la photothérapie est encore trop faible pour qu'on puisse juger définitivement de la valeur de la méthode dans leur traitement ; je me contente de mentionner ici des applications sur lesquelles je n'ai pas encore d'expérience réelle. Mais avant commencé depuis près de quatre mois à traiter, à l'Établissement dermatologique de Paris, les dermatoses rebelles de la face par la méthode de Finsen, j'ai eu surtout affaire à des cas de lupus érithémateux et je puis déjà appuver sur des faits précis une opinion concernant les avantages de la photothérapie dans la cure de cette maladie.

Mais, avant d'exposer mes observations et les résultats

du traitement, je dois rappeler quelle est la gravité du lupus érythémateux au point de vue local. Sans doute, il n'amène pas les destructions que détermine le lupus tuberculeux, mais il est encore plus rebelle à la thérapeutique. Le procès des diverses méthodes de traitement n'a pas été fait avec un soin suffisant, que je sache, les dermatologistes n'ont pas apporté de statistique qui permette de juger définitivement entre les divers procédés qui sont couramment employés, Mais, si je m'en réfère à mon expérience personnelle, je puis dire qu'en neuf années de séjour à l'hôpital de Saint-Louis et sept années de pratique personnelle, je n'ai vu guérir qu'un petit nombre de malades atteints de lupus érviliémateux de la face. Ceux que j'ai vus guérir ou que j'ai guéris présentaient des formes congestives, inflammatoires, des lésions de date réconte, dont certaines entraient en régression spontanéo; dans les formes fixes, infiltrantes, hyperkératosiques, telangecitasiques, la guérison par n'importe quel procédé thérapeutique, est rare.

Du reste, le nombre des traitements auxquels on peut soumettre los malades sans résultat est considèrable : applications de savon noir, de pommades à l'acide salicylique, à l'acide lactique et à la résorcine, de pommades pyrogalliques, d'îlctyol, de liqueur de l'olwer étendue, d'iode, de sels mercurièls; scarifications, cautérisations, toute la série des caustiques, en particulier la potasse, l'acide phénique neigeux, l'acide trichloracétique. On a même fait l'ablation par la méthode de Lang, comme dans le lupus tuberculeux.

Enfin, depuis peu, on a traité le lupus de Cazenave par les courants de liaute fréquence et les faits apportés par M. Brocq à la Société de dermatologie prouvent qu'il y a là un progrès important (1).

Mais, des à présent, je crois que la méthode photothérapique constitue un progrès bien plus considérable, et je me fonde

⁽¹⁾ Brocq. Société de Dermatologie, décembre 1900.

sur les résultats que j'ai obtenus sur 11 malades atteints de lupus graves, rebelles, datant de plusieurs années et ayant résisté à tous les procédés thérapeutiques, y compris les eourants de haute fréquence eux-mêmes.

Voici les observations de mes malades :

A. Malades quèris.

Observation I. — Mess C... Début du lupus : sept ans. Lupus couvrant le nez ; rougeur diffuse, squames sèches, télangiectasies. Hypertrophie de l'organe. Plaques des joues couvrant los régions sous-palpébrales. Traitée régulièrement sans résultat.

35 séances de photothérapie avec réactions photogénétiques (2) franches, allant parfois jusqu'à la phlyctène. Guérison complète des joues et du nez, sauf à son extrémité inférieure. La malade, obligée de partir à l'étranger, interrompt provisoirement le traitement.

Ons. II. — M= P., Début du lupus : sept ans. Traitée dune manière continue par des pointes galcaniques et des scarifleations (70 séances) sans résultat reét (deux ou trois potites plaques disparues seulement). Lupus à type conçestif, sans vaisseaux dilatés avec squames fines adhérentes. Plaque maîtresse couvrant le nez. Plaques multiples des joues, de la récino sourcilière, des oreilles.

45 séances de photothérapie avec réactions photogénétiques franches. Guérison complète des joues, du nez, de la région sourcilière. Les oreilles restent atteintes, n'ayant pas été encore traitées.

Obs. III. — Mile H... Début du lupus: deux ans. Plaque de lupus érythémateux du type congestif empiétant sur la face latérale gauche du nez et la partie adjacente de la joue.

⁽²⁾ L'inflammation produite par les rayons chimiques ne se révète cliniquement qu'au bout de six heures, douze heures et plus. Elle se traduit par de l'ordéme, de la rougeur; quand la « réaction photogénétique» est franche, on peut observer une phlyetène qui disparalt rapidement nour fatre place à des croûtes.

Traitée par des cautérisations au galvano, des applications quotidiennes de teinture d'iode, sans résultat.

7 séances de photothèrapie. Réactions photogénétiques franches. Formation d'un tissu cicatricel régulier : cicatrice plane à peine apparente. Après une période de repos, on constate qu'il reste seulement un peu d'érythème sur le bord inférieur de la cicatrice.

B. Malades améliorés.

Obs. IV. — M. J... Début il y a un an. Lupus èrythémateux de l'extrémité droite du nez : type atrophique avec étatcicatriciel central, zone de progression surélevée avec télangiectasies. Traitée par l'acide phénique neigeux sans résultat.

20 séances environ. Les premières ne provoquent pas de réactions sensibles; en revenant avec insistance au même point, or obtient de la rougeur, de l'oddeme et même des phlyetenes. Amélioration importante, sans guérison complète; cicatrice régulière : sur les bords, on trouve quatre foyers érythémateux persistants très petits.

Oss. V. — M. S... Lupus érythémateux trés profond du type télangiectasique; 3 plaques : extrémité du nez, lobule de l'oreille gauche, joue droite.

40 séances de photothérapie. Réactions photogénétiques régulières. Guérisou de la plaque de l'oreille et de celle de la joue. Amélioration de la plaque du nez, mais persistance de quelques télangiectasies profondes.

C. Malades en voie de guérison ou d'amélioration.

Ons. VI. — Mis N..., 26 ans. Début il y a 12 ans. Grand lupus érythémateux formant 3 plaques dont l'une couyre la plus grande partie de la joue droite, une autre la (partie moyenue de la joue gauche, la troisième le nez. Lésious des oreilles. Infiltration marquée des tissus, couleur rouge violacée, hyperthratose avec squames adhérents.

Traitée pendant 6 mois par le galcano-cautérisation, 6 mois par des scarifications sans résultat. Applications de créosote. Injections de chlorure de zinc. Applications pyrogalliques, injections d'oxycyanure de mercure. A subi récemment 70 séances de haute fréquence sans résultat.

22 séances de photothérapie au 20 décembre. Une quinzaine environ sur la joue gauche. Réactions photogénétiques typiques, avec phlyetènes. La joue gauche ne présente plus à la fin de décembre qu'une rougeur claire; toute lésion épidermique a disparu. La peau est tout à fait homogéne. Il est impossible de trouver des lésions caractéristiques du lupus érythémateux. Amélioration considérable de la joue droite en queluues séances.

Obs. VII. — M. G..., 47 ans. Début de l'affection, il y a 2 ans. Lupus érythémateux couvrant le nez, du type congestif, rougeur sombre diffuse, desquamation superficielle; légère hypertrophie de l'organe.

Traité, sans résultat, par la searification, le galranocautérisation, des applications d'emplatres et de pommades.

Au 24 décembre 1900, 17 séances de photothérapie. Les réactions photogénétiques ont été d'intensité moyenne. Diminution de volume du nez, rougeur moins foncée, affaissement des lésions, la peau a repris une souplesse plus grande.

Ons. VIII. — M** P..., 36 ans. Début du lupus 3 ans. Lupus typique du nez aver ougeur diffuse. Squames, arborisations vasculaires. Traitée par le savon noir, les pointes galvaniques, la haute fréquence, 25 ou 30 séances de scarification, sans résultats.

Au 20 décembre, 40 séances de photothérapie. Affaissement des lésions. Diminution d'étendue. La surface encore rouge sombre présente un aspect cicatriciel universel. Réactions photogénétiques moyennes, sans phlyctènes.

Ons. IX. — M¹⁰ de R... Début du lupus 6 ans. Plaque couvrant le nez. Plaques multiples sur la joue gauche. Grande plaque préauriculaire. Infiltration diffuse des oreilles.

Les lésions sont sèches, épaisses, dures, trés squameuses.

Traitée pendant 4 ans d'une manière continue par le galvano-cautère sans résultat. Il séances de photothérapie, au milieu de décembre, sans autre effot qu'un affaissoment léger de la plaque préaurieulaire traitée la première. Sur une petite plaque do la joue gauche on applique une ventouse de manière à provoquer un cédemo artificiel, puis on fait une séance de photothérapie; à la suite, réaction avec philyetène.

Au 6 janvier 1900, 30 séances. Sur chaque point traité, l'application des rayons chimiques est faite pendant deux heures consécutives. Depuis qu'on a adopté ce système, les réactions photogénétiques sont nettes, une grande amélioration se manifeste sur la plaque préanticulaire, qui devient lisse, de couleur claire, et présente en certains points une atrophée évidente de la surface.

D. Malades en traitement non modifiés ou peu modifiés.

Ons. X. — M. D..., 26 ans. Debut du lupus, 12 ou 13 ans. Actuellement, immense lupus érythémateux de la face; plaque centrale couvrant le nez et la plus grande partie des joues, plaques préauriculaires et auriculaires. Lésions du cuir chevelu. Ce lupus est remarquable par sa séchereses, l'état soumeux de sa surface. l'étaisseur des lésions.

Le malade a été traité sans résultat depuis le début par des applications de pommades à l'ichtyol, au pyrogallol, à l'acide salleglique, à la eréosote. Il a subi une centaine de séances de yalvano-eautérisation, autant de scarifications, 25 séances de haute fréquence.

An 20 décembre 1900, le nombre des séances de photolicirapie est de 13. Elles ont été faites sur quatre plaques de lupus érythémateux. L'application de la méthode Finsen n'a pas provoqué dans la plupart des points de réactions photogénétiques importantes; on remarque seulement l'affaissement des lésions, un état atrophique, trés léger de leur surface. Une plaque est trés améliors.

Ons. XI. — M. L... Début 4 ans. Immense lupus de la face ; plaques multiples disséminées sur presque toute l'étendue de la face. Lupus épais, dur, soc.

11 séances de photothérapie. Pas de réaction. Réactions

obtenues sur une plaque au niveau de laquelle on a fait une séance de haute fréquence.

On sait déjà que la photothérapie ne donne pas dans le lupus érythémateux les résultats à peu près constants qu'elle donne dans le lupus tuberculeux commun. Je ne connais jusqu'ici que deux statistiques: celle de Finsen, qui a soigné 34 malades; au moment où ses chiffres ont été publiès 10 étaient oncore soignés, 12 guèris. 12 avaient renoncô à poursuivre leur traitement. Pétersen a soigné5 malades et en a zuéri 4.

Pourquoi la photothérapie ne guérii-olle pas, jusqu'ici, tous les cas de lupus érythérmateux, mais seulement les deux tiers ou les trois quarts? Il me semblé évident que dans les cas qui résistent, les rayons chimiques n'arrivent pas à pénôtrer complètement les tissus malades, en raison de leur vascularisation et de leur structure scléreuse; dans les cas rebelles, que je soigne en ce moment, il s'agit toujours' de formes très sèches avec infiltration considèrable et résistante du derme. Ces formes comme les autres guériront par la photothérapie lorsqu'ou aura modifié la technique de manière à rendre les tissus cutanés perméables dans leur profondeur aux rayons violets etultra-violets.

Le moyen le plus simple, et celui qu'emploie Finsen (communication orale), consiste à laisser les malades exposés à l'action des rayons lumineux pendant deux séances consécutives d'une heure ou une heure et quart chacune.

Citez une de mes malades(obs. IX), ce procédé a donné un résultat excellent. La malade, qui présentait des réactions photogénétiques insignifiantes lorsqu'elle n'était soumise aux rayons que pendantune heure, a offertdes réactions vives à la suite de séances prolongées, et dés lors l'amélioration du lupus est devenue manifeste.

On peut aussi chercher à modifier les régions malades pour les rendre plus sensibles aux rayons chimiques. J'ai essayé de déterminer un codème par des applications de petites ventouses sur la région qui devait être soumise à la photothérapie, une inflammation séreuse, par des injections intradermiques de cantharidine, et même de soumettre ees plaques aux courants de haute fréquence. Je ne puis encore rien dire de procés sur ces procédés que ja mis à l'étude.

٠.

Je laisse de côté ces questions de détail. Ma communication peut se résumer de la manière suivante :

Depuis que j'ai eommencé à appliquer la photothérapie au traitement dermatologique, j'ai soigné II malades atteints de lupus cirythémateux de la face. 5 de ces malades ne sont plus en traitement; 3 sont guéris, 2 améliorès d'une manière notable. 6 sont en traitement, 4 sont en voie de guérison, 2 n'ont encore retire aucun bénéfice réel du traitement. Tous ces malades sont atteints de formes difficiles. Presque tous ont été traités par toutes les méthodes connues, acec toute la peracérance nécessaire, sans résultat appréciable.

La méthede de Finsen paraît done être jusqu'à nouvel erdre, la meilleure mêthede de traitement des formes graves du lupus érythémateux.

Discussion

M. Betocaxat. — Je me permettra simplement de protester contreles dires de Finsen relativement aux expérimentations, de Juhel Rénoy, dans le traitement de la variole par les rayons rouges, dans les chambres rouges, réflexions qui sembleraient faire croire que Juhel Rénoy a obtenu de mauvais résultats.

J'ai moi-même été le collaborateur de Juhel Rénoy, dans l'expérience de traitement en 1893 à l'hôpital d'Aubervilliers. Neus avens traité environ une dizaine de cas et il a été fait les remarques suivantes;

Période de dessiceation beaucoup plus rapide, absence de

suppuration le plus souvent. Moins de cicatrices à la face. Meilleurs résultats qu'avec tous les autres traitements malgré les défauts dans l'application de la méthode.

M. BLONDEL. — Ayant eu l'eccasion, l'automne passé, de visiter à Copenhague l'Institut photothérapique de Finsen, je dois dire que j'ai été véritablement supéfait des résultats obtonus. Je me souviens, entre autres, d'un Français intiliement soigné pendant dix ans à Paris, censidéré comme incurable par un de nos dermatologues les plus connus, et que Finsen parvint à guérir presque complétoment en six meis. Il a fallu, pour ce malade, inventer un dispositif spécial permettant de garantir les globes oculaires contre l'action des rayons chimiques. Un des grands avantages de la méthodo consiste dans l'aspect que présentent les malades guéris; on no voit nulle part de cicatrices apparentes, exerçant des tractions sur les tissus sains adiacents.

Il ne faudrait pas toutefois passer sous silence les incouvénients de la photethérapic; elle n'est, pas plus qu'aucune autre médication, infailible; sen application est pénible, la durée du traitement est fort lengue et le personnel, voué à une tâche fatigante, se rebute facilement. Les sèances pro voquent souvent chez les malades des migraines, des névralgies, dues sans doute, pour une grande part, à la chaleur intense qui rêune dans les salles d'opérations.

Malgré cos inconvéuients, la méthode a provoqué en Danemark un grand enthousiasmo et le gouvernement n'a pashésité à entreprendro la censtructien d'un véritable palais, dans lequel Finsen pourra continuer ses recherches. Si la méthode n'a pas attiré davantage, au Congrès internatienal de Paris (1900), l'attention du monde médical, cela tient à ce quo Finsen n'est pas venu lui-même au Congrès pour faire la démonstration de sou precédé.

M. Leredde. — Finsen n'a peut-être pas présenté sa méthode d'une façon avantageuse, il aurait fallu insister sur le fait que d'autres interventions thérapeutiques sent susceptibles d'amener la guérison du lupus, et que certains eas échappent à l'action de la photothérapie.

- M. Du Castel. Il existe entre la méthode de Finsen et celles que nous connaissions jusqu'ici une différence fondamentale ; nous n'avons jamais traité, jusqu'iei, le lupus que partiellement, tandis qu'au moyen de la méthode de Finsen, l'action thérapeutique s'exerce sur toute la lésion et pénètre en profondeur. Il ne nous est même pas possible de délimiter cette action. En outre, les méthodes classiques ne donnent peut-être pas, entre les mains des médecins, toujours plus timorés que les chirurgiens, ce qu'elles devraient donner. Lorsqu'on se trouve en présence d'un lupus peu profond, largement étalé en surface, on peut en faire l'érodication compléte par le procédé de Lang : notre intervention s'adresse dans ce cas, de même que la photothérapie, au tissu morbide dans son ensemble; nous obtenons alors des guérisons complètes, et cela beaucoup plus rapidement que par la métitode de Finsen, puisqu'une seule intervention suffit. Les lupus plans doivent donc être de préférence traités en une seule séance par le râclage avec ou sans cautérisation consécutive.
- M. LEREDDE, Les cicatrices que donnent les interrentions chirurgicales sont beaucoup moins belles que celles que laisse après elle l'application de la méthode de Finse. Le résultat esthétique est ici très supérieur et les récidives sont beaucoup plus rares.
- M. Bardet. Je ne puis intervenir dans la discussion pour apprécier les résultats du traitement du lupus, c'est affaire aux médecins dermatologistes, mais je voudrais dire deux mots sur un fait qui a son intérêt au point de vue général.

L'action des vibrations lumineuses exerce une action considérable sur les fonctions de la peau, mais d'autres vibrations, les rayons X, ont aussi montre par des accidents fort curieux qu'ils sont susceptibles de provoquer sur la fonction cutanée une action très considérable. Or, il me parait qu'on doit ranger ces actions diverses dans le même cadre.

Je serais done eurieux de voir M. Leredde, qui, je le sais, possède une installation électrique très complète, comparer l'action des tubes de Crookes à celle de l'appareil de Finsen.

Les découvortes de la physique modifient tous les jours nos connaissances, on les entréhissant et en les compliquant; en ce moment nous ne devons pas perdre de vue l'action pharmacodynamique nouvolle, due justement à la production de radiations actiniques, spéciale à certaines substances. Depuis quelques mois, j'étudie avec M. Adrian de nouvelles substances douées de la radioactivité, et nous commençons à obtenir des effets très curieux, je profite done de l'occasion de la communication de M. Leredde pour dire qu'avant peu nous surours, nous l'espérons du moins, des résultats théoriques, sinon pratiques encore, à vous apporter. Dans tous les cas, le champ est ouvert pour les cherelheurs et il est certain que la thérapeutique prendra de plus en plus dans le domaine physique et à ce point de vue les faits apportés par notre collègue Leredde sont des volus intéressants.

M. BIONDEL. — Je rappellerai à M. Bardet que Finsen a dôjà essayê l'action des rayons X; il en a été peu saisfait, car ces rayons donnent souvent lieu à des troubles trophiques qu'on ne saurait prévoir ni diriger. Finsen prétend, du reste, que sa méthode agit par la leucocytose abondante qu'elle provoque dans la région traitée : les bacilles tuberculeux sont ainsi détruits.

Pour le traitement de l'anémie, Finsen précenise les bains de soleil. Les malades, entièrement nus, sont exposés à l'action des rayous solaires pendant plusieurs heures par jour.

Etaient présents à la séance :

Titulaires. — MM. Adrian, Bardet, Berlioz, Blondel, Bolognesi, Boymond, Brun, Cadiot, Cantru, Chassevant, Courtade, Crinon, Dalché, de Fleury, de Molènes, Delpech, Desnos, Dignat, du Castel, Duehesne, Hirtz, Huehard, Josias, Le Gendre, Lepinois, Leredde, Mathieu, Muselier, Petit, Albert Robin, Saint-Yves-Mesnard, F. Vigior, Vogt, Weber, Yvon.

Correspondants. — MM. Bouloumié, Duhourcau, Linossier. La séance est levée à 6 heures.

Le Secrétaire de service,

VOGT.

REVUE DES TRAVAUX FRANÇAIS ET ÉTRANGERS

Emploi da permanganate de potavos comme antidote de la strychmine. — Les bons effets du permanganate de potasse dans l'empoisonnement par la stryclinine sont dus à l'action chimique qu'il exerce sur cet alcaloide. Il l'oxyde te clanage en une substance inoffensive pour l'organismo.

Lorsqu'on intervient de bonne heuve, avant que les convulsions aient commencé, on fait prendre au malade une solution de permanganate de potasse dessée à raison de 1 sur 2,000, et l'on fait faire un lavage de l'estomae avec une solution au einq millième.

Si une partie du poison est déjà absorbée et si les convulsions ont commencé, on a d'abord recours au chloroforme, à l'éther, au chloral, et quand le calme ost un peu revenu, on en profite pour faire le lavage de l'estomac avec la solution de permanganate au cinq millième et détruire ainsi ce qui peut rester du toxique dans les voies digestives.

La strychnine n'est du reste pas le seul poison sur lequel puisse agir le permanganate de potasse. Tous les alealoides peuvent être détruits par son action oxydaute, et l'on peut recourir avec avantage à cette médication dans les empoisonmements par la morphine, l'atropine, l'hyosciamine, otc., toutes les fois que la substance toxique n'est pas encere absorbée et que son antidote peut l'atteindre dans l'estomac. Journal de médecine de Puris du 14 jaurier 1900.)

La listerine. D' Lectoure. (Gaz. des Hôp., novembre 1900.)
On se rappelle los vives discussions soulevées il y a quelques
mois à la Société de chirurgie de Paris, sur la question de
l'asepsie et de l'antisepsie. Entre les opinions extrémes
soutonues denergiquement par des maires éminents, il semble
qu'il y ait, comme en toutes choses, un juste milieu à garder
excellemment défini autrefois par le regretté DujardinBeaumetz : c. lo meilleur antiseptique est, sans contredit,
colui qui est le moins nuisible à l'homme, à la dose nécessaire
nour produire l'ascessie.

C'est done aux antiseptiques non toxiques et puissants tout à la fois qu'est réservé l'avenir. Parmi ceux-ci, la listérine, un nouvel antiseptique qui nous vient d'Amérique, semble devoir occuper la première place. A vrai dire, il ne s'agit pas là d'un médicament nouveau, car si la listérine n'est pas oucoro très répandue en France, il n'en est pas de même en Amérique où, depuis longtemps, elle est connue et fort appréciée.

La listérine est un composó d'essences ozonifères, d'antisentiques végétaux et d'acide benzo-borique.

Elle se présente sous la forme d'un liquide clair, de couleur ambrée à la température de 15 degrés; à mesure que la température diminue, ce liquide deviont opaque. Cette propriété caractéristique de la listérine est due à la congeliation partielle de ses constituants essentiels; elle reprend sa transparence à mesure que la température primitive lui est rendue. La listérine présente uno reaction légérement acide, elle a une odeur forto, suave, aromatique, et une saceur piquante, qui toutes deux sont agréables; sa densité est moindre que celle de l'eau avec laquelle elle se mélange en toute proportion, sans précipitation ni séparation de ses eléments constituants.

L'étude du pouvoir antiseptique do la listérine a donné lieu à de nombreux travaux : Signalons, en particulier, ceux de M. Frank M. Deems (de New-York). Les conclusions de cet auteur nous montrent qu'une solution de listórine à 50 0/0 stérilise les cultures les plus virulentes; en dilution jusqu'à 10 0/0, elle empéche la putréfaction et conserve les tissus animaux; en solution à 33 0/0, elle arrête la formentation alecolique, etc.

Notons que, même en état de pureté, elle no coagule pas l'albumine.

Grâce à sos propriétés, la listérine laisse loin l'acide phénique, qui est toxique, corrosti pour la peau des mains des opérateurs et qui cause souvent des accidents de gangrène redoutables. D'une puissance supérieure à celle du sublimé, la listérine possède, en outre, l'avantage ne pas étre vénéueuse et de pouvoir s'employer impunément sur les muqueuses. Enfin, grâce s'es on odeur agraeble, elle présente de grands avantages sur l'iodoforme, nauséabond, toxique, et qui oxpose si souvent à des cezémas artificiles tenaces.

La listérine en solution au dixiônne est donc d'un emploi courant en chirurgie. Dans les plaies infectées, on utilise une partio de listérine pour quatro parties d'eux; culin, sur les plaies indolentes on peut, sans inconvênient, l'appliquer pure.

Mais la listérine n'est pas seulement un antiseptique pour l'usage externe. On peut l'employer aussi avec avantage, soit

en lotions, soit en injections ou en pulvérisations dans los cavités naturelles, dans les orcilles, le nez, la bouche, la gorge, le rectum, le vagin, l'urêthre, la vessie.

Les muqueuses les plus édicates la supportent parfaitement; les travaux de Lefferts, Portor, Seiler, Ingals, etc., montreut qu'on peut l'employre également en larguegoie, sous la forme de pulvérisations, seule en solution, ou associée à d'autres médicaments.

A l'intérieur, on en obtient les meilleurs résultats, et les malades l'absorbent d'autant plus facilement, qu'on peut l'associer avec d'autres médicaments.

C'est aiusi que dans la phtisie pulmonaire, la formulo suivante donne les meilleurs résultats.

Mèlez. Prendre une cuillerée à soupe toutes les trois heures.

La listérine trouve done son emploi dans les occasions les plus diverses, mais il y a un point qui mérite encore d'être signalé: par sa composition même, la listérine jouit, en effet, de propriétés analogues à colle des éthers ozonifères préconisés par sir Benjamin Ward Richardson pour désinfector los chambres de malades. Lá encore, elle sera employée efficacement.

Cette énumération, si incomplète qu'elle soit, des indications de la listérine, laisse prévoir le rôle que cet antiseptique est appelé à jouer dans la pratique journalière.

L'Administrateur-Gérant: O. DOIN.



A l'hôpital de la Pitié, dans l'amphithéatro des cours, M. Albert Robin a commencé, le 9 janvier, à nœu fieures et dennie du matin, ses leçons de clinique thérapeutique qu'il continuera tous les mereredis à la même heure. Elles doivent porter, cette année, sur le diagnostie et le traitement des matadies organiques de l'estonae.

Les premières leçons ont été tont particulièrement consacrése à l'exposé de la technique à suivre pour l'Étude du chimine stomacal. M. Albort Robin, après avoir rappelé l'utilité qu'il y a pour asseoir un diagnostic et instituer un tratiennent rationnel, d'étre édifié sur la façon dout s'accompit la fonding gastrique, montre qu'il suffit, pour atteindre co but, de disposer d'un outillage restreint parfaitement compatible avec les ressources de tout médecin praticien. Les réactions qu'il indique sont elles-mémes d'une telle simplirité que la recherche qualitative et quantitative de l'accidité, que la détermination de la nature de tolle ou telle fermentation devient extrêmement facile.

Pour que l'enseignement si pratique de M. Albert Robin ne reste pas limité an cercle de ses seuls anditeurs, le Bulletin de Thérapeutique en commoncera, dés la fin de ce mois, la publication.

Nécrologie

Le monde scientifique paie depuis quelque temps un large tribut à la mort. C'est par séries que les académies lèvent leurs séances en sigue de deuil. La profession médicale a été tout particulièrement éprouvée par la perte d'Ollier et de Bergeron, en décembre, et par les décès de Potaiu et Chatin, survenus ces lours derniers.

POTAIN 1825-1901

Potain s'est subitement éteint dans la unit du 4 au 5 janvier, terminant à 75 aus une vie d'un labeur inintervempu, consacré aux exigences de sa profession. Bon, serviable, accueillant, praticien soucieux de tous ses dovoirs, fidèle à sa mission de devouement et de désintéressement, sa vie peut être donnée en exemple à tous ceux qui out souci de la diguité du corps médical. De quel-que côté qu'on l'envisage en effet, qu'il s'agisse du médecin d'hôpital, du consultant, de l'homme lui-mème, la critique perd ses droits et tout ne commande qu'admiration et ôloges.

Né à Paris en 1825, Potain devenait interno en 1819, doctour et chef de clinique de Bouilland en 1831, médec-in des hopitaux en 1859, agrégé en 1860. Affecté à l'hospice des Ménages ectto année même, il passait en 1855 à Saint-Antoine, ot de la à Necker un an après, où il restait jusqu'en 1866, époque de son appel à la Charité, en remplacement de Hardy, Nommé professeur de pathodge interne en 1876, il promit possession quelques mois plus tard d'une chaire de clinique. Depuis 1882, il appartenait à l'Académie de médecine. En 1893, à la mort de Charcot, l'Académie des sciences se l'était spontanément adjoint, commo lo plus digne de représentor dans son sein la médecine française. Il avait été successivement promu chevalier, officier et commandeur de la Légion d'honneur.

Paisiblement, assez rapidement toutefois, Potain avait gravi

BULLETIN 115

les plus hauts sommots, obtenu les plus enviables succès et cola sans compromission, et sans autru noyen que sons seul mérite. L'intrigue et l'intérêt ne pouvaient aller avec sa nature droite, son honorabilité parfaite. Sans les avoir cherchées, la gloire et la fortuno étaient venues à lni, ce qui ne l'avait pas empéché de rester l'homme modeste dont la seule ambition était de faire le bien.

Potain écrivit peu. Parmi ses travaux, on cite sa thése inaugurale sur les « bruits vasculaires anormaux qui suivent les hémorrhagies », sa thèse d'agrégation sur les « lésions des ganglions lymphatiques viscéraux », des mémoires sur s'l'auscultation du cour », des articles daus le » Dictiennaire encyclopédique des sciences médicales » et surtont le recueil des « Cliniques de la Charité ». Ce bagge s'entifique ne saurait représenter la somme du travail de Potain. Son enseignement l'a surtout occupé; c'est en lui qu'il a mis le plus de lui-méme; c'est par lui qu'il s'est distingué puisque ses éléves, formés à son image, constituent aujourd'hui l'élite du corps médical.

Atteint il y a quelques mois par la limite d'âge qui ini imposait la retruite en pleine activité. Potain vécut un jour de tristesse. Ce fut le cœur serré et les larmes aux yeux quo malades et élèves se séparèrent du maître chez qui les années n'avaient fait qu'accroître la bonté.

Le Bulletin de thérapeutique devait un dernier hommago à Potain qui, jusqu'en 1893, en compagnie de Le Fort et de Regnault, fit partie de son comité de rédaction, mettant toute son intelligence et son activité au service de la divulgation scientifique.

CHATIN 1813-1901

Në à Dullins, dans le Dauphine, en 1813, Chatin reçu decteur en 1814 outrait neuf ans plus tard à l'Académie de médecine qu'en 1876 il était appelé à l'houneur de présider. Il était le doyen de cette docte assemblée à laquelle il appartenait depuis plus de quarante ans dans la section de la thérapeutique et de matière médicale. Il avait présidé, en 1896, l'Académie des sciences dont, depuis 1874, il faisait partie.

Chain était un savant dans toute l'acception du mot, plus particulièrement adonné à l'étude de la botanique. Ses travaux très remaqués font époque et l'on cite avec les plus grands éloges son ouvrage sur « l'austomie comparée des végétaux ». Fort apprécié du monde «cientifique, il n'était pas un incomu pour le grand public qui avait été très intéressé par ses études sur le mode de fécondation et de reproduction de la truffe.

Sa carrière professorale s'est déroulée à l'Ecole de pharmacie dans la chaire de botanique. Il avait aussi appartenu au corps des pharmaciens des hôpitaux en qualité de pharmacien chef des hôpitaux de Béaujon et de l'Hôtel-Dieu.

THÉRAPEUTIQUE GÉNÉRALE

Traitement des pnenmonies.

Par le D' Museller

Médecin des hôpitaux

Voiei un sujet qui n'est pas nouveau, loin de là, et qui pourtant, malgré ses apparences de sujet rebattu et épaisé, offre aux praticieus un intérêt de premier ordre. C'est que, parmi les affections coutumières, la pneumonie est toujours au premier plan de leurs préoccupations, parce qu'elle est une des plus communes et des plus redoutables. En second lieu, l'histoire des divers modes de traitements qu'on lui a successivement appliqué est un exemple vraiment suggestif de la mobilité des doctrines médicales, et de la variabilité paral-

lèle des méthodes thérapeutiques issues de ees doctrines. Nulle part on ne pent mieux saisir sur le fait l'influence que les unes out exercée sur les autres. De cet examen rétrospectif ressort la conviction que nos prédécesseurs ont trop souvent méconnu la véritable nature de la maladie qu'ils avaient à combattre, et, corrélativement, qu'ils ont plus d'une fois oublié l'importance du précepte : primo non nocere - légué par l'antique sagesse, Bien au contraire, on trouve chez eux une sorte de parti-pris de combativité et d'agression thérapeutique dont nous avons le droit d'être surpris. nous modernes, qui avons pu apprécier depuis longtemps l'inanité des efforts institués dans ce but : juguler et arrêter dans son cours une phlegmasie viscérale comme la pneumonie. Aussi la critique rétrospective de ces efforts a-t-elle vraiment beau ieu, depuis que le temps a prononcé sur eux son jugement définitif et sans appel. Il suffit, par exemple. d'opposer l'éclatante fortune de la saignée, envisagée comme méthode générale et systématique de traitement chez les pneumoniques, an discrédit à peu près complet qui l'a frappée depuis, ou celle de la méthode Rasorienne à l'oubli dans lequel elle est tombée de nos jours. On peut citer encore l'exemple de la méthode révulsive, moins bruvante. plus modeste dans ses allures, et qui a eu néanmoins la vie plus dure que ses ainées, bien que ses partisans décroissent chaque jour, les uns encore animés d'une conviction sincère, le plus grand nombre esclaves d'une tradition acceptée à la lettre et sans aucun souci de contrôle personnel. Ces divers exemples, choisis parmi bien d'autres, sont bien propres à donner une idée de l'influence que les idées médicales d'une époque ont pu avoir sur le traitement d'une maladie, et servent à nous expliquer l'origine des vicissitudes parfois contradictoires imprimées à la thérapeutique.

Juguler la pneumonie, l'arrêter dans sa marche, la faire avorter, telle était en effet la préoccupation qui semble avoir hanté nos prèdécesseurs, la prétention qu'ils affichaient et qu'ils s'efforçaient de réaliser. On a vu plus récemment d'autres méthodes qui, sans aller tout à fait jusque-là. représentaient néanmoins, dans l'esprit de leurs initiateurs ou de leurs partisans, des moyens d'action puissants, quasi héroïques, et dans lesquelles on a pu un instant croire avoir trouvé le secret du traitement de la pneumonie. Tels le traitement par la digitale et par les bains froids, dont on a espéré beaucoup, et qui a servi à édifier de brillanies statistiques. Pour la digitale, il suffit de rappeler les exagérations de Petreseo, de Bucharest, qui considérait ee mèdicament administré à haute dose, comme susceptible d'abréger de plusieurs jours la durée déjà si courte de la pneumonie, Visiblement, l'auteur a mal interprété les résultats qu'il a mis indûment sur le compte d'une action directe du médicament, alors qu'il eût été plus juste d'y voir l'effet d'une perturbation de l'organisme sous l'influence d'une substance qui agit uniquement par intoxication, comme le tartre stibié, moyen principal de la méthode Rasorienne. Cette intoxication se superpose à la maladie et ne sert qu'à en masquer la gravité: aussi l'amélioration constatée n'est-elle qu'apparente, un simple trompe-l'œil qui ne saurait longtemps faire illusion à un médeein exercé. Quant à la méthode des bains froids, très vantée à une certaine époque, non seulement comme étant propre à modifier favorablement certains symptômes, mais aussi comme moyen susceptible d'arrêter la marche de la maladie et d'abréger sa durée, elle ne mérite pas davantage eet excès d'honneur. On ne la eonsidère plus aujourd'hui que comme une méthode d'exception, comme une ressource éventuelle qui reconnaît, ainsi que nous le verrons tout à l'heure, ses indications et ses eontre-indications nettes et précises,

Cette énumération critique mériterait de prendre fin avec la méthode des bains froids, une des dernières venues parmi les médiodes systématiques instituées vis-a-vis de la punnonie. Pour d'autres, préconisées et et la, une simple mention peut suffire. Tel l'emploi de la veratrine, dont les lègers effets sont loin de contrebalancer les inconvénients réels et mêmes les dangers : celui de l'ergot de seigle dont l'action vaso-constrictive, théoriquement indiquée, ne trouve nullement à excerce rie d'une façon utile l'Alaunou. Ces diverses médications, qui ont en leur moment de vogue, n'appartiement plus qu'à l'histoire de la pneuronie. L'observation clinique, cette pierre de touche des innovations thérapeutiques et des systèmes, en a fait définitivement justice.

En sera-t-il de même pour d'autres tentatives plus modernes, plus en rapport avec les notions que la doctrine microbienne a introduites dans l'étiologie et la pathogénie des maladies infectieuses? La pnenmonie, qui mérite de figurer au premier rang de celles-ci, était tonte désignée pour servir à l'application des méthodes issues de la doctrine en question. En effet, du moment qu'il est reconnu que la phlegmasie du poumon est liée tout entière à la présence et à l'action pathogène d'un microbe spécial, le diplocoque lancéolé, le médecin est logiquement amené à rechercher un moyen propre à enrayer cette action pathogène, où tout au moins à en atténuer les effets. C'est la même préoccupation que l'on retrouve à propos d'autres maladies microbiennes, et notamment de la tuberculose qui a fourni déjà un appoint si considérable aux essais tentés dans cet ordre d'idées. En ce qui concerne la pneumonie, c'est évidenment elle qui a guidé les dernières recherches des thérapeutistes.

Ces recherches ont-elles été couronnées de succès, on autorisent-elles seulement l'espoir de la réussite finale? Avant de répondre à cette question, il est bon de connaître les opinions les plus accréditées, celles des auteurs qui ont le plus récemment écrit sur ce chapitre. Dans un article déjà cité. Talamon reconnaît bien la logique de ces efforts et il estime que cette voie nouvelle est à explorer, que c'est de ce côté sans donte qu'on trouvera le secret du traitement abortif de la pneumonie. Landouzy, qui a écrit sur la nneumococcie en général et sur sa localisation pulmonaire des pages où l'on retrouve l'originalité habituelle de sa pensée et de sa plume, exprime une idée analogue. Tont d'abord, il fait ressortir le rôle du diplocoque lancéolé, qui ioue dans la pucumonie le même rôle que le streptocoque dans l'érysipèle. C'est l'élément nécessaire, indispensable à la constitution du foyer d'hépatisation, comme le bacille de Koch est indispensable à la constitution des fovers tuberculeux. Les autres causes invoquées, froid, épuisement nerveux, traumatisme, ne sont que des causes occasionnelles, accessoires. Mais d'autre part, la gravité de la pneumococcie semble être plutôt l'effet de la nature du terrain que de la qualité de la graine. De même la suppuration juxta ou post-pueumonique est plutôt le résultat d'associations microbiennes, et non point du diplocoque lui-même. Les pneumococcies graves doivent leur gravité à l'intervention du système nerveux (inhibition) touché et adultéré par les toxines sécrétées par le diplocome et diffusées dans l'organisme. Le coefficient toxique lui-même a, d'une manière générale, moins d'importance que la résistance du pneumonique.

Poursuivant sa remarquable analyse, Landouzy constate que les analogies qui rapprochent la pneumococie des autres infections microliemes se maintiement quand il s'agit du traitement. Il n'y a pas de spécifique vis-à-vis de cette infection, pas plus qu'il n'y en a contre la streptococcie, a bactéridie charbonneuse et le bacille de Koch, Il n'y a qu'un traitement de défense. Mais l'avenir semble être à la s'erothèrapie, qui a tenu magnifiquement ses promesses vis-à-vis de la diphtérie. Le rève ici seratit de trouver une matière dont l'introduction dans l'économie ferait tomber toutes les manifestations symptomatiques et enrayerait net l'évolution de la détermination diplococcique locale. Jusquelà nous n'aurons que les médicaments dits de symptôme, c'est-à-dire un ensemble de moyens plus ou moins pallitatifs.

Un traitement spécifique de la pneumonie! Voilà, en effet, ce que l'on doit chercher, et ce que l'on a déjà cherché à réaliser par différents moyens, mais sans qu'aucune de ses tentatives ait donné par elle-même de résultat positif. On ne peut guère citer celles-ei que pour mémoire, encore que quelques-unes offrent une réelle importance au point de vue expérimental. Citons en premier lieu les essais réitérés d'injections antiscritiques dans la masse du parenchyme pulmonaire hépatisé. C'est à Lépine qu'on les doit, et l'auteur a constaté au début quelques faits qui semblaient de nature à l'encourager dans cette voie, il employait à cet effet une solution de bichlorure de mercure au 4000°, dont il injectait quelques centimètres cubes autour du foyer d'hépatisation. Mais ces injections ne semblent pas, en fin de compte, avoir abrégé d'une manière appréciable la durée de la maladie, ce qui était pourtant le but spécialement visé de l'auteur de la méthode. Même résultat négatif ou très discutable avec les injections de teinture d'iode en plein fover pulmonaire ou de benzoate de soude, ces dernières toutefois plus inoffensives, Talamon, qui fait la critique de ces essais, ne relève à leur actif qu'une amélioration superficielle, mais aucune influence marquée ni réelle sur la marche naturelle et sur la durée de la maladie. Les résultats ont été encore plus vagues, ou pour mieux dire aussi nuls, avec d'autres essais institués dans un ordre d'idées assez voisin du précédent et en vertu duquel l'expérimentateur cherchait à produire une sorte de stérilisation des pneumocoques et par conséquent l'arrêt de la phlegmasie pulmonaire dans son évolution. Tels sont les essais d'inhalation de substances antiseptiques volatiles (nitrite d'amyle, elhoroforme mélangé à l'alcool, etc.). Talamon, qui se contente de les mentionner, n'hésite pas non plus à les condamuer, en partieulier les inhalations de elhoroforne, à cause du danger de syncope et d'asphyxie auquel elles exposent les malades.

Il faut accorder naturellement plus d'importance aux tentatives de sérothérapie, qui représentent le premier pas dans une voie où se trouvera peut-être un jour la solution du problème. Disons de suite que, dans la pensée des expérimentateurs, le but de la sérothérapie serait plutôt iei de modifier le terrain sur lequel le pneumocoque exerce son action pathogène. Ce serait, en fin de compte, suivant la juste remarque de Talamon, une application partielle de la méthode générale de l'immunisation. On a fait servir à cela, tantôt du sérum de lapin préalablement immunisé, tantôt du sérum de pneumonique en convalescence. On a obtenu dans ee sens quelques résultats d'apparence favorable, mais en trop petit nombre pour que l'on puisse édifier sur eux une méthode comparable à celle qui représente l'emploi du sérum de chevaux immunisés vis-à-vis de la diplitérie ou de l'infection tétanique. Au dernier congrès des médecins allemands, tenu à Wiesbaden, on a mentionné ees tentatives, et nos confrères étrangers ont dû constater qu'elles n'avaient guère procuré que des résultats négatifs, tout en déclarant que la méthode procède d'une idée juste et en formulant des vœux pour sa réussite ultérieure. Même critique et même jugement sont applieables à une autre série d'essais, eeux-ei institués en vue d'utiliser la leucocytose que l'on sait exister chez les pneumoniques et dans laquelle on a vu un moyen de défense de l'organisme, une sorte de réaction do l'économie vis-à-vis des toxines pneumoeocciques. Les médicaments que l'on a

donnés à cet cffet, dans le but de provoquer une hyperleucocytose artificielle, antipyrine, acétanilide, n'ont donné aucun résultat appréciable. Il ne faut pas accorder plus d'importance aux abcès de fication, méthode qui procède de la même idée théorique et que ses initiateurs eux-mêmes ont abandonnée après avoir vérifié l'inconstance aussi bien que l'incertitude de ses effets.

En fin de compte, il est clair que nous ne possédons actuellement aucune médication active contre la pneumonie, aucun moven de l'arrêter dans son cours et de la faire avorter. C'est l'opinion nettement exprimée dans les plus récents traités de pathologie, aussi bien que dans les derniers congrès de médecine interne tenus en France et à l'étranger. C'est, entre autres, celle de Talamon, dont le remarquable article nous a déjà fourni la matière de plus d'une citation. « L'impuissance avérée de toute thérapeutique dirigée contre l'inflammation pneumonique, voilà, dit-il, la conclusion finale de tout examen sérieux des méthodes anciennes de traitement, aussi bien que des tentatives plus modernes d'ordre plus expérimental ». C'est également celle de Landouzy qui, après avoir souligné le grand desideratum. l'absence de sérothérapie spécifique, rejette en bloc les prétentions de toutes les médications systématiques. « Or cette conclusion en amène forcément une antre, c'est que le médecin ne doit plus se préoccuper de la maladie elle-même, comme il l'a fait trop souvent, mais du malade, c'est-à-dire du fait qu'il a sous les yeux et dans lequel il doit chercher à dégager tous les enseignements qui s'y trouvent contenus, » C'est donc à la médication de symptômes qu'il doit borner son intervention : dé claration qui ne saurait d'ailleurs être considérée de sa part comme un aveu d'impuissance, car, même dans une solière d'action aussi restreinte cu apparence et avec des visées aussi modestes, il peut encore rendre de notoires et réels services.

C'est l'opinion actuelle de tous les nosologistes et de tous les eliniciens. Nous la trouvons formulée en particulier dans un des plus récents congrès tenus à l'étranger, où la question du traitement de la pneumonie était inscrite en tête de l'ordre du jour et confiée à des rapporteurs d'une indiscutable autorité. L'un d'eux, M. Pel, d'Amsterdam, s'est montré assez explicite à ee point de vue. Après avoir constaté que la pneumonie n'est heureusement pas une de ces maladies qui laissent leur victime sans défense et que, grace aux moyens de protection dont l'organisme dispose, la guérison en est l'aboutissant naturel dans la majorité des eas, l'auteur estime que les chances en faveur de celle-ci seront d'autant plus grandes qu'on anra moins cherché à influencer le cours régulier de la phlegmasje viscérale et à troubler le jeu naturel des forces curatives de l'organisme. Il considère le pneumonique comme plus en sûreté entre les mains d'un médecin qui se borne à observer attentivement le cours de la maladie, qu'entre celles d'un praticien qui cherche, par des movens héroïques, à enraver le cours de celle-ci. Mais ce rôle d'expectation, il ne faut pas l'interpréter dans le sens d'inertie absolue, et Pel proteste avec vigueur contre une pareille confusion. Au contraire, chaque détail dans le traitement des divers symptômes de la pneumonie a son importance. et e'est de l'observation de tous ees points secondaires que le malade tire le plus de profit. Landouzy se prononce dans le même sens et proclame, jusqu'à nouvel ordre, la nécessité de se renfermer dans les indications eliniques. D'après lui, la tâche du médecin placé en face d'un pneumonique doit être de le défendre contre l'intoxication, soit de l'infection pneumocoecique, pour lui permettre de survivre à sa maladie. C'est, en somme, un rôle d'opportuniste qu'il est appelé à jouer et qu'il doit remplir de son mieux.

Talamon est eneore plus catégorique et déclare que l'expectation, bien qu'elle éveille l'idée d'un traitement négatif, n'en a pas moins conquis la première place dans le traitement de la pneumonie. Il entend sans doute par là l'expectation pure et simple, et il en trace quelques indications. C'est la forme d'intervention qui convient en présence d'un cas d'hépatisation confirmée franche dans ses allures et son évolution, comme c'est le cas chez les individus frappés en état de santé normal, en particulier chez les paysans, dont la résistance physiologique n'a pas été diminuée à l'avance par ees tarcs qui rendent l'agression de la pneumonie si meurtrière pour la population des grandes villes. C'est également eelle qui convicnt, et pour les mêmes raisons, dans la pneumonie du joune adulte ou de l'enfant, Dans tous ces cas, l'expectation peut être complète, absolue et mérite vraiment son nom. Mais, en dehors d'eux, elle ne saurait suffire : il faut que le médecin vienne en aide à la nature, on'il agisse dans le sens des forces qui penvent conduire à la guérison ; il faut, en un mot, qu'il remplisse ses indications et pour cela qu'il fasse de la médication de symptômes opportune, c'est-à-dire logique et raisonnée. Or, la connaissance de ces indications, il ne peut la tirer que des remarques avec lesquelles on édific d'avance le pronostie

Pour l'appréciation de celui-ei, bien des eonsidérations intervienment, de valeur et d'importance inégales. Nous avons déjà mentionné celles tirées de l'âge des sujets, en soulignant la bénignité de la pnoumonie chez les jeunes adultes et chez les enfants. La question du sexe a d'galement son importance, puisque la majorité des eliniciens reconnaissent une gravité particulière à la pneumonie chez la femme, puerpéralité mise à part, bien que cette dernière intervienne dans une large mesure pour l'explication de cette gravité. Il va ileu écalement de tenir conne des épidémies, dans quelques-unes desquelles l'élévation du chiffre des décès semble tenir à l'essence même de la maladie, c'est-à-dire à la virulence même du pneumocoque ; telles les épidémies de pneumonies malignes, dont quelques-unes marquent de véritables dates historiques. Mais les facteurs de gravité habituels résident plutôt dans la constitution des individus atteints, dans les tares organiques que ceux-ci portaient en eux-mêmes, souvent à leur insu et d'une manière tout à fait latente. C'est même ce qui explique pourquoi la pneumonie, maladie plutôt bénigne chez les habitants des campagnes, représente au contraire une maladie grave dans les grandes villes comme Paris, où elle figure pour une grande part sur les tables de la mortalité annuelle. Les tares organiques susceptibles d'amener la défaillance de l'individu en face de l'agression pneumonique sont nombreuses et variées, comme il est facile de le prévoir en présence de la complexité des fonctions attribuées aux viscères qui président à l'entretien de la machine animale. Aussi Talamon, prenant en considération leur importance. a-t-il essayé de les eatégoriser, en constituant des groupes dent chacun peut devenir le point de départ d'indications spéciales. C'est ainsi que, d'après lui, on doit tenir pour grave toute pneumonie survenue dans l'une des circonstances suivantes :

tances survantes :

Chez les artério-seléreux, et aussi bien, sinon plus, chez les jeunes que chez les vieux;

Chez les obèses et les bossus;

Chez les femmes en état de grossesse ou de puerpéralité;

Chiez les induxiqués (alcool, absinthe, morphino), chez les cancéreux (cancer de l'estomac ou de l'essophage), chez les sujets surments et chez les rachtiques, enfin chez les sujets porteurs d'une l'ésion ancienne et plus ou moins profonde du cœur, du rein, du foie, enfin chez les diabétiques et les alièmés.

Cette nomenclature est un peu longue et on pourrait sans inconvénient la simplifier, la réduire, sans que la netteté des indications issues des considérations de terrain en soit altèrée. Telle qu'elle est pourtant, elle peut efficacement guider la conduite du médecin qui, placé en face d'un pneumonique, sait qu'il doit se préoccuper du malade bien plutôt que de la maladie. Nous montrerons tout à l'heure le parti que Talamon en a tiré. Mais, pour en finir avec la question du pronostie, nous devons dire un mot de certains procédés de laboratoire qui ont été recommandés comme propres à nous renseigner sur celui-ci : entre autres, la recherche de la leucocytose et la séro-réaction chez les pneumoniques. Quant à la première, Landouzy n'y attache aucune importance et cite à l'appui de son opinion les conclusions de Tehistowitch qui, avant approfondi ee suiet, déclare que l'existence même de la leucocytose implique une pneumonie peu virulente et que, inversement, c'est précisément dans les pneumonies peu virulentes que les procédés leucocytogéniques paraissent réussir. Les conclusions jugent certainement la valeur de la leucocytose au point de vue pratique. Quant à la séro-réaction, elle semble susceptible de fournir un appoint utile au pronostic, s'il est vrai que les réactions fortes et précoces sont l'ananage des cas terminés par la guérison et inversement.

TRAITEMENT DES FORMES COMMUNES

Il pourrait se réduire à l'expectation pure et simple, comme nous l'avons indiqué tout à l'heure. Toutefois, ectte manière d'intervention négative étant généralement mal vue des malades et de leur entourage, il y a lieu d'instituer un sinulacre de traitement destiné à sauver les apparences. Talamon en règle ainsi les différentes phases, en prenant pour base la médication des symptômes, celle qui ne vise qu'à modifier certains effets passagers ou secondaires, comme la douleur decôté, la toux, la dyspepsie, l'expectoration. Contre la douleur de côté, ce phénomène initial particulièrement pénible aux malades, il conseille comme moyen labituel et préféré l'application de ventouses scarifiées au voisinnge de n'eigion hépatisée. La pratique noscomiale nous apprend que c'est le moyen le plus sûr, le mode de révulsion le plus simple, et dans l'espèce le plus efficace. L'injection de morphine, qu'on a préconisé dans le même but, ne peut être qu'une méthode d'exception, qui ne saurait faire oublier les bienfaits de la végulsion.

Les symptômes nerveux qui dérivent de la fièvre, agitation, insomnie, délire, appellent aussi parfois l'attention du médecin, mais Talamon proteste contre l'usage qu'on fait en pareil eas des médicaments nervins (chloral, bromure, opium), aussi bien que contre celui des bains froids qui, d'après lui, constituent chez les pueumoniques une agression thérapeutique le plus souvent inopportune et souvent aussi dangereuse. Il estime que l'on vient à bout de ce délire passager par des moyens plus simples, comme l'application réitérée de lotions froides ou vinaigrées, qui rafraichissent et calment assez bien les malades.

La toux et l'expectoration ne sont, dans la pneumonie, ni assez marquées, ni assez durables, pour mériter une intervention. Talamon rejette la plupart des médicaments que l'on prescrit contre ces deux symptômes, en particulier les antimoniaux et les vomitifs, dont l'action évacuante est plus que donteuse, dont les effets dépressifs soient les seuls qui aient chance de se produire.

Il est à peine besoin d'ajouter que l'usage de boissons fratches et abondantes, pour calmer la soif ordinairement si vive, est une des premières et des plus formelles indications à remplir. De même, l'alimentation s'impose dès les premières heures de la maladie et durant toute son évolution. Cette dernière prescription, déjà très motivée chez l'adulte, devient une nécessité impérieuse chez l'enfant, dont l'organisme comporte des besoins de réparation en rapport avec l'accroissement physiologique si marqué à son age. Dans une leçon récente, Marfan insiste sur ce dernier point et donne le conseil formel de nourrir les petits pneumoniques pendant toute la durée de leur maladie. Il fait seulement quelques réserves sur l'emploi des aliments solides et ne recommande que celui des aliments liquides, latit, houillon, tisane d'orge, etc. (A suirer.)

DERMATOLOGIE

La photothérapie ét ses applications à la thérapeutique des affections cutanées,

Par le Dr Leredde, Directeur de l'Etablissement dermatologique de Paris.

Les recherches de Finsen, qui ont conduit à la création d'une méthode thérapeutique nouvelle, la Photothérapie, ont été exposées en français dans une brochure intitulée : « La Photothérapie, par Nils R. Finsen » (Paris, Carré et Naud, 1889), aujourd'hui épuisée; j'en donnerai une analyse détaillée, car la brochure de Finsen restera la luse des recherches ultérieures; elle contient tous les documents essentiels à la comaissance des principes sur lesquels est fondée sa technique (I).

⁽I) Je suivrai fidélement l'exposé de Finsen dans ses chapitres I et II: le chapitre III a été écrit en 1897; depuis, Finsen a perfectionné ses appareils, et, au lieu d'analyser le chapitre, j'exposerai l'état présent de la méthode et les résultats actuellement obtenus.

Les autres travaux qui ont paru sur ce sujet ne mentionnent aucun fait important qui ne soit indiqué dans celui de l'insen. J'aurai à mentionner, cependant, une discussion qui a cu lieu sur le traitement du lupus vulgaire au Congrès de dermatologie; d'autre part, je donnerai mon opinion personnelle, fondée sur des faits que J'ai observés depuis plusieurs mois, les appareils de l'insen ayant été installés à l'Etablissement dermatologique de Paris, ce qui m'a déjà permis de me rendre compte de la valeur de la méthode dans le traitement de quelques dermatoses, et en particulier du lupus de Cazenave (lupus érythémateux).

Ŧ

LES RAYONS CHIMIOUES ET LA VARIOLE.

Les rayons du spectre n'ont pas, on le sait, des propriétés exclusivement lumineuses; il existe même à ses extrémités des rayons dépouvrus d'action sur la rétine, rayons ultrarouges et ultra-violets. Or, les rayons rouges et ultrarouges ont des propriétés calorifiques manifestes sans propriétés chimiques; les rayons violets et ultra-violets, à peu
présdépourvus d'ênergie calorifique, produisent au contraire des actions chimiques importantes.

Action physiologique des rayons violets et ultru-violets.

Parmi les actions physiologiques de la lumière, on dehors de son action sur la rétine, les plus remarquables sont dues à ses rayons violets et ultra-violets. Mentionnons d'abord, les propriétés mortelles qu'ils manifestent à l'égard des bactéries : Downes et Blunt, Arloing, Geisler, d'Arsonval et Charrin ont démontré que l'action bactéricide de la lumière leur est due. Les animaux photophobes, le lombrie (Gruber) le protée (Dubois) sont surtout sensibles aux rayons chimiques. Les cellules pigmentaires de la perat du camélélon (chromatophores) se déplacent sous l'in-

fluence des rayons violets et bleus, mais non sous celles des rayons rouges et jaunes (Paul Bert, Hoppe-Seyler).

Lesions de la peau produites par les ruyons chimiques : érythème, pigmentation. — Les accidents déterminés par la lumière solaire sur la peau (érythème solaire), accidents qui s'observent chez les chevaux et les bêtes à cernes, au niveau des parties non pigmentées, aussi bien que chez l'homme sur les parties découvertes, sont dus exclusivement aux rayons chimiques : Unna l'a démontré en 1885. L'hypothèse avait été émise par Charcot dès 1859. Les rayons calorifiques n'intervienment pas dans ces érythèmes qui peuvent se produire à des températures très froides, chez les explorateurs du pole Nord (Widmark) et les touristes des glaciers (Hammer). La pigmentation de la peau consécutive à l'action de la lumière est également due aux rayons chimiques : elle représente un processus de défense.

Une expérience de Finsen montre bien ce rôle du pigment : en tracant sur l'avant-bras une bandelette à l'enere de Chine, et en l'exposant pendant trois heures au soleil, il observa un érythème de chaque côté de la bandelette, mais non au-dessous de eelle-ei. L'érythème fut suivi de pigmentation; or, dans une exposition ultérieure au soleil. de l'érythème se développa sur la région protégée dans la première par l'enere de Chine : les parties pigmentées ne se modifièrent pas, ou leur pigmentation augmenta légèrement. Des faits identiques s'observent chez les canotiers, qui offrent de l'érythème au niveau de leurs bras nus, mais non sur les mains pigmentées. Lorsque la peau des bras est devenue pigmentée, l'érythème lui-même ne se produit plus. Suivant Finsen, la couleur noire des nègres est le résultat d'une défense contre la lumière du soleil. De même, les animaux de robe foncée sont protégés, et chez les animaux à robe tachetée, les parties foncées.

D'une manière générale, les régions dorsales, exposées

à la lumière sont plus pigmentées chez les animaux que les régions ventrales. Beaucoup d'animaux polaires out une robe foncée en été et claire en hiver. Chez l'homme, les parties découvertes sont les plus pigmentées; leur pigmentation aurmente en été.

Il est intéressant d'étudier de près les conditions de l'action de la Inmière sur la peau humaine; l'intensité de cette action dépend : 1º de la source de la lumière, les lampes électriques produisent plus de rayons chimiques et ont une action plus nocive que le soleil, au contraire des lampes ordinaires : 2º de la durée de l'exposition à la lumière : 3º de la pigmentation préalable; 4° de l'épaisseur de l'épiderme. L'inflammation photogénétique ne se produit pas de suite après l'action des ravons lumineux, au contraire des inflammations d'origine calorique, mais sculement au bout de quelques heures, et atteint son maximum après douze ou vingt-quatre heures. Elle se rencontre surtout chez les blonds et encore plus souvent chez les albinos. On l'observe au printemps; son maximum occupe sur la face les parties plus exposées : dos du nez et joues : chez les touristes des glaciers, elle atteint également la partie inférieure du nez et du menton, les rayons lumineux ayant été reflétés de bas en haut. En été, cette inflammation est

Les plus beaux exemples d'érythème solaire s'observent au printemps chez les canotiers ; cet crythème atteint son maximum dans la soirée ou la nuit qui suit l'exposition au soleil; il pout être vivement douloureux.

d'observation plus rare.

La lumière de l'are voltaïque (Defontaine, Maklakow), produit des effets analogues, et une inflammation différente de celle qui est due aux brûlures.

Les altérations épidermodermiques produites par la lumière, comme les autres effets physiologiques dont nous avons déjà parlé, sont dues aux rayons chimiques. Widmark l'a démontré en déterminant l'érythème au moyen d'une lampe de 1,200 becs Carcel. Il fit passer la lumière à travers une couche d'eau pour éliminer les rayons calorifiques et des plaques de verre qui absorbent les rayons ultra-violets. En éliminant, soit les premiers, soit lesseconds, il put constater que seuls les rayons ultra-violets jouissent de propriétés inflammatoires, alors que les rayons calorifiques, dans les conditions où il s'était placé, n'en ont aucune.

Etude histologique de l'inflammation photogénétique. Son mécanisme. — Peu de recherches histologiques ont été faites jusqu'ics sur ces phénomènes inflammatoires. Pinsen a constaté, chez un tétard exposé au solcil et arrosé d'eau froide, la dilatation des capillaires, l'arrêt de la circulation, te diapédiese des globules blanes et de quelques hématies, des modifications de la forme de celles-ci. Les rayons lumineux déterminent, d'une manière générale, des contractions du protoplasma, de celui de l'eauf de la grenouille (Auerbach), du corps du pelomyxa palsutris (Engelmann), des prolongements centraux des cônes de la rétine.

Suivant Hammer, la lumière n'agirait pas directement sur les vaisseaux sanguins, mais par l'intermédiaire d'élèments nerveux. Finsen, au contraire, admet une action directe sur les vaisseaux et le sang qu'ils contiennent. Le sang, du reste, absorbe la lumière plus qu'aucun tissu, et surtout des rayons violets. Toutefois l'action sur le système nerveux paraît considérable.

Après avoir mis en relief les propriétés pathogènes de la lumière, Finsen fait remarquer qu'elles ne sont pas isolées, et que les rayons chimiques, en quantité modérée, ont certainement une action utile sur l'organisme.

Rôle pathogénique de la lumière dans certaines dermatoses, Xeroderma pigmentosum. Pellagre. Prurigo estival. — Certaines maladies de la peau reconnaissent une irritation lumineuse comme une de leurs causes: ainsi le xeroderma pigmentosum, qui apparait sur les parties découvertes et est aggravé par l'action des rayons solaires.

La pellagre, le prurigo estival de Hutchinson se développent au printemps, sous l'influence du soleil. Certains sujets offrent une sensibilité excessive à la lumière solaire et présentent de l'érythème à la suite d'une exposition de très courte durée (Veiel, Wolters).

Variole. — On est naturellement amené à supposer que l'action de la lumière doit également se manifester dans des affections de la peau dues à d'autres causes morbides. Finsen pense que c'est le cas dans la variole. Les cicutrices profondes et confluentes se rencontrent, en effet, sur la face et les mains, c'est-à-dire les parties exposées à la lumière.

En se fondant sur ces considérations théoriques, Finsen a proposé, en 1893, de traiter les varioleux dans des chambres d'où l'on exclue tout rayon chimique en filtrant la lumière par des rideaux rouges épais.

. .

Photothérapie de la variole. — Les résultats de ce nouveau truitement ont été très remarquables. Svendsen (8 malades dont 4 non vaccinés) signale l'absence de suppuration et d'élévation thermique, de tout œdème, l'absence de pustulation et de cicatrices consécutives. l'eilberg (11 malades) Strandgaard (4 malades), Benckert (16 malades), ont observé les mêmes faits.

Si le malade est exposé à la lumière du jour au cours de l'affection, offrant encore quelques vésicules non desséchées sur certaines régions du corps, seules ces vésicules entrent en suppuration et aboutissent à des cicatrices. Suivant Pinsen, les méthodes employées pour éviter les cicatrices de la face et qui ont donné de bons résultats agissent en excluant l'action photogénétique (nitrate d'argent, iode, applications de pansements occlusifs (1).

Les résultats obtenus par Juhel Rénoy ont été moins favorables que ceux des médeeins seandinaves, mais il semble que les dispositions prises pour l'exclusion des rayons chimiques n'aient pas été suffisantes. l'insen exige l'emploi de verres rouges très foncés, d'étoffes rouges épaisses. « On doit protéger les varioleux avec autant de soin contre les rayons chimiques que le fait le photographe pour ses plaques et son papier ». On ne visitera les malades qu'à la lumière de bougies. Le traitement ne doit pas être interrompu, une courte e coosition à la lumière du jour pouvant produire la suppuration et ses suites; il doit être commencé dès que paraît l'éruption. Le traitement n'empêche pas les décès, surtout avant la période de suppuration. S'il est fait à temps, la suppuration est rare, en général il n'v a pas de cicatrice, mais seulement des taches hyperémiques et pigmentées passagères (2).

⁽I) Finsen rapporte qu'au moyea âge on avait déjà traité les varieux en les courrant de couvertures rotages; que Fonquet au xvuir sièrei avait vu des varioleux couchés dans des lits fermés par des rideaux rouges; qu'en Roumanis, Flashiund est de couvrir le corpa el le visege d'étoffes rouges; qu'au Toaktin, les varioleux sont corpa el le visege d'étoffes rouges; qu'au Toaktin, les varioleux sont profuses.

²⁾ Depuis la publication de cette note sur « les rayons chiuiques el la variole », Finsen a pur ceucellif de nouvelles observations, celles d'Etitinger, Krohn, Mygrind, Moore (de Dublin), Abel (de Bergen), B. Backmann, M. Chiiqner & Smalades dont Equirie at constité Pévolution plus rapide, l'avertement des vésicoquadutes, l'absence de cartires disgrancieness, la rareid des accidents liés à la supuration, debre un seul malante, traité senlement à partir du dixième jour. 20 malades n'euvennt in supuration ni fiforte secondaire. Abel a soigné

II

LA LUMIÈRE COMME AGENT D'EXCITABILITÉ

Cette partie du travail de Finsen est consaoré à l'exposé de ses recherches concernant l'action de la lumière sur les êtres vivants. Nous l'analyserons également, malgré son intérêt pratique moindre, en raison de la portée scientifique uvil présent.

l'insen a remarqué que la lumière solaire détermine chez le foctus de la grenouille et de la salamandre des mouvements et a cherché à expliquer le phénomène. Ces mouvements sont extrêmement nombreux sous l'influence de la lumière bleue (Finsen n'a pas étudié la lumière violette) et très rares quand l'exposition est faite à la lumière rouge (l'influence de la chaleur étant toujours éliminée). Chez des salumandres venant de naître, les réactions provoquées par la lumière bleue sont très vives; la lumière rouge, iaune ou verte n'en détermine pas

Lorsque des tétands tenus à l'ombre pendant plusieurs semaines sont exposés à la lumière, ils commencent immédiatement à nager avec vivacité. Ces phénomènes peuvent donner lieu à une accoutumance : o'est ainsi que l'inser a su des tétands. Clevés sous la lumière rouce, présenter de

²³ cas: tous les malades guérirent, un seul cut de la suppuration, fount entré à Hoipital au début de ce stade. Les cientries furent superficielles. Il. Hackmann a seigné 62 cas: 3 adultes et d'enfants mourrent, En général le traitement ne put être institud de suite; et la période suppurative fut brève et simple, les vésioules ne laissévent na de cientrice.

La réunion de toutes les observations publiées forme un total de 150 cas, en partie très graves. On est donc autorisé à poser des conclusions fermes et à affirmer l'utilité considérable de la photothérapie dans la variole.

vifs mouvements lorsqu'on les exposait une fois par vingtquatre heures à la lumière du jour; eeux qui étaient élevés sous des verres bleus n'en présentaient pas.

Gruber a vu que la salamandre aveugle, des canerelas et des lombries décapités réagissent d'une manière différente à la lumière prouge et à lumière bleue, et qu'ils fuient celle-ci : la seule explication de ce fait se trouve dans une intervention de la sensibilité cutanée.

Dubois a également observé que le protée se plaît mieux dans la lumière rouge que dans la bleue-violette.

Finsen place dans une boite oblongue couverte de verres de différentes couleurs, une vingtaine de lombries, et voit constamment, en peu de temps, ces animaux se grouper à l'abri du verre rouge.

La même expérience donne des résultats identiques avec le perce-oreille (forficula) qui comme le lombrie aime à se tenir eaché pendant le jour. Leurs réactions à la lumière bleue sont des plus énergiques. Mêmes résultats avec des cloportes et des euraibes.

Par coutre, les papillons ont une préférence marquée pour la lunière bleue; eeux qui se trouvent dans la zone bleue battent des ailes, ceux qui se trouvent dans la zone rouge restent au repos. Quand la boîte est soustraite au soleil, presque tous les papillons se tieunent dans la lumière bleue.

L'expérience ue donne pas de résultats nets chez les nouches à viandes (musca vomitoria); le soir elles se russemblent sous le verre rouge pour dormir, et y restent même si l'on met des morceaux de suere sous le verre bleu (1).

⁽¹⁾ Depuis ces expériences, Finsen a étudié l'action des rayons colorés sur 3 fœtus de grenouilles venant de naître. Les mouvements

Tout ceci prouve l'importanve biologique des rayons chimiques qui sont véritablement, dit l'insen, des promoteurs de vice et d'énergie. Cette action est certainement quotidienne et constante, et elle a été beaucoup trop négligée en médecine et en hygiène; il convient de l'utiliser; en particulier, elle engendre une excitation du système nerveux qui peut être tout à fait utile.

A ce sujet, Finsen rappelle encore les modifications qui se produisent dans la vie de la nature, lorsque le temps a été obseur pendant une partie du jour, et lorsque le soleil apparait brusquement; la sensation du bien-être que nous ressentons; l'agitation de tous les êtres vivants : oiseaux, insectes, reptiles. Ces phénomènes ont été attribués à une action psychique; de fait, ils doivent être rapportés pour la plus grande part à l'action des ravons chimiques.

111

Traitement du lupus vulgaire par les rayons chimiques concentrés.

La Photothérapie positive. — Nous avons vu que l'insenayant découvert l'importance de l'action nocive des rayons chimiques compris dans le spectre lumineux, avait utilisé cette découverte dans le traitement de la variole en supprimant ces rayons dans la lumière qui baigne les malades. C'est là une méthode de Photothérapie négative. La Photothérapie positive utilise au contraire les rayons chimiques pour guérir des lésions catunées.

les plus rapides se font sous l'influence des rayons bleus ou à la lumière solaire; il a pu remarquer en outre que l'action n'est pas immédiate et que l'effet atteint son maximum quelque temps seulement après l'exposition aux rayons chimiques.

Les recherches de Finsen sur le traitement du lupus omt pour point de dépard la notion de l'action bactéricide de la lumière, établies par Downes et Blunt, Duclaux, Arloing, Roux, Geisler, Büchener, etc. Dêjà quelques médecins avaient essayé de traiter le lupus par la lumière. Mayer a soumis des lupiques aux rayons solaires concentrés par une lentille biconvexe; Lahmann a employé la lumière fournie par un are voltaïque de 12 ampères, installé au foyer d'un miroir parabolique. Mais Mayer recherchait me action calorifique; Lahmann se servait de rayons parallèles et non convergents, émanés d'une source lumineuse beaucoup tron faible.

Emploi thérapeutique des rugons chimiques concentrés.

— La méthode de Finsen, au contraire, est fondée sur l'emploi des rayons bleus, violets et ultra-violets concentrés, avec exclusion des rayons calorifiques. La source lumineuse peut être le soleil; mieux vaut prendre comme source régulière la lumière d'une lampe à arc qui contient un très grand nombre de rayons chimiques et que l'on peut avoir toujours à su disposition.


Appareils de Finsen. — Pour concentrer la lumière solaire, Finsen emploie une lentille plan convexe creuse, de 20 à 10 centimètres de diamètre, remplie d'une solution ammoniacale de sulfate de cuivre, et montée sur un support qui permet de déplacer la lentille dans tous les sens, de l'élèver et de l'abaisser.

L'appareil destiné à la concentration des rayons émanés d'une lampe à arc, se compose de cylindres métalliques embottés contenant des lentilles destinées à concentrer les rayons (Fig. B.).

Finsen a perfectionné les appareils dont il s'est servi à l'origine. Celui que je vais décrire et qui est installé à l'établissement dermatologique de Paris, est plus récent. Il comprend :

1º Une lampe à arc de 60-80 ampères;

2º Des tubes de cuivre ayant 92 centimètres de long soutenant des lentilles en cristal de roche. Finsen, en effet, a observé que le verre arrête une grande quantité de rayons chimiques et l'a remplacé par du cristal de roche (flüt-gluss). Les lentilles a et a' sont destinées à rendre les rayons paralblès, les lentilles à et b' à les rendre convergents. Entre b et b' le tube de cuivre est rempli d'eau distillée, qui n'arrête pas les rayons violets ou ultra-violets et dont nous allons voir l'utilité:



 $Fig.\ A.$ — Appareils de Finsen pour la concentration des rayons chimiques encavés d'un arc voltaïque.

a. support usétallique, b. support des tubes porte leutilles, e, pièces serant à supporte, à élever, à édapacer la lampe di arc, d. charlous posits, d' charbon négatif, e, tube adducteur d'au desiméer à érbédire les rayous lumineux. Fube de cauchtone dostiné à assumer à trube porte leutilles, put des porte leutilles deux sont figurées sur la plante, l'appareil comptet en suporte jeunilles, sont figurées sur la plante, l'appareil comptet en suporte jeunilles.

3º Un système de refroidissement. Le tube de cuivre est entouré en c d'un manchon naétallique dans lequel circule de l'eau courante amenée par un tuyau de caoutchouc en m et sortant en u. L'eau courante refroidit constamment l'eau distillée contenue dans le tube, puis se rend aux verves compresseurs appliqués sur la peau et circule entre leurs parois, enfin est évacuée par le sol. Les rayons calorifiques sont ainsi éliminés:




Fig. B. — Tube portant la lentille (de cristal de roche) destinée à concentrer les rayon chimiques.

a.~a' lentilles rendant les rayous parallèles b.~b' lentilles rendant les rayons convergents, c.~ manchon métallique ou circule le courant d'ean froide, d.~ chambre contenant de l'eau distillèc, c.~ pièce métallique supportant le tube digurée en b dans la figure A), m.~ entrée de l'eau courante, a,~ sortie de l'eau courante, a,~ sortie de l'eau courante, a,~ sortie de l'eau courante.

4" Des verres compresseurs en cristal de roche. Le rôle de ces verres est d'achever le refroidissement des rayons lumineux grâce à la circulation d'œan qui se fait dans leur cavité, et d'autre part d'empécher la circulation dans les parties traitées. En effet, le sang protège les tissus contre l'action des rayons chimiques. Finsen a vu que si l'on place un paper photographique d'un côté de l'orcille en faisant agir sur l'autre face les rayons concentrés, le papier n'est pas impressionné au bout de cinq minutes, mais que si l'on comprime le pavillon par des lames de verre de manière à classer le sang, le papier est impressionné en quinze secondes. Les verres compresseurs servent à rendre la peau largement perméable aux rayons violets et ultraviolets.

Ils sont formés de lames de cristal de roche circulaires, écartées d'un centimètre environ et soutenues par une lame d'acier nickelé. L'une des lames de verre est plane, l'autre est plane, demi-convexe ou concave; suivant les points que l'on traite, on emploie un verre compresseur ou un autre.



Fig. C. — Appareil compresseur appliqué sur la peau. L'eau courante circule dans la chambre comprise entre les parois de cristal de roche a, et a', elle rentre en b, et sort en b'.

Technique du traitement. — L'application du traitement se fait de la manière suivante :

Le malade est couché sur un lit; la région que l'on veut traiter est placée au foyer des rayons concentrés. Pendant une heure, ou une heure et quart, une aide applique sur ce point le verre compresseur qu'elle a soin de ne pas déplacer de manière que les rayons agissent toujours au même point. Chaque fois on traite ainsi une surface dont les dimensions sont à peu près celles d'une pièce de 50 centimes. L'application est intolente; le malade souffre uniquement de la compression lorsqu'elle est faite sur des régions osseuses, telles que la face antérieure du nez.

Effets immédiats et éloignés du traitement. — Quelques heures après, une réaction inflammatoire se produit et vingt-quatre heures après l'application on constate du gonflement, de la rougeur de la peau; souvent une phlyctène claire se produit. En peu de jours elle se dossèche, il se forme des croûtes qui tombent sous l'influence de pansements humides. On peut reprendre l'application des rayons sur le point déjà traité, au bout d'une huitaine de jours.

La disparition des lésions lupiques exige un temps variable.

Dans les cas communs, on obtient en un petit nombre de séances sur un point donné une guérison presque complète: le tissu se décolore, les vaisseaux disparaissent, les lupomes s'isolent les uns des autres, puis ne sont plus perceptibles. Il est alors nécessaire de laisser reposer le point traitée; or reprend le traitement au bout d'un certain temps si le résultat n'est pas définitée.

Lorsqu'il existe des ulcérations, elles diminuent d'étendue, puis disparaissent complètement.

Risultats de la photothèrapie dans le lupus vulgaire. Statistique de Finsen. Observations du professeur Petersen et du D' Sabourand. — Au congrès de dermatologie de Paris (août1900), le professeur Finsen a indiqué les résultats obtenus au Finsen's medicinsek Lysinistitut de Copenhague, depuis 1856. 553 malades atteints de lupus vulgaire ont été traités; 362 ont suivi le traitement jusqu'au bout, et sont restés ensuite en observation. 130 étaient encore en traitement en avril 1900, 61 ont interrompu le traitement pour diverses causes. Le nombre des gerérisons est considérable : 3 0/0 seulement des cas sont réfractaires. M. Petersen (de S'-Pétersbourg) a obtenu les mêmes résultats que Finsen et les qualifie de merveilleux.

Le D' Sabouraud, qui avait fait installer depuis trois mois les appareils de Finsen à l'Ecole Lailler, à l'hôpital S'-Louis, a confirmé les faits apportés par le D' Forchhammer, au nom de M. Finsen.

Discussion du Congrès de dermatologie. — M. Finsen avait envoyé, à l'hôpital Saint-Louis, 20 malades atteints

de lupus vulgaire de la face et guéris par la photothérapie ; tous les dermatologistes présents au Congrès ont pu ainsi juger des effets de la nouvelle méthode. M. Finsen s'étant borné à en indiquer la technique, et à donner la statistique des malades guéris, sans faire la comparaison de la photothérapie et des anciens modes de traitement du lupus il parut nécessaire de remettre, dans une certaine mesure. les choses au point; MM. Besnier et Brocq juggrent indispensable de défendre, devant les dermatologistes étrangers la valeur des méthodes plus simples, employées par l'école française, et déclarèrent que l'on peut guérir nombre de lupiques par la galvanocautérisation et la scarification. A leur avis, la photothérapie ne peut être considérée, sans plus ample informé, comme applicable à tous les malades atteints de lupus de Willan; elle exige une installation considérable, des frais importants de personnel et d'électricité - par suite le prix du traitement est élevé - enfin elle exige des malades un sacrifice de temps considérable.

Les avantages et les inconvénients de la photothérapie dans le traitement du luyus de Willem (luyus tuberculeur wilgaire). Ses indications. — En m'appuyant sur les travaux de Finsen et les faits qu'il a publiés, sur la discussion du Congrès de dermatologie et sur mon expérience personnelle, je vuis essayer d'établir les indications de la méthode photothérapique dans la cure du luyus vulgaire : ses avantages sont considérables, elle est au premier plan parmi les méthodes que nous connaissons déjà; mais on ne peut dire que d'ores et déjà elle doive remplacer toutes les autres : il reste donc à savoir dans quels cas elle doit être apolitimée.

Les plus évidents de ses avantages sont les suivants :

l'Aucune méthode n'est si peu douloureuse. Sans insister, je rappellerai combien le médecin éprouve de difficultés à faire accepter par les malades de longues séances de scarification ou de cautérisation, et que certains se refusent à poursuivre ces traitements, après expérience faite. Inutile de parler du curettage ou de l'application de caustiques chimiques. Mais il n'est pas de malade, si pusillauime soit-il, qui se refuse à la photothérapie, et j'en pulparès y avoir soumis une vingtaine de malades, la plupart du sexe féminin, atteints de lupus de Willan, de lupus de Cazenave ou d'autres affections de la face.

2º Aucune méthode ne détermine une telle proportion de guérisons. La statistique de l'insen a été recueillie dans les conditions les plus serupuleuses. A part les cas à marche aiguñ, de lupus ferox, vorax, la guérison est la règle. Il faudra des années avant que d'autres médecins puissent recueillir une statistique aussi étendue: maistout observateur qui, comme moi, aura suivi de près quelques malades pendant quelques mois aura l'impression de la puissance de la méthode en voyant la guérison se faire sous ses yeux, règulièrement, sur les points tratiés.

3º Aucune méthode ne détermine de guérisons aussi définitives. Personne ne peut dire que les malades traités par l'insen ne présenteront jamais de récidive; régulièrement il n'y en a aucune lorsque les malades ont subi une période de tintiement consécutive à une période de repos, nècessaire à l'observation des effets produits par la première oure photothérapique. J'ai vu une malade de l'insen, qui a été guérie à Copenhague en quatre mois d'un lupus exedens du nez et des jones, après avoir été traitée pendent 20 aus par toutes les méthodes et par les dermutologistes les plus qualifiés. Après douze mois de repos, la guérison se maintient parfaite; il est survenu récemment un lupome de la grosseur d'une tête d'épingle anglaise, à côté d'une cientrice, non dans la cientrice; ce lupome a été guéri en deux séances de photothérapie.

La supériorité considérable de la méthode de Finsen à

ce point de vue est due à la profondeur à laquelle agissent les rayons lumineux. Sans difficulté, sous la condition d'une anémie locale, ils traversent l'épaisseur du lobule de l'oreille ou de la joue, et provoquent une réaction inflammatoire curative dans toute l'épaisseur. Or le tubercule lupique est souvent hypodermique; que l'on emploie les galvano-eautérisations, et on respectera en général la zone périphérique, la zone des cellules embryonnaires ou des plasmazellen qui entourc le foyer central en voie de désintégration caséeuse, et résiste à la pression du galvano-cautère, zone dont on ne connaît pas l'étendue; cette zone est bacillifère comme la zone centrale; on respectera les tubereules qui s'élèvent de la profondeur vers la surface et n'ont pas atteint celle-ei, les foyers qui sont inelus dans le derme et l'hypoderme. La searification, traitement de choix dans les lupus mous, n'arrive dans les lupus plans à des résultats définitifs qu'après un temps considérable : on ne peut la faire porter à la profondeur suffisante dans ceux-ci, Les agents réducteurs n'agissent qu'en surface et ne peuvent amener de résultats que dans des lésions superficielles; les caustiques chimiques sont très difficiles à manier si l'on veut aller assez loin pour éviter les récidives. Scule la méthode de Lang (ablation complète) donne peu de récidives; elle en donne cependant plus que celle de Finsen, Avec la photothérapie, il est inutile de s'occuper de la profondeur du mal, on sait que tout foyer lupique sera abordé et modifié par les rayons chimiques.

4º Aucune méthode ne détermine régulièrement des cicatres aussi parfaites. Seule la scarification pourrait donner des résultats comparables; pencor faut-il remarquer que, dans les lupus mous, des orifices où la scarification en tous sens, la dilacération produisent de merveilleux effets, elleprovoque une réduction de volume, une atrophie de l'organe; celle-ci paraît beaucoup moins importante avec la photothérapie. Si le lupus est ulcéré, l'irrégularité des cicatrices consécutives à la guérison par la méthode de Finsen est encore peu marquée.

Les inconvénients de la photothérapie sont : le temps nécessaire à la guérison, les dépenses qu'elle occasionne et le prix du traitement trop élevé pour beaucoup de malades.

Ces reproches, que l'on fait à la nouvelle méthode, méritent d'être examinés de près.

Et d'abord, M. Finsen le dit le premier, pour guérir un lupus tuberculeux étendu par la photothérapie, il faut des mois, mais at-ton calculé le temps qu'exigent les autres méthodes pour guérir le même lupus? Une scule est plus rapide en réalité, c'est l'ablation, qu'on devrait préférer si les cicatrices consécutives étaient comparables à celles de la méthode de Finsen.

Le traitement par les caustiques chimiques exige presque toujours des applications répétées; quant à la galvanocautérisation et à la scarification, elles permettent, il est vrai, au malade de ne pas se déplacer tous les jours pour aller à l'hôpital ou chez le médecin; mais, au toal, elles exigent beaucoup plus de mois que la photothérapie; si le malade est soigné peu de temps pour un lupus étendu, il ne bénéficiera que d'une guérison purement apparente. Du reste, après les cautérisations, il doit porter des pansements et les faire renouveler. Parmi les malades pauves, beaucoup préferront être soignés chaque jour pendant trois ou quatre mois que de venir à l'hôpital chaque semaine peudant douze et quinze mois

Le prix du traitement photothérapique est élevé; ce n'est pas une objection pour les malades de la classe aisée, pour lesquels il n'est pas supérieur à colui qu'exige une intervention chirurgicale importante, ni pour ceux qui sont soignés à l'hôpital; en se mentant au point de vue qui doit être celui de l'Assistance publique, il faut noter que la guérison complète d'un certain nombre de lupiques rend à la vie sociale des individus qui seraient à sa charge pendant toute leur vie, à un moment ou à un autre.

Néanmoins, il est tout à fait naturel que le médecin cherche à guérir d'abord le lupus tuberculeux par los méthodes simples qu'il a à sa disposition et qui peuvent déterminer la guérison complète. S'agit-il d'un petit lupus, recomnu et soigné à son début? Toutes les méthodes, cautérisation, sen-fifeation, rélalge, peuvent réussir, elles préviendrout même les récidives si on a soin : 1ª d'agir à une profondeur suffisante; 2º de traiter les parties saines ou paraissant telles qui entourent le foyer lupique. S'agit-il d'un lupus mou, en particulier de l'extremité du nex? La seurification déterminera une transformation totule, l'arrêt du processus, souvent une guérison complète (1). S'agit-il d'un lupus plau, même d'étendue moyenne, où les lupomes sont bien distincts les uns des autres, on peut espérer le guérir par la galvanocaulérisation.

Mais ce qu'on ne devra pas oublier, c'est qu'aucune méthode n'est aussi générale que la photothérapie et que, toutes les fois que par une technique thérapeutique soigneuse, adaptée au cas particulier, on n'est pas arrivé à une guérison récile, sans récidive au bout de plusieurs mois, la méthode de l'insen est la ressource dernière et le vrai moyen de salut pour le malade.

L'ablation ne paraît maintenant préférable que dans les cas excessivement étendus où la photothérapie serait beaucoup trop lente, et chez des malades non soucieux du résultat esthétique.

⁽¹⁾ Dans le cas particulier de ces lupus, il y aurait pent-ètre intérêt à régler le traitement ainsi : 1^{re} période de scarification profonde, en tous sens; 2^e période de photothérapie quand l'affaissement des tissus est devenu complet et qu'il y a intérêt à assurer une guérison stable.

Tout ce qui précètle concerne le lupus de la face. En dehors des cas spéciaux, le lupus des membres ne relève pas de la photothérapie, parce que les autres méthodes, le ràclage, la cautérisation, l'ablation y donnent des guérisons, souvent même rapides, et que l'irrégulorité des cea-trices n'a pas d'importance. Sur les mains, chez certains malades, il n'en est pas de même, parce que l'extension des lésions est souvent trop grande; et quoique je ne connaisse pas d'observation de tubercule anatomique ou de tubercules de litels guérie par la photothérapie, je erois que cette merveilleuse méthode serait à employer dans heaucoup de cas, parce qu'elle est plus radicale que toutes les autres méthodes, excepté l'ablation et parce qu'elle n'expose pas aux destructions que produit celle-ci quand elle veut être radicale.

Une dernière remarque pour conclure sur ce point.

M. Finsen n'a pas, que je sache, publié, au moins en français ou en allemand, l'observation détaillée de ses malades ni indiqué les traitements qu'ils avaient suivis avant d'être guéris par la photothérapie. Un tableau du genre de celui que je vais donner pour 12 observations de lupus érythémateux serait assez frappant et permettrait de faire d'une manière soientifique la comparaison avec les méthodes paciennes.

17

TRAITEMENT DES DERMATOSES AUTRES QUE LE LUPUS TUBERCULEUX COMMUN

Lupus èrythémateur. — Le lupus de Cazenave constitue une manifestation de la tuberculose, parfois bénigne et guérissant par presque tous les procédés, souvent plus tenace que le lupus de Willan lui-même, et, quoiqu'il ne provoque pas de destruction, aussi grave que celui-ci; l'infiltration des tissus, les cicatrices défigurent les malades; comme le

OBSERVATIONS	A renonce au traite- ment, sans eausc connue.	Les réactions photo- genétiques n'ont pu- être oblenues qu'a- la condition de re- venir tous les jour- sur le même point.	La malade a dûquitter Paris provisoirement sans atteudre la gué- rison complète.		Il ne reste de lésions que sur une partie des bords.	Au moment où la ma- lade a commence le traitement photothe- rapique, elle était dé- endée à faire praiquor en ess d'insucese l'a- biation chirurgicale.						
RÉSULTATS	Réactions nettes.	Amélioration nette, guérison partielle.	Guérison de la plus grande partie du lupus avec cicatrice parfaite.	Guèrison de l'oreille et de la joue, amé- lioration considéra- ble du nez.	Guérison complète de la partic centrale, eicatrice régulière.	Cuerrison complète des joues et du nez, sauf à sa partie ioférieure, cicatrice parfaite sur les régions traitées.	Amelioration considerable, décongestion, apparition d'un état cleatriciel sur tout le nez.	Amelioration considerable, los lésions traitées sont transformées en un tissu rouge clair de surface lisse, déjà electricielle en quelques points.	Amelioration impor- taute, affaissement des lesions, décolo- ration, guérison des hords.	An hout de 12 séances de photothérapte, l'e- ger affaissement des points touchés, pas do réaction inflam- matoire macroscopi- que après les séan- ces.	Mémos observations-	Amélioration impor- tante, formation de tissa cicatriele. Il a éténécessine ét faire des scances de 2 h. sur les points traités.
NOMBRE de séances		R	18	40	te	19	3,	31 ·	ħ	21	2	8
THAITEMENTS ANYERIECRS n'ayant pas donné de résultats	Emplátres, savon noir, acide phénique neigeux, scarilications pendant 1 an, 30 gianoss de cautérisation, 50 x 60 de haute fréquence.	Acide phénique nel- geux,	Empldres, scarifica- tions.	9+	Cautérisations au gal- vano, applications quotidiennes de tein- ture d'iode,	70 sennces de cauté- risation en 18 mois.	Savon noir, cautéri- sations, 39 séances de scarifications.	Gautérisations pen- dant 6 mols, scarifi- eations pendant 6 mois, injections de ehiovave de zine et ervosote. 70 soances de hante fréquence.	Emplâtres, pomma- des, cautérisations et scarifications.	lebtyol. pyrocallol, acide st le yl fq ue, criscote, 300 scances de caulérisation, 100 de scanfloation. 25 de baute fréquence.		Pendant \$ ans, soi- grice par le galvano- eautère, une séance par semaine.
CARACTÉRES ellniques	Plaques multiples de la face, inflitation modérée.	Lupus do l'extrémité du nez, extrémement see et profond.	Lapus avee infiltration profonde du nez et E de la partie voisine des joues.	Lupus avee infiltration profonde del'extrémi- té du nez, du bord de l'oreille et du cen- tre de la joue gauche.	inpus do la face gauelie du nez. in- filtration modérée, d'imension d'une pièco d'un franc.	Lupus à type conges- tif, courrant le nex, plaques sur les joues, la région sourcilière gauche, les oreilles.	Lupus du nez, à type congestif, militeation marquée.	Lupus du nez, les foues sont presque complètement en- valites.	Lupns du nez à type congestif.	Lupus avee infiltration considerable, plaques couvrant la face presque entière.	Lupns erythemateux, extrêmement épais et see, plaques nom- breages dissémnées, sur le front, les joues, les oreilles, le nez.	Lupus avecinfiltration epaisses, plaques sur les joues, les paupières,plaque unique eouvrant le nez.
DURÉE de la MALADIE	7 ans.	1 an.	, ans.	3 ams.	e ms	ans.	3 ans 1/2.	Ig ans.	2 ans.	12 ans.	4 aus.	6 ans.
KOX	Ohs. 1. M™ B.	Obs. II.	Obs. III.	Obs. IV.	Obs. V.	Obs. VI.	Obs. Vil.	Obs. VIII.	Obs. IX.	Obs. X.	6bs. Xl. Mr L.	Obs. XII.

lapus tuberculeux, le lupus érythémateux rend la vie normale impossible. Avec de la ténacité de la part du médecin, de la persévérance et de la méthode de la part du médecin, on arrive souvent à guérir un lupus tuberculeux; dans le lupus de Cazenave, tout pronostic thérapeutique est impossible, on ne peut formuler à l'avance une technique précise

Le nombro des cas de lupus érythémateux soignés à l'heure actuelle par la photothérapie est encore peu élevé. F'insen déclare avoir obtenu de bons résultats, moins constants toutefois que dans le lupus de Willan; à la fin de 1829, il avait observé 34 cas, sur lesquels 12 étaient guéris, 10 on traitement, 12 l'avaient interroupu. Petersen a soigné

en affirmant des chances de succès.

5 malades et a eu 4 succès. J'ai déjà soigné 12 cas de lupus tuberculeux par la photothérapie, et je puis déclarer qu'elle rédise un progrès

considérable dans la thérapeutique de cette maladie.

Je résume mes observations, à la fin de décembre 1900, dans le tableau précédent.

Le tableau que je viens de donner n'a pas de valeur au point de vue statistique, d'abord parce qu'il ne porte pas sur un nombre suffisant de faits, puis parce que beaucoup de malades étant encore en traitement, on peut tout au

plus juger des résultats immédiats de eclui-ci. Cependant, on peut dégager quelques faits :

Cependant, on peut degager querques tats:

Les résultats de la photothémpie appliquée au lupus
érythémateux ne sont pas, comme l'a dit l'insen, aussi
constants que dans le lupus tuberculeux. Parmi ceux que
j'ai exposés dans le tableau, deux ne sont pas encore modifiés d'une façon nette (obs. X, XI); tout au plus remarque-t-on, sur les points soignés avec persistance, un affaissement, une diminution de congestion, un état atrophique
de l'épiderme. Le traitement de ces cas difficiles a étô
commencé depuis trop peu de temps pour qu'on puisse

porter sur l'effet de la photothérapie un jugement définitif, dans un sens positif on négatif. Dans des cas rebelles, où on peut revenir avec persistance sur le même point, la photothérapie produit des guérisons partielles et des améliorations importantes (cas II, IV, XII).

Dans la plupart des cus, elle produit soit une guérison complète (cas III, V, VI), lorsqu'elle est suffisumment prolongée, soit quand son emploi est encore récent des transformations autorisant à prévoir une guérison complète (cas VII, VIII, XII.) L'observation ultérieure permettra de dire dans quelle mesure ces guérisons sont définitives.

Ce que j'ai désiré suriout mettre en relief dans ce tableau et qui permet de juger réellement de la valeur de la bhotothérapie du lupus érythémateux, c'est la série de traitements que les malades ont suivis avant d'être traités par la méthode de l'insens sous résultoits; j'ai donc en affaire à des cas particulièrement réfractaires.

La supériorité de la photohérapie sur les méthodes anciennes devient ainsi tout à fait évidente. Une de mos malados a été traitée d'une manière continue par la haute fréquence, sans aucun bénéfice; il est cependant pronvé que celle-ci constitue une des meilleures méthodes de traitement du lupus de Casenave (1). Chez elle, la transformation des lésious lupiques par la photothérapie a été véritablement extraordinaire.

Les cas dans lesquels la modification des régions traitées a été à peine sensible au bout d'une douzaine de séances, faites sur trois ou quatre points seulement, offrent des caractères communs; l'épaisseur des lésions, la sécheresse et la dureté du tissu. Chez ces malades, à la suite des séances, on n'observe ni la tuméfaction, ni la rongeur qui

⁽¹⁾ Brocq. Société de Dermatologie. Décembre 1900.

surviennent régulièrement. Selon toute vraisemblance, l'action de la lumière est due à ce que les lésions ne sont pas perméables aux rayons chimiques, à cause de la difficulté qu'il y a à comprimer les tissus et à chasser le sang, peut-être aussi à cause de la structure seléreuse du tissu dermique.

Il ne me semble pas douteux que ces cas seront guéris

comme les autres par la platothérapie, lorsque la teclinique de celle-ci sera encore perfectionnée. Il est malhacureusement impossible pour le moment d'employer des lampes à arc de plus de 80 ampères et par suite de concentrer sur la peau une plus grande quantité de rayons chimiques; déjà à 80 ampères la chaleur des rayons, au sortir du tube en cuivre, est considérable et l'infirmière qui applique le compresseur sur la peau doit prendre les plus grandes précautions pour éviter toute brilure. M. le Professeur Finsen, qui a bien voulu correspondre avec moi au sujet du traitement photothérapique du lupus de Cazenave, m'a consielle de faire subir aux malades des séances de deux à trois heures sur le même point; dans ces conditions, l'action des rayons chimiques devient déjà manifeste (V. ols. XII).

Peut-ètre peut-on agir d'une autre manière, pour essayer de rendre les tissus sensibles aux rayons. M. Finsen a appliqué sur la peau des malades atteints de lupus tuber-culeux des pommades à l'acide pyrogallique. J'ai essayé, de mon côté, de déterminer chez les malades rebelles, un codème ou une inflammation séreuse dans les tissus, avant de les soumettre aux rayons chimiques, soit par l'application d'une fisible dose de cautharidine (2 ou 3 gouttes d'une soiution dosée à deux dixièmes de milligramme par centimètre cube. Les résultats ne sont pas encore très nets; par contre J'ai eu me réaction photogénétique complète, chez un de mes malades auquel je pratiquais des effluyes de haute

fréquence avant de le soumettre aux rayons de Finsen. Je continuerai mes essais dans ce sens et en ferai connaître le résultat.

Acné vulgaire. Acné rosée. Rhinophyma. — M. Finsen a obtenu de bons résultats de la photothérapie dans le traitement de l'acné vulgaire et de l'acné rosée; sur 17 cas, 9 ont été guéris, 7 ont interrompu le traitement.

J'ai moi-même soigné une malade atteinte d'armé rosée du nez, avec légère hypertrophie et congestion considérable. L'amélioration a été très importante après 25 séances d'une demi-heure chacune, mais je ne puis parler de guérison complète et ilfaudrait encore un assez grand nombre de séances pour y parvenir. S'il en est toujours ainsi, la photothérapie ne devrait être essayée que dans des cas d'acmé rosée rebelles aux modes ordinaires de traitement. Je ne crois pas qu'elle doive être considérée comme une méthode normale de traitement de l'acmé vulgaire, qui guérit si bien por les procédés dermatologiques courante.

Par coutre, j'ai été très satisfait des résultats de la photothérapie dans un cas de rhinophyma. Il s'agissait d'un homme atteint d'une aené vulgaire grave de la face, qui fut guérie en deux mois à l'Etablissement dermatologique par la cure d'exfoliation, et d'un rhinophyma déjà grave. Le nez était, à son extrémité inférieure, presque doublé de volume, et transformé en une véritable éponge sanguine. Le malade a déjà eu 30 séanees de photothérapie d'une demi-heure et d'une heure; le volume de l'organe est très diminué, la coloration est passée au rose clair, l'amélioration est considérable.

Pelade. — Finsen et ses eollaborateurs ont traité la pelade par les rayons chimiques en se fondant sur le développement du système pileux à la limite des régions lupiques soumises à la photothérapie. Jersild a constaté la repousse active sur les plaques peladiques, parfos les poiss paraissent quelques jours après le début du traitement. La guérison la plus tardive a exigé deux mois et quart; le traiteract avait été, du reste, interrompu pendant seize jours. Une fois seulement il y eut récidive locale. Dans un cas, il y eut repousse des cheveux sur les régiens traitées, tandis que l'alopécie se développait sur celles qui n'avaient pas été exposées aux rayons lumineux ou Saraud a observé également les bons résultats de la photothérapie dans la pelade.

Les observations de Jersild ne sont qu'au nombre de sept : ce n'est pas un nombre suffisant pour qu'on pnisse fornutier dés à présent une conclusion positive. Je n'ai moimème aucune expérience, n'ayant soigné que deux malades et depuis très peu de temps (1).

Epithèlione. — Les recherches de l'insen sur l'applicacation de la photothérapie à l'epithèlione de la face ont été publiées par V. Bie, un de ses assistants (2). Sur 16 cas, 3 out été traités sans résultats, 5 ont été améliorés, 1 a été guéri, mais a cu ensuite une récidive, 7 ont été guéris et ne présentaient pas de récadire au bout de 10-30 mois.

La photothérapie semble agir d'une manière rapide : au bout de quelques séances, on observe souvent une clute en masse du tissu épithéliomateux qui est suivie de guérison en peu de temps. Les cas où Finsen a obtenu ce résultat sout des cas peu étendus, superficiels; il a échoué, au contraire, dans les formes étendues et profondes. Il semble

Jersild. Cas de pelade traités par les rayons chimiques, Annales de dermatologie 1899, p. 20.

⁽²⁾ Vald-Bie. Behandlung von Hautepitheliomen mit concentrirtem Licht. Dermatolog Zeitschrift 1900, p. 686.

résulter du travail de Bie que la photothérapie doit être considérée comme un mode utile de traitement de l'épithéliome facial.

Nœuus vusculaire plun. — Une des applications les plus mtéressantes de la photothérapic est celle qui concerne les grands nœvi plans, qui couvrent une partie de la face chez de nombreux sujets. Finsen, Petersen ont obtenu la guérison; ils ne donnent, du reste, pas de renseignements détaillés sur leurs observations et nous ne connaissons ni la durée du traitement, ni la durée des séances, ni les conditions dans lesquelles ils ont pu les observer.

Sycosis. — De mon côté, j'ai entrepris le traitement de deux cas de sycosis rebelles de la lèvro supérieure, datant de plusieurs années et ayant résisté à tous les traitements, Dans un de ces eas traités depuis six semaines (deux séances de photothérapie par semaine), l'amélioration est très marquée.

. .

La photothérapie sera peut-être utilisée pour la guérison d'autres maladies de la peau. Il faut observer toutefois qu'elle ne convient qu'à des affections peu étendues , tenaces et fixes, ne pouvant, comme beaucoup de dermatoses, guérir en un pont avec facilité et se reporter aussi facilement en d'autres. D'autre part, elle ne s'applique, jusqu'à nouvel ordre, qu'à des affections du visage daus lesquelles l'ablation chirurgicale ne permet pas d'obtenir des cieatrices qui ne compromettent pas l'aspect esthétique et, peut-être, à certaines affections des mains. Enfin, elle s'applique exclusivement à des lésions profondes que des agents chimiques modifient en surface seulement. Ces réserves faites, dans la thérapeutique des lésions cutanées lixes, profondes, rebelles, conuent les souries découvertes.

la photothérapie réalise un progrès considérable, dont la gloire appartient tout entière à un seul, le professeur Nils R. Finsen,

REVUE DES TRAVAUX FRANÇAIS ET ÉTRANGERS

Maladies du tube digestif.

La levure de hière coutre la constipation habituelle (Sem. med., n° 45). — D'après le D° E. Roos, privatdocent de méde. med., n° 45). — D'après le D° E. Roos, privatdocent de méderine de la levure de bière exercerait une influence des plus favorables sur la censtipation habituelle. On pourrait obtenir cet effet soit avec la levure fraiebe, simplement dessèchée à une température de 30 degrés et dont on administre 2 ou 3 prises de 50 centigrammes chaque jour, soit avec une levure dont la vitalité a été détruito par un séjour d'une heure dans une étuve à 130 degrés; dans ce dernier cas, des doses moitié moindres seraient suffisantes.

Le mode de préparation de la levure étant à peu près indiffèrent, on peut conclure que cette substance agit comme laxaif, non pas à la faveur d'un processus de fermentation au niveau du tube digestif, mais bien par sa composition chimique qui la rend susceptible de stimuler le péristaltisme intestinal.

L'action favorable de cette médication chez les eenstipés chroniques so manifesterait quelquefois dès le second jour; elle persisterait pendant un certain tomps même après la cessation du traitement, lequel serait presque entièrement dénué d'inconvénient. On observerait seulement parfois un peu de ballomement du ventre avec fiatulence et quelques coliques très lègères, troubles que l'on pourrait le plus souvent éviter, ou tout au moins atténuer, par l'emploi de levure stérilisée à l'étuve.

Maladies de la peau et affections vénériennes

Traitement du chancre simple (Presse méd., juil, 1900). -Ce traitement est conduit par MM, Hallopeau et Leredde de la facon suivanto :

S'il existe un phimosis, il convient de faire pratiquer par le malade des injections entre le prépuce et le gland, répétées plusieurs fois par jour, et surtout lorsque le malade a uriné. On emploiera, à cet effet, des solutions antisentiques faibles : sublimé à 1 pour 2000, acide borique à 3 pour 100, acido phénique à 1 pour 200. Souvent les solutions hydro-alcooliques au tiers sont préférables; on formulera par exemple :

Aleool à 60°	66 g	rammes
Eau	30	_
Agida baniana		

Mais ces topiques, utiles pour enlever le pus et combattre la balanite concomitante, n'ont aucune action spécifique sur l'agent infectieux. Les lavages doivent donc être immédiatement suivis d'une injection d'huilo de vaseline saturée d'iodoforme.

Les chancres abordables seront nettoyés, débarrassés dos croûtes et du pus, au moyen d'eau bicarbonatée tiède et de coton hydrophile; puis on pourra cautériser la surface, au moven do la solution suivante :

```
Alcool à 60°..... 10 grammes.
Acide phénique . . . . . 1
```

ou du chlorure de zinc à 1 pour 10, tous les deux jours.

Le pansoment est fait au moyon d'une poudre. L'iodoforme est, do l'avis universel, le meilleur des antiseptiques; on

peut également employer le salicylate de bismuth, le dermatol.

Les chancres de l'annes sont traités par des attonchements de la même manière; on applique ensuite des mèches imprégnées de vaseline iodoformée. Après chaque défécation, on lave à l'eau boracte et on applique à nouvean la pommade. Les bains locaux (bains de siège) quotidiens ou bi-quotidiens rendent de grands services.

On a proposé divers moyens pour détruire le chancre. La destruction doit être complète, sinon des réinoculations se produisent, et un chancre simple, plus étendu que le chancre actuel, apparait. La pâte de Balzer a pour formule :

Chlorure de zinc..... 1 gramme.

Oxyde de zinc..... 10 —

Eau distillée Q. S. pour faire une pâte

On laisse vingt-quatre heures en place.

L'Administrateur-Gérant: O. DOIN.



A l'Académia des sciences, MM. Mayet et Bortrand signalent que la sérosité d'un résicatoire est un excellent milieu pour observer le globule blanc à l'état de vie, que si ou ajoute une goutte de culture du bacille de la fièrre typhoide ou assiste au phénomène de la phagocytose des bacilles d'Éberth : les globules blancs sont bientôt bourrés de l'agent pathocène.

Les relations physiologiques des albuminuries intermittentes out été révélées à M. Charrin par l'observation de 2 cas d'albuminurie où le taux de l'albumine faible au réveil augmente légèrement jusqu'à midi, pour subir après le déjeuner, une brusque élévation, après quoi il décroit progressivement.

A la Société de pédiatrie, M. Guinou relate l'observation d'une stomatite pullacée au cours d'un érythème sérothéra-pique chez un enfant. On sait que M. Comby a signalé cette stomatite comme un signe diagnostique de la rougeole avant le stade éruptil. L'observation de M. Guinon montre que cette affection peut se voir dans d'autres affections. Il convient d'ajouter cependant que M. Comby ne considère pas cette-stomatite comme pathognomonique de la rougeole.

A la Société centrale de médecine du département du Nord, M. Butruille fait une intéressante étude sur ce sujet : La hernie est-elle un accident? Il critique d'abord la loi relative aux accidents du travail, et apres avoir fait remarquer qu'elle ne contient pas de définition de l'accident, il propose celle-cii : Les accidents du travail sont constitués par des

TOME CXXXXI. 5° LIVE.

blessures provenant d'une cause extérieure, involonuire, instantanée, et ayant pour cause le travail ». Il cherche à voir si cette définition s'applique aux hornies, ne s'occupant d'ailleurs que de la hernie crurale et inguinale. Il conclut qu'à part certains cas exceptionnels d'éventration et do hernie accidentelle, la hernie est une maladie survenant dans le travail et non un accident. Il montre que la hernie est la conséquonce do l'effort résultant du travail, tout comme l'hémorrhagie cérébrale, l'hémoptysie. Il conteste que l'ouvrier puisso prouver que la cause de la hernie est le travail, cite oussitie plusieurs jugements de tribunaux de commerce et termine en déclarant que la hernie n'est pas un accident du travail.

A la Société império-royale des médecins de Vienne. M. Carl Ullmann préconise les applications d'air chaud dans le traitement de certaines affections articulaires et des plaies infectieuses chroniques. Il présente à cet effet plusieurs malades atteints d'artropathies blennorrhagiques on syphilitiques qui, après avoir été soumis sans résultats à différents traitements, out guéri en quelques semaines par l'application d'air chaud, d'après le procédé de Bier. M. Ullmann a traité en outre par la même méthode 150 cas d'ulcérations des organes génitaux, des mombres et du tronc, Les lésions des muqueuses sont peu accessibles à co modo de traitement: mais colles du tégument cutané, les ulcères du nied en particulier sont modifiés très avantageusement dès la première application d'air chaud. La temperature doit varier suivant le dogré des lésions; elle sera plus élevée pour déterger les ulcères que pour tonificr les plaies et les rendre granuleuses. Chez tous les suiets anémiques, cachectiques, dyscrasiques ou débilités par une cause quelconque, le traitement par l'air chaud donne de meilleurs résultats que les antiseptiques chimiques.

A la Société physiologique de Kiel, M. Gerulanos rappelle que les affections pulmonaires consécutives aux interBULLETIN 163

centions chiruryicates ne sont pas rarcs et que la navosa par le chloroforme ou l'éther est une de leurs causes. L'éther agit localement sur la mujueuse brouchique, produit des modifications pulmonaires et par l'altération des vaisseaux prevoque une augmentation de la sécrétion bronciènque prèdisposant ainsi à la brouchite et à la pnoumonie hypostatique. Le chloroforme agit d'une façon analogue quand même il ne détermine pas d'hypersécrétion. Les pnoumonies hypostatiques qu'on observe dans esertains cas tiennent à l'alfaiblissement du cour et à la position horizontale que le malade est obligé de garder après les opérations graves. Les interventions pour hermies étrangiées, les ligatures de l'épiploon prédisposent aux embles, aux infaretus pulmonaires, aux abées et à la gangrène du poumon par voie métastatique.

A la Société médicale de Hambourg, M. Schmilinsky a rapporté une observation d'invagination intestinale chronique, révélée par une exagération du péristalisme de l'intestin gréle parfaitement visible sons la paroi abdominale, par une tuméaction de la région du euceum et du ciolon ascendant, sensible à la pression, de consistance semi-dure, ayant la forme d'un rein. Sous la palpation de la main ou par l'insufflation de l'intestin, on la sentait se dureir passagérement, ce qui est la caractéristique des tumeurs dues à l'invagination intestinale. On diagnostiqua une pénétration de l'iléon dans le colon ascendant, ce que confirma la laparotomie.

A la Société médicale de Birmingham, M. Saundiy attire l'attention sur un certain nombre de cas de méningite non tuberculeuse qu'il a obsorvés cette année et présentant le type de la méningite basale postérieure décrito par. Lecs et Barlow. Dans tous les cas on a trouvé le diplocoque de Still. M. Saundby établit un rapport entre ces cas et la méningite cérébro-spinale épidémique, dont ils ne seraient que des cas sporadiques. Ce fait a son importance, car il semble indiquer une augmentation de fréquence dans les cas sporadiques, co qui ferait prévoir une épidémie possible.

THÉRAPEUTIQUE GÉNÉRALE

Traitement des pneumonies.

Par le D' MUSELIER Médecin des hôpitaux.

(Suite).

Telle est, dans ses lignes principales, la ligne de conduite que Talamon conseille en face d'une pneumonie régulière. C'est ce qu'il appelle de l'expectation suggestive. mot à retenir, puisqu'il définit bien le rôle du médecin et l'impression produite sur le malade. Mais les choses sont moins simples quand on se trouve en face d'une pneumonie grave, soit que la gravité paraisse être le fait de la maladie elle-même, comme dans certaines épidémies, soit qu'elle procède de mauvaises conditions antérieures inhérentes au sujet dont la résistance vis-à-vis de la maladie se trouve ainsi diminuée à l'avance dans des proportions plus ou moins fâcheuses. Ce dernier groupe serait le plus important, d'après Talamon, qui propose même d'y englober en bloc toutes les pneumonies désignées autrefois sous le nom de pneumonies adynamiques, typhoïdes, dont on a voulu, par erreur, faire autant de variétés à part. Or, dans ces pneumonies, la sévérité du pronostic tient surtout, sinon exclusivement, à la mauvaise qualité du terrain sur lequel la pneumonie est venue se greffer: remarque à souligner, parce qu'elle est d'accord avec la doctrine contemporaine qui nous montre l'exaltation de la virulence microbienne

sous l'influence de conditions individuelles, durables ou passagères.

Quel traitement convient à ces pneumonies? Ici encore. en l'absence de médication spécifique, on n'a d'autre ressource que de s'adresser aux divers éléments de la maladie. Mais ce n'est plus de l'expectation suggestive qui convient, e'est la thérapeutique des indications dans toute sa rigueur. c'est le traitement symptomatique intensif. Ici encore on trouve, en dehors des indications issues des conditions inhérentes aux divers cas particuliers, des règles générales qui procèdent, il est vrai, plutôt de la maladie elle-même que du malade. Dépression des forces, advnamie, élévation thermique excessive, délire, voilà pour le médecin autant de causes de préoccupation qui se retrouvent dans tous les cas de quelque gravité. Pour que l'intervention ait des chances de succès, il faut d'abord qu'elle soit prompte et immédiate, il faut que la défense soit active et énergique. Si elle n'est encore qu'une forme d'expectation, il faut que celle-ci soit fortement et d'emblée défensive (Talamon).

Il y a d'abord la série des moyens qui s'adressent à cet clément symptomatique si fréquent, on pourrait dire immanquable dans toute pneumonie grave, qui s'appelle adynamie. Tous ont pour but de combattre la sidération du système nerveux, de maintenir les forces, de relever l'énergie défaillante du musele cardiaque. En premier lieu, l'alcool, dont l'usage a été si longtemps prôné, en quelque sorte exclusif. Mais quelle est sa valeur en tant que stimulant et dynamophore? Disons-le de suite, on ne trouve déjà plus ure epoint l'accord qui régnait autrefois. Pel, au congrès allemand déjà eité, affirme et proclame cette valeur, tout en avouant que nous ne sommes guère fixés sur le mode d'action du médicament, nonobstant toutes les théories proposées. Il y a même des cas où l'alcool est indispensable : dans les pneumonies des alcooliques, où il semble jouer un

rôle semblable à celui de la morphine chez les morphinemanes. La question des doses et du moment d'administration reste subordonnée aux cas particuliers. D'une manière générale, il est bon d'en modèrer l'emploi chez les individus jeunes et de l'accentuer, au contraire, chez les gens agés, D'autres médecins, en revanche, insistent plutôt sur le chapitre des inconvenients. C'est ainsi que Smith reproche à l'alcool de favoriser la dilatation du cœur chez les preumoniques, objection très sérieuse, ou en conviendra, si elle est fondée. Schultze (de Bonn) se montre également, mais pour d'autres raisons, peu disposé en faveur de l'alcool, auquel il préfère d'autres excitants qui joignent à leur efficacité certaine l'avantage d'être vraiment inoffensifs: le café, le camphre. Nous pourrions citer d'autres opinions d'où il ressortirait que, si l'alcool a conservé une majorité de partisaus, néanmoins le nombre de ses détracteurs a notablement augmenté dans ces dernières années. Il est résulté de cette dépréciation une diminution proportionnelle dans l'emploi de la potion de Todd, cette prescription banale dont nos maîtres ont fait si longtemps la base du traitement de la pneumonie. Peut-être aussi faut-il voir là un effet indirect du discrédit qui a peu à peu frappé l'usage des boissons alcooliques, envisagé d'une manière générale, et le contre-comp de la condamnation que les pouvoirs publics. d'accord avec les enseignements de l'hygiène, ont prononcée contre elles sous forme de lois on de mesures restrictives. L'essentiel, pour nous, est de constater le déclin de la vogue thérapeutique d'un médicament qui a longtemps régné en maître presque absolu dans le traitement de la pneumonie.

On peut formuler des réflexions analogues à propos de quelques autres méthodes, comme celle de la digitale à haute dose et des bains froids. La première fut érigée en traitement systématique par Petrescu (de Bucharest), qui

à son sujet publia des statistiques brillantes et en apparence demonstratives. Aujourd'hui on ne doit plus chercher dans l'action de la digitale que ce qu'elle peut donner, un moven de maintenir une tonicité suffisante du myocarde, pour empêcher celui-ci de fléchir et pour prévenir ainsi l'adynamie, puis le collapsus cardiaque terminal. De même pour les bains froids, que l'on a voulu appliquer comme méthode courante. sinon à toutes les pneumonies, du moins à certaines formes de pneumonies. Cette méthode, qui rend de si réels services aux typhiques, ne paraît pas en rendre d'équivalents aux pneumoniques, loin de là. Les inconvénients, voire les dangers, dépassent ici notablement la somme des avantages. On lui a reproché, non sans raison, d'aggraver la eongestion pulmonaire secondaire et la cyanose et d'augmenter les chances de collapsus cardiaque. Eichorst (de Zurich), qui a eu l'occasion d'étudier ce point particulier de pratique, déclare qu'il a dû renoncer complètement aux bains froids dans le traitement de la pneumonie à la suite des nombreux accidents dont il a été témoin, et dont tout médecin, le cas échéant, devrait comme lui se déclarer responsable. En regard de cette opinion nettement hostile, il est bon cependant d'en placer une autre, qu'on pourrait appeler l'opinion des opportunistes, c'est-à-dire des partisans de l'emploi du bain froid subordonné aux indications et conditionnel. Nothnagel (de Vienne) s'en est fait le défenseur en déclarant que l'usage de l'hydrothérapie chez les pneumoniques (ablutions froides, enveloppements humides) ne lui a donné que de bons résultats. Il déclare ne rien redouter non plus du bain froid, même dans les cas les plus graves. De même Landouzy préconise l'hydrostimulation comme un moyen d'action puissant vis-à-vis de l'adynamie, si grave dans certaines pneumonies.

Remarquons en passant que ce débat sur l'utilité de l'eau froide chez les pneumoniques se rattache à une autre ques-

tion bien plus générale et bien plus importante, celle de l'utilité de l'antipyrèse dans les maladies aiguës. Doit-on combattre la fièvre directement, chercher à la diminuer par des moyens qui s'adressent immédiatement à l'élévation thermique? Eichorst, déjà cité tout à l'heure, exprime à cet égard une opinion négative, et il donne pour principal argument ce fait incontestable, à savoir que l'élévation thermique est liée à l'existence du fover d'hépatisation, qu'elle ne peut décroître tant que celui-ci est en état d'activité. Logiquement donc, on ne doit songer à diminuer l'effet qu'après avoir modifié la cause. En fait, l'antipyrèse directe n'aurait de raison d'être et d'utilité que chez les sujets qui supportent mal les températures élevées, notamment chez les vieillards, les cardiagues, les alcooliques et les femmes enceintes. Eichorst conclut que l'hydrothérapie, dans le traitement de la pneumonie, ne saurait prétendre à devenir une méthode systématique et générale, qu'elle doit rester subordonnée à un petit nombre d'indications éventuelles et précises, et qu'elle réclame dans tous les cas unc surveillance étroite, une vigilance extrême de la part du médecin. Cette conclusion est anjourd'hui celle du plus grand nombre, on doit la considérer comme l'expression définitive de la vérité.

Nous venous de formuler quelques critiques à propos de certaines méthodes destinées à combattre quelques-uns des symptômes des pneumonies graves. Nous devons encore insister sur les règles qui doivent procéder au traitement de celles-ci, d'après les cliniciens les plus modernes. Il reste convenu que la gravité doit s'entendre ici d'une façon générale, soit qu'elle paraisse être le fait de la maladie elle-même, comme dans certaines épidemies, soit qu'elle résulte de ronditions inhérentes au sujet atteint de pneumococie. Ce dernier groupe est le plus considérable et nous avons vu que Talamon avait proposé de la seinder en groupes secondaires, à chacun desquels ressortissent des indications un peu spéciales qui ne se confondent pas avec les indications générales communes à toutes les pneumonies graves. Nous proposons de simplifier cette classification et de la ramener à quatre ou cinq catégories dans lesquelles il sera toujours facile de faire rentrer les cas particuliers. S'il est vrai, par exemple, que les cardiaques, les diabétiques, les brightiques comportent respectivement des règles de traitement à part, il n'est peut-être pas très utile, en revanche, de créer une catégorie pour les cancéreux, une autre pour les surmenés du physique ou du moral, une autre pour les cachectiques de tous ordres, car on ne trouve aucune différence essentielle entre ces différents groupes, en dehors des conditions générales créant la diminution de résistance physiologique qui a pour effet d'accentuer la gravité de l'agression pneumococcique et de préparer son aboutissement à ces trois modes de terminaison également redoutables qui sont : l'adynamie, la suppuration, l'infection. La distinction toutefois est plus légitime et mérite d'être conservée quand il s'agit de la pneumonie survenant chez les individus porteurs d'une déformation thoracique ou vertébrale ancienne (bossu), ou bien de celle des femmes enceintes, car la gravité tient ici à des conditions mécaniques défectueuses, et de ce chef on doit lui importer des moyens particuliers. Vovons d'abord quelle doit être la conduite du médecin vis-à-vis des cas appartenant à ce dernier groupe. Talamon fait remarquer judicieusement que chez les

Talamon fait remarquer judicieusement que chez les individus à déformation thorscique prononoée, la gravité de la pneumonie est surtout d'ordre mécanique, ainsi que chez les cardiaques aortiques ou mitraux. De même que chez ess derniers, la circulation pulmonaire, déjà génée, s'embarrasse encore plus du fait de la fluxion active inflamatoire, la congestion tend de ce fait à s'étendre aux deux poumons, et les malades succombent à l'asphyxie plus qu'à

la pneumonie elle-même. De même ehez les femmes enceintes, ehez Iesquelles on voit fréquemment l'asphyxie survenir de bonne heure au eours de la phlegmasie pulmonaire, circonstance făcheuse à laquelle il faut joindre l'éventualité de l'avortement ou de l'accouchemont prématuré. Talamon recommande chez les cardiaques l'usage des drastiques, si les sujets sont encore vigoureux, auquel il fait succéder celui du calomel, à doses fractionnées, duns le but de décongestionner la circulation hépatique et d'exciter la sécrétion urinaire. Ultérieurement, les injections hypoderniques de spartêine, puis celles de enfême concourent à maintenir l'énergie des contractions du myocarde et à l'empecher de liéchir.

Chez les obèses, le danger provient à la fois d'une nutrition générale défectucuse et de la surcharge graisseuse du cœur. Or, par ectte dernière circonstance, la digitale trouve chez eux une contre-indication formelle, tandis que les autres médicaments toniques du cœur, caféine, spartéine, apparaissent comme très utiles. De même chez les pneumoniques atteints antérieurement de lésions chroniques du cœur : chez ees derniers, Landouzy estime que les indications doivent être réglées, non pas seulement par l'état de fonctionnement du cœur, mais encore par la considération de la forme, de la nature et du degré de la cardionathie, de la validité relative du muscle cardiaque et de la facon dont celui-ei réagit aux influences thérapeutiques. Telle doit être la préoccupation dominante du médecin, et à un moment donné, il peut imposer l'usage de la cafcine, de la spartéine, de la strychnine, de préférence à eclui de la digitale, qui ne régularise le eœur qu'en lui imposant un surcroît de travail. Remarquons du reste, à propos de cette dernière, que nous sommes loin d'être fixés sur son utilité et par conséquent sur l'efficacité de son intervention. Nous l'avons déià fait pressentir plus haut, en relatant l'opinion des médecins allemands. Plus réceniment, M. le docteur Fiessinger, d'Oyonnax, s'est prononcé avec force dans ce sens et a fait san hésiter le procès de la digitale chez les pneumoniques, vis-à-vis desquels ce médicament n'aurait, d'après lui, qu'une action infidèle et illusoire. Ainsi, la clutte thermique qu'il produit n'est pas toujours accompagnée d'un amendement parallèle dans les symptômes. Parfois, au contraire, le malade va plus mal. Le pouls faitblit et devient irrégulier. En pareil cas, l'abaissement de la température devient un signe fâcheux et ne traduit que l'affaiblissement de l'organisme et l'impuissance de celui-ci à réagir par la fièvre contre l'intoxication pneumonique.

Fiessinger conclut que l'emploi de la digitale, particulièrement sous forme de digitaline cristallisée, dans le traitement de la pneumonie, est loin d'étre une panacée. L'asthènic cardiaque apparaît souvent, malgré son intervention. Eufin, dans les pneumonies graves, elle apparaît lamentablement impuissante.

Cette critique de l'action des préparations digitaliques es sérieuse, appuyée qu'elle est sur l'observation personnelle et conscienciouse de l'auteur. Il y aura lieu d'en tenir compte à l'avenir et de ne pas se laisser guider uniquement par des considérations théoriques sur le mode d'action physiologique du médicament. Remarquons du reste que les conclusions de Piessinger visent surtout l'emploi systématique et uniforme de la digitale chez les pneumoniques; peut-etre perdraient-elles de leur caractère négatif devant les cas oi le cour est réellement en cause, où il y a vraiment lieu de lui apporter une aide et un ressort, où l'asthénic myocardique et vasculaire est imminente?

Alcooliques. — En ce qui concerne la pneumonic des alcooliques, l'accord est plus général, les médecins sont à peu près unanimes à reconnaître la nécessité d'imposer à

ces malades l'usage de l'aleool à haute dose, de façon à maintenir une excitation nécessaire et à entretenir le stimulus nerveux grâce auguel ils pourront arriver à trionpher du collapsus cardiaque et de l'adynamie, les deux éventualités les plus redoutables. Landouzy administre la dose quotidienne de 200 grammes de rhum, étendus dans un litre d'eau, à la manière de Tood, de facon à assurer la continuité dans l'action du remède. Il y joint, pour les sujets déprimés, l'usage des injections de strychnine et d'éther, et parallèlement il insiste sur l'utilité de certains soins, en apparence limitatifs à des indications de second ordre et néanmoins très importants, comme la régularisation des garde-robes, le lavage répété des fosses nasales et de la bouche, etc. Il attribue à ces mesures pratiques, mises en œuvre dès le début de la maladie et continuées avec persévérance, un certain nombre des succès de sa clientèle personnelle. Talamon insiste sur l'utilité éventuelle des injections excitantes, comme celles d'huile camplirée ou de strychnine associée ou non à la spartéine, ou bien des injections hypodermiques, suivant la formule de Chéron. Aueun de ces deux auteurs ne fait allusion à l'opportunité des bains froids ehez les pneumoniques alcooliques atteints d'agitation nerveuse excessive ou même de delirium tremens.

On pourrait étendre encore cette énumération des diffirentes variétés de pneumonies et dos indications qu'elles entraînent respectivement, suivant les conditions de terrain ou leur degré de gravité en quelque sorte essentiel. On pourrait, par exemple, rechercher avec Talamon les indications particulières chez les diabétiques, les urémiques, les inanitiés et les cachectiques, ou bien encore dans les pneumonies associées à d'autres infections, comme la grippe. Mais ce ne serait là, d'après nous, qu'une division inutile et par conséquent une classification oiseuse et stérile, d'autant que dans quelques-unes de ees catégories, la mort est l'aboutissant à peu près fatal de la phlegmasie pulmonaire, comme c'est le cas chez les glycosuriques et les brightiques, chez lesquels on la voit s'affirmer d'emblée avec une gravité souveraine. Talamon reconnaît d'ailleurs que, sauf le degré d'intoxication, la situation ne diffère guère dans les pneumonies qui surviennent chez les individus épuisés par une maladie chronique quelconque ou simplement par le surmenage physique et moral, la misère. Il est done préférable, à l'exemple de Landouzy, d'englober tous ees faits dans une vue d'ensemble et de lui appliquer uniformément les considérations générales que comporte leur ressemblance pronostique, d'autant que, suivant la très iuste remarque de l'auteur que nous venons de eiter, les pneumonies graves sont loin d'être l'apanage et le monopole exclusif de certains aleooliques, brightiques, diabétiques ou de certains surmenés, mais s'observent parfois chez des suiets dont l'organisme était réellement sain. exempt de tares appréciables, comme si l'hypervirulence du pneumocoque donnait seul à la maladie son earactère infeetieux. Il y a chez tous ees sujets une communauté d'indieations qui aboutit à une certaine uniformité dans le choix des movens à opposer à la maladie. Ainsi, de pareils pneumoniques sont justiciables de l'hydrostimulation et de la sérothérapie, qui sont les meilleurs moyens de combattre l'hyperthermie et l'asthénie. De ces deux ordres de moyens, Landouzy préfère espendant le second, ou du moins lui accorde une importance prépondérante. S'il associe volontiers l'un à l'autre, il n'hésite cependant pas à déclarer que les injections de sérum, par l'apport d'un liquide neuf servant à la stimulation et à la dépuration cellulaire, aident mieux que la balnéation aux efforts de la nature médicatrice. Théorie mise à part, il est certain que ces procédés s'imposent chez tout pneumonique en péril. Ajoutons d'ailleurs que l'hydrostimulation ne comprend pas seulement le bain froid, dont les inconvénients et même les dangers sont comms, mais toute une série d'autres pratiques plus inoffensives et cependant tendant au même but, lotions froides,

enveloppements mouillés, enveloppements froids, etc. Il nous resterait à dire quelques mots au sujet du traitement du pneumonique en convalescence, car celle-ci est en quelque sorte le prolongement de la maladie; elle en représente la dernière phase, la phase de reconstitution histologique et de réparation. Ici, l'intervention de l'hygiène peut être fort utile, sous forme de séjour à la campagne, de eure de soleil ou d'altitude. Landouzy la considère comme très importante, particulièrement pour éviter au malade de nouvelles infections (grippe, tuberculose), qui ont chance de venir se greffer sur un terrain antérieurement infecté et amoindri dans sa résistance. Il v ajoute, dans le même but, l'usage de certains antisentiques dont l'action s'adresse plus spécialement au noumon, comme le carbonate de ercosote, et il recommande par sureroît la pratique longtemps continuée de l'asepsie buceo-pharyngée,

C'est donc, ainsi qu'il le dit très justement, un rôle de secouriste que le médecin est appelé à jouer, du commencement jusqu'à la fin, auprès du malade atteint de pneumonie. Ce rôle, moins beau assurément que celui qui consisterait à guérir, dans l'acceptation véritable du mot, est encore très lonorable, et c'est à le remplir de son mieux que le médecin doit s'appliquer, s'il veut à la fois obéir aux enseignements de la pathologie moderne et assurer le repos de sa propre conscience. VARIÉTÉ 175

VARIÉTÉ

Le Baqquet offert au professeur J. Renaut, à Lyon.

Lo samedi 19 janvier, de nombreux elèves ot amis du professeur Renaut lui offiraient un banquet pour célèbrer sa nomination réconte dans la Légion d'honneur. Ce fut une manifestation de chaude sympathie envers le Maître éminent qui, depuis vingt-cinq ans, eusseigne avec tant d'éclat, à Lyon, l'Anatomie générale, et qui y excree en même temps depuis 1883 les fonctions de médecin des hôpitaux. La haute estimo des uns, la reconnaissance des autres, la joie de tous de voir enfin justice rendue à qui la méritait, trouvaient dans cette réunion une occasion unique de s'exprime

Anssi bien l'assistance fut-elle aussi nombreuse que choisie. Plusieurs professeurs de la Faculté de médecino de Lyon, deux illustres maitres de Paris venus tout exprés pour témoigner de leur vieille et fidèle amitié; le président de l'Association des médecins du Rhône; une pléiade d'agrégés, de médecins et de chirurgiens des hôpitaux; un grand nombre d'anciens internos ou d'ancions élèves du laboratoire, dont plusieurs n'avaiont pas reculé devant un long voyage pour assister à cette fête; enfin plusieurs distingués praticions et les élèves actuols, formaiont autour du Maître une cohorte serrée, heureuse de lui faire une ovation diem de lui.

Tous garderont un inoubliable souvenir de cette soirée charmante, où régnérent seules et sans conteste l'amitié la plus pure, l'affection la plus sincère et la plus respectueuse, la sympathie la plus franche et la plus désintèressée.

On avait jugé bon do matérialiser en quelquo sorto le souvenir de cette fête et des sentiments qui lui avaient donné 176 VARIÉTÉ

naissance dans l'offrande d'un ebjet tangible et durable. Et M. Albert Robin fut chargé, au nom de tous, d'épingler à la boutennière du Maitre une croix de chevalier de la Légion d'honneur avec les palmes de l'Instruction publique.

A la fin du banquet, entre les coupes de champagne, la série des toasts commença et ce fut la partie la plus intèressante de la fêto. Le professeur Pierret rappela le caractèro essentiellement professoral du Maître, les succès de son enseignoment, les remarquables travaux sertis de son laboratoire et son influence sur ses élèves, telle que tous « conservent entre eux je ne sais quel air de famille . Puis, cherchant à dégager le caractère propre de l'œuvre de Renaut, il la trouvait dans co fait qu'elle n'est pas d'un histolegiste pur, mais en même temps d'un physiologiste et par conséquent d'un médecin. C'est l'union féconde de l'anatomie générale et de la clinique. Médecin, Renaut l'est devenu par une évolution régulière de sen esprit en pronant pour peint de départ los actions et les réactions des cellules vis-à-vis des agents pathogènes. Et en terminant, le professeur Pierret a demandé au héros de la fêto de couronnor sa carrière par quelque beau travail do synthèse anatomique et clinique.

M. Chappet, au nom de l'Asseciation des médecins du Rhôno, a romorcié M. Renaut du concours dévoné qu'il avait apporté à cette Seciété dont il est vice-président depuis plusieurs années.

M. Chandelux, l'élève de la première heure, a rappelé la fondation de l'école histologique lyennaise, dont il fut un des représentants les plus distingués.

M. Loclerc se fit l'interprète des anciens et récents internes. « Nous aveas tous gardé l'ineffaçable souvenir du Mattre incemparable et de l'ami désintéressé qui ne marchanda jamais au plus humble de ses élèves ni sa science ni sen dévouement. Chacun de nous n'est-l' pas encore sons le charme de ses séduisantes et pitteresques improvisations faites à chacune de nos visites hespitalières ? Clinique profites à l'appara de la comme de la visite hespitalières ? Clinique pro-

variété 177

prement dite, pathologie générale, anatomie pathologique, thérapeutique, tout était diseuté et résolu à propos de chaque malade, et Dieu sait dans quel langage imagé, avec quel luxe d'apercus originaux et personnels, jusque dans les moindres détails! » Il l'a loué onsuite de n'avoir pas eraint, jeune professeur, de subir le concours pour le médicat des hôpitaux. « Certes. il a fallu au jeune professeur de l'Ecole de Paris une dose d'énergie peu commune pour affronter les aléas des eoneours lyonnais et se poser résolument en face du fameux point minimum de la majorité. Et ce ne fut pas un spectacle banal que celui de ce Maître distingué, mais étranger à notre monde hospitalier, se faisant d'abord candidat, puis descendant courageusement dans l'arène, à côté de lutteurs réputés solides, voire mêmo fougueux. Il est en déliente posture. Le milieu n'est pas le sien. Le talent l'emporterait-il sur eertaines influences locales? Alt! l'incertitude fut vite dissinée et le combat fut pour vous, eher Maître, un véritable triomphe. »

M. Regand, au nom des élèves actuels du laboratoire d'histologie, a fait ressortir la grando valeur de l'euseignement
publie de son Maître. « La hauteur des idées générales, l'originalité des conceptions, l'élégance de la forme, l'illustration
des faits abstraits qui accompagnent constamment, grace à
une habileté consommée, les descriptions verbales..., tout le
monde vous reconnaît ces qualités et bien d'autres qui font
de vous un professeur éminent, le professeur à, ainsi que vous
désignont familièrement vos élèves. » Et il a caractérisé ains
les relations quotidiennes qui unissent le professeur à ses
élèves, au laboratoire: « De votre côté le libéralisme; — du
nôtre la soumission facile à votre autorité; — de part et
d'autre l'affection et le dévouement. »

M. Huchard a louó, en termes èmus, « le chevalier sans peur et sans reproche ».

Enfin M. Albert Robin, dans une exquise improvisation qu'on lira plus loin, et qui a véritablement tenu sous le

178 Variété

charme toute l'assistance, a rappelé les souvenirs de jeunesse, et parlé surtout de l'homme et de l'ami.

Le professeur Renaut se lève alors et adresse à tous ses remerciements dans cette langue à la fois cerrecte, précise, imagée et pittoresque qui lui appartient. Il a fait retomber l'honneur des succès de sa carrière sur ses maitres et sur ses dèves : sur ses maitres, Cl. Bernard, Ranvier, (tubler, Lorain surtout, qui lui apprit à réfréner son imagination, car oc maitre à l'esprit généralisateur, à l'imagination puissante, se défendait contre ses propres entrainements et domptait la folle du logis » en s'astreignant à prendre et à comparer des températures rectales; sur ses élèves que, dans un excès de bieuveillance, il a trop bien jugés, et qui, on réalité, ne lui on trien domné, et a sont contentés de recevoir beaucoup de lui, en science, en dévouement affectueux, en formation intellectuelle.

Colui qui écrit ces lignes le sait mieux que personne, car après aveir été son élève, son interne, son assistant, son cellaborateur, il a eu le bonheur de devenir son collègue dans les hôniaux.

Cliacun de ses pas dans la carrière a été dirigé et soutenu par l'excellent Maitre qui a su lui donner, en toutes circonstances, les preuves d'une fidélité et d'une selidité de sentiments que rien n'ébranla jamais. C'est pourquoi il s'honore et se félicite surtout d'être son ami et il est heureux de le proclamer en rendant compte de cette seirée du 19 janvier, qui fut véritablement et uniquement la fête de la justice, de la reconnaissance et de l'amitié.

> Dr J. MOLLARD, Médecin des Hônitaux de Lvon.

DISCOURS DE M. ALBERT ROBIN.

Quand j'ai reçu l'invitation que m'ont envoyée MM. Mollard et Regaud, ces élèves d'une école où l'on ne forme que variété 179

des maîtres, je n'ai pas hésité un seul instant à venir, pour t'apporter le souvenir ému des amis que tu as laissés làbas.

Tu sais bien aussi que c'était pour moi une joie personnelle que d'assister à l'ovation qui l'est faite et de te témoigner publiquement, avee ma vieille affection, toute mon admiration pour ton œuvre scientifique qui honore non seulement la Faculté de médecine de Lyon, mais la France entière, qui brille à l'étranger d'une vive lumière, et qui, même dans notre pays, n'a pas trouvé de détracteurs.

C'est de cette œuvre que je voulais parler, parce que nous, tes amis, nous sommes fiers de toi comme si quelque chose rejaillissait sur nous de l'honneur de ton nom. Je vonlais dire entre autres choses comment, en parlant de l'anatomie générale, tu as cu de merveilleuses envolées du côté de la clinique et de la thérapeutique, et comment, de ces études d'apparence abstruites et exclusivement scientifiques, tu as su tirer des applications pratiques qui sont définitives, comme tout ce qui est bât invee des faits.

Mais, tout à l'heure, pendant ce magnifique banquet, en entendant ces toasts, en voyant autour ide toi ees hommes eminents, ces savants qui te font fête et qui ont exprimé aussi bien et mieux peut-être que je ne saurais le faire moimême la haute et brillante part que tu as dans l'évolution de la médecine contemporaine, dans l'éclat de ce véritable triomphe, j'ai senti un souvenir qui montait à ma pensée, et ce souvenir, c'est celui de notre jeunesse, de nos luttes et de nos espérances.

Vingt-huit ans! — Presque la moyenne de la vie humaine.

Il me semble que je revois notre salle de garde de la Charité comme si nous en étions sortis lier, notre première rencontre le 1^{et} janvier 1873, et le profond mépris que tu 180 VARIÉTÉ

affectas aussitôt pour moi — parec que je ne savais pas le diamètre exact des globules rouges du sang.

Mais bientôt ce mépris s'atténua.

C'était à un diner chez Henri Bouley où nous collàmes de concert un vieux général sur la bataille d'Austerlitz et sur les boutons des uniformes des grenadiers de la vieille garde. Pour me récompenser de l'aide que je t'avais apportée, tu me pris comme élève et tu m'enseignas l'histologie au Laboratoire du Gollège de France, où tu étais le premier consul du triumvirat Renaut-Debove-Malassez.

T'en souviens-tu, colonel, comme nous t'appelions

Notre amitié date de là

De ma part, elle commença par l'admiration pour l'eneyelopédiste que tu es — savant, poète, artiste, érudit, quelque Pie de la Mirandole reviviscent en notre siècle, et autre-

ment créateur que lui.
Erudit même en blason, s'il te souvient de ce marquis qui
te crut presque sorcier quand tu lui expliquas ses armoiries
qu'il ne comprenait pas.

El puis, cette amitié s'est fortifiée par des échanges d'idées et d'aspirations communes dans les longues causeries de la salle de garde. Dans nos travaux, dans les projets d'avenir, les injustices subies, nous nous appuyions l'un sur l'autre et nous nous sentions plus forts.

Les années coulèrent. La table de Gubler nous réunissait tous les vendredis avec Henri Bouley, Pidoux, Simon Duplay, le baron Larrey et celui qui devait être un jour le président Carnot.

Tu étais l'enfant terrible de ce grave milieu, mais on te permettait tout, même les plus étranges paradoxes, tant tu apportais dans la maison de vie et d'originalité.

Je erois même que tu parvins à dérider Carnot luimême, et certain soir où tu nous avais tenu sous ton charme. variété 181

j'entendis qu'il disait à Pidoux : « Je ne puis pas concevoir comment on peut être un grand savant et avoir en même temps tant d'esprit! »

Plus tard la lutte commenca.

Je ne te rappellerai pas le mcrveilleux concours d'agrégation que tu lis en 1875. Tes épreuves excitèrent l'admiration même des juges qui ne te nommèrent pas pour trois raisons: parce qu'ils te trouvaient trop joune; parce que ta conception du système lymphatique heurtait les idées régulières; parce que tu avais traité la question de l'insemnie d'une façon trop littéraire.

L'année suivante, nous nous retrouvions à la Charité, chez Hardy, toi comme chef de clinique, moi comme chef de laboratoire.

Tu commenças par troubler Hardy, mais il comprit bientôt tout le parti qu'il pouvait tirer des connaissances que tu lui apportais et il n'hésita pas à rajeunir sa clinique à l'éblouissement de tes idées générales.

Quand tu vins à Lyon, nous continuâmes à être en intime communaté intellectuelle et je n'oublicrai jamais le concours dévoué que tu me prêtas à maintes reprises, au concours d'agrégation par exemple, où tu rédigeas jour ma thèse un chapitre qui eut son heure de célébrité et qui affirma une fois de plus ta maîtrise en anatomie générale.

Ces années passées, ces années de constante amitié qu'aucun nuago ne troubla jamais, je les revois ici et je les revis en un instant! Dans la vie souvent dure que nous avons menée, leur souvenir m'a été un puissant réconfort.

Tu as été et tu seras toujours le oœur robuste, sur lequel on peut se reposer sans qu'il fléchisse jamais une fois qu'il s'est donné. Tous œux qui ont vécu près de toi le connaissent, ce cœur inépuisable; tous, ils en ont éprouvé la sûreté et la délicate tendresse. Tu t'es donné sans compter, sans souci de toi ni de ta peine, à tous tes élèves, à tes amis. Partout où il a fallu du travail, de l'énergie, du dévouement, du patriotisme, tu as payé.

Ta haute et lumineuse intelligence, aux multiples fenôtres ouvertes sur le monde, a été vraiment créatrice, et dans le sang chaud du fier Tourangeau que tu es, circule encore quelque atavisme de tes grands compatriotes, Rabelais et Descartos.

Il n'est pas de distinction officielle qui puisse prétendre sanctionner tout cela, mais il était bon pour l'honneur de la science française qu'un bout de ruban rouge fût à ta boutonnière, en attendant quelque plus haute étoile qui ne saurait tarder.

Mon cher Joseph, en buvant à ta nomination de chevalier de la Légion d'honneur, à la justice tardive, mais à la justice qui l'est faite, je porte un toast au compagnon de ma jouncesse, à l'ami fidèle et sùr de toute ma vie ! — Mon vieil ami, laisse-noi l'embrasses de l'anni, laisse noi l'embrasses mans la mis l'anni l'embrasses mans l'anni l'embrasses mans l'embrasses ma

SOCIÈTÉ DE THÉRAPEUTIQUE

SÉANCE DU 23 JANVIER 1901

Présidence de M. Albeit Robin

Le procès-verbal de la dernière séance, lu et mis aux voix, est adopté.

A l'occasion du procès-verbal.

Quelques faits relatifs à l'action de la digestion sur la réaction des urines.

Par M. G. BARDET.

Au ceurs de la récente discussien sur le traitement de la neurasthénie, plusieurs orateurs, et netamment MM. Albert Robin et Linossier, ont apporté leur opinion, basée sur des expériences antérieures, pour affirmer que chez les hyper-chlorlydriques les urines étaient hyperacides. Pour moi, commo Joulie et Cauteu, l'émettais une opinion toute contraire; or, au peint de vue thérapeutique, c'est un fait extrémement impertant, attendu que l'indication devient juste opposée suivant l'hypothèse. Il était donc intéressant de présenter des faits, cemme l'ent demandé mes contradictours, et j'ai immédiatement institué une série d'essais. Je voudrais en avoir beauceup, mais on sait combien ces études sent laborieus, combien il est difficile d'ebtenir des malades des urines tetales soigneusement recueillies; aussi je n'ai que l'étude d'un seul sujet.

Avant de cemmencer l'énoncé des résultats, je rappelle que je prends le titre au litre calculé ca caicé sulfurique et que j'établis le rappert en fonction de la densité, car le titre absolu n'a aucune valeur par lui-mème. Je prends cemme normale une urine dont le rapport ainsi établi est de 4 à 5 0/0. Le rappelle également que le dosage est effectué au meyen du saccharate de chaux, méthede qui donne au-dessous de la réalité, c'est évident, mais qui, à men avis, feurnit des résultats cemparables à eux-mèmes.

- I. Le titre des urines est le matin de 2,9 0/0, soit inférieur à la normale. A midi il est de 3,1 après un très léger repas pris à huit heures du matin. La réaction n'a pas été influencée, car la quantité d'aliments était faible.
- A midi repas de viande et légumes avec un peu de dessert. Le titre des urines de deux heures est de 1,8. Vers cinq heures else urines sont neutres. Aucun phienomène pathologique appréciable. Ici il n'y a pas d'erreur possible, le titre des urines a baissé des l'ingestion d'une quantité d'aliments suscentible d'exciter fortement l'estomac.
- II. La nouvelle expérience est faite un jour de malaise, le matin à joun les urines titraient 3,6 90. A midi repas ordinaire, c'est-à-dire un peu de viande et de légumes, lait comme boisson. A midi les urines titraient 3,4 0,0 et à deux heures le titre tombait à 1,3. Vers cinq heures, malaise, crise légère de fermentations anormales, l'urine à ce moment est alcaline et il y a précipitation des phosphates. La crise augmente et les urines, tout à l'neure alcalines, donnent à sept heures un titre de 4.2 0/0.
- Coci est intéressant, car nous sommes à un tire normal, mais la réflexion vient aussibit et je fire la déduction que les acides de formentation par stase ont relevé artificiellement le titre. C'est là un fait fréquent et c'est à lui que l'on doit attribuer beaucoup d'erreurs. L'hyperchlorhydrie s'indiquait par un abaissement du titre, mais la fabrication d'une grande quantité d'acides libres de formentation, incapables de se combiner aux albunines, déjà saturées par HCl, remonte artificiellement le titre.
- III. L'expérience suivante et dernière est encore plus intéressante, car elle a été faite au cours d'un accès franc d'hyperchlorlydrie sans fermentations anormales, parce que le malade n'a pas mangé, ou du moins fort peu, une fois qu'il a reconnu l'existence du trouble gastrique. Ce fait permet donc de mieux se rendre compte de la narche du phéno-

meno en ce qui concerne la réaction, parce qu'il n'a pas été troublé par des fermentations asormales.

Lo malade se réveille avec un sentiment d'aura migraineuse, les urines du matin tirent 2,8. A midi, avant le repas, appètit, le titrage donne 2,4 soit un leger abaissement. Averti par la sensation d'une legère irritation gastrique, le maladeprend seulement un cur poché dans du bouillon.

Aussitôt après ce petit repas les urinos systématiquement titrées voiont baisser l'acidité d'après le tableau suivant :

La deruière urine donne un abondant précipité de phosphates. Touto cette seche dépend uniquement d'une excitation fonctionnelle, à six heures, il y a eu régurgitation d'un peu de liquido qui fournit 3,8 0/00 de HCl libro. Pas d'acides de fermentation, car il n'y a plus d'aliments dans l'estomac.

A huit heures, le bosoin d'aliments se fait sentir, le malade absorbe un potage fait d'ut jaune d'eurel avec une purce claire do pommes de terre. Remarquons qu'il y a seulement un trouble gastrique lèger, qui n'a pas fourni une grande orriso parce que le suigét n'a pas mangés érieusement.

Après co petit ropas, bien-être, mais les urines restent alcalines jusqu'à ouze heures du soir, et la réaction monte ensuite comme on le voit;

Cette série de quarante-huit heures est intéressante, car celle montre que sous le coup de l'excinition gastrique, soit par une petite erise, soit par suite du fouetionnement régulier de l'estomac chez un hyperehlorhydrique, l'acidité urinaire a régulièrement baissé des que l'activité fonctionnellciait réveillée, tandis que le titre acidimétrique remontait dès que l'estomac commençait às reposer. Au point de vue thérapeutique ce sont là des indications de grande valeur, c'est pourquoi j'ai tenu à communiquer ces faite.

En terminant, j'insiste à nouveau sur l'élévation artificielle de l'acidité urinaire quand il y a des fermentations anormales, cause d'erreur qui peut masquer les phénomènes dus à l'hypersécrétion acide de l'estomac.

M. Boynoxo, - Dans l'intéressante communication de M. le doeteur Bardet et dans les précédentes, avant trait à l'urologie, il a été dit, d'après les travaux récents de M. Joulie, que le dosage de l'acidité urinaire devait être apprécié en fonction de la densité de l'urine. A ce propos, et à un point de vue plutôt rétrospectif, le demanderal à M. Bardet et à nos collègues s'ils ont constaté eux-mêmes un fait, observé depuis déjà fort longtemps, et que l'on pourrait appeler, pour un instant, sans appuyer : la densité paradoxale de l'urine, C'est-àdire, par exemple: une urine présentant une densité élevée, soit 1030, ne renfermant pas de suere, donne parfois, à l'analyse, des proportions d'urée, d'acide phosphorique, de chlorure de sodium, etc., etc., ne justifiant pas, par leur total approximatif, la densité notée, et cela souvent avec un écart considérable. En raison de cet écart, qui ne serait plus qu'apparent, aujourd'hui, d'après les méthodes nouvelles d'appréciation et de contrôle, on se demandait autrefois à quoi l'on pouvait attribuer la cause de cette soi-disent anomalie ou disproportion et on répondait vaguement : ee sont les matières extractives, sans savoir au juste ce qu'elles comportaient et en comprenant dans ce bloc des substances qui ne doivent pas v appartenir.

Cotto observation, jo ne la fais qu'en passant, je le repetç, sans insister sur son peu de valeur actuelle et simplement pour provoquer quelques éclaircissements qui mettront mieux en lumière les faits sur lesquels repose l'urologie rationnelle et permettroit d'élucidre définitivement une question autrefois obscure et qui me parait définitivement résolue aujourd'hui.

M. POUCHET. — Il n'est pas admissible, à mon sens, qu'il n'existo pas un rapport tout à fait étroit entre la densité et la quantité des éléments urinaires; si le chimiste arrive à des résultats paradoxaux, c'est qu'il s'est servi d'un mauvais densimètre ou qu'il a commis des erreurs au cours de ses recherches.

M. BOYMOND. — Il arrive parfois qu'une urine non sucrée présentant une densité de 1030 ne renferme que 20 grammes de matières dosables : un tel résultat est bien fait pour étonner et a été observé maintes fois.

M. POUCHET, — Tout dépend de la façon de déterminer la quantité des ébéments urinaires : si l'on évapore à 100°, on arrivera aux résultats les plus variables, car une partie des éléments s'évapore dans ces conditions. Il faut, pour être sûr de ses résultats, se sevir d'un bon donsimètre et évaporer dans le vide ; on reconnaîtra alors dans les examens qu'il existe un rapport constant et étroit entre la densité et les matériaux dissous dans l'urine. Si, au contraire, on se sert du hair-marie, on perd de l'urée, des matières extractives, etc., et le résultat final sers an discordance avec la densité.

M. Albert Ronn.— Il n'est pas admissible qu'il existe des densités paradoxales : on ne satrait concevoir un liquide dans lequel la quantité totale des substances dissoutes ne serait pas en rapport étroit avec la densité de ce liquide. Ni M. Boymond trouve 20 grammes d'urée dans une urine pesant 1030, et pas de sucre, et que les éléments ordinairement recherchés ne sont pas en excès, il n'y a rin lá de paradoxal. Cela prouve simplement que certains éléments ont échappé à son investigation. On sait que dans une urine normale, le rapport entre l'azote de l'urée et l'azote total est de \$50.0°; si dans une recherche on trouve que ce rapport est de 70.0°, il y aura forcément dans cette urine une certaine quantité d'azote pouvant se rapporter à des substances non déterminées au cours d'une analvse faite selon les récles courantes.

On sait, d'un autre côté, que Landwehr a découvert dans l'urine des substances ternaires, qu'il a dénommées gommes animales, et que Worm-Muller a décrit des matières réductrices qui paraissent constituer des intermédiaires entre le sucre et les aliments ternaires ingérés. Ces recherches correspondent à un type clinique : les malades dont les urines contiennent de ces produits présentent quelques-uns des symptômes de diabete, mais leur urine ne contient pas de sucre, bien que la densité urinaire atteigne chez cux un chiffre elève. Ces sujets sout, en genéral, des candidats au diabete. On observe le même phénomène chez des diabétiques qui vieune retrouve un type normal, elle passe par une période de densité élevée avec présence de matières ternaires en excès qui ne sont aes du clucose.

Chaque fois que l'on rencontrera une densité soi-disant paradoxale, il faudra rechercher si l'evolution des matériaux azotés s'est bien faite et si l'on n'a pas affaire à un faux diabéte par élimination exagérée des matériaux ternaires. Les dyaperiques hyperstiteniques, dont les digestions sont mauvaises, assimilent fort mal les aliments ternaires et présenteront souvent aussi des urines à densité dite paradoxale.

M. POUCHET. — Il y a vingt ans dojà, dans ma these inaugurale, je proposais de réserver le nou de matière extractive à un résidu très riche en azote (131/20/0), une sorte de leucine, produit de transformation des matières albumnoides. La xantilne, la tyrosine, etc., sont des substances bien définies qu'il faut se garder de désigner seus le terme un peu vague de matières extractives.

M. Bardet. - Cette question de la densité des urines est très intéressante, et je suis heureux du hasard qui m'amène à la traiter incidemment ici : ce n'est pas seulement de temps en temps, c'est tres souvent qu'on se trouve avoir des urines qui présentent cette densité dite paradoxale par M. Boymond. A mes débuts dans les recherches biologiques, i'ai été étonné de voir les traités d'urologie traiter de manière assez peu étendue de la densité des urines, car cette notion, si facile à obtenir pour le clinicien, peut feurnir d'excellentes indieations. On parle toujours d'une densité normale de 1,018 à 1,020, on dit volontiers que les urines de 1,025 ou 1,030 sont des urines très denses et qu'au delà on a affaire à des urines sucrées. Cela est si courant que j'ai vu des médecins et même des pharmaciens envoyer à des spécialistes en chimie urinaire des urines avec prière de « doser le suere ». Or, pas trace de suere. Si l'on demande à l'envoyeur le pourquoi de sa question, il vous répond généralement que cette urine titrant 1,030 ou plus au densimètre, il avait cru à l'existence du sucre et que, ne le trouvant pas, il avait supposé l'existence d'un suere spécial qu'il était incapable de déceler.

Eh bien, il faut savoir que très fréquemment en trouve chez les malades chroniques et, on peut le dire, presque toujours chez les dyspeptiques, des urines de densité considérable. Le m'en suis surtout aperça depuis que J'ai ataché mon attention aux urines de la nuit, lesquelles présentent parfois une densité tres élevée de 1,030 à 1,036; J'ai même trouvé des classités approchant de 1,040. Or, ces urines coutiennent justement les corps sur lesquels M. Albert Eobin appelait tout à l'Ihenre l'attention.

Or, il n'y a pas de doute que la présence de ces principes insuffisanment transformés eoineide toujours avec l'ingestion d'une quantité d'aliments exagérée, ou du moins supérieure à celle qu'un organisme altèré par des troubles fonetionnels est capable de transformer et d'utiliser. L'abaissement de la ration ou le groupement mieux entendu des repas suffisait généralement pour voir la densité moyenne des vingt-quatre houres revenir à un titre à peu près normal, ou tout au moins beaucoup moins élevé.

M. Boymonn, — le suis très heureux d'avoir provoqué cette courte discussion qui répond à un desideratuu resté longtemps dans le vague et donne satisfaction à coux qui pourraient encore avoir des doutes sur ce point aujourd'hui bien éclairé.

Communication.

Action apéritive du persulfate et du métavanadate de soude.

Par M. Albert Rober.

Parmi les médicaments proposés récemment contre la tuberculose, les persulfates et les métavanadates semblent avoir donné quelques résultats. En employant ces médicaments fai pu me convaincre que les malades qui en tiraient un bénéfice réel présentaient une augmentation notable de l'appétit : ceux chez lesquels les fonctions digestives restent languissantes ne sont pas améliorés. Pour le persultate de sonde en particulier, je suis tout à fait convaince que l'amélioration que l'ou peut avoir dans la tuberculose est tout entière amencée par la stimulation de l'appétit. Ce fait n'a conduit à étudier chez d'autres malades les propriétés apéritives du persulfate de soude; elles peuvent ôtre nillisées dans un grand nombre d'états morbides ; le persulfate est à ce point de vue un excéllent médicament; dans la moitié des cas oi je l'ai omployé conne apéritif; il m'a donné de hons

rosultuts, saus que, du reste, je sache quel est le mécanisme de son action ; je peux dire qu'il réussit souvent chez les dyspeptiques hyperchlorhydriques arrivés aux confins de la période fonctionnelle et de la période lésionale de leur affection, c'est-d-dire au mement où le catarrhe acide commence à s'installer et cela qu'il s'agisse de dyspeptiques simples ou de tuberculeux dyspeptiques.

Même dans lo cancer de l'estomac, on a quelquefois des effets encourageants et on arrivo, comme je l'ai vu dans plusieurs cas, à l'atténuation do l'intoléranco stemacalo et à la diminution de l'anerexie.

A quelle dose et de quelle manière doit-on prescriro le persulfate ⁹ Je crois que les auteurs lyennais qui l'ont préconisé ont employé des doses trop elevées; je donne pour ma part, uno demi-heure avant chacun des deux principaux repus, une cuillerée à soune de la solution suivante :

 Persulfate de soudo.
 2 grammes.

 Eau
 300

Si, au bout de six jours, on u'a rien obtenu, il est inutile d'inisitor; on n'obtiendra rien en continuant davantage. Même dans les cas où l'appétit s'est réveille, il est uile dinterrompro la médication au bout de six jours, sans quei l'action s'épuise; mais on rodonnera du persulfate au bout d'une période suffisante de repos.

Ce que je vicus de dire pour le persulfate, je pourrais le répèter pour le métavanadate de soude.

lei encore, il s'agit d'un bon apéritif ayant chez les tuborculoux une influence assoz uette : il ya, du reste, des malades qui se trouvent mieux du persulfate; d'autres, qui se trouvent mieux du métavamedate, sans que à l'avance on puises savoir quelle médication est proférable. D'aprèse ce que j'ai vu, l'action du métavamedate sur l'appétit est très peu marquée chez les carcinomateur. Je donne une demi-heure avant les deux principaux repas, une cuillerée à café d'une solution ainsi composée :

Métavanadate de soude...... 0sr,03 Eau distillée....... 150 grammes.

Soit 2 milligrammes par jour, et je ne continue jamais le médicament plus de quatre jours consécutivement.

La séance est levée à six heures.

Le Secrétaire, Vogr.

L'Administrateur-Gérant: O DOIN.

BULLETIN 193



A l'Académie des sciences, M. Richet signale qu'avec une forte presse on obtient 33 p. 100 de sérum musculaire en opérant sur la viando de bœuf. Malgré sa richesse en albumineides, ce sérum filtre sur papier comme de l'eau, co qui pormet de le débarrasser instantanément des graisses et des éléments figurés. Il est extrémement altérable et doit être employé au plus tôt, Même à 0° en quelques jours, il est putréfié. En été, à la température extérieure, il est hors d'usage après une ou deux heures. Ce sérum ingéré par les chiens à la dose de 20 centimètres cubes par kilogrammo d'animal, les guérit de la tuberculese inoculée. Or, intreduit par la voie veineuse ou cutanée, il ost fortement toxique et tue à la dose de 5 et même 3 centimètres cubes par kilogramme d'animal. Après coagulation par la chalcur, le môme sérum est inessensif. Il est donc probable qu'il contiont des texinos actives modifiées par l'acto digestif,

A l'Académie de médecine, M. J. Bœckel présente l'observation d'une femme à laquelle il a pratiqué avec succès, il y a quolques annèces, l'ablation totale de l'estomac pour cancer, greffé sur un ancien ulcère. Ceci prouve que la gastrostonie n'eutrave pas les fonctions digestives; l'esteme e semble avoir d'autre action que celle d'un réservoir élastique; son ablation nécessito des repas peu abondants et très fréquents.

A la Société de chirurgie, M. Poirier présente une femme de 53 ans qu'il a opérée d'un épithéliome de la région iléo194 BULLETIN

corco-colique. Cette femme pesait 33 kilogrammes. M. Poirier a fait l'incision iliaque; il a pu isoler et exciser la tumeur bien qu'elle fit en contact immédiat avec le rein. La résection faite, il a suturé bout à bout les deux portions restantes de l'intestin en fronçant un peu la portion colique. Cette femme, qui était dans un état de caclexie extrême, s'alimentait des le lendemain et avait une selle; les jours suivants, elle se remontait facilement et moins d'un mois après l'opération elle avait engraissé de 8 kilogrammes.

M. Lucas Championnière montre un malade auquel il a pratiqué une résection de l'épaule pour fracture voicieusement consolidée de l'extrémité supérieure de l'humérus. Cet homme jouit à peu près de tous les mouvements de son épaule. Le résultat fonctionnel est des plus satisfaisants. M. Lucas Championnière parlant des indications d'une parcille intervention signale qu'elles ne sont pas fréquentes. En quarante ans, Ollier ne l'a pratiquée que tronte fois. M. Lucas Championnière ne l'a fait que quatorze fois dans des cas de l'uxation non réduite ou mal réduite.

A la Société médicale des hópitaux, M. Galliard rapporte l'observation d'un pneumothorax suffocant traité par ta pleurotimie. C'est la crainte d'une infection pleurale imminente, en même temps que la menaçante suffocation qui l'amené à faire pratiquer cette opération sur une de ses malades, Italienne de 25 ans, récemment accouclée et, d'apprès les renseignements, atteinte de pneumonie à la suite de l'accouchement, qui n'avait de collection gazeuse que dans la partie postérieure et externe de la plévre. Comme les crachats ne contenuient pas de bacilles de Koch, M. Gaillard rattache ce pneumothorax non à la tuberculose, mais à la pneumonie consécutive à l'accouchement.

M. Variot apporte un nouveau contingent d'observations établissant les services que peut reudre la radioscopie pour le diagnostic de la pneumonie franche chez l'enfant. La radioscopie est de beaucoup préférable à la radiophotographie. Elle est surtout utile dans les cas de pneumonie centrale avec symptômes généraux graves et absence compléte ou presque compléte des signes physiques relevant de la percussion et de l'auscultation.

A la Société de biologie, MM. Tuffier et Milian relatent rétude extologique du liquide de l'hydrocèle qu'ils ont faite en vue d'obtenir des reuseignements pour le diagnostie étiologique de cette affection. Tandis que le liquide de l'hydrocèle simple est, en général, très pauvre en élement cellulaires et ne renferme guère que de grandes cellulos ovalaires à noyau excentrique, vraisemblablement endothéliales, l'épanchement de l'hydrocèle symptomatique d'une tube reulose testieulaire est riche en éléments cellulaires, constitués exclusivement par des lymphocytes.

CHRONIOUE

Les poisons dans l'histoire

Par le Dr Cabanès.

Bonaparte a-t-il fait empoisonner les pestiférés de Jaffa?

Une des plus graves accusations qui aient été portées contre Bonaparte, une de celles qui pésent le plus lourdement sur sa mémoire est celle d'avoir donné l'ordre d'empoisonner des pestiférés, traités à l'hôpital de Jaffa.

Est-ce une légende, une imputation calomnieuse, l'odieuse invention d'un libelliste aux gages? Et si le fait est vrai, comment l'expliquer et, s'il est possible, le justifier? Rappelons d'abord les circonstances du drame; replaçonsle dans son cadre; et, comme le peintre qui veut faire valoir son tableau, mettons-le dans son jour, dans sa luminosité, puisque nous sommes dans ce fantastique pays d'Orient où si fréuents sont les mirages.

Voici d'abord la relation, de visu, de Larrey (1) :

La peste avait déjà attaqué quelques militaires à Cathieli, à El-Arisch et à Gaza, lors du passage de l'armée dans ces endroits pour se rendre en Syrie; mais elle ne se déclara d'une manière très marquée ou'à Ramleh.

Pendant le siège de Yafa (Jaffa), plusieurs soldats, bien portants en apparence, périrent subitement de cette maladie, et après la prise de cette ville, elle se développa avec une telle intensité, que durant le séjour que nous y fimes, le nombre des morts était depuis six, jusqu'à douze et quinze par jour (2).

. Cette maladie s'apaisa pendant quelque temps, mais ce ne fut que pour reparaltre avec plus de violence, et elle ne quitta point l'armée jusqu'au siège de Saint-Jean-d'Acre, où elle exerça le plus de ravages...

Il y avait bien eu quelques cas isolés de peste à Alexan-

⁽¹⁾ Prévis de la maladie qui a régné dans l'armée d'Egypte pendant son expédition en Syrie, encogé au Conseil de santé le 10 messidor au VII, in Rélation historique et chirurgicale de l'expédition de l'armée d'Orient en Egypte et en Syrie, par D.-J. LARREY, À Paris, an XI (1803), p. 121.

⁽²⁾ Ce fut après le siège de Jaffa que la peste commença à sommaifester avec un peu plus d'intensité. Nous perdiues par la comangion 700 à 800 houmes dans la campagno de Syrie, Un écrivais decosais dit que le ciel nous envoya ce fieu pour veager le massacre de Jaffa. Cest une double niaiserie. D'abord, il était beaucoup plus simple que le ciel empédeuit le massacre, et puis la division Kierna vanit pris à Damiette les germes de cette affreuse maladic : ils se développèrent, se communiquément acr route; mais cette paste din entrée avec nous en Syrie. [Mémoires de M. de Bourrienne, t. II, p. 227, en nota.]

drie, dans la population civile (1), en messidor et en thermidor (an VI), mais il ne fut pour la première fois question d'une maladie épidémique qu'en vendémiaire de l'année suivante. Encore resta-t-elle localisée à certains endroits, sans étendre ses ravares.

C'est au 21 ventose, an VII, que se place la visite de Bonaparte aux pestiférés de Jaffa, cette action prétendue héroïque du général en chef de l'armée d'Egypte, embellie par la légende, et sur laquelle nous rétablirons un peu plus loin la vérité, à l'aide des seuls témoignages oculaires (2).

Du 19 ventose au 1^{ee} germinal, 266 malades entraient à l'hôpitel de Jaffa; il en succomba 87 (3) pendant le même laps de temps. La plupart étaient attaqués de l'épidémie régnante; le reste était atteint de dysenterie, d'affections pulmonaires, etc.

Le gros de l'armée s'était rendu de Jaffa à Acre, qui se trouvait à environ trente heures de marche.

Le 22 floréal, des ordres étaient donnés pour presser l'évacuation des malades et des blessés, soignés dans les hôpitaux de Jaffa et du Mont-Carnel. Le médecin Pugnet, qui était à la tête de cet hôpital, prévenait son supérieur Desgenettes, que « l'hôpital complètement encombré recevait journellement des mourants; que le médecin Vallat, l'économe et tous les infirmiers français étaient

Cf. l'Histoire médicale de l'armée d'Orient, par R. Desgenerres, Paris, 1830, p. 16.

^{(2) «} Ce ne fut point à cette prise de Jaffa, comme le disent des historiens et des hiorgraphes, qu'eut lieu dans l'hôpital la scène bien imaginée pour donner lieu à un bean tableent : ce fut deux mois plus fard, au retour de Saint-Jean d'Acre. J'en parferri quant le moment sera ceun. » Bou magnes, a Minotières, 1. 4), les, ch.

⁽³⁾ DESGENETTES, op. cit., p. 84.

attaqués de l'épidémie et qu'il n'y avait même plus de panier nour faire les visites (1). »

On a prétendu que Bonaparte, au retour de Jaffa, aurait à ce moment ordonné « trois évacuations de pestiférés; l'une par mer, sur Damiette, et pur terre; la seconde sur Gaza'h et la troisième sur El A'rych. » Dans ce peu de lignes, s'il faut en eroire un de ceux qui prirent part à l'expédition (2), il y aurait autant d'inexactitudes que de mots. « Comment, écrit Bourrienne, aurait-on pu évaeuer pur mer l'1 n'y avait pas une barque. Et puis, où prendre les vivres, les médeciens, la garde oour les conduire?

« Par terre! Ce sont les débris de l'armée qui ont évacué avec eux ce qui était évacuable. D'ailleurs, le seul chemin pour aller au Caire est par Gaza'h et El-A'rych. Pourquoi donc aurait-on fait deux convois, l'un sur Gaza'h, l'autre sur El-A'rych! * »

A vant d'arriver à l'épisode même qui a fait le sujet de tant de discussions, et sur lequel nous allons essayer de donner quolques éclaireissements, il est utile de déterminer la valeur du témoin que nous venons d'appeler à la barre et à qui sa situation de secrétaire de Napoléon donne en apparence un certain poids.

Bourrienne affirme qu'il n'y eut d'évacuation ni par mer ni par terre. Or, voiei ee que lui répond le comte d'Aure, ancieu ordonnateur de l'armée d'Orient, dans deux lettres

peu eonnues (3), dont nous allons donner quelques passages:

⁽¹⁾ Desgenettes, op. cit., p. 82,

⁽²⁾ Mémoires de Bourrienne, t. II, loc. cit.

⁽³⁾ Elles ont été publiées dans un ouvrage, devenu rare, de du Casse, initialé Histoire anecdotique de l'empereur Napoléon I^{et}. Paris, 1839, p. 161-162.

Lors du reteur de l'armée à Jaffa, après que le siège d'Acre eut été levé, le général en chef, voulant faire entièrement évacuer par terre ct par mer tous les malades sur l'Egypte, m'ordonna de me rendro dans la place afin d'y prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire partir les blessés et les pestiférés, seit par mer sur Damiette, soit par torre sur El-A'rych. L'évacuation par mer sur Damiette se sit par l'embarquement sur sept bâtiments qui se trouvaient dans le port de Jaffa. Ces bâtiments furent approvisionnés par les magasins de la place... Quant aux officiers do santé, comme il n'en restait pas un scul des trente-quatre que nous avions laissés dans la place pour le service de hôpitaux, qu'ils étaient tous morts de la peste, MM. Larrey et Desgenettes désignérent MM. Rosel, André, Lugiet, Javanat, Leclerc, Gloze et Morangers, tous officiers de santé appartenant aux ambulances et aux corps de l'armée. Le convoi mit à la voile seus la conduite du commissaire des guerres, Alphonse Colbert. Quant à l'évacuation par terre, elle se fit par El-A'rych, notre première place ferte sur la frontière d'Egypte, etc...

Bourricnne n'en est pas à une erreur près; nous le prendrons de nouveau tout à l'heure en flagrant délit d'inexactitude. Il se trouve cependant qu'il a dit à peu près la vérité sur l'incident de l'empoisonnement des pestiférés, qui fait l'objet de l'étude critique qui va suivre. Son récit, que nous allons produire, va se trouver confirmé par le héros même de l'affaire, le brave docteur Desgenettes, sur le role duquel tous les historiens, de quelque partialité qu'ils fassent preuve, tombent d'accord.

Écoutons Bourrienne qui, pour une fois, n'arrange pas l'histoire au gré de ses rancunes et autres bas sentiments.

Quelques tontes furent dressées sur une petite éminence près des jardins qui entourent Jaffa à l'Orient. L'ordre fut donné sur-le-champ de miner les fortifications et de les faire sauter, et, le 27 mai, à un signal convenu, nous vîmes tout à coup la ville à découvert.

Une heure après, le général en chef s'y rendit de sa tente avec Berthior, quelques médecins et chirurgions, son état-major ordinaire. Je l'accompagnai; une triste et longue délibieration avait eu lieu sur le sort qui attendait les postiferés incurables, et aux limites de la vie. Après les discussions les plus consciencieuses, on se décida à arancer de quelques instants, par une potion, une mort inécitable quelques moments plus tard, mais plus douloureuse et plus cruelle.

Bonaparto n'est done pas formellement accusé d'avoir fait empoisonner les pestiférés. Il en a délibéré avec son conseil de santé, et d'est après avoir pris l'avis des personnages compétents, qu'il aurait pris la décision dont on lui fait zrief.

Est-ce bien de la sorte que les choses se sont passées

Voici comment le fait est rapporté dans une relation publiée vers 1829 :

Uno soixantame de pestiférès, déclarés incurables, furent laissés à Jaffa et conflés au pharmacion en chef R, qui prit sur lui cette affreuse responsabilité, dont îl a omporté le secret dans la tombe, en l'Egypte, trois ans après le départ de l'armée française. Plusieurs de ces malheureux furent, dit-on, recueillis par les Auglais sur le bord de la mer. C'était seulement d'après l'avis d'un comité secret, dont l'opinion avait été unanime, que Bounparte ététait décidé. Au reste, il n'est pas sans intérêt de faire connaître que sur trente pestiférés à qui les potions farent administrées, plusiours curent une crise salutaire; quinzo ou dix-buit succombérent (1).

Vie de Napoléon, acec les détails les plus intéressants sur la maladie et la mort de cet homme célèbre. Genève, Lador, 1822, p. 69-71 (notel.

Cette version n'est pas acceptée par tous, tant s'en faut. L'ordre d'empoisonner les pestifèrés est niè par Walter Scott, Montgaillard et le duc de Rovigo; d'autres, moins affirmatifs, se contentent d'élever des doutes, et de recourir au raisonnement, pour établir qu'un pareil ordre était contraire aux véritables intérêts de Bonaparte; les plus

aurimants, se contenent a caver use source, et ae reconrir au raisonnement, pour établir qu'un pareil ordre était contraire aux véritables intérêts de Bonaparte; les plus instruits imitent M. de Norvins; ils se taisent sur le fait de l'empoisonnement (1).

Il en est d'autres qui s'en tirent par quelques phrases à

Il en est d'autres qui s'en tirent par quelques phrases a effet, pour éviter l'embarras d'une explication difficile. Tel, par exemple, l'auteur de l'article sur Napoléon l'ar, inséré dans la Nouvelle biographie générale, dirigée par le D' Hoefer: la note est assez brève pour qu'on n'en trouve pas la reproduction superflue.

L'affaire des pestiférés de Jaffa se place à la date des 24-28 mai 1799, au retour de Syrie, après l'abaudon de Saint-Jean-d'Acro.

Ce fut l'invention d'un misérable chassé de l'armée française pour des vols. Voulant se faire bien venir des Anglais, qui l'arvient accueilli, ce misérable imagina plusieurs calounies, notamment celle-ci, dont le colonol Robert Wilson se fit l'arrangeur et le propagateur daus son Histoire de l'expédition britannique en Eupufe.

Les écrivaius français ne se sont pourtant émus do cette fable, qui a pourtant ému toute l'Europe, que depuis 1815.

D'après le D' Larrey, témoin des faits, l'ompoisonnoment et l'alandon des pestifèrés de Jaffa sont entièrement controuvés : « J'eus la satisfaction de n'en pas laisser un seul en Syrie », a écrit Larrey, dans sa Relation chirurgicate de l'armé d'Orient (2).

L'Empereur Nanotéon et le duc de Rovigo ou le revers des m'idailles, par le S.-I.-M. A** (le sous-intendant militure Antoine Année). Paris, 1828, I vol. in-8*, p. 26.

⁽²⁾ Nouvelle biographie générale, édit. Didot (1833), col. 252 (en note).
TOME CXXXI. 6º LIFE.

Ce qui est à retenir de ces assertions, plus intéressées que véridiques, c'est qu'en effet ce sont les Anglais (1) qui ont les premiers répandu le bruit que Bonaparto s'était déburrassé des malades qui encombraient l'hôpital de Jaffa en leur faisant administre du noison.

Voici conment le colonel Wilson, dans son Histoire de l'expédition anglaise en Egyple, publiée en 1801, raconte les faits; comme c'est la source à laquelle ont puisé depuis tous les détracteurs de Napoléon (2), il importe de ne point paraître l'ignorer.

Bonaparte, voyant ses hôpitaux encombrés de malades, envoya chercher un mêdecin, dont le nom devrait être gravé en lettres d'or sur un monument, mais qui, pour des raisons majeures, ne saurait être inséré ici (c'est le D' baron Desgenettes). Ce mêdecin étant venu, le général entra dans une longue coaversation sur les dangers de la contagion, et termina ses discours par cette remarque: Il feut prendre un parif; il n'un a que la destruction des malades

⁽¹⁾ La chose fut d'abord publiée, comme un on-dit, par Morier, cavayé du gouvernement anglais à Constantinople, puis copiée mot pour mot par Wilson et enfin intercalée dans l'ouvrage de Wittmann, à l'insu de l'anteur, par l'éditeur Skinner.

[•] Wilson (di l'auteur du livre anglais, dont nous rapportons l'impression) sait bien qu'il a copié exte lisidoire dans le pamphlet de Morier, et Skinner n'ignore pas qu'il n'y avait pas un not de tout cela dans le journal de Wiltmann; mais comme c'était la grande histoire du jour, elle fui insérée dans les épreuves pendant l'impression de l'ourrepe. Wittmans nuviril les Français à Jafa; il y resta quelques mois, et ce ne fui qu'à son arrivée en Egypte qu'il entendit parler de cette fable; il la regeaula comme une calonnie inventée à plaisir par un ennemi irrité. » — C. An historicul inquiry into the principal circumstances and ceents relatice to the lute Emperor Napaleon, etc., par Barchy Mountency, i vol. in-9, Lundres, Etinjenn Vilson; l'aris, l'ossenage père. Analysée dans le Globe, 25 jan-genn Vilson; l'aris, l'ossenage père. Analysée dans le Globe, 25 jan-

⁽²⁾ Cf. l'Appendice de l'Histoire de Saint-Cloud, le célébre pamphilet de Goldsmith, p. 6.

act nellement dans les hápitaux qui puisse arrêter le mat. Le médeein, effrayé de cette proposition atroce, fit les remontrances les plus fortes au nom de l'hymanitè et de la vertu; mais voyant que Bonaparte persistait dans ses idées et proférait des menaces, il partit de la teute en prononcant ces paroles: N' mes principes, ni la dignité de mu profession ne me permetteut de derenir un assussin; et si pour former un grand homme, nun général, il faut absolument des qualités semblables à celles que rous pur ruissez aunter, ie remercie Dieu de ne mas les nossider.

Des considérations morales ne pouvaient détourner Bonnparte de ses desseins. Il y persévéra et trouva enfin un pharmacien qui, redoutant sa puissance, consentit à exècuter ses ordres eriminels, mais qui, dans la suite, a sonlané sa conscience par un franc aveu de toute l'affaire.

Le pharmacien, d'après les instructions du général Bonaparte, fit mêler une forte dose d'opium dans quelques mets agréables. Les pauvres victimes en mangèrent avec avidité et avec joie. Peu d'heures après, c'inq cent quatre-ringts soldats, qui avaient tant souffert pour leur pays, périrent insérablement par les ordres de celui qui rtait alors l'idole de la nation.

* *

On frémit d'horreur à ce tableau, écrit celui qui rapporte le passage du colonel Wilson (1), et on est tenté de révoquer en doute une action aussi éloignée de toutes nos idées et de tous nos principes. Le général Andréossi a contredit d'une manière semi-officielle l'ouvrage du colonel lord Wilson. Mais le colonel a répondu par une lettre imprincée, dans laquelle il répète son accusation dans les

⁽I) Cf. Cadet de tiassicourt, Voyage en Autriche, p. 386-388. Cadet de Gassicourt reproduit l'extrait de l'ouvrage de Wilson, qui lui a été adressé par un de ses amis, ainsi que le commentaire qui suit,

termes les plus formels, et en appelle au témoignage des membres de l'Institut d'Égypte.

Le médecin qui avait refusé d'exécuter les ordres de Bonaparte osa, lors de son rectour de Syrie, accuser le général devantl'Institut assemblé, en lui reprochant d'avoir, par ectte atrocité, blessé l'honneur de la France et les droits de l'humanité. Il lut à l'assemblée une relation détaillée du massacre des prisonniers tures et de l'empoisonnement des malades français, en y ajoutant un nouveau trait : « Bonaparte, dit-il, a déjà fait étrangler à Rosette plusieurs « Français et Coptes attaqués de la peste, de sorte qu'on peut croire qu'il veut rendre générale ectte affreuse mesure, »

Le général en chef essaya de se justifier : il avait détruit les prisonniers parce qu'il n'avait ni vivres pour les nourrir, ni troupes peur les garder; ils auraient attaqué les derrières de l'armée si on les ent laissés virre, d'autant plus qu'il y avait parmi eux cinq cents hommes de la garnison d'El-A'rysch, à qui on n'avait laissé la vie qu'à condition de ne plus perter les armes, et qui avaient été forcés de servir par le commandant de Jaffa. A l'égard des malades pestiférés, il les avait fait mourir d'une manière douce plutôt que de les laisser tomber entre les maius des Tures, et par cette mesure il avait on même temps sauté l'armée d'une infectien générale.

Pour savoir ce qui, dans le livre du colonel Wilson, appartenait véritablement à l'histoire, celui dont nous empruntons le récit (1) s'adressa à plusieurs officiers attachés au quartier général de l'armée d'Orient, ainsi qu'à plusieurs membres de l'Institut d'Égypte; tous lui répondivent que e les événements retrucès par l'auteur amplais

¹⁾ Le pharmacien Cadet de Gassicourt.

étaient vrais au fond, mais infiniment exagérés et envenimés. »

L'extrait de l'ouvrage de lord Wilson fut alors remis au général D..., qui n'avait point quitté Bonaparte en Égypte, et voici la note que ee général rédigea à cette occasion ;

Les blessès et les pestifèrès de Jaffa furent évacués sur Damiette par mer, et sur Bl-A'rysch par terre. Soizunte pestifèrés (et non 589) restaient encore a l'Inòpital. Ils étaient dans un état à ne pouvoir être transportés. Je restai trois jours dans Jaffa pour cette évacuation. Je proposai au général en chef d'envoyer à sir Sidney Smith un parlementaire pour lui demander une sauvegarde. Bonaparte me répondit qu'il ne voulait avoir aucune communication avec cet amiral anglais.

Sur le refus de M. Desgenettes, qui est errai, ost ît venir M. Royer, pharmaeien en cheft, homme très faible, os lui ordonna de donner de l'opium aux pestifierès... Il obéit, l'lusieurs malades eurent une crise salutaire et se sauvérent; la plus grande partie succomba. Lo général en chef m'avait donné l'ordre de rentrer au camp et če ne point m'occuper de ce restant de malades. Je lui présentai quelques observations; il m'imposa silence.

Je fis de très vifs reproches à M. Royer (1). Il se mit à pleurer. Je lui dis qu'il n'avait pas compris sa position et qu'il s'en repentirait (2). Il voulait s'excuser... Je n'écoutai que l'horreur que m'insvirait cette affaire.

^{(1) «} A l'époque de la campagne de Syrie, le pharmacien en chef de l'armée ne Aspleafa pas Roger, ainsi que le nomme M. de Bourrienne, mais Royer, et cette erreur qui, aux yeux de bien des personnes, pourruit paraître peu importante, l'est cependant beaucoup lorsqu'une action biamable s'y rattache. » Hourrienne et see erreurs,

^{(2) «} M. Royer resta en Égypte; il y est mort de chagrin, Bonaparte ne voulut jamais consentir à le laisser revenir en France.

[«] Tallien, qui connaissait M. Royer, et auquel ce pharmacien avait cerit, en parla à Napoléon, qui déclara que si Royer mettait le pied

L'histoire de l'Institut d'Egypte, racontée par Wilson, est fausse, celle de Rosette est controuvée...

La visite aux pestiférés de Jaffa est vraie. Elle est le sujet du beau tableau de M.Gros. J'étais à cette visite avec M.Desgenettes.

On voit par cette note d'un témoin oculaire, d'abord que le nombre des victimes immolées à la sùreté de l'ormée est beaucoup moins considérable que ne l'avance l'auteur anglais; et que les circonstances des deux événements différent notablement du récit de lord Wilson.

Un autre officier de l'armée d'Orient, interrogé sur le même sujet, s'est exprimé en ces termes :

Il est de toute fausseié que Bonaparte aît donné l'ordre de les tuer; il n'est pas même vraisemblable qu'il ait risqué par un crime aussi révoltant de soulever son armée, à laquelle on n'aurait pu le cacher. Quel est le soldat qui ent combattu avec courage s'il avait eu la perspective, en cas de blessure ou de maladie, d'être empoisonné par des hommes dont le devair était de le secourir?

Le général en chef était dans un grand embarras; l'arméallait s'éloigner, il n'avait d'officiers de santé que le nombre strictement nécessaire aux troupes agissantes; il ne pouvait laissare des médecins et des chirurgions à Jaffa. Les malades, qui craignaient d'ètre massacres par les Tures, demundaient à grands cris qu'on les emportàt, ils ne pouvaient traverser le désert. Dans cette extrémité, Bonaparte voulut au moins leur cacher le départ de l'armée. Il ordonna au pharmacien Royer d'assoupir nomentanément leurs sens, et celui-ci leur donna un sommeil éternel.

le de sais jusqu'à quel point une pareille justification est admissible. Les mémoires particuliers l'apprendront à l'histoire. (A suivre).

eu France, il l'enverrait devant un conseil de guerre, ce qui voulait dire à la mort. Royer le comprit et ue revit plus sa patrie.» L'Empereur Nupoléon et le duc de Borigo, p. 29.

THÉRAPPUTIQUE CHIRURGICALE

Varices, hémorrhoïdes, varicocèles, hydrocèles, épauchenents sèreux, leur nouveau mode de traitement par le gauïacol.

Par le Dr Allahverdiantz.

Je n'entreprendrai pas de décrire ici ces diverses affections plus ennuyeuses que graves, différents anteurs et des plus autorisés ont étudié ces affections à tous les points de vue, on ont recherché les causes, d'où une foule d'hypothèses avant chacune nour conséguence un mode de traitement spécial : compression (je parle ici des varices), compression prolongée au moyen des famenx bas élastiques, ou on peau dechien, repos rigourcux, excision, cautérisation et greffes épidermiques en cas d'ulcères, injections au perchlorure de for, très ingénieuses à la vérité, mais aussi très dangereuses : à l'intérieur l'hamamelis et l'hydrastis, enfin grand nombre de traitements externes. Tous ces traitements n'ont pas justifié l'espérance des praticiens. Cos malades après avoir essayé maints remèdes se résignatent à vivre avec leur mal considéré incurable, se contentant de renouveler de temps en temps leur classique has élastique.

En acceptant la possibilité des varices ducs à une cause mécanique telle que la compression par une cirrhose, un cancer, un néoplasme quelconque, soit fibrome ou uyoux, le produit de la grossesse, etc...; en incriminant anatoniquoment les anneaux aponéroritques tels que le fascia cri-

briformis et l'anneau du soléaire et à côté des causes physiologiques, eette prédisposition aussi vague qu'indéfinie, spéciale, stations verticales prolongées, etc., etc., et à côté des arthrites et des névrites, je erois qu'il existe autre chose que l'avenir nous apprendra; je erois, dis-je, qu'il y a autre chose, et je fonde cette hypothèse sur les résultats obtenus par un nouveau mode de traitement.

Voilà en quoi consiste ce genre de traitement : On badigeonne les jambes, le membre ou la région variqueuse avec une solution de guaïaeol plus ou moins concentrée selon la tolérance de la part du malade, puis, afin d'éviter le contact de l'air, on recouvre la partie badigeonnée de taffetas gommé et on termine le pansement par un enveloppement épais et chaud d'ouate maintenue au moyen d'une bande queleonque; matin et soir on renouvelle ee pansement; le malade est tenu de garder un repos relatif pendant le temps nécessaire à son traitement, temps qui varie généralement de dix à vingt jours.

Ayant expérimenté dans ma elientèle ce mode de traitement, j'ai obtenu :

7 eas de guérison radieale de variees;

3 cas de guérison de varicoeèles;

5 eas de guérison d'hémorrhoïdes. Mais là ne se bornent pas les applications du guaïacol. Avant eu à traiter 2 malades atteints d'hydrocèles et préméditant l'intervention chirurgicale, je fus amené, par leur hésitation devant une opération, à leur ordonner des badigeonnages au guaïacol, et, au bout de quelques jours seulement, trois jours pour l'un, einq jours pour l'autre, mes malades vinrent m'annoneer qu'ils étaient radiealement guéris. L'un d'eux, G. D..., habitant Noirmoutier, avait son hydroeèle depuis deux mois, et l'autre malade, habitant l'Epine, depuis trois mois et demi. Ces deux elients, que i'ai revus un an après leur traitement, n'ont pu que m'affirmer leur guérison. L'affection est-elle définitivement disparue, ou bien y aura-t-il retour? L'avenir seul nous le dira; mais il est un fait réel, c'est que :

Sans ponction, sans intervention chirurgicale, les hydrocèles ont parfaitement disparu.

Encouragé par ces résultats, j'ai employé le guaiacol au traitement des épanchements pleurétiques et chaque fois, j'ai constaté une diminution immédiate et une disparition au bout de quelques jours de la sérosité sans avoir recours à une ponction d'acuatrice.

Le guaïacol m'a également paru souverain dans les eas de points de côté des pneumoniques,

Je trouve inutile de relater iei les différents cas de guirisons obtenus pas ce procédé, l'énumération en serait fastidieuse au lecteur. Qu'il me soit permis seulement de reproduire les lettres de M^{ne} M..., de Niort, malade souffrant de varices depuis sept ans. Voici textuellement la teneur de ses lettres :

1re lettre.

- « Niort, 29 novembre 1900.
- « Monsieur le Docteur,

« Je viens vous donner des nouvelles de mes jambes, elles sont presque guèries, seules les veines des chevillées et des pieds sont encore un peu grosses, elles diminuent lentement et je me demande si ciles guériront tout à fait. Les veines de la jambe gauche, la plus malade, ressortent seulement un peu lorsque je porte un fardeau un peu lourd, mais autrement elles ne paraissent pour ainsi dire pas. D'ailleurs, je suis très régulièrement votre traitement et je ne dois pas me plaindre, car il me semble que les effets produits ont été très rapides, surtout ayant affaire à des varices datant de sept aus. »

2º lettre.

- Niort, 31 décembre 1900.
- « Monsieur le Docteur.
- « Je viens vous annoncer que mes jambes sont hien guéries, les variess ont complètement disparu, seules et parfois soulement, les veines du pied sont un peu apparentes; je continue le traitement au guañavol et je n'ose supprimer mes bandages sans votre autorisation.
- « Je regrette vivement que vous ne puissiez juger par vous-même de la guérison de mes jambes, ce dont j'aurais été très heureuse; en tout eas, je suivrai très exactement tous les conseils que vous me donnerez, etc... »

Quant aux autres malades qui ont vu disparaître leurs varices à la suite du traitement au guafacol, ils en étaient atteints depuis un temps relativement long, trois, cinq, onze et même dix-sept aus.

Il serait donc à désirer que les praticiens essaient le traitement pour les variees de toutes sortes, pour les hydrocèles, varieocèles, hémorrhoïdes et épanchements divers.

J'ai également traité au moyen du guañacol un nombre consi-lérable de malades atteints d'ordèmes énormes et de toute nature, soit aux membres inférieurs, soit aux membres supérieurs et toujours en ai obtenn d'excellents résultats. J'insiste dons eur ces divers emplois du guañacol et je lui donne la préférence à la ponction capillaire et aux autres moyens présonisés en thérapeutique et qui dans les eas précités restent la plupart du temps infruetueux.

Je considère donc le guaiacol comme un de nos plus précieux agents thérapeutiques et je ne lui connais pas de succédané.

THÉRAPEUTIQUE MÉDICALE

Considérations sur le régime des albuminuriques, Par M. Albert Roms.

1

Il régne dans la science la plus grande confusion au sujet du régime qu'il couvient d'imposer aux albuminuriques-Jadis, la mode allait uniquement au régime lacté, et son usage était passé à l'état de dogme. Aujourd'hui, des protestations se sont fait entendre. Si quelque-rams ont déchré que le régime animal n'avait pas les inconvénients dont on l'a accusé, d'autres, plus nombreux, réclament en faveur du régime végétal, et celui-ci commence à déviver sur lui une partie de la faveur si longtomps monopolisée par le régime lacté absoln.

La question est difficile à résoudre, ou ruison des élements complexes qu'elle comprend. L'un des plus importants, c'est évidemment de déterminer le critérium à l'aide duquel on peut apprécier la valeur d'un régime. Or, ce retiérium lui-neine comporte des facteurs multiples; il doit tenir compte de la quantité d'albumine, de l'état de la nutrition élémentier, du degré de la perméabilité rénale, des modifications survenues dans l'état général et dans la condition des divers symptômes, etc.

Je me propose d'envisager peu à peu ces divers éléments, et dans la note actuelle, j'étudierai l'action de certains régimes ou aliments sur la quantité d'albumine éliminée.

11

A ce propos, un premier fait apparaît, c'est que le même régime, appliqué à des cas identiques, n'excree pas, dans t us ces cas, un effet semblable sur l'excrétion de l'albumine. En voiei la preuve :

A. — 4 malades atteints de mal de Bright à prédominance scléreuse ont été soumis au régime suivant :

1º A huit heures du matin, une grande tasse de lait éerémé;

2º A midi, un repas uniquement composé de légumes préparés avec un peu de beurre et de lait, et 100 grammes de pain:

3º A sept heures et demie du soir, repas exclusivement animal, avee 160 grammes de pain.

Variations de la quantité d'albumine chez 4 brightiques sous l'influence des régimes lacté, végétal et animal.

	RÉGINE LACTÉ		RÉGIME VÉGÉTAL		RÉGINE ANINAL	
	DENSITÉ	ALBUMINE par litre	DENSITÉ	par litre	DENSITÉ	par litre
1** eas 2* 3* 1*	1028 1019 1025 1020	0,32 0,10 0,38 1,10	1028 1028 1025 1023	0,51 0,30 0,50 1,80	1022 1027 1021 1025	0,45 0,24 0,24 1,95

Chez le premier malade, c'est le régime végétal qui fournit le plus d'albumine, et le régime laeté qui en donne le moins. Chez le deuxième malade, le régime végétal l'emporte eneore, puis vient le régime lacté, enfin le régime animal.

Chez le troisième malade, le régime animal vient en tête. puis le régime lacté, enfin le régime végétal.

Chez le quatrième malade, le régime lacté, le régime végétal, le régime animal se succèdent en série croissante au point de vue de l'albumine.

Donc, aucun de ees malades offrant cependant le même type morbide ne se comporte de la même facon pour le même régime, au point de vue de la quantité d'albumine éliminée.

Mais voici une première objection. - Que se passerait-il,

si au lieu de calculer l'albumine par litre, on la calculait d'après la quantité d'urine émise par heure dans l'intervalle des régimes? Les expériences du tableau suivant répondent à cette objection. Elles montrent :

1º Que dans les deux cas l'élimination horaire d'albumine après le régime lacté est supérieure au chiffre trouvé après le régime végétal;

2º Dans le premier cas, le régime animal donne le maximum d'albumine;

3º Dans le second cas, c'est ce même régime animal qui donne le minimum d'albumine.

Variations horaires de l'élimination de l'albumine sous l'uction des divers régimes.

	RÉGINE LACTÉ	BÉGINE VÉGÉTAL	BÉGINE ANIMAL	
i e				
I .	ALBUMINE	ALBUMINE	ALBEMINE	
í	3 8 8	2 2 2 2	1 BB 12	
	par mantite mantite par bears	par fitre Puantit rendue par	par litro Quantito rendue par heure	
			- 01	
I** cas			0,46 0.201 0,0367	
2	0.57 0.262 0.0262	0,78 0,413 0,0391	0,51 0,260 0,0235	
1				

Cos irrégularités ne sont pas spéciales aux variétés de néphrites que fai choisies dans cette première catégorie. Elles se retrouvent dans la plupart des néphrites, comme le démontrent les exemples ci-dessous :

A. — Néphrite miete. — Homme de 40 ans.

Albumine après trois mois	-	-	_
de régime lacté absolú Albumine après un mois de	4,662	4,099	8,761
régime lacté mixte	4,342	2,401	6,743

Jour. Nuit. Total.

B	Déaénérescence	amuloīde	du rein.	

Albumine après le repas du matin (carné). du soir (végétal). émise pendant la nuit. Total en vingt-quatre heures	2,46 2,40 0,875 5,735
C. — Nephrite miste. — Maladie de Bright.	
Régime lacté absolu. — mixte végétal. — animal. — végétal pur. — animal pur.	2,147 2,109 1,922 1,333 1,548
 D. — Néphrite miste. — Maladie de Bright. Régime lacté absolu 	9 198

Voici 4 malados dont 3 atteints de maladie de Bright vulgaire, chez !esquels aueune règle alimentaire ne préside aux variations de l'albumine, puisque chez tel d'entre eux tel règime produit des effets diamétralement opposés à ceux qu'il engendre dans un cas strictement similaire.

earné.....végétal.....

2,466

qu'il engendre dans un cas strictement similaire.

Et je pourrais multiplier ces exemples si la preuve ne me semblait pas suffisante, si l'évidence du fait ne s'imposait pas.

Co n'est pas que je nie l'influence du régime chez les albuminuriques: il suffit, au contraire, de jeter les yeux sur les chiffres précédents pour acquérir la ferme conviction que le régime agit au plus haut chef sur tous les maindes qui excrétent de l'albumine, depuis ceux qui sont atteints de selérose rénale jusqu'à ceux qui présentent, de la façon la plus incontestable. les attributs du classique mai de Bricht.

Deux conclusions découlent donc de la première série de faits que je viens de rapporter :

1º Le régime exerce une grande influence sur les albuminuriques, quelle que soit la condition génératrice de l'albumine;

2º Aucune règle fixe ne permet à priori d'appliquer indis-

tinctement tel ou tel régime à un albuminurique, mémo quand on a établi le diagnostie de la variété anatomique de la néphrite à traiter. En d'autres termes, chaque albuminurique présente une personnalité morbide qui ne permet pas de lui imposor, par avance, tel régime, quelle que soit la faveur off-ételle dont il touisse.

HII

Ce point étant établi, il s'agit de rechercher pour chaque malade le régime lo plus favorable. Pour cela, je commence par lo régime lacté absolu institué de la façon suivanto:

De sept heures du matin à dix heures du soir, faire prendre, toutes les trois heures, un 1.2 litre de lait chaud, par petites gorgées, en mettant environ une demi-heure pour ingérercette quantité. On pourra se servir utilement d'un tube de verre pour aspirer le lait plus lentement. Il y aura ainsi 6 prises de lait de 1/2 litre chacune, soit 3 litres en tont. Mais des que la toléreme serve clabile, on augmentera peu ha pen la quantité de chaque prise de lait, de façon à atteindre 1 à 5 litres dans la journée.

Aussitôt après chaque priso de lait, le malade s'étendra sur un fauteuil et gardera le repos pendant une demi-henra environ, puis il fera une courte promenade à pied.

Sous l'influence de ce régime lacté absolu, on voit d'abord, dans presque tous les cas, augmenter la quantité de l'albumine des vingt-quatre heures. Après cette augmentation ordinairement passagére, l'albumine s'abaisse et arrive à un taux à peine variable. A ce moment, sans cesser l'usage du lait, je conseille d'ajouter des légumes, des pâtes alimentaires, des fruits cuits, du pain. Rinfi, j'ajoute des œufs et de lu viande quand le régime lacto-végétal ne paraît plus influencer la quantité de l'albumine.

Cette expérience préliminaire, pendant laquelle le dosage de l'albumine sera fait régulièrement, permet de fixer le régime général qui donne lieu à la moindre élimination d'albumine.

IV

Alors, quand il s'agit de constituer un régime définitif, it n'est vraiment pas possible de rechercher pour chiaque malade en particulier l'accion de chaque aliment sur la déperdition albumineuse. Il faut done avoir réalisé un grand mombre d'expérieuces anticrieures qui permettent de fixer, au moins à peu près, la valeur des aliments considérés individuellement. Il est vrai qu'ou pourra toujours objecter en vertu du principe posé plus haut que tel aliment qui augmente l'albumine chez tel brightique la diminuera pent-être chez tel autre. Cette objection est loin d'être sans fondement. Cependant, si des expériences démontraient que certains afiments augmentent ou diminent toujours l'albumine, il y aurait lieu, il me semble, d'en tenir grand compte dans l'institution du régime.

Un pareil travail de revision demande un temps considerablé et de très nombreuses analyses. Je n'ai pas la prétention d'apporter des anjourd'imi des solutions définitives, mais uniquement un certain nombre de faits bien observés fondés sur plusieurs centaines d'analyses et qui seront complétés au fur et à mesure que l'occasion m'en sera fonraic, et dont voiei le résumé sous forme de conclusions (1):

- 1º Le régime lacté absolu et les régimes lacto-végétal et lacto-animal donnent généralement moins d'albumine que les régimes dans la composition desquels le lait n'entre pas ;
 - 2º L'albumine augmente quand on substitue le vin au lait;
- 3º L'alimentation par les œufs donne moins d'albumine que le régime carné;
- 4º Un régime composé d'œufs et de lait donne souvent moins d'albumine que le régime lacté absolu:

Les analyses dont ces conclusions constituent le résumé seront publiées dans le Bulletin général de Thérapeutique.

5º Parmi les viandes, le vean et le bœuf eonviennent mieux aux albuminuriques que le poulet et le monton;

- 6º Le poisson paraît toujours augmenter l'élimination d'albumine;
- 7º Parmi les végétaux, les pommes de terre, les chouxfleurs et le riz sont eeux qui donnent lieu à la moindre élimination d'albumine:
- 8º Il est rare que l'addition du pain à un régime quelconque augmente l'élimination d'albumine.

Remarques sur le traitement de la variole,

Par M. Legrand.

Au cours de la dernière épidémie de variole, j'ai expérimenté diffèrents traitements. J'ai fait certaines remarques qui me semblent intéressantes; les unes concernant le traitement génèral, les autres le traitement local.

Dans tous les cas observés, j'ai toujours en à combattre une très grande intolérance gastrique avec vomissements bilieux très fréquents.

Dans cette première période, j'ai pu, en quelques heures, mettre un terme à ces accidents par l'emploi de la potion suivante:

```
Chlorhydrate de eocaine 10 ceutigrammes.
Sirop d'éther 30 gyammes.
Sirop de codéine 30 —
Eau elhoroformée 3 —
Eau de menthe 3 —
```

Une cuillerée à dessert d'heure en heure et de l'eau d'Evian, seule boisson pouvant être supportée par les malades.

Au point de vue du traitement général proprement dit, j'ai, aussitôt l'intolérance gastrique disparue, employé des méthodes classiques et sans aueun résultat appréciable. La méthode éthéro-opiacée, tant vantée, donnée presque comme spécifique, ne m'a donné que peu de succes et bien des malades montrent pour l'éther une vive répugnance qu'il est difficile de surmonter.

de me suis contenté d'administrer une potion tonique et d'y ajouter un peu d'opium. Voiei d'ailleurs la formule que j'ai adoptée :

Une cuillerée à bouche toutes les heures.

Mais ce qui me parait plus particulièrement intéressant dans le traitement de la variole, c'est le traitement local; c'est-à-dire le traitement qui a pour but de prévenir la suppuration on tout au moins d'en atténuer les conséquences.

Traitement local. — Après avoir constaté l'inefficacité du traitement interne sur l'évolution des pustules varioliques, j'ai clierché à éviter, par un traitement local, la période de suppuration et j'ai pu arrivor, dans une douzaine de cas, à supprimer cette période.

La médication que j'emploic à cet effet consiste à donner systématiquement des bains de sublimé tous les deux jours, et à recouvrir les pustules soit d'emplâtre de Vigo, que je fais découper en bandelettes de 1 continietre de large et qui s'imbriquent les unes sur les antres; soit, et é'est là le point sur lequel je désire attirer plus partienlièrement l'attention, de masse emplastique de Vigo.

Voici comme je pratique cette opération: je fais chanffer la masse emplastique de manière à lui donner la consistance de pommado liquide et je recouvre chaque pustule avec cette substance, ensuite l'applique par-dessus cette goutleclete de masse emplastique un petit morceau de papier de soic, de telle sorte que tout se passe comme si chaque pustule était recouverte par an emplâtre. Co procédé peut être appliqué sur tous les points de la surface du corps où se trouvent des papules ou des vésicules, et c'est là un grand avantage sur les bandelettes de sparadrap qui se déplacent et qui bien souvent n'adhèrent qu'imparfaitement aux surfaces sous-jacentes.

l'ai pu me rendre compte que par cette méthole, en vingtquatre heures les papules étaient totalement disparues. Quant aux vésicules, au bout de quatre ou cinq jours elles étaient, elles aussi, comptetement disparués: une simple tache rose indiquait leur existeme éphémère.

Voiei d'ailleurs comment les choses se passent dans ce dernier cas.

La papule se flétrit, puis s'affaisse; il semble qu'elle soit comme étouffée; une simple tache rose et plane lui succède.

Cette tache s'efface très rapidement au cours de la convalescence, et quelques bains savonneux hatent sa disparition.

Cette pratique qui n'est qu'une variante de certains procédés tombés en désuétude m'a donné d'excellents résultats que je résume très brièvement:

- 1º Cessation rapide des phénomènes d'intolérance gastrique;
 - 2º Suppression de la période de suppuration;
 - 3º Absence totale de eicatrices.

BIBLIOGRAPHIE

Traitement médical des malarties des femmes, par MM. Albert ROBIN et P. DALCHÉ. Un fort volume in-8° de 500 pages, avec figures dans le texte. Rueff, éditeur. Le traitement des affectious utériace est certainement un des grands écucils de la pratique médicale, car ess maladies sont des plus fréquentes, elles dépendent presque toujours de causes plus ou moins éloignées et sur lesquelles il n'est pas toujours facile d'agir. Dans ces derniers temps, la chirurgie a presque complètement accapare le dominie gynécologique et plus d'un praticien s'est volontiers débarrassé dos difficulteis réulles de sa pratique journalière en hissant au chirurgien le soin de s'occuper des maladies spéciales de sa clientèle feminine.

MM. Albert Robin et Dalché n'ont jamais voulu admetre cette stination et lis not toujours soitent que dans le plus grand nombre des cas les maladies de l'atérus et de ses annexes relevaient uniquement de la thérapeutique médicale. Les faits d'affleurs leur out donné raison : on s'est tod aperu que les résultats opérationes n'étaient rien moins que brillants et l'on compte aujourd'hui par milliers les malleurenses qui ont perdu leur nierus et leurs oxires à la bataille et qui continuent à souffir autant et parfois, souvent même, plus qu'avant l'intervention chirurgicale.

Telles sont les idées doctrirales qui ont présidé à la rédaction du beau volume que les autours offrent au public médical. Comme sanction à ces arguments, ils out établi un ourrage essentiellement pratique, destiné à armer le praticien dans la lute, aprile et longue, qu'il est si souveut obligé de soutenir contre des phénomiens conforciouse extrêmente tenanes.

Dans une première partie, consacrée à l'étude de ce qu'ils appellent si heureusement les fauses utériese, si montrent que, dans un nombre extraordinairement fréquent de cas, la feume sent dans son utérns, paree quo l'importance de la fonction rapporte presque tou-jours tous les phénomènes à l'organe géuital. Avec une grande carté, un pervission remarquable, las monatrent comment le diagnostic peut être posé de manière à déceder la cause réelle et principale des troubles mortides et il sen tracent la thérapeutique avec une grande noteté. Toute catte partie est extrèmement originaie, elle est surtouit d'un immense intéré, parce qu'elle pose pour la prémière fois les bases d'une titérapeutique veniment appropriée aux pliénoites de la contrain que tous les méderies qu'es survont product de cet vascigement seront à même de readre de grande services à de souvres malades fatigioses par des traitements locaux intemessiffs.

Abordant ensuite les lésions utérines et annexielles vraies, les auteurs montrent comment, mieux que le chirurgien, le médecin est à même d'obtenir des résultats favorables et surtout durables. Tous les prociclés sont soigneusement analysée-et passés en revue. Je ne saurais trop insister sur la manière claire et pratique avec laquelle sont traitès les moyens orthopèdiques, la description et l'indication des ceintures abdominales, question si délicate et que je n'ai vu nulle part aussi bien et judicieusement traitée.

Enfin, on trouvers dans ce volume, et c'est encore là une partie absolument originale, une savant-discussion du traitement hydrominéral des maladies des femmes, question également très délicate et dans laquelle M. Albert Robin a sequis une juste célebrie. Nonbions pas non plus les chapitres consacrés par M. Dalecho au traitement des troubles de la puberté et de l'âge critique, chapitres trés intéressants et ruités d'une facon particulièrement heurense.

Dr G. B.

REVUE DES TRAVAUX FRANÇAIS ET ÉTRANGERS

Pharmacologie.

Créosotol. — Stainer a employé ce remède dans le traitement des pneumonies compliquant la rougeole et en a retiré de bons effets. Il prescrit :

M. s. a.Une cuillerée à thé a prendre toutes les six heures.

Petrosalfol. — Le petrosalfol est une nouvelle préparation bituminense employée dens les affections de la pean. Elirmann, de Vienne, publie une étude à ce sujet. (Wener Klin. Rundseh., 6 mai 1990.) Physiquement et chimiquement, te petrosalfol se rapproche beaucoup de l'ichthyol. On l'emploie sous forme d'ongueut et en solutions aqueuses, il se mélango facilement aux solutions citérèes. C'est surtout dans le traitement de l'eczéma. l'eczéma folliculaire, pustuleux que o nouveau remêde est utilo. On peut également l'employer avec succès dans le sycosis ; l'auteur possède une statistique de 462 cas d'eczéma et de sycosis traités par le petrosulfol. (40 cas de sycosis.) Les applications étaient faites sous forme de patées ou d'onguents.

Petrosulfol Onguent, caséine			4.00 20.00 à 40.00
Ouguent, caseine			20.00 a 40.00
Petrosulfol			6.00
Lanoliue Vaseline		.)	94 90 00
Vaseline		-)) *** 20.00.
Oxyde de zine		.)) áá 10.00
Talc			

L'association du trioual et de la paraldébyde.— (Ropiteau, Th. de Paris, 1990.) L'administration du trioual en poudre, sous forme de cachets, comporte comme principaux inconvénients la lentour et l'irrégularité de l'action à produire. Aussi a-t-on depuis longtemps cherché un mode d'administration plus rapide et plus sûr.

Los récentes recherches de M. Ropineau, en mettant en évidence la solubilité du trional dans les huiles, permettent précisément de prescrire le trional sous des formes médicamentouses façiles à ingérer et contenant, sous un petit volume, et en dissolution, la dose médicamenteuse moyenne de trional.

On pourra avoir recours, avec avantage, à l'une des formules suivantes.

Mêlcz. — Chaque cuillerée à soupe contient 30 centigrammes de trioual et 1 gramme d'eau de laurier-corise.

LAVEMENT

Solution huileuse de trional à	
8 0/0	10 grammes.
Jaune d'œuf	n° 1
Lait	125 grammes.
ur un adulte.	

SUPPOSITOIRE

Trional	10 centigr.
Beurre de cacao	4 grammes.
l'our un adulte.	
Trional	5 centigr.
Beurre de cacao	2 grammes.
Pour un enfant.	

Po

Le trional n'est pas seulement soluble dans les huiles végétales, il l'est aussi dans la paraldélyde; l'association de ces deux médicaments constitue un nouvel hypnotique quatre à cinq fois plus actif que le trional, et qui peut être employé assez longtemps sans crainte d'accoutumance ni d'accumulation.

Les formules suivantes penvent être recommandées.

POTION

Solution huileuse normale de trional et de paraldéhyde.... 45 grammes. Mucilage de Carragaheen..... 90 —

Mélez. — Chaque cuillerée à bouche contient 30 centigrammes de trional et 60 centigrammes de paraldéhyde pure.

(La solution normale est ainsi préparée par M. Ropiteau ;

Huile d'amandes douces...... 15 — Mélanger trional et paraldéhyde dans un flacon fermé.

Mélanger trional et paraldéhyde dans un flacon fermé, agiter, puis ajouter l'huile et achever la dissolution au bainmarie à 60 degrés.)

LAVEMENT

Solution normale de trional et de paraldéliyde Jaune d'œuf	nº 1
Lait	125 grammes.
Pour un adulte.	
Trional	. 20 centigr.
Paraldélivde	. 10 —
Beurre de eacao	. 4 grammes.

Pour un enfant.

Pour un adulte.

CAPSULES GÉLATINEUSES

Sérothérapie.

La sérothérupie dans la diphtérie. (Broeckaert, Belgique Méd., 26 juillet 1990.) — Cet intéressant article se prétant mal à l'analyse à cause des nombreux tableaux de statistique, nous nous bornerons à sigualer les conclusions de l'auteur.

1º Avant l'époque de la sérothérapie, la mortalité diphtéritique moyenne en Belgique était de 37 pour 190,000 habitants; elle n'est plus que de 19 grâce à l'emploi du sérum.

Cette diminution de la mortalité s'observe, à peu près dans les mêmes proportions, dans toutes les villes du monde où l'on fait usage du sérum.

2º Si l'on considère tous les eas de diphtèries bactèriologiques, la mortalité est abaissée à 16 0/0.

Pour les cas de croup, la mortalité qui était jadis de 67 0/0 n'est plus que de 23 0/0.

- Le pourcentage moyen de la mortalité pour les cas de croup trachéotomisés était jadis de 73 0/0; il n'est plus aujourd'hui que de 42 0/0.
- 3º La mortalité est beaucoup plus basse dans les cas injectés de bonne heure; l'extension des membranes pharyugées vers le larynx, se produit très raromont dans ces cas. 4º Lo sérum n'a guère d'influence sur les paralysies
- diphtériques que quand l'injection est faite dans les deux premiers jours.
- $5^{\rm o}$ Les accidents dus au sérum anti-diplitérique ne sont pas mortels.
- 6º La valeur de l'injection préventive de sérum paraît réelle mais la durée de l'immunité est très courte.
- 7º Les principales causes d'échec de la sérothérapie antidiphtérique sont :
 - a) L'intervention en cas de pseudo-diplatéries :
 - b) L'intervention en cas de diphtéries associées graves;
 - c) L'insuffisance des doses;
 - d) L'intervention trop tardive;
 - e) L'altération ou la mauvaise qualité du sérum.

Médecine générale.

Action physiologique de la phémacétine. — H. C. Wood étudie ce sujet qu'il trouve trop peu connu (University Medical Magazine, juillet 1969). Les expériences cliniques faites sur la phémacétine sont nombrenses; il u'en est pas de même de celles qui portent sur son action physiologique. Hinsberg et Kost out trouvé que 20 centigrammes de phémacétine par kilogramme d'animal ne montraient aucune action sur des chiens. Si for angumente la dose, il se produit, d'après ces auteurs, de la dyspnée, des vomissements, des altérations du sang (métahémoglobine). On a trouvé que la phémacétine basissait la température des févreux, saus posséder d'action

sur la circulation. Mahuert a obtenu des symptômes d'intoxication chez un lapin en lui injectant I grammo de substance par kilogramme de poids de l'animal. Le lapin meurt par paralysie de la respiration si on lui en donne 3 grammes par kilogramme de sou poids. L'étude la plus complète faite sur la phénacétine est celle de Ledoux : malheurensement, cet auteur a employé dans ses expérionces une solution de phénacétine contenant presque 10 grammes d'alcool pour 1 gramme de substance activo, et il s'ensuit que quelques-uns des resultats qu'il obtint, principalement ceux qui concernent la circulation, sont peut-être faussés par la présence de cet aloool. Suivant Müller eufin, la phénacétine est décomposée dans l'organisme et perd son radical acétyl; elle est éliminée sons forme de phénétidine. Les auteurs attirent à ce propos l'attention sur ce fait qu'une solution de phénacétine subit à l'air libre une décomposition si on la taisse ainsi plusieurs semaines, et on peut y déceler de la phénétidine. Les quelques expériences qui ont été faites avec une solution de phénacétine ainsi décomposée out montré qu'elle n'était pas plus toxique que les solutions fraiches. L'une des grandes difficultés dans l'étudo do la phénacétine, c'est sa faible solubilité dans l'eau : 1/200°, L'auteur a constaté cependant qu'une grenouille placée dans l'eau saturée de phénacétine absorbait assez de substance pour présenter des symptômes d'in-

Les premièrs de ces symptômes consistaient en une purésisuivie bientôt de l'abolition complète des mouvements. Il semble une fois ou deux que cette plasse de dépression était précédée d'une très courte plasse d'excitation. La faiblesse musculaire alfait graduellement jusqu'à la paralysie complète, puis était suivie de mort au bont de quatre leures d'immersion de la granonille.

toxication mortels.

Pour étudier les effets de la phénacétine sur la circulation, l'auteur a employé un mélange dans lequel le remêde était en suspension dans une solution saline à 7 0/0. U injectait ce liquide dans la veine juzulaire d'un chien. Les petites doses n'avaient aucun effet; il fallait arriver

à 0sr,50 par kilogramme d'animal pour arriver à causer la mort par paralysie de la respiration. Il n'y avait cependant aucune altération visible ni dans l'état du pouls, ni dans l'état de la pression sanguine. L'anteur conclut ses expériences par les propositions suivantes :

- 1º La phénacétine à faible dose est sans action sur l'organisme:
- 2º De fortes doses du médicament diminuent les réflexes par une action directe sur la moelle épinière :
- 3º 50 centigrammes de phénacétine par kilogramme d'animal aménent la mort par paralysie de la respiration;
- 4º Des doses dépassant 50 centigrammes par kilogramme d'animal sont sans aucune action sur la circulation.

Maladies des voies respiratoires.

Le formiate de soude dans le traitement de la pucumonie. (Sem. méd., nov. 1900.) - Un médecin militaire russe, M. le docteur A. Polénov, a en l'occasion de soigner 13 soldats atteints de pneumonie fibrineuse par l'usage interne du formiate de soude. Ce médicament est administré d'après la formule suivante :

Feuilles d'adonis vernalis... 2 grammes. Faites infuser dans : Eau bouillante.... 180 Passez et ajoutez : Formiate de soude...... 2 à 1

F. S. A. - A prendre par cuillerées à bouche toutes les deux heures, jour et nuit.

Dans les observations de notre confrère, cette médication eut pour effet de modèrer la fièvre et d'abrèger la durée de la maladie. Ce résultat thérapeutique sut particulièrement manifeste chez les patients qui prirent des le début de leur affection du formiate de soude en quantité assez élevée, par exemple ·l grammes en vingt-quatre heures, dose qui fut toujours bien tolérée.

De la guniacolisation intensive dans la tuberculose palmonaire. — Si jusqu'à présent le traitement de la phisic par le guaincol et la créosote ne paraît pas avoir donné de très bous résultats, il faudrait, d'après MM. Weil et Dinuantherzer, s'en prendre à l'insuffisance des doses employées.

Ils conseillent de faire tous les jours une injection hypodermique de 1 centimètre cube d'une solution de 10 grammes de gualacol cristallisé, dans 10 grammes d'huile d'amandes douces stérilisée, solution additionnée de 20 centigrammes de chlorivârate de cocaine.

lls font donner au malade en mêmo temps tous les jours un lavement de lait tiède additionné de 50 gonttes de la même solution.

A cette médication ils ajoutent l'administration journalière de 6 à 8 pilules contenant chacune I centigramme de guaïacol, 2 centigrammes de terpine et 3 centigrammes d'acide bonzolque.

Ils fout faire, en outre, tous les soirs des badigeonnages sur la poitrine avec la solution employée pour les injections. MM. Weil et Diamantberger attachent une grande importance à la qualité du gualacol employé. Le gualacol liquide du commerce ne mérite d'après eux ancune confiance, et ils recommandent de n'avoir recours qu'au gualacol cristallisé.

Avec cette précaution on n'a à craindre aucun accident d'intoxication et l'on peut sans danger administrer les doses nécessaires pour faire une médication sérieuse. (Bull. méd. du 1º sept. 1900.)

Traitement du coryza et des bronchites chez les tuberculeux (Journ. des Praticiens). — Les bronchites chez les tuberculeux ont une très grande tendanco à la chronicité; aussi il convient de les traiter activement. Voici la façon de faire préconisée par Kuopf. Le plitisique des ventouses séches sur la poitrine et dans le dos; on lui fait prendre des limonades chaudes, du sulfate de quinine. L'application de compresses échauffantes est indiquée dans les bronchites aigués, mais il faut prendre soin de frictionner le norma à l'alcool ou à l'eau fraiche après l'enlèvement de la compresse jusqu'à ee que la peau devienne séche. Dans le coryza, l'application locale de cecaine (1 gramme dans 25 grammes d'eau distillée) avec un pinceau procure souvent du soulagement. On peut se servir aussi, après que la période aigné est passèe, de la pouder suirante que l'on fait priser :

Poudre de tale		
Lactose	àà	40 centigrammes

Les aspirations de vapeur d'iode et d'ammoniaque ou de menthol font aussi du bien. La broneho-pneumonie nécessite le repos absolu au lit. On appliquera des révulsifs, et on donnera des expectorants tels que le kermès, l'acétate d'ammoniaque. Contre les quintes de toux et la douleur, on pourva donner par cuillerées à soupe toutes les heures la potion suivante:

Eau de fleur d'oranger	100 g	rammes
Sirop de chloral	à à 30	_
Eau de laurier-cerise	10	_

Maladies du système nerveux.

Le brombydrate d'hyssecine contre les accidents consécutifs à la cecanitastieu de la moetle. (Sem. méd., nov. 1900.) — Après la cocainisation de la moetle, qu'il a pratiquée chez une trentaine de parturientes, M. le docteur S. Marx (de Now-York), sans avoir jamais en à euregistrer d'accidents graves ni durables, à cependant presque toujours noté l'existence de phénomènes plus ou moins pénibles, tels que nausées, vomissements, céphalalgie intense, etc. Afin d'éviter ces inconvénionts, notre confrère a essayé d'associer la cocaine à la morphine, mais les résultats out été peu encourageants; dans un cas, l'injection de 0 gr. 01 centigr. de chlorhydrate de morphine dans le canal rachidien, a même donné lieu à des symptômes très graves d'intoxication. Par contre, M. Marx a pu constater que le bromhydrate d'hyoscine, introduit sous la peau à la dose de 9 gr. 0003 décinilligr. en mêmo temps qu'on procéde à la cocainisation de la moello ou bieu dés que le sujet commence à accusor des nausées ou des vomissements, empédeh l'apparition des accidents lubituels ou, tont au moins, les attènue d'une manière considerable.

Liniment au chloval contre la sciatique et le lumbago. (Sem. méd., nov. 1900). — M. le docteur A. Lafond-Gredley (de Villefranche-de-Longehapt) a guéri une diznine de cas de sciatique ou de lumbago par des frictions énergiques des régions doulouveuses avec un mélange à parties égal d'hydrate de chloval et d'huld fine.

Ces frictious, qu'on fait matin et soir pendant dix minutes environ, provoquent de la rougour de la peau et une cuisson assoz forte mais pussagére; elles calment les douleurs saus jamais produire de vésication, et aménent la guérison de la sciatique et du lumbago plus rapidement que les pointes de feu ou le stypage.

Le chloral n'étant pas soluble dans l'huile, il importe de ne le mélanger à co liquide qu'après l'avoir fait dissoudre dans une quantité minime d'eau.

On peut, d'après M. le docteur E. Masse, professeur à la Faculté de médecine de Bordeaux, rendre le liniment encore plus bomogène en dissolvant le chloral dans de l'eau de chaux; à cet effet, on prescrit comme véhicule le liniment oléo-calcaire, dout 60 grammes sont susceptibles de dissondre 30 grammes de chloral.

Le phosphate de soude dans le traitement de la neurastérie (Presse médicale). — Partant de cette idée que la neurasthénie est due à une déperdition, par le système nerveux, d'acide phosphorique absolument indispensable à son bon fonctionnement, — et l'on sait que la phosphaturie est fréqueute chez les neurasthéniques, — M. Lemoine (de Lille) a recours voloutiers à une méthode ayant pour but de parer à la dépense des phosphates.

Il fait faire tous les deux jours une injection sous-cutanée de 2 à 5 grammes de la solution :

Cette dose de phosphate, quoique trés faible, agit quelquefois avec rapidité; elle peut amener la guérisou, et même dépasser le but. Certains neumsthéniques sortent, sous l'influence de cette médication, d'un état de dépression profonde, pour eutrer dans une excitation si marquée que l'on est obligé de diminuer ou de suspendre les iniections.

On peut remplacer la voie hypodermique par la voie rectale, et, dans ce cas, on formule de petits lavements, à conserver, contenant I gramme de phosphate. Il ne faut jamais employer la voie buccale.

A la médication phosphatée, on peut ajouter l'hydrothérapie tiéde à 35 degrés, sous forme de douches sans pression et de lotions faites le matin et suivies de frictions excitantes et d'un ropos au lit. Comme médicament tonique, on present le valorianate de quinine à la dose tonique, c'est-à-dire 20 à 25 centigrammes.

S'il y a lieu, on ordonne encore un traitement symptomatique contre l'estomac qui ne fonctionne pas bien, contre la peau qui ne sue pas, con're les palpitations cardiaques qui sont justiciables des bronures à faible dosc.

L'opium dans le traitement du delirium tremens (Presse médicale). — Sous prétexte de guérir rapidement le delirium tremens, de le - juguler -, on a utilisé tous les moyens thérapeutiques, depuis les sels inorganiques jusqu'aux alcaloides les plus toxiques, en passant par les sels d'or, l'électricité et l'hydrothèrupie. Un des plus employés de ces médicaments, l'hydrate de chloral, devrait être définitivement proserit de la thérapeutique du delirium; il peut mettre en grand danger la tonicité cardiaque d'un malade dont le cœur est déjà locus minoris resistentire.

C'est seulement dans les cas graves, quand l'agitation violente, continue et prolongée, mence directement la vie du sujet, qu'il sera permis de chercher à provoquer le sommeil. Le seul médicament vraiment utile dans ces cas est, d'après M. Villers (de Bruxelles), l'extrait d'opium, preserit à laute dose, sous forme de potion, de la manière suivante :

A prendre en un jour.

Il va sans dire que la quantité de médicament actif devra être diminuée aussitôt que se manifesteront quolques signes de sammeil

Maladies de la peau.

Cure rapide des ampoules du pied (Ward. Sem. méd., nº 39). — D'après M. le D' H. Ward (de Londres), le meilleur traitement des grosses phlytetenes produites par la marche con, siste à exciser complétement aux ciseaux les tissus épidermiques soulovés par l'épanchement séreux, à assécher ensuite soigneusement la surface dénudée et à y appliquer plusieurs couches de collodion salicylé. On recouvre avec une rondelle de toile dépassant les bords de la perte de substance et l'ixée au moyen de quelques nouvelles couches de collodion salicylé,

A-ton affaire à des vésicules étendues, il est nécessaire de renouveler ce pansement dès qu'il commence à se détacher, ce qui se produit au bout de deux à trois jours. Le contact de l'éthor avec la plaie provoque une légère sensation douloureuse, passagère d'ailleurs, mais lo panscment une fois en place, le patient peut continuer à marehor sans éprouver de gêne ni do douleur. Lorsqu'on se trouve on présence d'une ampoule fortement irritée ot hémorragique, il est bon, avant d'instituer le traitement ei-dessus décrit, de calmer les phénomènes inflammatoires à l'aide de simples lotions autiseptiques continuées pendant un ou deux jourtiques continuées pendant un ou deux jour-

Traitement de la trombidiose (Presse médicale). — La trombidiose est tout simplement l'ensemble des lésions cutanées provoquées par la pénétration dans la peau d'un acarus proche voisin des sarcoptes de la gale, le rouget, que tout chasseur, tout botaniste, tout amateur de promenades automnales connaissent bien.

L'ensemble des symptômes, douleurs, démangeaisons, perte do sommeil aspect de la peau recouverte de vésicules isolées ou réunies, de plaques rouges confluentes ou espacées strices des ongles du patient qui, se grattant jusqu'au sang, en exagère encere ainsi l'inflammation, voire même un mouvement fébrile quelquefois très marqué, tout en un mot pour les malades, ignorant le sillon distinctif, leur fait supposer qu'ils sout atteints de la gale.

M. lo D' Labesse (d'Angers) a essayé centre la trombidiose tous les traitements indiqués dans les divers ouvrages : cau de Cologue, aleool eamphré, teinture de pyréthre, huile, vaseline, benzine, essence de térébenthine, etc. Tous ces moyens sont loin d'avoir la même efficacité, et l'emploi de la benzine est le seul qui mérite vraiment d'être retonu. Cependant, il est nécessaire, pour se débarrasser complétement des parasites, de fairo deux ou trois applications successives de benzine, et de plus, la facile et prompté évaporation du liquide lui enfève une partie de son efficacité.

M. Labesse a donc substitué à la benzine seule le liniment suivant qui, en une seule séance, suffit à faire disparaître de suite toutes les larves et à guérir instantanément les *trombi*dioses qui paraissent, de par leur étendue, devoir être le plus opiniâtres:

Liniment.

Naphtaline	
Benzine	60
Huile de vaseline	30 —
Essence d'andronogon citratus	9

F. s. a.

Co liniment offre plusieurs avantages auxquels, d'ailleurs, il doit son action certaine et immédiate : 1º l'addition de la vaseline retarde l'évaporation de la benzine; 2º sa consistance légèrement huileuse en facilite l'application d'une couche égale; 3º après évaporation de la benzine, il reste sur l'épideme une très légère couche de vaseline naphtalinée et partant insecticide; 4º l'essence d'andropogon citratus, en dehors de ses propriétés antiseptiques, attene et fait même presque disparatire la désagréable odeur de la benzine.

La seule précaution à prendre est d'éviter de faire l'application du médicament près d'une lumière ou d'un foyer, en raison de la facile inflammabilité de la benzine.

Chirurgie générale.

Prophylaxie des accidents de la narcose chloroformique. (Pres. méd., nov. 1900.) — Pour prévenir les accidents de la narcose chloroformique, M. Feilchenfield (de Berlin) emploie avec suecés la teinture de strophantus, dont il donne v à vi gouttes la veille de l'opération et autant le lendemain matin, peu de temps avant l'opération.

D'après M. Feilchenfeld, ce serait un calmant de premier ordre qui rendrait des services chez les individus bien portants, chez lesquels, dans l'attente d'une action inaccoutumée (examen, discours en public, apparition sur la scene, etc.), se produit un état d'excitation accompagné d'angoisse précordiale et de palpitations.

Plaie nénétrante du crâne par balle de revolver : trépanation ; extraction de la balle logée dans le cerveau ; guérison, - M. Morestin enveie une observation qui a trait à un hemme de trente-huit ans. Ce dernier s'était tiré treis ceups de revelver dans la tempe dreite. Lersque M. Merestin vit le blessé, quelques heures après, celui-ci ne présentait pas le meindre symptôme qui pût faire supposer que les prejectiles avaient pénétré dans le cerveau; au niveau de la région temperale dreite, en constatait l'existence de treis orifices dent l'expleration prudente fit supposer qu'une partie au meins des projectiles étaient restés en dehers de la beîte crànienne. Peur faciliter cette expleration. M. Merestin fit une large incision curviligue à concavité antéro-inférieure. Le lambeau, rabattu par en bas, lui permit de découvrir un premier prejectile situé presque seus la peau et un deuxième enchassé dans l'os temperal. Ces balles extraites. M. Morestin agrandit par la trépanation l'erifice esseux peur pouveir enlever teutes les esquilles preduites par la pénétration du projectile et qui déprimaient la dure-mère. Cette membrane se montra intacte, mais sa celoration neiratre dénetant un épanchement sauguin, sous dure-mérien, M. Merestin agrandit encere la brèche osseuse en avant, dans la direction du treisième erifice de pénétration. La dure-mère incisée à ce niveau. denna issue à que beuillie faite de caillets et de matière cérébrale, et l'intreduction du doigt permit de sentir vers la base du crâne, dans le lobe sphéneïdal, une balle qui fut ensuite aisément extraite à l'aide d'une piuce. Nettevage de la plaie. tampennement à la gaze aseptique; guérisen sans incidents. Le malade, présenté un mois après l'opération, est resté parfaitement guéri depuis.

Appeadelte à répétition topération à froid ; ver intestinal vivant (trichocéphale mâte) dans l'appendice. — M. Gui-nard présente une femme âgée de 35 ans qui a cu plu-sicurs crises d'appendicite dans le cours de ces dernières années et opérée récomment à froid. L'appendice, très long,

terminé en massue, renfermait un ver vivant, enroulé sur lui-même, et ayant environ 2 cent. 1/2 de longueur. Ce ver a été examiné par M. Blanchard, qui a déclaré qu'il s'agissait d'un trichocéphale mâle, parasite qu'on rencentre habituellement dans le cœcum; cependant, c'est la première fois, je crois, en exceptant une observation de Malpighy ayant trait à une autopsie, que la présence de ce ver a été signalée dans l'appendice.

Fracture du calcauciampar arrachement; suture, guérison.

M. Polherad présente un homme qui, dans un saut violent,
se fit une fracture du calcanéum par arrachement; en se relevant, il s'apervut que sa jambe était impotente; il ne ressentit
du reste pas la moindre douleur. Quant l'auteur vit
le blessé, il n'eut pas de peine à faire le diagnostic exact;
il existait d'ailleurs une plaie transversale nette du talon
causée par le bord tranchant du fragment postérieur remonté
sous l'action du tendon d'Achille. On fit l'ouverture du foyer
de la fracture, on ramena assez facilementa contact les deux
fragments qui étaient complétement séparés et fortement
écartés; on les sutura à l'aide de deux fils d'argent, et on
termina en plaçant le membre dans un appareil plâtré, le
pied étant en extension forcés sur la jambe. La guérison est
actuellement compléte.

Laxation ancienne de l'épauler réduction sanglauter biessures de l'artère auxiliaire suivie de suturer guérison.
M. Rieard présente un homme opéré, il y a quinze jours, pour une luxation ancienne, sons-soracoidienne de l'épaule. Il pratiqua la réduction, après résection de la capsule nouvelle qui s'était formée autour de la tête lumérale. Au cours de cette intervention, il blessa d'un coup de bistouri l'artère saillaire qui se trouvait enfouie dans l'épaisseur de la néo-capsule. La plaie artérielle, qui était longitudinale et longue de plusieurs millimérires, fut ansaid suturée par quelques points au catçut. La guérison s'est faite compléte, sans qu'à

aucun moment on ait remarqué de changements dans les caractères du pouls du côté lésé.

Nouveau procédé de confection d'appareils inamovibles en celluloide, (Semaine médicale). - S'il est une substance, à la fois légère ot solide, dont l'emploi soit particulièrement indiqué pour l'immobilisation des membres, c'est assurément le celluloïde. Mais jusqu'à présent on ne l'a guére utilisée, en raison de la difficulté qu'on éprouve à l'assouplir sans lui faire perdre sa solidité. Le procédé préconisé par MM, les docteurs Landerer et Kirsch et qui consiste à se servir d'une solution de celluloide dans l'acétone, s'il permet d'obtenir d'excellents appareils inamovibles, n'est pas exempt d'inconvénients, puisque le celluloïde liquéfié dans l'acétone ne durcit qu'au bout de trois ou quatre heures et ne peut, par conséquent, êtro employé pour l'application immédiate d'un appareil sur le malade lui-même. Or, M, le docteur F. Hersing (de Mulhouse) a trouvé un moyen très simple de ramollir rapidement le celluloide, sans qu'il tarde cependant à reprendro sa rigidité. Il suffit, pour cela, de plonger los lamos de celluloïde dans de l'alcool à brûler chaud : au bout de deux à trois minutes elles deviennent assez souples pour pouvoir être enroulées autour d'un membre en s'adaptant parfaitement à ses formes. Un quart d'heure après, elles sont de nouveau aussi dures qu'avant d'avoir été traitées par l'alcool.

Depuis deux ans, notre confrère a eu maintes fois l'occasion d'utiliser cotto propriété du celluloïde, en confectionnant des appareils d'immobilisation de la manière que voici :

On commence par découper à l'aide de ciseaux, dans une feuille de celluloide ayant une épaisseur de 5 millimètres, une lame assez large pour dépasser de 3 à 4 centimètres la circonférence du membre atteint. N'agit-il d'imnobiliser, par exemple, toute une extrémité inférieure, articulation coxo-fémorale et bassin compris, il faut préparer une lame de 1 m. 20 centimètres de long et de 30 à 50 centimètres de large pour enveloppre le membre, et une autre à peu prés de

mêmes dimensions pour le bassin. On roule ces plaques ot on les plonge dans un vase contenant de l'alcool à brûler, qu'on fait clausifier au bain-marie. L'alcool ne tarde pas à entrer en ébullition, en même temps que les fœuilles de collutoide deviennent molles et flexibles. Il import de ne pas les lais-ser trop longtomps dans le liquide, sans quoi en risquerait de les voir se dissoudre. Entre temps, on a cu soin d'envelopper le membre dans du coton; il ne resto plus alors qu'à appliquer, par-dessus, la plaque de celluloide préalablement dévoulée et à la fixer a unoyen d'une bande, en évitant la formation de plis au niveau des articulations. Si l'appareil confectionné de la sorte ne parait pas assez solide, on peut lo enforcer en ajoutant une seconde lame du même goure; cette pratique est préférable à l'omploi de plaques épaisses de colluloide, qui se noulent moins bion sur lo membre,

Pour enlever le bandago, il suffit, après avoir déroulé la bande, de recourber los bords de la gouttière, d'écarter le coton à l'aide des doigts et de soulever lo membre. L'appareil est telloment élastique qu'il reste intact après ces manipulations et veut, au bosoin. ette aisément remis en place.

Il va de soi que le celluloïde se laisse également omployer sous forme de bandes, mais cette manière de faire ne permet pas de retirer et de replacer l'appareil aussi facilement quo dans le cas où l'on a appliqué une simple goutière.

Maladies du larynx, du nez et des oreilles.

Le cyanate de mercure dans le traitement de la rhisite fibriueuse (Presse médicale).—Il oxiste un grand nombre de traitements de la rhinite fibrinouse. Ordinairement, après cocalinisation de la pituitaire, on tamponno les fosses nasales avee de la gaze iodoformée, ou bien on y fait des insufflations d'acide borique, de sozoiodate de soude, d'iodol, etc. Lo succès couvonne rarement eette thérapeutique et le plus souvent les fausses membranes se reproduisent sous le topique et bouelent les fosses nasales, ce qui, chez le nourrisson on particulier, n'est pas sans danger.

D'après M. Peltesohn, le cyanate de mercure posséderait la propriété de dissoudre les fausses membranes et d'en empécher la reproduction. Dans la rhinite fibrineuse il s'on sert de la facon suivante:

Un long et étroit tampon d'ouate est trempé dans une solution de cyanate de mercure à 1 pour 2,500 et introduit profondément dans une narine, où on le laisse pendant une heuve. Au bout de ce temps, on le retire et on place un autre tampon dans l'autre narine. Pendant le jour, on met par conséquent toutes les houres un tampon, tantôt dans l'une, tantôt dans l'autre narine. Pendant la nuit, une seule narine est tamponnée.

Sous l'influence de ce traitement, les membranes se dissolvent et au bout de quelque temps ne se reproduisent plus.

Traitement de l'oterrhée (Ann. des mal. de l'orcille. t. XXV, nº 42). - M. A. Lucae préconise, dans le traitement des otorrhées chroniques, l'emploi de la formalino à la dose de XV à XX gouttes par litre d'eau; il estime que les cas qui résistont à ce traitement sont justiciables de la curo radicale, ce sont des cas où l'on trouve de graves lésions osseuses, Kümmel (do Breslau) fait remarquer, à ce propos, avec juste raison, que ce n'est peut-être pas tant le médicament employé que le mode de donner l'injection qui assure la guérison de l'otorrhée : l'ajoute : l'emploi des seringues à bout rond qui lavent toutes les parties du pavillon excepté le conduit et l'oreillo movenne est particulièrement néfaste parce qu'il donne l'illusion de soins appropriés et efficaces alors que le pus stagne et se putréfie au fond du conduit. Enfin, il faut savoir que, si le nez n'est plus toujours immédiatement en cause comme pour les otitos aigués, c'est encore lui qui, seul, donnera souvent la clef d'une otorrhée chroniquo : végétations adénoïdes, polypes, ozène, syphilis nasopharyngée, etc., etc.; l'examen et les soins du nez restent donc toujours le grand secret de nombre de succès de thérapeutique auriculaire; on ne saurait trop le redire.

FORMULAIRE

Solution contre le coryza chronique.

(MORELL-MACKENZIE,)

Bicarbonate de soude		
Biborate de soude	àà	057,40
Chlorate de soude		

Sucre blanc 1 gramme.

Eau tiède, un demi-verre environ, Faitos dissoudre. Cetto

solution étant chauffee à 37 degrés, on eu verse dans le creux de la main et on l'aspire fortement, de manière qu'elle traerse touto la cavité nassile, jusqu'au plaryux, d'où elle est ensuite crachée; on bien on l'injecte dans le nez avec une pette seringue de verre ou de caoutchoux.

Elixir laxatif au cascara.

(Desesquelle.)

Extrait hydroalcoolique de cas-		
cara sagrada	20	grammes.
Glycériue neutre	50	_
Alcoolature d'orange	200	

Un verre à liqueur à chaque repas, commo laxatif. On augmenterait la dose d'extrait dans la formulo, si l'on voulait obtenir un effet purgatif.

On peut obtenir aussi un élixir avec une macération do cascara dans du vin de Madère, additionnée d'alcool et de sirop de sucre.

L'Administrateur-Gérant: O. DOIN.



241

A l'Académie des sciences, M. Chauveau a exposé les résultats auxquels il est arrivé dans l'étude de la question ciaprès : la production du travail musculaire utilise-t-elle comme potentiel énergétique, l'alcool substitué à une partie de la ration alimentaire? Dans cette nouvelle étude, le but expressément visé était de savoir, nen si l'ingestien de l'alcool est d'une manière vague et générale de quelque profit, mais si le sujet qui travaille, ayant le sang saturé de cette substance, fait fonctionner ses muscles en puisant dans sa cembustion l'énergie nécessaire à ce fonctionnement. Il v a là une haute question d'hygiène et d'écouemie soudee à la solution d'un important problème de physielogie pesé. Or, des résultais obtenus il résulte que l'alcool ingéré dont l'organisme s'imprègne si rapidement, ne saurait participer que pour une bien faible part, s'il y participe, aux combustions où le système musculaire puise l'énergie nécessaire a son feuctionnement. Même quand il est saturé d'alcool, l'organisme ne parait pas plus ante à utiliser cette substance comme petentiel énergétique, tant pour l'execution de l'ensemble des travaux physiologiques de l'état de repos que pour l'exécution du travail des muscles pendant l'exercice. En résume, l'alcool n'est pas un alunent de force et sou introduction dans une ration de travail se présente avec toutes les apparences d'un controsens physiologique.

M. Ghanu a réalisé la transformation de la créatine rucréatinine par un ferment soluble déshydratant de l'orgunisme. Il a suffi de soumettre în citro de la créatine à l'action d'oxtrait aqueux de rein de cheval. Il semblevait donc quo la transformation en question a lieu daus le rein, vraisemblablement sous l'influence d'un ferment soluble déshydratant sécrété par cet organe.

A la Société de biologie, MM. Rober et GALVEILE, signalent les résultats des expériences qu'ils ont entreprisos sur le Poucoir immunisant de la matière nerveuse rabique conservée en glueérine. Ils sont arrivés à cette conclusion que les cerveaux vicilis en glycórine manifestent une propriété préventive mêmo lorsque, après un long séjour, ils ont totalement nerul eur virulence.

SOCIÉTÉ DE THÉRAPEUTIQUE

SÉANCE DU 13 FÉVRIER 1901

PRÉSIDENCE DE M. Albert Romy

Le procès-verbal de la dernière séance, lu ot mis aux voix, est adopté.

Candidature s.

Le Secrétaire général a reçu des lettres de candidature de MM. Moutier, A. Riehe, Chevalier, Isch-Wall et Georges Baudouin, qui so portent candidats aux places verantes daux la sec.on de médecine. En outre, M. Odilon Martin pose sa candidature à une place de correspondant national, et M. Perez Noguera, de Madrid, à une place de correspondant déranger.

Ces candidatures seront étudiées par une commission composée de MM. Josias, du Castel, Créquy et Hirtz, rapporteur. Cette commission déposera un rapport de classement dans la séance du 27 mars et l'élection aura lieu le 17 avril.

Communication.

Contribution à l'étude du pyramidon et de ses sels (1) Par M. L. Bertherand.

MM. Albert Rebin et G. Bardet ont communiqué à l'Acadounie de médecine et au Congrés de médecine (juillet et août 1900) un travail sur le pyramidon et sur l'importance de son action thiérapeutique; ils ent notamment mentré qu'en outre de son action analgesique, édié constatée dans l'emploi de ce médicament par divers ebservateurs, le pyramidon, contrairement à l'antipyrine dent il se rapproche pourtant beaucoup au point de vue chimique, jouit de la propriété inattendue d'augmenter les échanges et d'élevre considérablement le ceofficient azoturique. J'ai centinué ces recherches, dans le service de M. Albert Robin, à la Pitié, en les étendant à l'étude de deux nouveaux sels, les camphorates te le salicylate de pyramidon. C'est leur résultat qui fait le fond de la présente nete.

Il existe deux camphorates de pyramidon, le camphorate acide et le camphorate neutre; j'ai seulement essayé le sel acide, qui est aussi soluble que le pyramidon lui-méme, comme aussi d'ailleurs le salicylate, ces deux sels peuvent douc, comme la base, s'administrer en solution ou en cachets.

1º Action excitante du pyramidon sur la nutrition. — Aux details déjà fournis sur ce point par MM. Albert Robin et G. Bardet, je puis joindre quelques ebservations qui confirment cette action intéressante.

Un malade présentant des signes de rhumatisme, coîncidant avec une azeturie manifeste, fut d'abord mis à l'étude avant

⁽¹⁾ Un travail plus développé que cette note parattra incessamment.

l'administration du médicament. Les résultats de l'analyseindiquent un ceefficient acturique de 78,5 0/0 et une phosphatic extrémement faible (10 0/0). Après un traitement de huit jeurs, à raison de 0er,30 de pyramiden dans les vingtquatre heures, le ceefficient azoturique a menté de 10 0/0 et atteint 88 0/0, la nermale étant enviren 84 0/0. En même temps, la phosphatic passe à 12 0/0, et l'en voit l'urés monter de 4 grammes par jour. Le ceup de feuet denné à la nutrition n'est ass deuteux.

Du reste, neus treuvens la confirmation de ce fait chez un autre malade, un diabétique, qui après un traitement rationnel avait vu le sucre tomber à 2 eu 3 grammes par jour: chez ce malade mis au pyramiden avec une dese de 0+30 de médicament, le sucre est remoné à 15 ou 30 grammes pendant plusieurs jours. La suppression du médicament a permis de raumene le sucre à l'état de traces.

Enfin, une analyse du chimisme respirateire chez un tuberculeux me permettait de censtater seus l'influence du pyramidos une augmentation manifeste des échanges organiques gazeux.

2º Action antipgritique. - Si le pyramiden exerce sur les fébricitants une action favorable en raison des propriétés excitantes sur les échanges que neus venons de confirmer, il n'en est pas meins vrai que, comme teus les autres aromatiques, il proveque, surtout chez les tuberculeux, des sueurs profuses qui fatiguent beaucoup le malade. Pour cette raisen, j'ai songé à utiliser les prepriétés bien cennues de l'acide camphorique en les combinant à celle du pyramidon et peur cela j'ai tait usage d'un médicament qui me paraissait indique en la circonstance, le bicamphorate de pyramidon. Les resultats expérimentaux ent confirme la théorie : sur 24 tuberculeux avec manifestations febriles, qui out abserbé le módicament, 18, soit les deux tiers des cas, ent vu la fièvre tomber sons l'influence de doses de 0gr,30 à 0gr,60 données en deux teis. Il suffisait, au cas où la fièvre paraissait devoir se rallumer. d'administrer ensuite de très petites deses du modicament. Nous retrouverons tout à l'heure cette action antipyrétique à propos du rhumatisme chronique.

3º Action analgésiante. — Je diviserai les douleurs en deux classes: A) douleurs d'origine névralgique, et B) douleurs d'origine rhumatismale.

A) Douleurs uêrralgiques. — Mes observations confirment de point en point celles qui ont déjà été mentionnées par les auteurs cités, aussi je me contenterai d'appeler l'attention sur des cas qui présentent un caractère de nouveauté intéressant.

Pai voulu comparer l'a-tion de l'autipyrine à celle du pyramiden eluz les migraineux. Cles quatre malades qui s'étaient uontrès rebelles à l'action de tous les médicamonts et notamment à celle de l'autipyrine, j'ai vu des doses de 0°,30 de pyramidon ammer la cessation des douleurs. Il est à noter que cetto action ne s'est généralement montrèe utile quo si le médicament était pris dès le début de l'accès, car une fois la migranie nistallée il se montrait impuissant.

l'ai également constaté, dans des névralgies variées, que des doses de pyramidon notablement inférieures à celles qu'il eut fallu administrer d'antipyrino, exerçaient une action malæssiante très appréciable.

Je citerai particulièrement un mode d'emploi que je n'ai pas encore vu indiquer, je veux parier de la méthode hypedermique. Chez quatre malades atteints de scintique, j'ai injecté sous la peau, dans la région douloureuse, 1 centimètre cube d'une solution à un dixience de pyramidon, soit til centigrammes de médicament. Malgrol à faiblesse de cotte iose, l'effet a été remarquable chez deux malades, qui ont vu los douleurs disparaitre rapidement; chez les deux autres, Peffet fut moins favorable.

B) Douteurs d'origine rhumalismale. — Pour les mêmes raisons que celles exposées à propos des tuberculeux, c'est-àdire l'àpparition des sueurs prefuses à la suite de l'administration du pyramiden rhez les fébricitants et aussi pour faire une médication théoriquement indiquée, j'ai employé le salicylate de pyramidon chez les rhumatisants.

Dans deux cas de rhumatisme aigu, je suis forcé de constator deux insaccès et il a fallu recourir au salicylate de soude. Je m'attendais, d'ailleurs, à ce résultat, les aromatiques du genre antipyrine étant inactifs contre cette maladie.

Dans lo rimmatisme subaigu et le rimmatisme chronique, affections si rebelles à la therapeutique, comme cinacma, frai vu l'action du pyramidon très irrégulière et très variable, il ne s'est donc pas, à ce point de vue, montré inférieur aux autres agents que nous possédons déjà, mais pourtant il a sur la plupart des arematiques l'avantage d'abaisser la température sans sucurs et à faible does, ce qui est à considères.

En terminant, je dirai que dans tous les nombreux cas sobservés, j'ai eu une seule fois l'occasion de noter de l'érythème, celui que je signale était à forme urticarienne. Je rôpôte que ce cas unique s'est présenté sur un nombre considérable de malades traités, j'ai même ru plusieurs sujots très sonsibles à l'antipyrine au point de vue de l'exanthème et clez lesquels le pyramidon n'a rien anené. Enfin, je signalerai ègalement que les affections cardiaques ne scraiont pas une contre-indicatien à l'emploi du pyramidon, car ce médicament n'a jamais prevoqué le moindre trouble de l'appareil circulatoire chez les malades que j'ai observés et que j'examinas soignessement à ce point de vue.

Discussion.

M. Duners. — Pai donné le pyramidon à un assez grand nombre de maldes, à la suite de la publication du travail de MM. Albert Robin et Bardet, et j'ai pu constater que ce médiament, incontestablement supérieur à l'antipyrine comme analgésique, agit à dose beaucoup moindre; mais il est à remarquer que cette action est plus tardive à se manifestery, seit généralement deux leures surés l'administration. Per contre, l'action est de plus longue durée, ce qui est un avantage sérieux. Je signalerai également un point qui a une réelle importance, o'est que les douleurs fulgurantes des ataxiques sont merveilleusement soulagées par le pyramidon, à des doscs très minimes, or on sait combien ces douleurs sont difficiles à supprimer, dans un nombre assex élové de cas fai pu obtenir les meilleurs effets avec le pyramidon.

M. Biarmiraxin. — L'observation do M. Dubois, relativement à l'action assez lente du pyramidon est exacte, et e'est pour cela que dans les essais j'ai constaté qu'il fallait administrer le médicament avant la manifestation des accès deuloureux, une fois ceux-ci reconnus. Je n'ai pas eu l'occasion de traiter des ataxiques, mais, étant donné l'action énergique du pyramidon et de sos sols sur le systéme nerveux sensible, notamment dans la névralgie du trijumenu et dans la sciatique, affections si tenaces et si intensos, je no suis pas étorné des bons résultats obtemus par M. Dubois.

M. Albert Roux. — L'action antinévralgique du pyramidon est aujourd'hui incontestable et ce médicament a certainement pris une place considérable dans la thérapeutique, mais, si jo prends la parole, c'est surtout pour insister sur un point de l'inferesante communication de M. Bertherand, sur l'action excitante de la base pyramidon et de ses sels sur la nutrition, car, ce point est, non seulement trés particulier dans la plarmacodynamique des médicaments aromatiques, mais, il se trouve venir à l'appui d'une question doctrinale extrêmement importante elle-môme.

Bardet et moi avons montré, l'an dernier, que malgré son voisinage très proche de l'antipyrine, le pyramidon possède sur la nutrition uno action excitante, tandis que le premièr, au contraire, retarde considérablement les échanges. Les essais nouveaux do M. Berthovand viennent confirmor ététendre nos premièrs résultats, car ils montrent bien que le pyramidon amène à la fois un relèvement du coefficient azoturique, une augmentation de la quantité de l'urée et symè-

triquement, chez le diabétique, une augmentation du sucre.

Or, co fait déjà intéressant pour la pharmacologie du pyramidon, le devieut bien plus pour ce qui concerne la pathogénie du diabète. On sait, en effet, que M. Bouchard et ses élèves font du diabète une maladio par ralentissement de la nutrition, tandis que d'antres, parmi lesquels je me range, veulent voir dans le diabéte glycosnrique, le résultat d'une excitation très vive de la fonction de nutrition. J'avais déjà trouvé une démonstration expérimentale de cette théorie dans le fait que l'antipyrine, agent modérateur des échanges, dimique rapidement la production du sucre chez les malades et l'ai même basé sur cette action, le traitement du diabète que ie préconiso depuis quelques années. Mais, il me manquait la contre-épreuve pour appayer encore mieux la théorie du diabète par excitation de la nutrition. Or, instement le pyramidon vient me permettre de fixer la question de la manière la ulus formelle.

En effet, voici un médicament capable, l'expérionce le prouve, d'augmenter de 10 9/8 la valeur du coefficient acetarique, de faire monter, de même quantité, le poids de l'urée, d'augmenter, également, les échanges repiratoires et cette substance fait immédiatement monter l'exerction du sucre, il le fait reparaître chez des malades dont l'urine n'en renfermait plus que des traces. C'est la un fait qui me parait absolument catégorique pour monter l'exactitude de la théorie de Claude Bernard pour expliquer la glycosurie, celle-ci est bier ertainement provoquée par une exacération notable des phénomènes de nutrition, puisque les modérateurs de cette fonction diminuent el suppriment le sucre, tandis que les excitateurs te font augmenter systématiquement.

Naturellement, ectte constatation fait du diabète et de l'azoturie, une contre-indication absolue de l'emploi du pyramidon, et, par contre, la propriété qu'il a d'activer les échanges, er ont, tout an contraire, un excellent antipyrétique puisqu'ou n'a noint à raindre, dans son administration, les effets secondaires dus à la suppression des phénomènes d'oxydation, qui sont si utiles dans la lutte de l'organisme contre la fiévre.

II. — Essai sur le traitement de la tuberculose pulmonaire chez les enfants par le sérum musculaire, suivant le procédé de MH. Charles Richet et Héricourt.

Par MM. les docteurs Albert Josias, médecin à l'hôpital Trousseau, et Jean-Ch. Roux, ancien interne des hôpitaux.

Nous apportous ici un compte rendu sommaire de notre cesai sur le traitement de la tuberculose pulmonaire par lo sérum musculaire. Ces recherches ont été faites sur des cufants, à l'hópital Trousseau, dans le service de l'un de nous; elles ont porté sur un petit monbre de sujets évidemment, mais elles ont été continuées assez longtemps pour que l'on puisse avoir quelquei déde de la valeur de ce traitement.

Dans le traitement de nos malades, nous avons suivi les conseils donnés par MM. Charles Richet et Héricourt, dans leurs prennières communications à la Société de biologie, les 2 et 8 juin 1900. — S'appuyant sur de très nombreuses expèriences (23% chions) poursuivies dopuis cinq ans, ces auteurs avaient établi la valeur de la viande crue dans le traitement de la tuberculose. Ils inoculaient à leurs animaux dans la veine saphéne tibiale 1/2 centimétre cube d'une émulsion de culture tuberculeuse vicille de deux mois ; tous les chiens livrés à eux-mêmes succombaient dans l'espace de quatre à cinq semaines; les chiens nourris avec de la viando crue avaient une survio des plus notables, et quelques-uns guérissaient complétement.

Un fait trus intéressant, c'est que le suc obtenu en soumettant la viande à une forto pression (autrement dit sérum musculaire), jouissait des mêmes propriétés que la viande crue; et, dans une communication toute récente, M. Richet pouvait dire que lo sérum musculaire, à la dose de 20 centimètres rous CXXXX.75 LVR. cubes par kilogramme d'animal, guérit les chiens de la tuberculose inoculée.

La meilleure façon de procéder pour obtenir ce suc de viande avec une presse de ménage, est de faire d'abord macérer la viande dans un peu d'eau (environ 1/4 de son poids), puis de mettre le tout, eau et viande, dans une presse de ménage, et comprimer aussi fortement que possible; on obtient ainsi environ 15 à 20 centimètres cubes de suc par 100 grammes de viande, légérement dilué par l'eau que l'on a aioutée.

Le sérum musculaire ainsi obtenu est un liquide rougeaire, sans grande saveur, excessivement altérable: en quelques heures il se putréfie. Aussi, doit-on le préparer au moment même où l'on veut s'eu servir; en été, si l'on doit attendre une heure ou deux, avant de le donner au malade, il faut absolument le conserver dans la clace.

Les enfants que nous avons soignés ont tous pris facilement ce sérum musculaire sans qu'il aitété nécessaire d'en masquer le goût. La dose minimum de viande crue, pour obtenir un résultat, est, d'après MM. Richet et Héricourt, de 15 grammes de viande par kilogramme de malade. Nos malades pesant en moyenne de 20 à 25 kilogs, nous leur avons donné le sue extrait de 500 grammes de viande crue de lecuf, dose qui dépasse notablement le minimum actif (1).

Les cufants choisis pour le traitement étaient tous manifestement tuberculeux; nous les avons pris aux diffèrents états de la tuberculose pulmonaire; le traitement consistait uniquement à faire prendre à l'enfant, chaque jour, le sérum musculaire obtenu par compression de 500 grannmes de beur cru; cet raitement a été continué longtemps, le plus long-

Nous n'avons pu metire en œuvre divers perfectionnements, signalés tout récemment par MM. Richet et Héricourt; ainsi, nous avons lissée nos enfants mangerde la vitande-euite; or, ces auteurs croient avoir remarqué qu'elle a une grande valeur nocive pour Panimal lubernelistx.

temps possible, jusqu'à sept mois de suite et si, chez quelques malades, nous l'avons interrompu plus tôt, c'est quo les parents nous les ont enlevés.

Ce traitoment a porté sur une malado au premier degré; Sur trois malades au deuxième degré;

Sur trois malades au treisième degré.

1

Notre première malade, II., Maria, est âgée de 10 ans; elle est entrée dans le service le 6 septembre 1900; il n'ya rien à relever dans les autéedents héréditaires et familiaux; les parents ne teussent pas, il y a deux autres enfants bien portants.

Notro petite malade a cu la rougeole à 3 ans ot la coquelucle à 3 ans 1/2; elle a toujours été assez délicate et elle toussait souvent l'hiver. Lorsqu'on nous l'amène à l'hôpital, ello se plaint de céphalée, de douleurs abdominales, elle a une diarrhée très abondante. Les parents font remonter le dôbut de ces accidents à une vingtaine de jours. L'enfant est tes amaigire, elle a une tompérature irregulière qui oscille ontro 38 et 39 degrés; le ventre est excavé, la diarrhée intense, 10 à 12 selles parjour; il existe des douleurs dans les membres inférieurs; la rate est légérement augmentée de volume et perceptible à la percussion. L'auscultation permet d'entendre des rales sibilants disséminés dans la poitrine; on note en plus au sommet droit, en avant et en arrière, de la submatité, uno augmentation des vibrations thoraciques et quelques craquements.

Pendant tout le cours du mois de septembre, ces signes persistentsans se modifier sensiblemont; la température bausse légèrement, mais la diarrhée continue et l'enfant s'afiaibli. Pendant le mois d'ectobre, la diarrhée tres abondante persiste, la fiérre qui avait à peu près disparu se rallume et la tompérature atteint jusqu'à 40 dogrés; l'enfant s'amaigrit et s'affaiblit de jeur en jeur. Le 7 novembre seulement, après l'échec des autres médications, on met l'enfant au suc de viande crue : l'offet est immédiat, la diarrhée s'arrête aussitôt pour ne plus reparaître et l'état général commence à se relever. En six jours, la température revient à la normale et ne s'élève plus, le poids qui était de 23°s, 400 le 7 novembre devient successivement de .

```
23<sup>kg</sup>,800 le 9 novembre.

24<sup>kg</sup>,100 le 12 —

24<sup>kg</sup>,600 le 15 —

25<sup>kg</sup> le 19 —

25<sup>kg</sup>,500 le 23 —

26<sup>kg</sup>,200 le 28 —
```

Somme toute, l'augmentation de poids a cté extinordinairement rapide; l'état général est excellent, l'examen du poumon no permet pas de constater encore de modifications notables; il y a toujours quelques craquements et quelques rales sousreépitants au sommet d'orit; la température est normale. Les jours suivants le poids continue à s'élever régulérement et attein 13#-250 le 8 décembre. Vers cette époque apparait pourtant à la partie médiane du tibia, du côté gauche, une tuméraction légère qui, au bout de quelques jours, devient fluctuante; sous l'influence de compresses humides et sans autre traitement, cette tuméfaction s'efface et la jambe reprend pen à peu son aspect normal; il s'agissait probablement d'une ostéonyélite tuberculeuse qui s'est arrêtée dans son dévélonsement.

M. Héricourt nous a, d'ailleurs, indiqué que, sur leurs animaux en expérience, on pouvait voir parfois, alors que la tuberculose pulmonaire disparaissant, quelques localisations articulaires ou osseuses du bacille tuberculeux, localisations toujours bénignes qui guérissent sans complication et qui indiment la diministion de vivulence du bacille.

Enfin, ces derniers jours, l'enfaut pesait 30 x,700, allait parfaitement bien; la périositie était en voie de régression; au sommet droit, on trouvait encore de la submatité et la respiration rude en avant et en arrière. Chez cette malade le résultat du traitement a été des plus remarquables; la disparition de la diarrhée, l'annélioration de l'état général, l'augmentation de poids, indiquent l'arrèt dans l'envahissement de l'organisme par la tuberculose.

Le sue de viande cruo a produit son effet immédiatement sur cette malade comme sur les chiens inoculés avec les cultures tuberculcuses; mais, chose importante, nous étions en présence de lésions peu avancées, bien qu'à marche rapide; et, ce sont probablement les conditions idéales pour que le traitement donne le maximum de résultat ou du moins les succès les plus appurents.

11

Il n'en va plus de même lorsqu'on s'adresse à des malades cliez lesquels la tuberculose évolue depuis longtemps d'une façon sourde. Voici un cas où les poumons étaient plus profondément atteints et présentaient de l'infiltration tuberculeuse avec début de ramollissement.

R., Jeanne, est âgée de 10ans 1/2; elle estentrée dans le sorvice le 27 mars 1900; le père de la fillette est mort d'une affection pulmonaire aigué; la mère est bien portante; il y a six enfants bien portants, deux autres enfants sont morts, un mort-né, l'autre d'une méningite à 1 an.

Notre malado a eu la rougeole à 2 ans; elle tousse depuis le mois d'octobre, elle a maigri, elle a des sueurs nocturnes légères. l'endant le mois de janvier elle a eu quatre hémoptysies, mais l'appétit est bien conservé. On trouve à l'examen, au poumon droit, en avant, de la submatité et des vibrations exagérées, une respiration souffiante, quelques craquements; en arrière, de la maité dans les fosses sus et sous-épineuses, des vibrations exagérées, au meine niveau, un souffe a lo voix est très retentissante, il y a de la bronchophonie; il existe aussi des craquement humides et quelques frottements pleuraux. Dans le reste du pounon droit et dans le poumon

gauche, rien à noter. Le ventre est souple, non doulourenx, le foie de dimension permale.

A sou entrée à l'hôpital, lo 25 mars, la malado a une flèvre légère, mais qui s'abaisso en quelques jours, sons l'influence du repos; son poids, qui était de 26 kilogrammes, après s'être élevé à 20%,500, retombe à 25 kilogrammes à la flu de mai.

Après avoir lait, pendant un mois, quelques injectious de caeodylate de soude, qui ne modifient pas l'état général et qui ne font pas augmenter le poids, on mel l'enfant au traitement avec le jus de viande crue et, pendant quatre mois : juillo acit, septembre et octobre, ou continue régulièrement ce traitement; le sérum museulaire ne fait pas disparaitre toute élévation de température; par moments, la flèvre apparaît et la température atteint, le soir, 38° à 38°,5 pendant une dizaine de jours; on troave deux poussées theruiques de ce genre durant quatre mois de traitement. Le poids varie pen, il baisse plutôt légérement : de 55 kilogrammes à 21°,100 au moment de la sortie. L'enfant est pourtant très amélierée, elle ne tousse plus, elle a un aspect de santé parfaite et les parents la retirent mateir nous (25 cotobre).

Nous revoyons la malade lo 7 févrior 1991. Chez elle, la petite malade n'a plus suivi son traitement avec la viaude crue; la tubereulose a repris sa marche envalussante. L'enfant tousse dans la journée et vouit quolquefois après soc quintes de toux. Son poids a diminué. Elle ne pèse plus que 22°±900. Elle n'a pas do fièvre la nuit, ni de sneurs Appetit diminué.

A l'ezamen, on ne constate pas d'adénopathie cervicale ni sus-elaviculaire. Il existe de la submatité dans la fosse susépineuse droite, partout ailleurs sonorité normale. Bruit de pot fété sous la elavicule droite.

A l'auscultation, en arrière et à droite, nombreux râles sous-crépitants, pas de souffle, pas de gargouillement.

En arrière et à gauche, respiration soufflante au sommet, pas de râles. En avant et à droite, sous la clavicule, respiration soufflanto non caverneuse; nombreux râles sous-crépitants humides, sonsation de gargouillement.

En avant et à ganche, respiration normale, pas de râles.

L'enfant rentre dans le service pour reprendre son traitement.

Voici l'histoire d'une seconde malade au douxième degré, que nous p'avous pu suivre aussi longtemps.

Albortine F..., âgée do six ans, entre dans le service, lo 28 jauvier 1901. Sa mère est manifestement tuberculeuse : elle présente au sommet droit de la submatité et des craquements.

A l'àgo de quatre ans et demi, la petite malade a en au cou une adénite tuberculeuse, qui a laissé une cicatrice caractéristique.

A l'ago de cinq ans, elle a la rougeole. Depuis cette époque, ollo s'enrhume facilement. Cet hiver, depuis décembre, la toux a été plus fréquente, surtout la muit, on même temps l'enfant s'amaigrissait.

Huit jours avant son entrée, la malade est prise de févre intense, revenant tous les soirs, et de sneurs nocturnes. Quatre jours avant son entrée, le 21 jauvier, dans la nuit, l'enfant so plaint d'envie de vonir et rend, en toussant, un demi-vero de saug pur très rouge par le noz et par la bonche; pendant la journée, elle rend encore quelques crachats striés de sang. Comme l'état no s'améliore pas les jours suivants, l'enfant est amenée à l'hoital.

An moment de son entrée à l'hôpital, l'enfant présente une température oscillant entre 38 et 39°.

On trouve à l'examen du poumon :

En avant :

A gauche, de la submatité, de nombreux râles ronflants, des râles sous-crépitants après la toux.

A droite, une respiration rude et quelques râles renflants. En arrière : A gauche, au sommet de la submatité, de gros râles muqueux et quelques riles sous-crépitants. A la base, une matité de quatro travers de doigt, de nombreux râles muqueux et sous-crépitants après la toux, de la bronchophonie, pas de pectoriloquie anhone.

L'enfant a perdu tout appétit.

On met aussitôt la petite malade au sérum musculaire, à la dose habituelle (500 grammes de viande crue par jour).

Elle le supporte très bien.

La température s'abaisse rapidement, et six jours après le début du traitement, la température atteint la normale et s'y maintient. Les signes de congestion du poumon droit et du sommet du poumon gauelle disparaissent; il ne persiste que la matité à la base gauelne en arrière.

Pendant les quinze premiers jours de son traitement, le poids ne se modifie pas sensiblement. Pourtant l'état général s'améliore et l'on continue d'administrer le suc de viande.

Sur une troisième malade, F..., le traitement fut à peine mis en œuvre, les parents ayant repris leur enfant trop tôt.

Cetto retite malade, entrée le 6 septembre, dans lo service, était une tuberculense avancée; rien dans ses antécédents héréditaires n'indiquait son état; mais, depuis trois ans, elle avait la fièvre la nuit et des sueurs profusos; elle n'a pas d'appétit et se plaint beaucoup de l'estomac : il est très difficile de l'alimenter, A l'auscultation, on trouve une infi!tration du poumon gauche avee des craquements ot des rûles souserépitants, surtout à la base; la fièvre est persistante, la température du soir varie entre 38°,5 et 39°,5, le pouls est très rapide (141). La petite malade ne fut mise au suc de viande crue que le 6 octobre; le 20 octobre, ses parents l'enlevérent. Dans ce court espace de temps, il est difficile d'apprécier la valeur de la médication; pourtant, nous avions bon espoir d'améliorer l'enfant; dans les dix premiers jours de traitement, le poids de l'enfant augmente de 800 grammes, mais lu fièvre ne s'était pas modifiée sensiblement.

De ces observations, nous pouvons conclure que, au douxième degré, lorsque la tuberculose est ouverte, lo sure de viande erue améliore notablement l'éstat général, mais la lièvre persiste et le traitement ne suffit pas à élever considérablement le poids.

111

Nous allons retrouver ees mêmos caractères chez les tuberculeux au treisième degré, mais beaucoup plus accentués.

Maria P..., Agéode dix ans, est entrée dans le service, le 28 juin 1990; ya mère est bien pertante, sen père est mort d'accident. L'enfant a cu la seartatine, il y a cinq mois et demi; depuis un an elle tousse, maigrit, a la fièvre; elle aurait craché plusieurs fois du sang et, à son entrée dans le service, elle a une hémoptysie. On trouve dans le pounon gauche, dans le tiers supériour, en avant et en arrière, de la matité; à ce niveau, la respiration est souffiante; il existe des râles sous-crépitants dans toute la hauteur du poumon. La température varie entre 37-5 et 38-

Des son entrée, le 28 juin, la malade reçoit, chaque jour, le sue extrait de 500 grammes de viande crue. Le l'e juillet, l'enfant pèse 21¹⁴,700; le traitement est continué sans interruption jusqu'à aujourd'lui. Le 23 novembre, l'enfant pèse 23⁸,100; le 20 décembre, elle pèse 28 kilogrammes.

Pendant ces six mois de traitement, l'état de l'enfant est resté à peu près stationnaire; l'état local n'a pas changér d' l'examen du pounon révèle exactement les mêmes fésions qu'au début; à ect égard, l'état de l'enfant ne s'est ni aggravé ni amélioré; l'état général n'a pas varié d'une façon appréciable.

La potito malade crachait souvent du sung avant d'entreu dans le service; or, depais six mois, cet accident ne «'est plus reproduit; le léger état fébrile (38°) a disparu petit à potit, au bout de deux mois de traitement, et la malade a repris une température normale; on note une ou deux fois une poussée fébrile, durant deux ou trois jours, et pendant laquelle le thermométre s'élève à 38-5; cet état se maintient jusqu'au 6 janvier 1991. A cette date, la malade a une légère hémoptysie, peu abondante, qui se répéte le lendemain matin, puis cesse définitivement. A la suite de cette hémoptysie, pendant une diraine de jours, la température s'élève progressivement jusqu'it 38-5, puis redessend à la normale; l'enfant garde, d'ailleurs, son poids de 23 kilogrammes. A l'auscultation, on trouve une modification dans l'examen du poumon; l'état focal s'est aggravé: il existe, au poumon gauche, en arrière, de haut en bas, surfout à la base, des râtes sous-crépitants lumides; vers le tiers moyen, en dehors, on trouve un souffie eavitaire et des râtes humides agglomérés (pseudo-gargouillement).

Voici encore l'observation d'un tuberculeux au troisième degré, soumis au même traitement.

L., Emile, âgé de 12 ans.

'Pas d'antécèdents hérèditaires. Il a cu la rougeole à 4 ans. Depuis deux mois, l'enfant s'affaiblit, maigrit, transpire la

nuit. U tousse, il est oppressé après le moindre effort. L'examen des poumons permet de constater les signes sui-

vants :

A droite :

En arrière, matité dans la moitié supérieure, respiration soufflante aux deux temps, râles sous-crépitants fins:

En avant, submatité sous la elavieule et râles sous crépitants fins:

A gauche :

En arrière, matité dans la fosse sous-épineuse, respiration soufflante, quelques craquements sees ;

En avant, submatité, respiration obscure.

Le poids est de 22kg,100. La température atteint le soir 38°,5.

L'enfant reçoit chaque jour la dose habituelle de suc de viande crue, 150 grammes. On supprime complètement la viande cuite. L'enfant supporte assez bien le sérum musculaire et le vomit deux ou trois fois, à la suite de quintes de tonx.

Il est soumis, depuis le 14 janvier, à ce traitement. Le poils s'est lègèrement relevé (22%,500). Mais l'état général est reste mauvais. La fievre persiste et s'est nieue élevée jusqu'à 3P-5, ces jours derniers. Depuis dix jours l'enfant a une diarrhée abondante et opinitire.

Enfin, nous avons employé le même traitement sur une pauvre petite tuberculeuse arrivée dans un état navrant.

A., Henriette, âgée de 6 ans, sans antécédents héréditaires ou familiaux, est tembée malade deux mois environ avant son entrée à l'hôpital; l'enfant tousse beaucoup, maigrit et a perdu tout appétit.

Dès son entrée, le 6 décembre, on trouve dans les deux poumous des râles sibiliants disséminés, et à la base gauche une submatité de trois travers de doigts, un souffle bronchotubaire et de nombreux râles sens-crépitants. La malade est très amaigrie et d'aspect cachectique. A partir du 12 décembre s'installe une diarrhée intense (jusqu'à 12 selies par jour) qui persiste malgré toutes les médications. Le 24 décembre on essaio de lui donner du suc de viaude crue; dés le leudemain. la diarrhée s'arrête et l'enfant n'a plus qu'une selle par jour, parfaitement normale. Les lésions pulmonaires persistent, et augmentent en étendue et en intensité. La température oscille autour de 38 degrés; le poids, après s'être maintenu pendant deux semaines, baisse en deux jours do 1000 grammes, et l'amélioration intestinale obtenue par l'emploi du jus de viande ne persiste d'ailleurs pas longtemps. Le 9 janvier, la diarrhée s'installe de nouveau et l'enfant, vomissant son jus de viande, on doit le supprimer le 11 janvier.

Si nous voulons résumer les résultats obtenus, nous voyons que le suc de viande crue semble constituer dans les stades de début de la tuberculose pulmonaire un remêde pent-être spécifique. Sur notro première malade où la lésion légère du poumon se compliquait pourtant d'une diarrhée tuberculeuse intennous avons vu tous les symptômes du mal rétrocéder, le poids augmenter, l'état général se relever dans des proportions telles qu'il n'est pas téméraire d'espèrer une guérison compléte.

Si les lésions sont pen avancées, an début de la période de ramollissement, on peut espèrer également une amélioration notable, mais les résultats sont moins satisfaisants. L'état général s'améliore, il est vrai, mais le poids ne s'dèree pas, et les signes locaux persistent à pen près saus modifications après un traitement de cinq à six mois.

Enfin, lorsquo le poumon est largement infiltré et ramolli, il ne faut pas trop escompter les bons effets du truitement: l'état des malades peut rester stationnaire, mais les lésions ne cossent d'évoluer plus ou moins rapidement.

Somme toute, tant que l'on a devant soi une lésion tonant seulement au bacille tubercelux, le traitement par le sèvant nusculaire peut améliorer notablement le malade et le guérir peut-étre; mais, lorsque la lésion tubercelusue estervahie par tous les microbes serondaires qui végetent dans les poumons en voie de ramollissement et dans les cavernes, to traitement par le suc de viande crue, et que non l'avons institué, n'a plus qu'une action thérapeutique très relative. Telles sont nos conclusions provisoires.

IV

Nous avons en l'idée d'essayer également l'action du sévant musculaire dans le traitement de la méningite tuberculeuse. Nous espérions arriver à temps pour prévenir l'invasion du mal, dans une maladie où les lésions apparentes sont au minimum, où il s'agissait surtout d'une intoxication relevant uniquement du bacille de Koch; malheureusement, dans les trois eas où nous avons pu expérimenter ce traitement, l'état était trop grave, lorsque nous l'avons mis en œuvre; c'est à peine si les malades ont survéeu deux ou trois jours; et, à l'autopsie, les lèsious étaient tellement nettes, qu'elles existaient déjà depuis une ou deux senaines. Lorsque la piemère est envahie par une infiltration diffuse, on conçoit qu'il est difficile de faire rétrocéder des lésious devenues assez intenses pour ne permettre à peine que quelques heures de survie.

Les signes cérébraux, caractéristiques, dans la méningite tuberenleuse, sont trop tardifs, et indiquent presque toujours une lésion des méninges très profoude. Si l'on s'en rapporte aux expériences récentes de production de méningite tuberculeuso sur l'animal, il y aurait une période lateute de trois semaines, avant l'apparition des premiers signes.

Entin, à l'hôpital, les enfants nous arrivent toujours trop ard; lorsque les parents s'inquiétent, le petit malade est dèjà profoudément infecté. Ces cessais auraient plus de chance de succès dans la clientéle privée, où les premiers symptôms a véchappent pas aux parents. Le diagnostic évidenunent est difficile à cette période; mais, peut-être, l'examen du liquide céphalo-rachidien, tel que le conscille M.F. Widal, pourrait-il permettre un diagnostic précoce de la méningite tuberculeusse.

Voici, d'ailleurs, le résumé de ces trois observations :

R., Louise, 23 mois, était le 9 juillet dans le service; les parents ont trois autres enfants bien portants; un seul des enfants est mort d'une entérite.

La petite malade était bien portante jusqu'à maintenant; mais, depuis huit jours, elle est devenue triste, elle a des vomissements, de la constipation, elle tousse, elle maigrit très rapidement. Aujourd'hui, 10 juillet, dans son berceau, elle est couchée en chien de fusil; elle a de la photophobie; ses pupilles sout inégales; le ventre est rétracté en bateau, elle grince des dents, mais le signe de Kernig manque. On lui donne le sue extrait de 500 grammes de viande crue. Le 11 juillet, malgré le suc musculaire, l'enfant va plus mal, la température s'est élevée, elle attoint 39 degrés; la respiration est trés rapide, le pouls incomptable; il y a du ptosis à gauche. L'enfant prend toujours la même dosse de suc de viande. Le 12 juillet, elle meurt à cinq heures du matin; depuis la veille aux soir elle avait des convulsions.

A l'autopsie on trouve un exsudat purulent à la base de l'encéphale avec des trainées remontant dans la scissure de Sylvius et un semis de granulations à la face externe des circonvolutions.

La deuxième malade, M., Marie, 5 aus, entre dans la salle le 21 octobre 1900 avec des signes nets de méningite tuberculeuse : peuls lent, intermitent, irrégulier; constipation opiniàtre, amaigrissement, abattement, vomissomonts.

Le 22, on lui donne 100 grammes de jus de viande crue; la température continue à s'élever et la malade meurt lo 24 octobre.

R., Rose, 3 ans 1/2, était à l'hôpital le 26 novombro 1900; ello présente aussi des signes nets de méningite tuberculcuso. Depuis douze jeurs, l'enfant est alitée, elle a la fiévre, des convulsions, une constipation epiniâtre, des vomissements bilieux et alimentaires. Depuis trois jours elle est somnolente; elle est très amaigrie; ses pupilles sont dilatées, lo pouls est irrégulier, la température atteint 39 degrés le soir.

Malgré le suc de viande crue, l'enfant menrt le 24 décembre au soir.

Nous terminons cette communication on rapportant quelques analyses urinaires, faites avec un grand soin par M. Donat, interne en pharmacie du service, ot qui complétent nos abservations:

Volume de l'urine. - La quantité d'urine émise en vingtquatre houres par les quatro enfants mis en ebservation est notablement augmentée pour trois d'entre cux, qui ont donné par kilogramme corporel :

Pour lo quatrième :

Cette augmentation paraît due au régime alimentaire des enfants qui pouvaient boire du lait à volonté et qui ont absorbé une moyenne de :

Densité. — Cette abondance d'urine a influencé la densité qui est un peu inférieure à la moyonne ;

> 1,015,5 1,016,8 1,016,3

une densité est normalo 1,021. - Salle Blache, nº 6.

Urée. — Le taux de l'urée par rapport à i kilogramme du poids est normal, c'est-à-dire, légèrement supérieur à celui de l'adulte. L'azote total est également normal et le rapport azoturique a donné:

Sal	le Bla	che	e. 1	it	6.			٠.						85,6 0/0
_		_		Lit	8.							٠.		80.3
_		_	1	Lit	23.					٠.				81.7 —
-	- Bar	rie	er. l	it	28.				٠.		٠.	٠.	٠.	82,1 —
L'azote	total	a	été	do	sé	րց	ľ	le	1	r	С	ėd	é	Kjeldhahl-Hen-

niuger,

Aeide urique. — Dosé par la méthodo Denigès (hyposul-

fite cuivreux et éyanuro de potassium); les quantités trouvées sont normales.

0,011 0,011 0,009 0,0075

Lassaux (Émite). — Salle Barrier, Lit 28.

ANVIER

PESANT 22 kgr. 540 LENEART

OYENY ŝ œ ieg, abral. 4015 (1012.5 9 FEVRIER 3 acido ю

Ē limplife Hr. akal. <u>8</u>

> routhle 3

limite 3

rouble

Aspect tèaction..... Densité.... Trée.....

Quantité d'urine ou

acido

kilogramme rorporet 0.0 1,00 0.27 65 ax Joens 0,936 ±8. 6.37 0,285 6.0 0.903 2 8.11 Ē 8 6.43 82.1 0,300 8.2 5 5

9 2.5 0,76 9.75

200.0

3.965

0.251 3 8 Ę

> Acide urique..... rique....

Phosphates exprimés en acido phospho-

38. 0 9.53

5

8.60

9.50

Chlorares Azote total Rapport azaturique. 800

9000

9006

9000

9000

800

200X

993

8

ŝ

8

Boissons absorbées en

26 heures....

SOCIÉTÉ DE THÉRAPEUTIQUE

PHILIPPART (MARIA). - Salle Blache, Lit 8.

JANVIER

31

	o) .	4 8.	0		l				
	ā	§ .	200		1-	æ	٥	des bex soens	kilogramme corporel
				3	3	25	200	ž	1 - 31
-					=	Sent head	-	=	3
			c		ā			_	1
018 10	2		101	1013	1016	101		_	#
	38		43.74	16.3	13,45	19.15		_	0.48
-	0.191	0,914	0,903	0.198	0,933	0,932	0,917	0.939	0.011
	15	3,0	51.1	8	1.97	9.1	25	0.990	0.043
10		86.5	10,80	2	10.30	871	1.5	6.80	0.39
_					8.13	8	2	8.1	0.33
	,	4			2	a:	ē Ē	£.	e
1000	905	200	1300	1300	1300	1300	1300	9911	

truble res-

Aspect.

Urëe.....

Densité Acide urique..... Chlorures....

Quantité d'urine en

0,97 9.81

Phosphates exprimés sous forme d'acide phosphorique.....

q

Azote fotal Rapport Boissons abrorbins on

24 houres.....

953,0 opjou 9101 9.57 0.83 2 L'oxamen microscopique des sédiments utrinitres, fait chaque jour, montre de nombreux géboules rouges, des cylindres grannleux, et de nombreux géboules interies de chara et d'ammonisque, no rocsante déstament la présence d'albomine (etthes) en quantité notable. Le B, l'urine est moins rouges et le mointo des globaules parait notablement dimines.

266			soc.	гåт	ÉΙ)E :	тнi	RA	PEUTIC	UE			
	L'ENFANT PESANT IT ROT.	32	9.68	*	R	s	0,34	0,0075	0,031	0.28	0.13		*
	MOYENNE	des DIX JOURS	305	•	a	1016.3	3.86	0,198	0,500	8.3	9.0	21.1	200
		6	220	8	*	1013	8.	0,153	0.31	37.	3	8	200
		· ·	390		-	1013	35	0,094	90,300	99.5	22	ž	200
		-	820	,		101	=	0,171	65.0	E	% %	2	1000
		9	9	A	æ	9101	8.18	0,007	0.237	3.71	R	ę.	300
23.	FÉVRIER	۵	ŝ	a	R	6101	6.13	0,17	8.0	6.23	R	£	200
he, Li	E	4	210	£	*	Ξ	39	0,136	88,0	8.8		=	900
e Blac		8	28	R	*	3	7.30	9,000	9,0	6.3		-	200
Sall		es	8	p	Vg. abal.	1020	21.	0,167	9:0	3:	R	A	200
TINE).		-	錢	£	acido	1031	9.29	9,10	0,79	3.92	*		200
(ALBER	JANVIER	31	ĝ	limpide	Vg. alcal.	1050	8.35	0,104	0,73	5.3	,	£	900
FOUCAULT (ALBERTINE) Salle Blache, Lit 23.			Quantité d'urine en	Aspect	Réaction	Densité	Urde	Aeide urique	Phosphates exprimes on acide phospho- rique	Chlorares	Azote total	Rapport azoturique	Boissons absorbées en 24 heures

267

200 83.6

8

9000

2000

3000

900

35

900

503

3000

Eoissons absorbées cu 24 heures.....

31 kgr. 600 par kilogramme corporel 0,009 0,057 0,49 DIX JOURS 3 3 18.76 ÷. 6.7

3

9101 13.06

3

2

30.0

0,302 8,78 31

2027

Phosphates a l'état d'acide phosphori-

0,278

13

2

20.5 10 9006

60.03

12.41

57.0

19.65

.

.

LENEANT

TOYENNE

PEVRIER

JANVIER

HASTERT (MARIA). - Salle Blache, Lit 6.

des

8

9

20

8 mpide 15.02

2

2 3 27

957

200 seide 35 8.0 12 53.5

Quantité d'urine en

inpide

Aspect Róactien Densité.... Crée..... leide urique..... dno anb Rapport azoturique... Chlorares Azote total.....

Z. freshle

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Acide phosphorique. — Dosé volumétriquement par l'azotato d'urano et le forrocyanure de potassium le kilogramme corporci donne par vingi-quatre heures :

0,57 0,042 0,031 0,041

Ces quantités sont normales.

Rapport de l'acide phosphorique à l'urée. — Lo rapport de l'acide phosphorique à l'urée donne :

1/9,1 1/11 1/11 1/12

Rapports sensiblement égaux à ceux indiqués par Monfet (Urine normale de l'enfant).

Chlorure de sodium. — Le chlorure de sodium dosé par la méthode Denigés donne les résultats suivants par kilogramme corporel.

0,38 0,39 0,28 0,55

Le dornier chiffre 0,55 est supérieur à la moyonne 0,37; mais, comme on le sait, l'élimination du chlore est sous la dépendance de l'alimentation; or cet onfant proud lusbituollemont le jus de viande crue (tasse du traitement) dans un bol de bouillon froid assez forteaunet chargé de chlorure de sodium.

En résumé, cet examen assez complet des principaux éléments de l'urine n'indique pas de phénomènes marquès de dénutrition.

La nutrition paraît se faire dans des conditions très favorables et plus particulièrement pour le nº 6 de la salle Blache, dont les urines présentent un coefficient azoturique supérieur à la moyenge 83,5 0,00.

Discussion

M. Dalcui: — Je demanderai à M. Josias s'il a expérimenté le suc de viaude chez dos malades de la ville?

M. Josas. — Assurément. Toutefois, mes observations sont trop incomplètes pour me permettre de conclure dans un sens quolconque. Plusieurs de ces malades sont actuellement

en traitement dans le Midi on en Suisse. Je communiquerai nitérieurement les résultats ainsi obtenus. Aujourd'hui, nous nous contentons de révèler notre pratique hospitalière, et nous nous sommes placés dans les meilleures conditions d'hygièrepour traiter nos pétits malades.

M. Dalché. — Je crois que le milieu hospitalier n'est pas un bon milieu pour juger un traitement du genro de celui dont M. Josias nous a entreteuus de manière si intéressante. Je crois que si M. Josias avait pu étudier la méthodo de MM. Richet et ll'ericourt dans la clientele de la ville, il serait moins défavorable dans sa manière de juger la zomothérapie dans les cas avancés. Les salles d'hópital, en effet, ne peuvent présenter pour le nalade les mémes avantages que la famille, surtout chez des cufants, et une foule de causes morales et physiques accessoires viennent compliquer l'état du malado, de sorte qu'il est difficile de tirer d'une nouvolle méthode tous les avantages qu'elle pourrait peut-être présenter dans un autre milion.

Traitement de la tuberculose par la viande crue et par les injections intratrachéales d'orthoforme,

Par le Dr Paul GARNAULT, docteur ès sciences.

Le traitement de la tuberculose par la viande crue a été proposé par MM. Richet et Hériconrt, qui ont fait à ce sujet plusieurs communications. Leurs études ont été surtout d'ordre expérimental; mais M. Héricourt, dans un travail publié au deruier congrés international, a signalé les résultats correspondants obtenus dans la pratiquo humaine, et qui sont très satisfaisants. C'est d'une observation de co genre, que je considere comme trpique, qu'il s'agit.

M. V..., 45 ans, taille 1=,59, a été examiné et soigné par moi, à partir du 15 octobre dermer. Autrefois très vigourenx, ce malade avait commencé depuis plus d'un anà maigrir. Son poids était tombé de '68 kilos à 60. Il exerce la profession extrénement pénible de premier danseur et de professeur de ballet dans un grand thétaire de Paris. Il avait du interrempre ses fonctions dans le courant de septembre, lorsque, au cours d'une représentation, il était tombé innaimé, dans les coulisses. La toux était continuelle, les crachats verdétres, souvent tointés de sang; il cut plusicurs hémoptysies. L'examen des crachats fait par M. le Dr Frenkel donna les résultats suivants: « Crachats très épais, purulents, verdâtres, sans odeur, deux millions de bacilles de Koch par centimètre cube, microcoque tétragêne en petit noubre, ni staphylocoque, ni streptocoque.» A l'auscultation, matité, exagération des vibrations vocales, craquements humides et rales eaverneux.

La voix est voilée, sans que l'on constate cependant d'ulcérations sur le larvnx, très pâle et très anémié.

l'instituai un traitement à la viande crue, suivant la méthode Richet Héricourt, et je fis pratiquer un vasistas dans la fondtre du malade. J'èpreuvai, au début, beaucoup de difficultés à faire suivre rigoureusement le traitement zomothérapique, qui consista en l'ingestion journalière de 600 grammes de viande crue et du jus extrait de 1 kilogramme de viande crue. En même temps, je fis des injections journalières, intratrachéales, de 6 centimètres cubes, d'une é unuision avec :

Dans la première sounaine, le poids tomba à 59 kilogrammes. Depuis cette depoque, il «Set progressivement et régulièrement relevé à 6624,500. Les crachats out complètement disparu, la toux a presque entièrement cessé, les forces sont revenues avec le poids, et seraient déjà suffisantes pour que le mainde puisse reprendre ses fonctions, très fatigantes, de la scênce best of jauvier, il a repris as classe de danse. Les sueurs necturues, extrêmement abondantes, ont disparu vers le 15 décembre.

J'ai pu ebserver, il y a deux ans, qu'un de mes malades, gravement tuberculeux, aquel le professeur Grancher recommanda l'ingestion jeurnalière d'une petite quantité de viande crue, 100 à 150 grammes, je crois, se mit spontanément à cn absorber 700 à 800 grammes par jeur. Au bout de quelques mois, il avait repris une santé florissante, qui ne l'a jamais quitté.

Par contre, l'abbé B..., curé dans l'Oise, tuberculeux très avancé, affligé d'une toux absolument continne, que M. Rondu attribuait avec raison, je pense, à une adénepathie brenchique tuberculeuse, n'use jamais du traitement zemethérapique. Il était considéré par son médecin, le D' Calilaux, de Crépy-en-Valois, et par le D' Duheureau, de Cauterets, qui me l'adressa, comme voné à une fin très proclaine. Je lui fis, pendant six mois environ, des injections intratrachéales d'en-theforme, sans autre traitement. Son peids monta de 56 kilegrammes à 62, sa toux disparut complètement et sa santé genèrale est satisfisiasate, le malade n'absorbait pas de viande crue, il se contentait de faire cuire l'égérement sa viande qu'il absorbait en petite quantité. Il n'a jamais non plus été seumis à la surallimentation.

Les résultats obtenus chez ce dernier malade, sent loin d'ètre comparables à ceux que m'a donnés la combinaison de la zomothérapie avec les injectiens intratracbéales d'orthoforme. Je pense donc que, grâce à ces deux trationents simulanés, en pent obtenir des résultats très satisfaisants, même chez des tuberculeux arrivés à une période très avancée de leur affection, et cela sans avoir besoin de leur faire quitter Paris, en leur milieu d'existence, à condition qu'il soit suffisamment hygiénique. Il est à remarquer que, dans les deux cas cités, le traitement a débuté au commencement de la mauvaise saison.

Les injections intratrachéales, bien exécutées, ne déterminent aucun réflexe; elles sont un jeu pour tout spécialiste de la gorge, et tout médecin peut arriver, au bout de quelques tentatives, à les exéculer très correctement, même sans l'aide du miroir frontal ou laryngien, qui, pour tout mèdecin nou exercé, représentent une gène plutôt qu'une aide efficace. Jo peuse que, dans le cas de M. V..., elles ont constitué un adjuvant très important au traitement zomothérapique.

Comme dans le traitement de l'abbe B..., condanné à brève échéance par tous les médecins ul l'ont examiné, et qui fut amelioré dans des proportions surprenantes, on n'employa ni la viande erue, ni aucune autre espèce de médication, jo me crois autorisé à rapporter aux injections intratrachéales d'urthofurne le mérite de cette amélioration.

M. Albert Rober. - S'il est incontestable que la suralimentation est très utile pour beaucoup de tuberculeux, on no doit pas oublier qu'elle doit être surveillée de très près et qu'elle expose certains malades à de réels dangers. Les tuberculeux ont bieu souvent un foie en mauvais état, ils ont des reins qui demandent à être ménages; or, on ne doit pas perdre de vue qu'en suralimentant les malades on soumet le foie et le rein à un surmenage excessif. Je viens de voir un ieune tuberculeux atteint de lésions pulmonaires assez avancées mais dont les reins paraissaient complétement intacts (il n'y avait pas trace d'albumine), aggravé singulièrement à la suite d'un séjour dans un sanatorium on on l'a gavé à ontrance. En peu de temps il avait gagné 18 kilogrammes, mais bientôt apparurent des symptômes de néphrite aiguê et celle-ci a été le point de départ de lésions rénales chroniques irrémédiables. Actuellement ce malade est perdu et j'attribne cette grave complication à l'alimentation colossale de princines toxiques à laquelle on a force lo rem par une suralimentation excessive.

Le Secrétaire des séances, Dr Bolognesi.

L'Administrateur-Gerant : (), DOIN



A l'Académie de médecine, M. Albert Robin fait une communication sur la Glucosurie et le diabète duspentique. Parmi les retentissements des dyspensies sur le foie, il faut citer la glycosurie. Elle se reneontre dans 5 0/0 des eas de dyspepsie hypersthénique irrégulière, toujeurs minime, variant de 0gr,50 à 6 grammes par litre, elle n'existe jamais que dans l'urine de la digestion et manque dans l'urine du jeune : dans la meitié des eas elle ceincide avec l'albuminurie digestive. Cette giveesurie guérit par le traitement de la dyspepsie hypersthénique : l'administration de peudres alcalinoterreuses après les repas suffit souvent. Dans les cas plus sévères, le régime lacté abselu denne de bons résultats ; tandis qu'au centraire, on sait que le régime lacté est très défavorable chez les diabétiques vrais. Quand le diabète dyspeptique est constitué, on commence par diminuor la quantité de sucre éliminé par un régime, puis en applique le traitement de la dyspepsie.

M. Dioulafoy communique les observations d'un cortain ombro de malades qui en présenté des hématémèses appendieulaires. Ces hématémèses sont habituellement précòdes do nausées et de vomissements bilieux; olles frappent les enfants aussi bien que les adultes, so renouvelleut deux ou trois fois à d'assez courts intervalles et se terminent le plus souvont par la mort. Cette complication ue serait pas rare puisque M. Dieulafey en a vu 0 cas en meins d'un an et que plusieurs auteurs ont publié des faits semblables. Il s'agit la d'accidents test-infoctieux et l'on est en présence d'érostiens

274 BULLETIN

stemacales comme en el esserve chez les animaux dont les intestins ont dé expérimentalement ligaturés. Déjà Millard, en 1876, avait publié une elservation d'hématémèses mertelles consécutives à une appendicite suppurée post-typhoid que. Il seutenait que dans ce cas les altévations gastriques n'avaient rien à faire avec la fièvre typhoide et qu'elles étaient a conséquence d'un empoisonnement résultant de la péritonite. Peur M. Dieulafey, l'appendicite n'est pas une maladie purement locale, c'est une toxi-infection qui menace l'économie teut entière à plus ou moins brève échéance et les cliances d'infection sont d'autant plus grandes que la suppression du foyer infectioux a cèté effectuée plus tôt.

A la Société médicale des hôpitaux, M. Ferrier rapporte les ebservations de 3 malades atteints de perforations intestinales au cours de la dothinenterie qu'il a fait traiter par la laparotemie et la suture de la porte de substances. Il estime que l'enération aura d'autant plus de chances de succès que lo diagnestic sora porté plus hâtivement. Si certains symptômes, tels que les vemissements, le tympanisme fent défaut, d'autres ent, à la vérité, une réelle importance; c'est ainsi qu'il cenvient do placer en première ligne l'hypothermie, surteut lorsqu'elle coîncide avec l'accélération du peuls, la suppressien des selles succédant à la diarrhéo, et le caractère des deulours. Celles-ci, même quand elles sont peu vives, ont on général un début brusque : d'abord lecalisées, elles envahissent progressivement tout l'abdomen. Enfin, souvent en censtate l'apparitien de treubles vésicaux indiquant la participation du petit bassin à l'inflammation péritenéale.

A la Société de chirurgie, M. Lagrange signale un nouceau proaded destiné à perfectionner la prothèse après l'énucléation de t'est. Il s'agit de grefier dans la capsule de Tenen un csil de lapin au devant duquel en suture deux à deux les muscles droits, et la conjenctive par dessus. L'oril complétement enfoui contracte des adhèrences par teute sa surface; il se ramolit, devient hypotone, perd dans les deux premiers mois

BULLETIN 275

environ la moitié de son volume, mais vit et constitue un moignon assez volumineux, très mobile, capable de supporter dans les moilleures conditions une coque artificielle.

M. Begouin, au nom do M. Desmons, fait une communication sur l'emputation précoce et haute dans le traitement de
la gangrène spontanée des membres chez les ditabéliques.
Ayant en à traiter, en ISST, une femme de 54 ans atteinte
dopuis six mois de gangrène huminde du membre inférieur,
avec état général très mauvais et dont les urines contenaieur.
110 grammes de sucre par vingt-quatre heures, ils pratiquèrent l'amputation de la cuisse et la guérison fut parfaite :
le résultat se maintiut excellent bien que la malade continuât
à rendre 72 grammes de sucre par jour. Eu raison do ce fait,
MM. Bégouin et Desmons peusent que chez le diabétique plus
que chez tout autre, la gangréne spontande et profonde des
membres réclame l'amputation d'emblée. Si celle-ci est faite
à un niveau ôlevé et avec une asepsie rigoureuse, olle sauvera de nombreux malades que l'expectation efit laisse mourir.

A la Société de biologie, MM. Gilbert et Fournier signaleut l'emploi qu'ils ont fait de la lécithine en thérapeutique. L'administration de ce produit aux animaux do laborateire par la voio gastriquo, sous-cutanée on péritonéale, seit à dose de 2 à 5 grammes en une fois, soit par petites doses de 10 à 20 centigrammes longtemps prolongées, a montré que cette substance était dénuée de toute toxicité; los animaux augmentant, au contraire, très notablement do poids. Chez lo tuberculeux, la lécithino administrée soit par voie buccale, sous forme pilulairo à la dese de 10 à 20 centigrammes, soit en injections sous-cutanées, en solution dans l'huile d'olives stérilisée, à la dose de 5 à 15 centigrammes tous les deux jours, a provoqué l'augmentation de l'appétit, la reprise des orces, l'élévation assez notable du poids, malgré un état fébrile assez intense, l'amélioration de l'état général. En somme, il n'y a rieu dans cette communication que neus ne sachiens déjà par les publications de précédents observateurs.

PHARMACOLOGIE

Sur une nouvelle méthode de posologie pour les médicaments très actifs. — Solutions normales officinales, basées sur l'équivalent thérapeutique.

Par L. Adrian

Une des grandes difficultés de la prescription des médicaments qui sont doués d'une activité considérable, et qui, par conséquent, peuvent à l'occasion devenir dangereux, réside assurément dans la grande diversité des doses susceptibles d'exercer une action thérapeutique comparable.

Ainsi, par exemple, certains produits s'administrent à des doses maxima de 10 à 20 centigrammes, quand d'autres ne sont employés, dans les mêmes conditions, qu'à la dose de 10 à 20 milligrammes, et certaines drogues ne loivent s'administrer dans les 21 heures qu'à la dose maxima de 10 à 20 dixièmes de milligrammes. Cela représente une différence de 1 à 100, ce qui est énorme.

Il est bien évident que tout médecin instruit connaît sa posologie et qu'il faut théoriquement supposer qu'il ne fera pas d'erreurs dans les doses, mais ee n'est pas pour eeux-lâ que je parle, et mon expérience personnelle, les relations journalières que j'ai avec les pharmaciens de toutes provinces à de tous pays m'a démontré que, parmi les simples pratiziens, la crainte d'une erreur est certainement un grand ampéchement à la vulgarisation d'un grand nombre de médicaments très actifs, doués de propriétés spéciales et bien définies et qui pourraient, dans des cas particuliers, rendre de très grands services.

Il faut convenir en effet que la thérapeutique s'est, depuis une trentaine d'années, enrichie d'un nombre considérable de produits végétaux très toxiques, et que la mémoire a peine à retenir les doses très variables de chacun d'eux. Japense done qu'il y aurnit avantago à ajouter à la plaracopée une préparation fixe, basée sur une convention toute nouvelle, et qui aurnit pour effet d'unifier les doses, sinon de tous les médicaments, au moins de œux qui possèdent une activité considérable et qui peuvent amener une hésitation très pardonnable dans la prescription.

On reproche beaucoup à la médecine moderne d'avoir restreint le champ pharmaceutique de ses prescriptious à la formule journalière de quelques préparations qui reviennent machinalement sous la plume du praticien. Ne croiracon pas que les choses pourraient changer le jour oû le médecin n'aurait à retenir qu'un soul chiffre, une fois pour toutes, quel que soit le médicament employé? Or, c'est là cu'il servit uile d'en arriver.

qu'il seruit utue d'en arriver.

N'oublious pas, en effet, qu'il ue s'agit pas seulement de trouver une formule commode et permettant d'utiliser plus largement qu'aujourd'hui des drogues dont les effets sont précieux, mais qu'il faut aussi penser que pareille mesure aurait pour avantage immédiat de supprimer presque complètement les chances d'accidents dus à une erreur ou à un oubli. Si l'on envisage les accidents divers causés par la prescription ou par l'exécution des ordonnances, on verra utirbuable à la fois au médecin et au pharmacien. La loi a voule entre le malade et le médecin la prescription cou le malade et le médecin le présence d'un tiers chargé de l'exécution de l'ordonnance: pourquoi? Parce qu'elle a sageuent pensé que cette obligation augmentait la garantie de la société contre des empoisonnements dus à

l'erreur ou même à l'ignoranee. Bien des fois le pharmacion a pu arrêter une prescription dangereuse, mais on constate depuis une trentaine d'années que le nombre des empoisonnements dus à des erreurs de dose a augmenté. Il n'est pas douteux pour moi que ees faits sont dus à la difficulté qu'a le pharmacien, aussi bien que le médeein, à retenir la dose active et la dose dangereuse de certains produits rarement employés. Eh bien l'es secielents ne se produiraient certainement passi la pharmacopée possédait une préparation officiale dout la posologie serait établie sur une base fixe et uniforme pour toutes les drogues qui entreruient dans sa composition, our le médeein pourrait formule rette préparation et au besoin le pharmacien pourrait exècuter avec elle toute evalueures.

De cette manière, et grâce à cette innovation, le médecin serait à l'abri des erreurs de plume ou de mémoire, et le pharmacien de son côté verrait sa responsabilité moins menacée, le tout au plus grand avantage du malade qui naturellement courrait moins de rissues.

Plusieurs tentatives ont déjà été essayées dans ce sens et parmi ces essais, j'en citerai deux, qui représentent une tendance vers la méthode que je veux proposer aujourd'hui.

En 1891, M. A. Petit, se basant sur des considérations analogues à celles que je viens de résumer, proposa à la Société de Pharmacie de remplacer la prescription des granules par celle d'une solution au millième des médicaments très actifs, comme l'aconitine, la digitaline, la stroplantine, etc. C'est à cette ocasion que notre confrère imagina le glycéro-alcodé qui permet de dissoudre facilement et de conserver la plupart des drogues très actives. Cette colution était cinsi formulée.

```
Glycérine : (D = 1,250 à 15 degrés)... 333 centimètres eubes
Bau distillée ... ... 147 —
Alcool à 95 degrés ... ... 520 —
```

Cette solution a la même densité que l'eau et chaque gramme occupe un volume de I centimètre cube et fournit L gouttes; si l'on s'en sert pour faire des solutions au millième des drogues actives, chaque gramme ou centimètre cube contiendra un milligramme et l'on pourra doser au cinquantième de milligramme en fractionnant par gouttes.

Il est évident que ce procédé a l'avantage de permettre la manipulation des produits dangereux avec plus de sécurité, mais il ne résoud pas les difficultés que nous avons soulevées tout à l'heure, ear le néclecin sera toujours obligé de proportionner la quantité du médicament à la plus ou moins grande activité du produit employé, de sorte qu'on réalité il serait obligé de retenir à la fois la dose limite, en poids, du médicament et la dose de la solution au millième. En conséquence, ce serait presque une complication: seul le pharmacien peut avantageusement se servir du procédé en faisant d'avance des solutions titrées au millième et en s'en servant pour l'exécution des ordonnances, il s'entoure ainsi de plus de garantie pour le dosage des produits dangereux.

Vers la même époque (1891), un autre de mes confrères M. Duflot, imaginait sous le nom de Posologie décimale une méthode ayant pour but de doser toute une série de formes médicamenteuses, de manière à ce que la dose maxima pour vingt-quatre heures de tout médicament fut représentée par dix unités de la forme choisie. Voici comment s'exprimait l'auteur :

« Tous les médicaments officinaux, tant anciens que nouveaux, à l'exception toutefois de eeux qui s'emploient presque ad libitum et dont le dosage par conséquent n'offre pas d'intérêt, sont présentés sous la dénomination de Médicaments-técima dosés d'une manière uniforme d'après le système décimal.

« C'est-à-dire que, pour les produits solides, 10 pilules,

10 granules, 10 pastilles, 10 dragées, etc., d'un médicament quelconque représentent la dose maxima pour un adulte et pour vinyl-quatre heures; et que, pour les produits liquides, (la cuillerée à café ayant été prise pour unité de dosage), 10 cuillerées à café d'une solution, d'un sirop, d'un élixir, d'un vin médicamenteux, etc., quelconques, représentent la dose maxima pour un adulte et pour vinyl-quatre heures (1).

Cette méthode représente d'une manière intéressante la solution du problème que nous avons posè, à avoir la possibilité d'unifier de manière fixe les doses des préparations des divers médicaments actifs, mais elle a un très grave inconvénient, celui de supprimer la formule, car le pharmacien serait obligé de possèder toutes les formes médicamenteuses possibles et le médecin serait, de son côté, dans l'impossibilité depreserire d'une manière rationnelle. Cependant il est évident que c'est dans cette direction que l'on doit aller pour arriver à un résultat pratique, c'est-à-dire : trouver un moyen qui permette de formuler magistralement une seule dose uniforme pour tous les médicaments actifs.

analytique : les chimistes ont simplifié considérablement les procédés d'analyse en créant les liqueurs normules, dont l'établissement est basé sur l'équivalent chimique des corps simples. Un centimètre cube de liqueur normale d'acide sulfurique correspond à 1 centimètre cube d'une solution normale d'une base quelconque. Quelle que soit la liqueur normale utilisée, elle correspond à la même quantité d'une autre liqueur également normale. On obtient ce

Or, nous avons un exemple intéressant dans la chimie

⁽¹⁾ M. Trouette-Perret de son côté, avait présenté une méthode analogue mais duodécimale, c'est exactement le même système, mais il est certain que le système décimal est plus logique que le système duodécimal, c'est pourquoi je parle suriout de la proposition de M. Duflot.

résultat en mettant dans la liqueur (par contimètre cube de celle-ci), un poids de chaque substance correspondant au poids de l'équivalent moléculaire de cette substance.

Eh bien, je propose d'établir un équivalent thérapeutique pour chaque substance très active et d'établir des solutions thérapeutiques normales dont l'unité de poids et de volume contiendra exactement l'équivalent thérapeutique de ce médicament.

Pour obtenir ce résultat, il suffirait d'établir pour le plus grand nombre des médicaments actifs et notamment pour tous ceux qui présentent un danger réel dans leur usage, une solution officinale, dont le titre serait calculé d'après l'activité de la substance active, de telle sorte que l'unité choisie contienne exactement la dose quotidienne maxima établie par l'expérience.

Prenons des exemples : la dose de quelques médicaments est ainsi établie par l'expérience, d'après les formulaires usuels :

```
| Azotate d'aconitine. | 1 10° de milligr. â 1 milligr. Adonidine. | - â 15 | - 3 | 15 | - 2 | - â 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 | - 3 | 15 |
```

Ces doses, si variables, sont difficiles à retenir pour la mémoire; il en sera tout autrement si l'on établit une solution officinale qui contiendra pour chaque unité choisie la dose généralement considérée comme maxima des vingtquatre heures, de chacune de ces substances, car alors le praticien saura que pour toutes les drogues, quelles qu'elles soient, il peut prescrire la même quantité de ladite solution.

Or, l'unité choisie doit naturellement être l'unité de poids et de volume, car le gramme et le centimètre cube sont quantités usuelles et admises. Donc nous ferons un excipient de densité égale à celle de l'eau, de manière à ce qu'un centimètre oube pèse un gramme et, reci admis, chaque gramme ou centimètre de notre solution contiendra toujours la dose maxima pour vingt-quatre heures admise par la thérapeutique. Le praticien, médecin ou pharmacien, saura donc toujours qu'un centimètre cube représente la quantité maxima à administrer au malade dans les vingtmatre heures.

Ce sera donc entre 0 centimètre enbe et 1 centimètre eube que la dose de toute substance active sera comprise. Ce sera également entre 0 et 1 gramme que le poids à prescrire se trouvera compris.

Je propose d'appeler ces solutions : solutions thécapeatiques normales, car leur établissement est fait sur l'équivalent thérapeutique, comme les solutions normales qui nous servent en analyse sont établies sur l'équivalent chiuique. En conséquence, la solution normale d'aconitine contien-

En conséquence, la solution normale d'acontifne contiendra un milligromme de nitrate d'acontine par gramme ou centimètre cube, la solution normale de morphine contiendra pour le même poids et le même volume un centigromme de chlorhydrate de morphine, enfin la solution normale de digitatine, de spurtième contiendra par centimètre cube ou gramme deux milligrammes de la première et dix centigramme de la seconde.

Du reste, ces doses sont indiquées ici seulement pour l'exemple et l'on pourra les fixer après étude sérieuse, mais le principe sera toujours le même : le médeein saura une fois pour toutes que la solution normale contient la dose thérapeutique maxima pour vingt-quatre heures et que par conséquent, à moins de cas volontairement exceptionnels, il ne doit jamais dépasser la dose de un gramme ou un certimètre eube de toute solution qu'il formulera. Il n'y a pas de doute qu'une pareille méthode de poso-

logie présente des avantages pratiques considérables.

Il me reste maintenant à fournir quelques considérations relatives à la mise en exécution de la méthode. Tout d'abord il est évident qu'il faut choisir un excipient capable de dissoudre toutes les substances glueosidiques ou alcaloïdiques, ear ee sera surtout des mèdicaments de ce genre qui devront être ainsi préparés. Par conséquent l'eau est immédiatement à rejeter ; il faut done prendre un liquide aleoolique étendu, et de plus ce liquide devra être additionné d'une substance eapable d'augmenter sa densité pour l'amener à celle de l'eau, c'est-à-dire un gramme au centimètre cube. Notre collègue, M. Petit a, comme je l'indique plus haut, donné la formule d'un liquide de ce genre obtenu en mélangeant quantités calculées d'eau, de glycérine et d'alcool; un gramme de ce liquide est donné par un centimètre cube, et cette quantité correspond à 50 gouttes du compte-gouttes officinal, Moi-même ai donné à la Société de thérapeutique, en 1892, la formule d'une solution alcoolique sucrée qui présente les mêmes propriétés de densité et donne 40 gouttes au gramme. Il est évident que nour le but que nous poursuivons, ma solution sucrée ne peut servir, car le suere eristalliserait dans le tube capillaire d'un compte-gouttes et par conséquent il faut s'en tenir à un liquide du genre de celui de M. Petit. Sa formule, je crois, doit être légèrement modifiée parce que le nombre de gouttes fourni par elle, c'est-à-dire 50 au gramme ou centimètre cube, est un peu trop élevé.

Je ne veux pas discuter la valeur posométrique de la goutte; il est bien évident qu'an point de vue absolu ce mode de calculer les doses demédieaments est vicieux, qu'il n'est pas discutable et pèche gravement, mais il n'en est pas moins vrai que la goutte estentrée complètement dans la pratique et nous aurons beau lutter contre les habitudes, le pharmacien et le médecin continueraient à se servir de ee procédé de mensuration des solutions médicamenteuses.

Je suis done bien obligé de faire intervenir la goutte dans la discussion de la nouvelle méthode que je préconise. Or, en variant les quantités d'aleool, de glycérine et

Or, en variant les quantités d'aleool, de glycérine et d'eau mises en présence, je suis arrivé à une formule ainsi établie :

Ean distillée	. 80	grammes.
Alcool à 90°	. 10	-
Glycérine pure à 30°	. 10	
	100	grammes.

Cette formule, que l'on pourrait d'ailleurs modifier suivant : es besoins et après expériences ; fait exactement 30 gouttes au gramme ou centimètre cube. C'est une quantité acceptable, car si 50 gouttes sont déjà un chiffre long à compter, le chiffre de 30 gouttes sont déjà un chiffre long à compter, le chiffre de 30 gouttes sont malact principes et is a comparable de principes estifs médicamenteux. Suivant la sensibilité ou l'âge de son malacte, suivant le but à atteindre, le médicamenteux varier sa formule entre ces quantités faciles à déterminer et invariables, quelle que soit l'activité de la substance utilisée. Cette méthode d'unification des prescriptions de principes actifs et dangereux me paraît présenter beau-coup d'avantages.

En effet, la méthode que je propose a un exraetere de logique qui me semble devoir lui promettre un bon aceucil auprès des inedecins, ma solution normale, mieux que los solutions alocoliques au cinquième, mériterait de prendre place au Codex, car elle représente une quantité pondérale en rapport avec les effets et non pas une quantité absolue. A ce point de vue elle se rapproche, comme je l'ai dit, des solutions normales de la chimic. Pour celle-ci, un graume d'acide sulfurique, un gramme de soude ne signifient rien, celle ne peut acir que sur le poids d'un équivalent de soude,

un équivalent d'acide sulfurique. De même en thérapeutique, un gramme de digitaline, un gramme de quinine n'ont aucune valeur intelligible et comparable, mais la dose active de ces substances au contraire est une quantité immédiatement compréhensible, car il y a un rapport entre toutes les doses actives; un milligramme de la première sera comparable à 50 centigrammes de la seconde. En conséquence, une préparation correspondant à ces conditions et présentant toujours, pour un même poids et un même volume, l'équivalent thérapeutique de toutes les substances actives me paraît présenter des avantages incontestables; on pourra critiquer les procédés d'exécution, mais je crois que tout le monde acceptera le principe sans discussion.

HYGIÈNE

Bouillons ouvriers et restaurants populaires,

Par le D. J. LAUMONIER.

A mesure que la grande industrie se perfectionne et s'étend, des organisations nouvelles s'imposent, dont certaines doivent répondre aux exigences de la vie quotidienne des agglomérations ouvrières.

De ces exigences, celle qui tient à l'alimentation est évidemment la plus impérieuse, par ses conséquences proches ou lointaines, d'autant que l'ouvrier est souvent, en vertu même de son métier, une sorte de transplanté, vivant dans des conditions hygiéniques défavorables. Il importe à la société tout entière, de protéger, au moins de ce côté, la

286 uvgiène

santé de l'ouvrier, en substituant aux gargotes dans lesquelles il va prendre des repas coûteux ou mauvais, par l'improbité de tenanciers peu scrupuleux, des établisses ments situés dans les centres les plus actifs, où il puisse trouver, au prix minimum, des aliments sains, abondants, variés, préparés conformément à ses goûts, de manière à l'attirer et à le retenir par les avantages physiologiques et économiques qu'il y rencontre.

C'est sous l'empire de ces idées et principalement à l'instigation des médecins que les premières Cuisines populaires ont été fondées en Allemagne; elles se sont depuis répandues, sous des formes diverses, dans les autres régions industrielles. Malheureusement elles restent rares en France, parce que sans doute on connaît peu leurs principes d'organisation et de fouctionnement et que l'on est en conséquence porté à considérer ce genre d'entreprise comme une œuvre de philanthropie coûteuse. Or, tout au contraire, cette œuvre éminemment sociale se trouve être en même temps une bonne affaire. Mais ce point de vue, si attachant qu'il soit ne saurait nous arrêter ici où seuls peuvent nous intéresser l'organisation et le fonctionnement des Bouillons ouvriers et Restaurants ou Cantines populaires, tels qu'ils doivent être pour répondre à leur but essentiel.

Ce but est, comme on l'a déjà pressenti, le suivant : acheter et préparer en grand les dennées alimentaires de manière à fournir ainsi une nourriture saine et à bon marché aux classes pauvres et spécialement aux ouvriers qui ne sont pas en mènage ou qui travaillent à trop grande distance de chez eux (Munk).

Pour atteindre ce but, certaines conditions sont nécessaires, qui visent à réduire les dépenses, les frais inutiles, le gaspillage, les déchets d'assiette, tout en respectant les lois de la diététique et en fournissant aux consommateurs des mets qui leur plaisent, qui les attirent et les retiennent. Ces conditions sont les suivantes :

le Calculer les portions ou la distribution des repas de manière qu'elles répondent aux exigences de la ration alimentaire movenne d'ouvriers adultes, fournissant un travail mécanique assez considérable. - Voici d'abord quelques chiffres, dus à F. Ritter, qui indiquent le travail quotidiennement produit en movenne par un ouvrier, suivant la nature de son métier :

Terrassiers 100,000 kilogrammètres. Håleurs de bateau... 110,000 Débardeurs surrampes. 157,000

Pour avoir la somme totale de la dépense énergétique d'un ouvrier donné, il suffit d'ajouter au travail moyen

dépendant du métier et traduit en ealories, le travail qui résulte des réactions intraorganiques (thermogenèse, évaporation eutanée et pulmonaire, travail eardiaque et respiratoire, etc.), et qui est estimé à 25 ou 30 calories en moyenne par kilogramme du poids du corps. Cette somme de dépense est à couvrir par les aliments dynamogènes, dont il n'y a qu'à fixer la nature et la quantité respective. Toutefois, parmi ees aliments, il faut distinguer essentiellement eeux qui sont destinés à couvrir la dépense de matières plastiques eirculantes. Les phénomènes énergétiques sont en effet aecompagnés d'assimilation fonctionnelle, dont les matériaux sont empruntés au milieu intérieur. On estime cette dépense à environ 1 gramme d'albumine par 30 eslories apparues, par kilogramme et par jour (1). La ration d'albumine, ainsi déterminée par la

⁽¹⁾ J. LAUMONIER. Physiologie générale, chap. VII et Bulletin de therapeutique, février et mars 1898.

288 HYGIÈNE

dépense énergétique, entre naturellement en ligne de compte, avec sa valeur calorimétrique propre, dans la liste des aliments destinés à couvrir cette dépense.

des aliments destines à convirr octe depense.

Ces calculs sent trop compliqués pour que l'entrepreneur puisse les établir lui-même; d'ailleurs, il est impossible de les répéter pour chaque client et de ne livrer à ce client que la ration qui lui convient spécialement. Les calculs sont donc faits une fois pour toutes et ne fournissent en conséquence que des chiffres moyens, suivant la nature du travail; l'entrepreneur n'a qu'à les consulter au moment oi il établit ses devis; il en tient, le plus possible, compte pour fixer les menus et la valeur des portions, et voilà tout. En Allenugne, des feuilles imprimées, contenant tous les renseignements utiles à ce point de vue, sont mises à la dissensition des nersonnes qui installent ou exploitent des cui-

sines populaires. . La composition des menus doit être en outre basée sur la quantité relative des divers principes alimentaires essentiels consommée à chaque repas. On admet, laissant de côté le petit repas du matin et éventuellement celui de quatre licures de l'après-midi, que l'on consomme moyennement au repas de midi, 40 0/0 du carbone total et 60 0/0 de l'azote total de la ration : au renas du soir, 45 0/0 de carbone total et 35 0/0 de l'azote total de la ration. Ces chiffres, qui intéressent spécialement les ouvriers français, correspondent à environ : midi, 65 grammes d'albuminoïdes, 30 grammes de graisse, 150 à 200 grammes d'hydrates de carbone; soir, 38 grammes d'albuminoïdes, 15 grammes de graisse, 200 à 250 grammes d'hydrates de carbone. Mais ces proportions varient naturellement avec la race et le climat. Pour les ouvriers allemands, au repas de midi. Voit indique 50 0/0 de l'albumine totale de la ration, 60 0/0 de la graisse, 33 0/0 des hydrates de carbonc, et Uffelmann 42 0/0 de l'albumine, 45 0/0 de la graisse, et 33 0/0 des hydrates de earbone. Pour les ouvriers anglais, d'après Smith, la proportion serait notablement plus forte.

Il convient au reste de noter que les bouillons ouvriers et certains restaurants populaires donnent surtout le repas de midi. A Paris, en movenne, dans ces établissements, on donne 30 repas du soir contre 100 repas de midi, proportion qui diminuera sans doute si la loi de fermeture à 7 heures. actuellement à l'étude, est votée. En Allemagne, eette proportion est paraît-il plus faible encore. Cette circonstance a déterminé quelques patrons à fermer leurs euisines de très bonne heure, s'évitant ainsi des frais d'éclairage et de domesticité, ce qui doit abaisser le prix de la portion servie.

2º Fournir des préparations culinaires aussi satisfaisantes que possible au point de vue de l'assaisonnement. de la cuisson, de la température (sur table) qui leur conviennent, et de la propreté. - Les aliments, de bonne qualité et choisis avec soin par des personnes sûres et expertes, doivent être achetés en gros et de préférence dans les pays de production ; il faut cependant éviter le magasinage, qui est eoûteux, et au cours duquel les denrées peuvent plus ou moins s'altérer.

D'autre part, le bon outillage de la cuisine est un facteur des plus importants. Malgré beaucoup d'avantages, il paraît cependant utile de repousser les appareils de cuisson à la vapeur, ear, ne produisant que peu ou pas d'osmazôme, ils donnent des aliments peu savoureux et de mauvaise apparence. L'expérience des cuisines militaires doit à cet égard servir d'enseignement. La cuisine au gaz est encore ee qu'il y a de plus pratique; elle n'est pas extrêmement onéreuse, et si elle ne fournit que des grillades et des rôtis médiocres, elle donne, en revanche, par la facile régulation de ses feux, de bonnes soupes, de bons bouillons et 290 nygréne

de bons ragoûts. De plus, elle permet, tout aussi bien que le procédé à la vapeur, de maintenir les mets préparés à une température convenable pour les consommateurs retardataires. Il faut en effet que, suivant leur nature, les mets soient servis chauds; e'est là une obligation, moins urgente peut-être au point de vue diététique qu'à celui de l'achalandage. Les ouvriers refusent avec raison une soupe ou un ragoût froids; d'ailleurs, les aliments chauds leur sont indispensables en hiver, surtout quand ils travaillent au deliors.

Une eirconstance très fàcheuse est la mauvaise euisson des aliments, qu'ils soient trop ou pas assez cuits. S'ils sont trop cuits, ils prennent mauvais goût et cessent d'être alibiles; s'ils ne le sont pas assez, ils restent durs, indigestes, peu savoureux et peuvent contenir des macroparasites et des bactéries pathogènes.

Il en est de même des aliments préparés sans soins et sans propreté. Nous ne voulons pas parler ici de viandes ou de légumes de conserve, altérés ou toxiques, ou bien euits dans des vases en métal plombifère par exemple. mais des plats faits avec de bas morceaux, trop gras, trop tendineux, des légumes mal épluchés, contenant des saletés, des insectes ou des vers, servis dans des vases ou des assiettes malpropres. Sans demander l'impossible, il est cependant nécessaire que le triage de la viande et l'épluchage des légumes, salades, herbes, etc., soient faits avec attention et que tous les ustensiles dont on se sert. aussi bien à la cuisine que sur la table, soient d'une propreté rigoureuse. Les consommateurs, au reste, doivent être mis en garde contre le danger qui peut résulter, pour la santé, de l'usage d'ustensiles insuffisamment nettovés et lavés. La syphilis notamment se transmet très bien par le moyen de verres, de cuillers, de couteaux malpropres,

Un assaisonnement convenable est indispensable à la

consommation des aliments, car les condiments excitent l'appétit, favorisent la sécrétion des sucs digestifs et, en variant les saveurs, évitent la monotonie et le dégoût. Il convient toutefois de n'en point abuser, surtout des épices fortes, qui portent à boire et qui bien souvent aussi ne figurent que pour masquer le goût facilement reconnaissable des aliments altérés. D'ailleurs, dans les cuisines populaires, il est difficile, en raison du prix très modeste de la portion, de fournir beaucoup de condiments fins, dont la valeur est toujours assez élevée. Au surplus, les plus simples, les plus ordinaires sont encore ceux qui plaisent le mieux à la grande majorité des clients. Il faut, en conséquence, donner la préférence au sel, au sucre, au vinaigre, aux herbes (persil, cerfeuil, oseille, estragon, thym, laurier) et à l'oignon, et recourir plus rarement aux épices fortes (poivres, piments) et aux condiments âcres (moutarde, raifort, ail, échalotte, etc.). Mais à cet égard, en dehors de la proscription de l'abus, on ne peut fournir aucune règle précise, car tout dépend en définitive, dans le choix et la quantité des assaisonnements, du goût et des habitudes des consommateurs ordinaires qu'il convient. à ce point de vue, de ne point contrecarrer.

3º Organiser les repas de telle sorte que la masse des aliments individuellement servis soit suffisante pour amener la satiété. - Une autre condition indispensable est de fournir à l'ouvrier la quantité d'aliments convenables pour amener la satiété: il ne faut évidenment pas chercher une réplétion trop forte qui nuirait à la production du travail, mais il est cependant nécessaire que la faim soit complètement apaisée, grâce à un choix d'aliments non seulement alibiles, mais aussi suffisamment volumineux. En Allemagne, on admet que l'ouvrier a besoin, pour le repas de midi, d'un volume alimentaire de 1,000 centimètres cubes 202 Hydrine

environ, et pour le repas du soir de 600 centimètres cubes seulement. En France, ces chiffres paraissent, au moins d'après l'expérience faite dans quelques ménages et dans quelques grands établissements (Bon-Marché), trop élevés, en raison sans doute de la moindre prédominance, chez le français, de l'appareil digestif. Les influences climatiques doivent en outre intervenir et tout le monde sait que le volume des aliments soit des consommés en été est sensiblement plus faible que celui des aliments consommés en hiver. En moyenne, 700 centimètres cubes à midi, 500 le soir, sont des volumes qui s'adaptent parfaitement à l'appétit normal d'un adulte.

Un tel volume ne peut guère être obtenu, si l'on ne veut pas dépasser la ration d'albumine, qu'à l'aide d'aliments végétaux lesquels renferment en général (sauf légumineuses) moins de matières albuminoïdes que les aliments animaux et dont, en tout cas, les albuminoïdes ont une digestibilité plus faible par suite de la résistance des parois cellulosiques et de la surabondance des hydrates de carbone, lesquels, comme l'a indiqué Rubner, retardent ou entravent la peptonisation des albumines, Abstraction faite de la question de volume, certaines raisons du reste militent en faveur d'une alimentation à prédominance végétale, dans les bouillons ouvriers et les euisines et restaurants populaires. D'abord l'ouvrier est accoutumé à l'alimentation végétale, comme saveur et comme masse et, en dehors des noces, des godailles, où il se gave systématiquement de viandes, il y tient pour sa nourriture quotidienne: en second lieu, par suite du travail physique considérable qu'il est obligé de rendre, il a besoin d'une quantité élevée d'hydrates de carbone, qui représentent les aliments dynamogènes, et la proportion convenable de ces matières ternaires ne se reneontre facilement que dans les végétaux : ensin il ne peut dépenser chaque jour qu'une somme minime pour ses repas; or les aliments végétaux coûtent beaucoup moins cher que les aliments animaux et présentent cependant autant de variétés et de facilités pour les préparations culinaires.

Il convient toutefois de ne pas pousser trop loin la prédominance végétale dans l'alimentation normale des ouvriers, car on s'exposerait à de graves mécomptes, comme ceux que Munk a signalé dans la cuisine menagère annexée aux usines Krupp à Essen. En effet, le poids des portions augmentant et dépassant les limites du pouvoir digestif, les ouvriers laissent des déchets de repas considérables, - qui constituent une perte seche, - se dégoutent et éprouvent bientôt des accidents, qui amènent, soit le désachalandage de l'établissement, soit des plaintes et des mécontentements légitimes qu'un bouillon ouvrier bien tenu et conscient de son rôle hygiénique doit tenir par-dessus tout à éviter. Si donc il faut admettre que le fond des portions des restaurants et cuisines populaires doit être constitué par des aliments végétaux (ponnnes de terre, haricots, lentilles, pois, choux, riz, carottes), il est également indispensable d'associer à ces végétaux, pour compléter la ration nécessaire, une quantité suffisante de viande de bonne qualité (bœuf et porc, morue, harengs, mouton et veau) et de corps gras (saindoux, oléomargarine vraie, huiles, beurre, graisse d'oie). L'adjonction d'une proportion notable de bonne graisse est très importante, car la graisse est pour un estomac robuste le meilleur aliment dynamogène, et elle a l'avantage, sous un petit volume, de satisfaire complètement l'appétit et de rassasier pour plus longtemps. Du reste l'ouvrier aime, saus savoir probablement pourquoi, la graisse, et, peu difficile, à Paris notamment, sur la saveur des soupes et des sauces, il exige cependant et avec raison, qu'elles soient suffisamment grasses. Dans une petite cantine, voisine du 294 nygiène

quai de Valmy, qui alimentait quotidiennement des débardeurs, ouvriers qui se livrent à un travail de force considérable, la viande devait être grasse et chaque portion de légumes accommodée au lard : cette condition avait été innosée par les clientes eux-mêmes.

Ceci nous amène à parler du poids de la portion. En Allemagne, le poids moyen est de 800 grammes, quelquefois 1,000 grammes; mais l'ouvrier ne consomme qu'une scule portion à son repas, et encore le pain se trouve-t-il compris dans ce poids. En France, le poids de la portion moyenne est beaucoup plus faible; il dépend généralement du prix. La portion de viande et légumes mélangés pèse de 300 à 400 grammes, souvent moins; dans les bouillons ouvriers de Paris, où le prix de la portion est uniformément de 0 fr. 20, la portion de viande pèse, suivant sa nature, de 100 à 150 grammes, celle de légumes 250 à 300 grammes. Mais il convient de remarquer que l'ouvrier français, et surtout l'ouvrier parisien, ne se contente jamais d'une seule et unique portion : il v ajoute le plus souvent soit une portion de soupe, soit une portion de fromage ou de quelque autre dessert. La portion dite ordinaire (soupe grasse, bœuf et légumes du pot au feu) pèse souvent près de 500 grammes. C'est la plus avantageuse, au point de vue alimentaire et économique.

En somme, an point de vue des portions, on peut établir deux types de repas ouvriers : A Ordinaire, 500 grammes; portion de fromage, 50 grammes; pain 250 à 300 grammes; — B. Portion de viande, 120 grammes; portion de légumes, 250 grammes; portion de fromage, 50 grammes; pain, 250 à 300 grammes.

4º Varier les menus le plus possible. — La variété des menus est une condition absolument indispensable à une bonne alimentation. On sait en effet que la répé-

tition fréquente des mêmes mets entraîne rapidement l'inappètence et le dégoût. L'exemple de l'ancienne alimentation des troupes avec le régime univoque est, à cet égard, démonstratif. L'homme à son arrivée au corps engraissait, ear la soupe et le rata sont de bons aliments; mais au bout de quelques mois son poids diminuait au contraire, car son appétit avait disparu devant le retour quotidien des mêmes aliments. Le régime varié, introduit dans l'armée grâce à l'heureuse initiative de Schindler a très favorablement modifié eet état de choses. Pour les mêmes raisons évidemment, il faut appliquer les mêmes principes à l'établissement des menus des bouillons et restaurants populaires, et l'organisation de ces menus est ici facilitée par ce fait que le prix des portions et la dépense totale peuvent varier dans une ecrtaine mesure, tandis que, dans l'armée, la somme allouée au rationnaire est fixe et invariable. Cependant on ne doit pas oublier que l'ouvrier parisien, qui pourrait se nourrir beaucoup mieux s'il ne dépensait pas tant en superflu alimentaire et en apéritifs, tient assez à payer ses portions le même prix, encore qu'il n'aime guère le repas à prix fixe, et ne supporte d'écart que pour les portions de desserts fins et surtout de viande de luxe. Ajoutons que l'on peut obtenir très facilement la variété des menus en observant la règle de changer quotidiennement les associations de viande et de légumes; il faut en outre user beaucoup plus largement qu'on ne le fait d'habitude en France des poissons salés et fumés (harengs, morue, etc.), qui sont des aliments très nourrissants et bon marché, et des préparations au lait et au fromage, également substancielles, savoureuses et neu coûteuses.

5º Adapter les préparations culinaires aux goûts particuliers des consommateurs. - Le client habituel des euisines populaires a besoin de retrouver de temps à 296 nycrèse

autre les mets spéciaux de son pays; ectte circonstance, en rappelant chez lui des souvenirs agréables. l'attache à l'établissement d'une manière plus étroite; on possède, du reste, dans l'introduction do ces mets locaux, un élément précieux de variété et un moyen certain de maintenir l'appétit et la bonne humeur des consommateurs. Il faut donc que les menus des bouillons ouvriers et des restaurants populaires réservent plusieurs fois par mois - ou davantage si cela est utile - une place pour les mets d'origine de leurs clients. C'est là du reste une nécessité dont certains établissements ont été obligés de tenir compte. Aussi il existe à Paris des cantines qui fournissent à leur clientèle limousine ou creusoise des mets limousins et creusois préparés à la mode du pays par une personne au courant de cette cuisine locale. D'autres hébergent des auvergnats, des bretons, des méridionaux et leur donnent également une nourriture appropriée. Il en peut être encore de même s'il s'agit d'ouvriers étrangers, Belges, Suisses, Allemands, Italiens, Espagnols, etc., d'autant plus que la cuisine nationale de ces divers clients renferme des plats excellents et peu coûteux.

Enfin, pour terminer ces considérations d'ordre diététique, rappelons que les cuisines populaires doivent s'interdire la vente des boissons altocoliques, autres que les boissons alimentaires, vin, cidre, bière. On ne doit livrer qu'avec les boissons aromatiques, thé et café, chocolat, quelques spiritueux, rhum, eau-de-vie, kirch, marc et genièvre, et encore à la condition qu'ils soient authentiques et nou de fantaisie.

Reste à examiner une dernière question, capitale à bien des égards, celle de l'exploitation commerciale.

Dans les cuisines populaires, comme dans toutes les autres entreprises commerciales, le prix de la portion vendue aux consommateurs est la somme de quatre facteurs : 1º le prix brut des denrées correspondantes : 2º les frais de préparation culinaire; 3º les frais généraux (patente, loyer, assurances, éclairage, domesticité, intérêt du capital, etc.); 4° enfin le bénéfice.

Il n'v a ici aucun intérêt particulier à discuter les taux de ces différents facteurs, qui sont variables et dépendent d'une foule de circonstances, quoique les règles qui permettent de les fixer soient assez rigoureuses. Cependant il est impossible de passer sous silence certaines indications, en relation avec le mécanisme même d'une bonne exploitation.

Les mercuriales des marchés fournissent le prix des denrées en gros ; mais, dans la pratique, il faut faire intervenir sur ces prix, une correction très importante : la valeur des déchets. Beaucoup d'aliments en effet ont besoin d'être triés et épluchés avant de pouvoir subir les préparations culinaires qui leur conviennent. Le tableau suivant donne la valeur de ces déchets pour quelques aliments :

100 kilog, viande de boucherie donnent 60 kilog, viande nette. 100 - de lard brut 80 de lard. 100 - de pommes de terre 78 --de pommes

de terre épluchées. de choux choux épluc. de cárottes 45 carottes épl.

de petits pois nois verts en gousses 40 écossés.

De telle sorte que le déchet se trouve être en définitive de : 400/0 pour la viande de boucherie, 20 pour le lard, 22 pour les pommes de terre, 25 pour les choux, 55 pour les carottes et 60 pour les petits pois, - décliet dont il faut nécessairement tenir compte dans l'établissement du prix de revient de la portion.

298 Hygiène

Etant donné que la portion de consommation doit comprendre en moyenne: 125 à 150 grammes de viande ou 300 à 400 grammes de légumes (quelquefois 500 grammes), 15 à 20 grammes de saindoux ou 25 grammes de lard, 15 grammes de sel, etc., — on voit que la portion brute d'achat correspond à : 200 grammes de viande brute, 30 grammes de lard, 500 à 600 grammes de légumes, etc. Pratiquement, le prix de revient de la portion de con-

ranguement, e più de trenta de la potata de consommation (déchets déduits), est moins élevé, même à
Paris, qu'on se le figure d'habitude; le tout est de savoir
passer des marchés, de s'y connaître très bien en denrées,
de ne jamais perdre de vue la quotité respective des
déclutes d'épluchage et d'avoir assez d'expérience pour
éviter le gaspillage et les pertes sèches qui résultent d'une
mauvaise utilisation des denrées acquises. Ainsi le menu
suivant, que j'emprunte à un restaurant populaire de
l'avenue du Maine, revient à 35 francs environ et correspond à 100 repas, ce qui met le repas à 0 fr. 35 par tête
(non compris les frais de préparation, les frais généraux et
le bénéfice), pour 3 plats différents : soupe aux pois, veau
roit, salade de poumes de terre.

Voici le détail, en poids, des aliments qui servent à préparer ce repas :

```
5 kilog. de petits pois.
```

8 - de pain (rassis de la veille).

2 - de saindoux.

14 — de viande de veau.
 38 — de pommes de terre.

1 kil. 500 d'huilo et de vinaigre.

1 kil. 500 d'huilo et de vinaigre 4 — d'oignons et d'herbes.

2 - de sel. etc.

Or cette ration est livrée aux consommateurs au prix total de 0 fr. 70, calculé ainsi :

Prix de revient brut	0 fr. 35	
Frais de préparation	0	071/2
Frais généraux	0	171/2
D4-10	•	40

La maison sert en moyenne (1898), sur semaine, 250 repas de onze heures à une heure et 50 repas le soir, de six à huit heures, au prix uniforme de 0 fr. 70, non compris le vin et le pain. Son bénéfice est nul sur le pain, mais il atteint sur le vin 0 fr. 30 par litre, avec une consommation quotidienne d'une centaine de litres environ. Le bénéfice total de ce bouillon, un des mieux organisés que je connaisse, dépasse donc 50 francs par jour, tous frais déduits. Les achats de denrées sont faits directement par le patron.

Dans une cantine de la Villette, que j'ai eu récemment l'occasion de visiter, les portions sont toutes uniformément à 0 fr. 25, même la mesure de vin et de bière, qui correspond pour la première à 1/3 de litre et pour la seconde à une chopine. La cuisine est assez bonne et, chose rare. suffisamment grasse; on donne assez souvent des grillades, mais on ne fournit pas le pain, que le consommateur doit apporter du deliors. Cette cantine délivre des jetons de portion qui donnent droit à une réduction de 100/0, s'ils sont pris pour une semaine au moins (40 jetons d'après la moyenne calculée). L'ouvrier ne paie ainsi ses 40 jetons hebdomadaires que 9 francs au lieu de 10 francs. Cette idée, de délivrer d'avance des jetons qui assurent à l'ouvrier sa nourriture hebdomadaire, est excellente : il ne m'a pas paru cependant que les clients en fussent très enthousiastes, car, sur une centaine d'habitués, huit ou dix tout au plus profitaient de l'abonnement. D'autre part, l'uniformité du prix des portions, si elle est commode, ne semble pas très logique, à cause de la disproportion qu'elle entraîne entre 300 nygiène

les aliments, viande et légumes, salade, fromage, desserts, dont la valeur est très différente.

Dans un restaurant d'ouvriers, qui a fonctionné quelques mois, au moment des travaux de l'exposition, on avait adopté un système assez singulier.

Les denrées étaient réparties par table de 6, de manière que chaque table eut uniformément 1 kilogramme de viande, 150 grammes de lard, 2 à 3 kilogrammes de légumes (suivant nature), 2 kilogrammes de pain, 2 litres de vin, 250 grammes de fromage, etc. Défalcation faite des déchets, on avait donc, par ration individuelle, 120 grammes de viande et 25 grammes de lard ou de graisse, 300 à 400 grammes de légumes, 350 grammes de pain, 40 grammes de fromage, 1/3 litre de vin, etc. Chaque table était louée. pour le repas, par équipe ou par chantier; le chef de table, contre-maître ou ouvrier quelconque, payait en entrant une somme invariable de 6 fr. 90 pour les 6 repas, recevait un numéro qu'il échangeait contre les portions qu'un garcon servait sur la table. La cuisine était bonne et propre; l'établissement ouvrait à dix heures et fermait à une heure de l'après-midi; il y avait 32 tables de 6 places chacune et on pouvait donner 4 séries de repas par jour. Mais le nombre moyen des repas servis n'a guère dépassé quotidiennement 200, sauf au début. Comme les chiffres de l'exploitation avaient été établis sur la prévision de 500 repas quotidiens, l'entrepreneur dut liquider. Cela n'a rien d'étonnant. Cette organisation était beaucoup trop complexe pour nos ouvriers français qui n'ont jamais pu comprendre les avantages de l'association, ni la nécessité des petits sacrifices qu'elle impose en revanche. Aussi la clientèle de cet établissement, où les repas, très suffisants, proprement apprêtés et servis, ne revenaient, tout compris, qu'à 1 fr. 15, fut-elle surtout composée d'ouvriers étrangers.

Λ Lyon, on a fondé, dès 1892, une association alimen-

taire qui s'est depuis fusionnée avec la société des Logements économiques. Les deux restaurants ouvriers qu'a montés cette dernière société paient un lover de 24,000 fr., occupent 52 employés, dont 8 cuisiniers. Un gérant est à la tête de chacun d'eux, sous la direction du directeur de la société des Logements économiques et d'alimentation. C'est ee dernier qui fait les marchés de viande, de pain, de vin, etc.

Les prix des portions sont les suivants :

Pain, 0 fr. 05; vin (1/4 de litre), 0 fr. 15; légumes ou pâtes alimentaires, 0 fr. 10; viande (150 gr.) ou poisson, 0 fr. 20; desserts variés, 0 fr. 10; café, 0 fr. 10; café avec cognac, 0 fr. 20.

On délivre movennant 0 fr. 15 des jetons donnant droit à l'entrée dans une salle réservée; dans cette salle, on a une serviette et on est servi par un garçon, ec qui n'a pas lieu dans la salle commune.

En 1898, les deux restaurants ont fait 528,950 francs d'affaires ; ils ont distribué chaque jour 12,954 portions à 3,225 clients, dont la dépense movenne n'a pas dépassé 0 fr. 45 par repas. Le bénéfice réalisé s'est élevé à 34,322 fr. soit 6,50/0 du chiffre des affaires. Chaque elient sortant de la maison a done laissé en movenne un bénéfice de 2 centimes 8 divièmes

Dans les bouillons ouvriers, à Lille, le prix de la portion est de 0 fr. 30. La cuisine populaire de Grenoble donne un litre de soupe, ou 130 grammes de viande, ou une portion de légumes pour 0 fr. 10, et un quart (125 grammes?) de pain pour 0 fr. 05.

La euisine ouvrière de Bruxelles vend : 1 litre de soupe, 0 fr. 10; 100 grammes de pain, 0 fr. 05; 120 grammes de viande, 0 fr. 20; 200 grammes de pommes de terre, 0 fr. 20; 200 grammes d'autres légumes, 0 fr. 20, etc.

A Mulhouse, le restaurant ouvrier donne un repas complet (soupe, bouf, légumes et pain) pour 0 fr. 50.

302 nygiène

En Allemagne, los cuisines populaires qui sont nombreuses et en général bien achalandées, livrent des repas complets du matin et du soir, au prix moyen de 60 à 80 pf. (75 centimes à 1 franc), lo prix de revient brut (par conséquent non compris les frais de préparation, les frais généraux et le bénéfice) étant d'environ 25 à 30 pf. (31 à 38 centimes). Voici, d'après Munk et Voit, la composition, par tête, de quelques-uns de ces repas.

1º REPAS DE MIDI

A. Menus de l'Allemagne du Nord :

a. Porc aux pommes de terre et aux choux; coût brut, 38 centimes: 1/5 téte de choux; 180 grammes de viande de porc; 75 grammes de pain; 17 grammes de saindoux; 12 grammes de sel; 600 grammes de pommes de terre.

b. Bouf aux harieots et aux pommes de terre; coût brut, 35 centimes: 150 grammes de viando de bœuf; 100 grammes de haricots blanes; 500 grammes de pommes de terre; 22 grammes de saindoux: 15 grammes do sel.

e. Mouton aux choux ot aux pommes de terro; coût brut, 35 centimes: 200 grammes do viande de mouton; 50 grammes de choux verts; 600 grammes de pommes de terro; 60 grammes de pain; 10 grammes d'oignons; 25 grammes de saindoux.

d. Hareng salé et pommes de terre au lard; coût brut, 31 centimes : 1 hareng (poids variablo); 25 grammes do lard; 800 grammes do pommes de terre; 7 grammes de sel.

B. Menus de l'Allemagne du Sud :

a. Soupo aux petitis pains, beuf aux haricots blanes et aux pommos de torre; cont brut, 43 ceutimes : 50 grammes do petit pain; 20 grammes de graisses; 100 grammes de viande de bœuf; 80 grammes de haricots blanes: 10 grammes de farine; 150 grammes do pommes de terre; 80 grammes de pain.

b. Soupe aux pommes de terre et pore à la choueroute; coût brut, 38 centimes : 180 grammes de pommes de terre; 10 grammes de graisse; 75 grammes de farine: 150 grammes de porc : 350 grammes de choucroute : 80 grammes de pain.

2º Repas du soir

- a. Hachis aux pommes de terre sautées; coût brut, 20 centimes : 250 grammes de pommes de terre ; 10 grammes de graisse ; 80 grammes de hachis de viande ; 180 grammes de pain.
- b. Soupe au gruau de sarrasin et saucisse (ou bondin); coût brut, 25 centimes : 1/3 litre de lait; 60 grammes de gruau de sarrasin; 100 grammes de saucisse ou boudin; 160 grammes de pain.
- c. Harengs salés aux pommes de terre et au beurre; coût brut : 21 centimes : 1 hareng (poids variable) : 300 grammes de pommes de terre; 7 grammes de sel; 18 grammes de beurre : 120 grammes de pain, etc.
- Il suffit de multiplier cette ration individuelle par le nombre moven des repas quotidiens que l'on est appelé à scrvir, pour avoir la quantité totale des denrées nécessaires. déchets d'épluchage déduits.

Il ne faut pas croire que la cuisine, faite, d'après les principes et les calculs qui précèdent, dans les bouillons ouvriers et restaurants populaires, soit peu appétissante et mauvaise au goût. Au contraire, elle est généralement saine, propre et savourcuse et bien supéricure, à ce point de vue, à celle de maints établissements, qualifiés également de bouillons, tables d'hôtes, etc., où le bon marché n'est qu'apparent, la qualité médiocre des denrées, masquéc par d'incendiaires épices, compensant et au-delà l'abaissement des prix. Dans les quelques cuisines ouvrières que j'ai eu l'occasion de visiter et où j'ai mangé, tant en France qu'à l'étranger, la nourriture m'a toujours paru passable et meilleure, en tout cas, que dans les restaurants moyens (de 2 fr. 50 à 4 francs par repas). Ce qui manque évidemment surtout, c'estle décor, les glaces, les lustres, les lanquettes de velours, la fausse argenterie, et les garçons ou les filles en tablier blanc. Mais si l'on songe que, au point de vue hygiénique et gastronomique, ce décor n'est d'acuenu utilité et qu'il représente les 3/4 de la somme payée, 1/4 au plus figurant comme valeur réelle des aliments consommés, on ne manquera pas de reconnaître que la cuisine populaire est bien plus avantageuse, quand elle reste fidèle à son but hygiénique et social. C'est pourquoi les cuisines populaires, ou, tout au moins les principes qui leur servent de base, tendent de plus en plus à se répandre, au grand bénéfice des consommateurs.

CHRONIOUE

Les poisons dans l'histoire

Par le De Cabanès.

(Suite.)

Nous avons produit jusqu'à présent maints témoigranges, les uns en faveur de Bonaparte, les autres contre lui. Mais le principal témoin est celui qui nous reste à faire comparaître : c'est le médecin Desgencites, dont le général en chef avait réclamé tout d'abord le concours.

Il est à remarquer que dans la première édition de son Histoire médicale de l'armée d'Orient, publiée en 1802, sur l'invitation du Premier Consul, auquel elle fut dédiée, il n'est nas du tout mestion de l'incident. Lorsque parut la deuxième édition, en 1830, l'auteur était tenu à moins de réserve; aussi lit-on, dans la préface de cette édition nouvelle : « Celle-ei est conforme à la première, si ce n'est que l'on y frouvere quelques notes qui NE POUVAIENT PARAITES AYANT 1821. »

Parmi ees notes, il en est une qui mérite d'être tout au long rapportée. On en comprendra l'importance après l'avoir lue (1).

Le temps est venu (2), écrit Desgenettes, de s'expliquer sur un fait important.

Le général Bonaparte m'avait fait appeler le même jour, 27, do grand matin, sous sa tente, où il était seul avec son chef d'état-major. Après un court préambule sur notre situation, il me dit : « A votre place, je terminerais à la fois les souffrances de nos pesifiérés, et je ferais cesser les dangers dont ils nous menacent en leur donnant de l'opinu. »

Je répondis simplement : « Mon devoir, à moi, c'est de conserver. » Alors le général développa sa pensée avec le

C'est la note h de la page 245, de l'Histoire médieale de l'armée d'Orient, édition de 1830.

^{(2) «} Je dois m'expliquer iei sur une odieuse imputation dont le général Bonaparte a été l'objet depuis longtemps : je veux parler du prétendu empoisonnement des soddats attaqués de la peste.

[«] Il est tellement contre toute vérité, que le général Donaparte air proposé de faire empisionner ces malleureux, que N. Larrey, chirurgien en chef de l'armée, n'a cessé de déclarer que c'était une calonnie artoce et qu'il en propase plusieurs fois à M. Deagenettes, depuis quinze aus, de protester par la roie de la presse, conjointement acce lui. Céclaite, maltruité par le gouvernement regul, a sans douter ecculé denant une déclaration qui currait pu rendre su position plus pénible. En outre, il est impossible de trouver un homme à qui cette proposition ait été faite; cafin, este calonnie a été répandue un crit de sir lobert Villeau, qui était for june alors, et que de un un égre plus môr, a échach hautement qu'il s'était trompé. » Mémoires et sourenirs du connte de Lacalette, t. l. n. 242.

plus grand calme, en disant qu'il conseillait, pour les autres, ce qu'en pareil cas il demanderait pour lui-même.

- Il me pria d'observer aussi qu'il était, avant qui que ce fût, chargé de la conservation de l'armée, et par conséquence d'empécher nos malades délaissés de tomber vivants sous le cimetère (sté) des Tures.
- « Je ne cherche pas, continua-t-il, à vainere vos répugnances, mais je crois que je trouverai des personnes qui apprécieront mieux mes intentions.»
- Le général Berthier resta muet pendant ect entretien, mais il me témoigna, un instant après, qu'il approuvait mon refus.
- Ce ne sut, au reste, qu'à notre retour de lassa, et nulle part ailleurs, que je puisse attester que l'on donna à des pestifèrés, au nombre de 25 à 30, une forte dosc de laudanum. Quelques-uns le rejetérent par le vomissement, furent soulagés, guérirent et reaconférent tout ce qui s'était passe.

Ce qui eut lieu dans la première séance de l'Institut d'Egypte au retour de Syrie, et oû les torts furent réciproques, a ôté assez connu. Le Premièr Consul ne parut pas s'en souvenir, et de grands témoignages de confiance ont prouvé que PEmpreur Parait oublié.

Les déclarations de Desgenettes sont dépourvues de toute ambiguité. L'accusation portée contre Bonaparte peut avoir été exagérée, ou, pour mieux dire, amplifiée par l'esprit de parti; elle repose sur un fonds rigoureusement exact.

Il n'est pas question, on le voit, du pharmacien qui no cruignait pas d'assumer la responsabilité que le, médecin en chef avait déclinée. Il nous semble, après examen impartial, qu'on l'a chargé bénévolement. L'intention de Bonaparte, a-t-on écrit, était de faire administrer aux pestiférés l'opium en dose suffisante pour qu'ils fussent endormis au moment du départ de l'armée, afin de lui épargner le spectacle de leur désespoir; le pharmacien Royer aurait outrepassé ses ordres.

Mais on oublie que, sous Bonaparte général en chef, comme sous Bonaparte consul, et sous Bonaparte empereur, aucune mesure ne fut impunément prise sans son ordre ou sans son aven.

Si Royer, de lui-même cût eu recours à l'opium pour priver d'un reste de vie einquante moribonds, une élettante satisfaction cût été donnée à l'armée: il ent payé de sa tête, non pas sculement le crime, s'il avait eu l'intention d'empoisonner, mais même l'înexpérience, s'il n'avait voulu qu'endormir les malades.

Cependant, aucune recherche ne fut faitc et aucune poursuite ne fut excreée contre lui; il continua ses fonctions et ne cessa, ni sous Bonaparte, ni sous ses successeurs, d'être le pharmacien en chef de l'armée d'Égypte (1).

Bonaparto était trop autoritaire pour laisser entamer, par qui que c fût, le pouvoir absolu qu'il prétendait excreer. Quand il prenait une décision, il en revendiquait toute la responsabilité, et s'il paraissait solliciter l'avis de son entourage, il était d'avance résolu à s'en passe;

Donc, ne cherchons pas de ce côté une circonstance atténuante au forfait qui lui est reproché. Essayons plutôt de l'expliquer, puisque nous ne nous sentons pas le courage de l'absoudre.

Il no s'agit point, pour un historien, dit l'abbé de Montgaillard, de diseuter tranquillement dans son cabinet la moralité d'un tel ordre. Ecrire après un événument, à mille lieues de distance où il s'est passé, d'après des rapports infidéles, en s'abandonnant, même sans le vouloir, à l'esprit de parti, d'est s'exposer à de graves méprises et s'écarter des devoirs

⁽¹⁾ L'Empereur et le duc de Rorigo, p. 29-30.

d'un véritable historien; avant de prononcer un jugement, il doit s'assurer de l'état des choses, considèrer les temps, peser les circonstances, examiner les n'écessités qui portent à ordonner un acle que réprouvent l'humanité, la religion, la morale.

٠.

La morale est une, avons-nous besoin de le proclamer, et là-dessus notre conviction est formelle. Nous ne nous porterons donc nullement garant des opinions formulées en termes différents, mais analogues quant au fond, par deux compagnons d'armes de Bonaparte, et, constatation qui n'est pas superflue, tous deux ses ememis!

On a souvent reproché au général Bonaparto deux actions, cérit Marmont (1): l'empoisonnement de quelques pestificrés, abandonnés lors de sa retraite, et le massacre des prisonniers faits à Jaffa. Le prends bien grutatiement la défense de ces deux actés auxquels je suis complètement étranger, mais ils me paraissent si simples, que je me laisse entraîner par la conciction, dans l'espérance de les institients.

Des hommes animés d'une fauses philanthropie out égaré l'opinion à cot égard. Si on réflechit à ce qu'est la guerre et aux conséquences qu'elle entraîne, conséquences variables stivant le pays, les temps, les mœurs, les circonstances, on ne peut blaimer des actions qui, Jose le dire, out été commandées par l'humanité et la raison : par l'humanité, car chacun de nous placé dans la situation où étaient les pestiferés, ne pouvant être emportés, devant être abandomés, au moment même, eutre les mains de barbares qui devaient les faire nourir dans des tourments horribles; chacun de nous, disje, placé dans de pareilles circonstances, serait satisfait de finir quelquos heures plutôt et d'échapper à de pareils tourments.

⁽¹⁾ Mémoires du maréchal Marmont, duc de Raguse, p. 12 et suiv.

Car quels reproches n'aurait-on pas à faire à un général si, par un faux motif d'humanité envers ses ennemis, il compromettait le salut de son armée et la vie de ses soldats?

« En Europe, il y a des cartels d'échange; afin de ravoir ses soldats prisonniers et leur sauver la vie, on a soin de ceux qu'on fait. Mais avec des barbares qui massacrent, on n'a rien de mieux à faire que de tuer. Tout doit être réciproque à la guerre, et, si, par un sentiment généreux, on n'agit pas toujours à la rigueur, il faut se borner aux circonstances qui n'offrent aucun inconvénient; or, ici, ce n'est pas le cas. Un général ne serait-il pas criminel de faire vivre des ennemis aux dépens de ses troupes manquant de pain ou de rendre la liberté à des prisonniers pour qu'ils viennent de nouvoau combattre? Le premier dovoir d'un général est de conserver ses troupes, après avoir assuré le succès de ses opérations ; le sang d'un de ses soldats , aux veux d'un général pénètré de ses devoirs et faisant son métier, vaut mieux que celui de mille ennemis, même désarmés. La guerre n'est pas un jeu d'enfants, et malheur aux vaincus !

de no puis donc comprendre commont des gens sensés ont pu faire de la conduite tenue en cette circonstance par lo général Bonaparte, l'objet d'une accusation. L'incendie du Palatinat, sous Louis XIV, est bien autre chose, et cependant s'il était utile au but qu'on se proposait, il était légitime. Il faut seulement s'attendre à la représaille, si los circonstances en fournissent l'occasion, et voir si, par un calcul faux, on ne risque pas de perdre plus qu'on n'a gagné d'abord : voilà toute la règle de conduite dans une pareille affaire. Quant à ce qui so passa alors, il ne peut pas y avoir deux opinions parmi les gens de guerre. Je suis aussi philanthrope qu'un autre, plus lummain que beaucoup de gens, et je n'hésiterais pas à agir de la mème manière en circonstance semblable.

Bourrienne se montre tout aussi indulgent dans ses appréciations, lui qui, en d'autres endroits, n'a pas été tendre pour son ancien maître.

Il y avait à peine une soixantaine de pestiférés, écrit Bourrienne. Tout ce que l'on a dit au delà de ce nombre est exagéré. Leur silence absolu, leur complet abattement, une atonie générale annencaient une fin prochaine. Les emmoner dans l'état où ils étaient, c'était évidemment inoculer la peste dans le reste de l'armée, J'ai, il est vrai, appris, depuis que ie suis revenu en Eurepe, que quelques personnes touchaient impunément les pestiférés, voire même que d'autres s'inoculaient la peste pour guérir ceux qui en étaient atteints ! C'était une bien grande protection du ciel d'en être préservé; aussi. pour dissimuler un peu l'absurdité d'un pareil conte, on ajoute que l'on savait éluder le danger, et que ceux qui ont voulu le faire sans précaution en sont morts. Toute la question, en effet, est là. Ou ces êtres privilégiés pronaient des précautions sévères, et alors leur héroïsme est une farce des boulevards, ou ils les touchaient sans précautions, et s'inoculaient la pesto en affrontant surement la mort, et alers c'est un conte.

On confia les pestiférés, a-t-on écrit, au pharmacien en chef Roger qui, mort en Egypte, a emporté le secret dans la tombe, trois aus après le départ de l'armée française. Mais, que l'on veuille bien réfléchir que laisser Roger seul à Jaffa, c'était évidemment vouer à une mort certaine, prompte et cruelle un homme utile et bien portant. Car on ne pouvait lui laisser aucune garde, les Tures étaient toujours sur nos pas, et Bonaparte dissint avec raison, en traverant les salles de l'hópital, que dans une heure les Tures seraient à Jaffa. Etait-ce avec cette conviction qu'il aurait laissé le pharmacien en chef dans ectte ville?

Quand un historien n'a pas vu un fait, qu'il y a un désaccord, on deit pencher pour ce qui est le plus vraisemblable dans les assertions contradictoires, et s'aider des antécédents...

On a dit, par exemple, que l'on embarqua les pestiférés sur des vaisseaux de guerre; mais il n'y en avait pas. Et où ent-ils débarqué ? Qui les a reçus ? Qu'en a-t-on fait ? personne n'en parle.

D'autres qui, no deutant pas que ces pestiférés ne soient merts à Jaffa, disent que l'arrière-garde, commandée par Kléber, retarda par erdre de Benaparte son départ de treis jeurs, et ne se mit en marche que lorsque la mort eut apperté un terme aux seuffrances de ces infortunés, dent aucun sacritice n'abrégea la durée. Els bien, cela est teut à fait inexact. On ne laissa point d'arrière-garde : on ne le pouvait pas. On feint toujeurs d'oublier que les remparts étaient détruits, que la ville était euverte comme un village et sans aucune espèce de défense : e'eût été livrer cette faible arrière-garde à uno destruction certaine. Les dates mêmes sent centraires à ces suppositions. Il est certain, et on peut le veir dans la relation officielle, que nous arrivâmes à Jaffa le 21 mai, que nous y séjeurnames les 25, 26 et 27. Nous en partimes le 28. Dene. l'arrière-garde qui, selen les auteurs, partit le 29, ne resta pas, même dans leur hypothèso, treis jours après l'armée. pour voir meurir les malades. Mais elle partit, en effet, le 29 mai, un jeur après nous.

Veici les propres expressiens du major général, écrites sous les yeux et par erdre du général en chef dans sa relation efficielle:

- « L'armée arrive le 5 prairial à Jaffa (24 mai), et en y « séjourna les 6, 7 et 8 (25, 26 et 27 mai). Ce temps est em-
- « ployé à punir les villages qui se sent mal conduits. On fait
- « sauter les fertifications de Jaffa. On jette à la mer toute
- « l'artillerie en fer de la place. Les blessés sont évacués par
- « mer et par terre; il n'y avait qu'un petit nombre de bâti-
- « ments, et, pour donner le temps d'achiever l'évacuation par « terre, l'en est ebligé de différer jusqu'au 9 (28 mai) le
- « départ de l'armée.
- « La division Kléber forme l'arrière-garde et ne quitte « Jaffa que le 10 (29 mai). »

On remarquera que dans ce rapport il n'est pas dit un

mot dos pestiférés, pas un mot do la visite à l'hôpital et de l'attouchement inoffensif des pestiférés. On n'en parla dans aucun rapport officiol. Pourquoi co silence ? Bonaparte n'était pas un homme à taire un fait qui lui éti servi, avec raison, d'un beau texte pour parler do as fortune. Si l'on a évacué les pestiférés, pourquoi ne pas le dire ? pourquoi se taire sur n'évônément aussi important? Mais il fallait avouer encere que c'étaient les suites do cette malheurouse expédition qui forraient à cette mesure. Il fallait donner des dôtails qui répugnaient. On a mieux aimés et aire.

Jo n'ignore pas qu'il y a beaucoup de versions sur ce fait que l'on aurait pu franchement avouer, en prouvant en même temps son indispensable et cruelle nécessité. Mais, moi aussi, je viens de dire ce que je crois avoir été vrai alors, ce que je crois vrai aujourat'hui. Jo ne puis pas dire que j'ai eu donner la potion, je mentirais. Je ne puis done nommer personne, sans lusarder une chose inexacte. Mais je sais bien pusitivement, que la décision a été prise après délibération, que l'ordre en a été donné, et que les pestiferés sont morls; co que je garantis peur sevir à découvrir la verité (1).

Quoi! co dont s'entretient, des le londemain du départ de Jaffa, tout le quartier général, comme d'une chose positive; ce dont nous parlions comme d'un épouvantable malheur; ce qui était répandu dans l'armée par la voix publique; ce qui était répandu dons l'armée par la voix publique; ce qui était régarde comme un fait dont en so demandait seuloment les détaits sans même pensor à le mettre en doute (et j'en appelle à tous les hommes de bonne foi qui étaient présonts), sorait devenu une atroce invention pour unire à la réputation

⁽¹⁾ Mais à quoi aboutira cette vérité? A prouver l'impérieuse nécessité de l'action, et l'on serva réduit à se dire qu'il y avait plus d'humanité que de barbarie et de cruaulté à administere ce soportifique.

Mais nier la chose, c'est nier l'evidence. La vérité n'est pas, quoi qu'on dise, dans le consentement du grand nombre. Tous les peuples ont cru à l'astrologie, aux influences de la lune, jamais le petit nombre de gens sensés. (Note de Bourrienne.)

d'un héros qui, si l'on n'avait que ce reproche à lui faire, irait bien sûr à la postérité.

Les opinions changent acce le temps et l'afirme que, sans le pouvoir immense que Bonaparto a conquis quelques mois après cet événement, ce ne serait aujourd'hui qu'un fait historique sur la nécessité duquel seulement on raisonnerait bien ou mal.

Il serait très possible que ceux qui ont contribué dans le temps à cet acte de dévouement avec la plus grande conviction de sa nécessité aient réclamé depuis avec le plus de force courre ce dont on a fait plus tard un crime. Qui sait "ils ne se vanteront pas ensuite, comme d'un acte de pitié et d'humanité, de ce qu'ils appellent aujourd'hui un acte de cruanté.

Après Bourrienne, écoutons Napoléon lui-même, qui s'en est expliqué dans le Mémorial de Sainte-Hélène. A l'entendre, Bonaparte ordonna d'examiner ce qu'il y aurait de mieux à faire. Le rapport fut que sept à huit hommes étaient si dangereusement malades qu'ils ne pouvaient vivre au delà de vingt-quatre heures; qu'en outre, atteints de la peste comme ils l'étaient, ils répandraient cette maladie parmi tous les soldats qui communiqueraient avec eux. Plusieurs demandèrent instamment la mort. On pensa que ce serait un acte de charité de devancer leur mort de quelques heures.

Et Napoléon ajoute : « Je ne fais pas de doute que cette histoire d'empoisonnement n'ait été faite par Den... (Denon, probablement), qui était un bavard : on l'aura mal entendue et mal répétée ensuite. »

Enfin, il termine par ces mots :

« Je ne pense pas que c'eût été commettre un crime que de donner de l'opium aux pestiférés. Au contraire, c'eût été obéir à la voix de la raison. Quel est l'homme qui n'aurait pas préfèré une mort prompte à l'horreur de vivre exposé aux tortures les plus affreuses de la part de ces barbares? Si mon fils, et cependant je crois l'aimer autant qu'on peut aimer son enfant, était dans une situation pareille à celle de ces malheureux, mon avis serait qu'on en agit de méme; et si je m'y trouvais moi-même, j'exigerais qu'on en agit ainsi envers moi. »

Eh bien, ce raisonnement qu'il fit à Sainte-Hélène, conclut Bourrienne, n'est que la répétition de celui que chacun faisait vingt ans auparavant à Jaffa et que Bonaparte fit lui-même.

Cela prouve simplement, conclurons-nous à notre tour, que la morale des hommes d'État n'est pas celle des particuliers, et que la mentalité des pasteurs de peuples a des abines qui emplissent d'effroi ceux qui ont la curiosité de s'y nencher.

D' CABANÈS.

13 décembre 1900.

BIBLIOGRAPHIE

A propos du livre de G. Pouchet: Leçons de pharmaeodynamie et de matière médicale. Un vol. in-8°. O. Doin, Paris, 1901.

Je viens de lire avec un vif intérêt et un très grand profit le deuxième volume des Leçons de pharmaeodynamie et de matière médieale, professées par G. Pouchet à la Faculté de médecine. Ce deuxième velume cemprend l'étude des hypnetiques et des modificateurs intellectuels.

Parmi les hypnetiques, M. G. Pouchet étudie : le Sulfonal, le Trional, l'Hydrate d'Amylène, la Paraldéhyde, l'Uréthane, auxquels il consacre quatre leçons; mais la partie la plus impertante du livre, seit trente leçens, est consacrée aux medificateurs intellectuels : l'Alcool, l'Opium et le Chancre indiren.

Il scrait à désirer que ces Leçeus fussent lues par teus coux qui ont encere quelque seuci de la thérapentique; ils y puiscraient des connaissances indispensables aux esprits qui, lorsqu'ils font quelque chose, veulent se rendre compte de ce mils font.

Si la thérapeutique semble encore aussi incertaine à la majerité des médecins, cela tient beauceup à leur tetale iguerance de la pharmacedynamie. Ils pouvaient répendre jadis, et avec juste raisen, que cette ignerance était bien légitime, puisou'il n'existait vraiment aucun euvrage d'ensemble eù l'en pût étudier la pharmacodynamie. En effet, en dehors de l'ouvrage allemand de Binz, de la première partie du Traité de pharmacelegie de Lauder-Brunton et des Lecens de Steckvis, d'Amsterdam, la littérature médicale est bien restreinte. En France, elle était teut à fait nulle avant les magnifiques lecons de G. Peuchet. Mais celles-ci mettent si bien au peint le mécanisme des actiens médicamenteuses et jettent une telle lumière sur les effets preduits par tel médicament sur les diverses activités organiques qu'elles constituerent peur ceux qui veudrent bien se denner la peine de les lire, nen seulement une véritable révélation, mais un guide aussi sur que facile à suivre.

La méthode de G. Pouchet est simple et physiologique.

Prenens par exemple le sulfonal. L'auteur cemmence par mentrer l'impertance que la structure méléculaire de certaines substances erganiques exerce sur l'actien médicamenteuse que l'on est en dreit d'espérer de ces substances. Parmi les radicaux aleooliques, le radical éthyle pesséde par lumême une action hypnotique, et lorsqu'on cembine avec lui certains corps simples ou certains radicaux composés, comme du résidu SO3, on s'aperçoit que la combinaisen de ces éléments avec le radical éthyle exalte dans une forte mesure ses prepriètés hypnetiques. Un tableau représente les fornules de constitution d'un certain nombre de ces dérivés sulonés possédant des prepriétés hypnetiques et fait saisir la succession des métamorphoses que subit la molécule originaire de l'aleoel pour abeutir au létronat, le plus énergique et le plus texique de cette série d'hypnotiques.

L'action du médicament étant ainsi déduite de sa construction chimique, G. Pouchet étudio ses caractères physiques, sa solubilité, les agents qui l'accroissent et la diminuent. Il montre, entre autres, qu'il faut de une à deux heures pour dissoudre 0°75 de suifonai dans 100 centimètres cubes de sue gastrique à la température de 38 à 40 degrés. Tout ecci est très important peur le praticien, puisque cela lui approud que le suifonal doit être administré au moment des repas, alors que le sue gastrique en plus grande abondance peut porter sa solubilité au maximum. Cette selubilité sera facilitée encore si l'on prescrit, aussitôt après l'administratien, l'inecstien d'une boisson très chaude.

Puis la façon dont s'élimine le suttonat par l'urine prouve que ses molécules se détruisent complètement dans l'organisme et que son soufre se combine à des matériaux de nature prebablement albuminoide. Ceci importe encore, puisque celamontre que les doses médicamenteuses de sutjonal n'entravent pas le métabelisme des tissus azotés mais que des doses trep fertes peuvent accèlerer la destruction des tissus azotés.

Après cette étude chimique du médicament, G. Pouchet le retourne en teut sens au point de vue de son actien physiologique. Le sulfonal agit sur la metilité, sur la sensibilité; il produit le sommeil, il ralentit la respiration — c'est un dépresseur norveux. Et do cette étude plysiologique serrée dont je no puis donner les détails et qui est à lire tout entière, M. Pouchet conclut que le sulfonal exerce son action d'uno façon élective sur la substance grise corticale et plus spécialement peut-être sur celle du cerrelet.

Jo regrette vivement de ne pouvoir insistor sur ce chapitre de l'étude physiologique qui précise si nettement le mode d'emploi chimique du sutfonat. Prenez un médecin qui ait plus ou moins au hasard ordomé le sutfonat dans sa prastique sur l'indication d'un formulaire, qui ait tantot réchoué, qui ait été quelque peu impressionné par ses insuccès et les accidents qu'il a pu obsorver, et faites lui lire co chapitre du livre de G. Pouchet. Aussitot tout s'éclairera. Il comprondra le pourquoi de ses insuccès et de ses réussites, et dans l'avenir, au lieu d'agir à peu prés au hasard, de donner le suffonat quand l'opium no réussit pas ou réciproquement, il pourra diriger son choix avec des chances de probabilité qu'il n'avait pas soupcomées jusque-là.

Or, tout le livre de G. Pouchet est conçu dans cet esprit. l'ai chois i l'exemple du sutfonat parce qu'il constitue le chapitre le plus court, et encore, n'ai-jo pu qu'effleurer très superficiellement les nombreux faits qu'il met en œuvre et les multiples indications qu'on o peut tirre.

Les leçens consacrées à l'aleool et à l'opium ont plus d'ampleur. Elles méritent d'être lues en entier, la plume à la main.

Je creis rendre service aux lecteurs du Bulletin de Thérapeutique qui s'intéressent à la thérapeutique vraiment scientifique en leur recommandant l'ouvrage de G. Pouchet qui est le premier et le seul de son genre dans la littérature médicale française.

A une époque où l'on vit beaucoup sur les idées des autres, où les préoccupations doctrinales l'emportent trop souvent sur l'observation des faits, où la pauvreté des idées personnelles se revêt de fastueuses éruditions, le livre de G. Pouclut marquera une utile réaction, car il ne se berup pas à enregistrer, - il discute. Quand il cite un autour, en voit qu'il l'a lu. L'opinion de cet autour, quel qu'il soit, ne devient un argument que si le fait avancé résiste à la critique, et ce côté personnel, vivant, original, est un des grands intérêts de cette œuvre qui fait à sen auteur et à la Science française le plus grand henneur.

Albert Rebin.

REVUE DES TRAVAUX FRANÇAIS ET ÉTRANGERS

Gynécologie et obstétrique.

Traitement des trauchées atérines par le salophème. — Les tranchées utérines, c'est-â-dire les contractions deulourouses du nuscle utérin pendant le post partam, dit M. Audebert (de Teulouse), Gazette hebdo. de méd. et chir. décembre 1990, sont erdinairement hénignes et de peu de durée. Elles ent une utilité physielegique et servent à chasser hors de l'utérus tout ce qu'il renferme : sang, débris de l'œuf. A ce titre on doit les respecter quand elles sent peu intenses et se contenter d'un massage léger qui aide à l'expulsion des caillets.

Dans les cas cû elles acquièrent une intensité et une persistance telles qu'elles amènent de l'insemnie, de l'agitation, parfois même du subdélire, un traitement devient indispensable

Au nombre des médicaments les plus fréquemment employés il faut compter l'epium sous toutes ses fermes et en particulier l'injection hypodermique de merphine et les lavements laudanisés. La médication opiacée, dontl'action calmante est incontestable, est passible do doux reproches : elle supprime les contractions utérines et leur action embelique pourtant nécessaires à l'écoulement normal des lochies et de plus elle provoque, si colle est continuée pendant quelque temps, une constipation qui n'est pas exempte de dangers chez une nouvello accouchée.

Pour ces deux motifs il vant mieux s'adresser à d'autres médicaments, et ou pout prescrire du chloral en lavemants, de la teinture de Viburnum prunifolium (de 50 à 60 gouttes dans les 21 heures), ou mieux encore de l'antipyrine. Le plus souvent l'absorption de 1 graume ou de 1 gr. 50 d'antipyrine est suivie rapidement de la diminution et bientôt de la disparition des phénomènes doulouveux. Cependant j'ai observé un certain nombro de cas dans losquels l'antipyrine ciait restóo absolument sans action. C'est dans ces cas qu'en pourra recourir à un hypnotique très puissant, le salophéne, que j'emploie depuis plus d'un an et dont l'effet me parait plus sitr, plus fidelo que celui de l'antipyrine.

Lo salophène est un excellent caimant. Il a l'avantage de combattre l'élément douleur et de respecter l'élément contraction; il est facile de s'en assurer en palpant la région bypogastrique d'une femme soumise à l'action du salophène : en voit l'utérus dureir, se rétracter, et copendant la patiente n'accuse aucune sensation douloureuse.

Lo salophène doit être administré à la dose de 1 gramme dans un cachet. Je l'ai toujours vu très bien tolèré. Dans la domi-houre qui suit, les tranchées sont déjà moins intenses; si elles persistent, au bout de deux heures on peut faire prendre un second cachet contonant encore 1 gramme de salophène. J'ai toujours constaté que lo second cachet amenait la sédation demandée, même chez les femmes qui avaient été déjà traitées sans succès par l'antipyrine. Quelquefois la douleur calmèe pendant une journée se reproduit le londemain; elle céde toujours à une nouvelle desse és salophène.

FORMULAIRE

Liqueur des teigneux

(Liègeois.)

Cette vieille préparation a pour formule :

Cônes secs de houblon cultivé... Sommités fleuries sèches de at 40 grammes.

Faire macérer pendant trois semaines, exprimez et filtrez, La liqueur des teigneux rend des services dans le pruigo, les dartres, l'ecthyma, l'acné, l'urticaire, les furoncles, les orgelets qui sont en relation évidente avec la dysepsaie atonique hypopepique compliquée ou non d'état bileux son action « dépurative » est la conséquence des bonnes digestions qui suivent son usage.

Quel que soit le but poursuivi, les doses sont: 20 à 40 gouttes chez les enfants, une cuiller à bouche chez les adultes une demi-heure avant les principaux repas. Dans les dyspepsies et dans les dermatoses d'origine dyspeptique on alternera la préparation de huit en luit jours avec les petites doses de sel de Vichy avant, ou d'acide muriatique après les repas; dans la serofule gangliounaire, dans les serofulides, ands l'impédigo des strumeux on continuera la médicain pendant cinquante jours ou deux mois en supprimant le reméde — pour que l'estomac se repose — pendant une semaine tous les huit jours.

L'Administrateur-Gérant : O. DOIN.

Imp. PAUL DUPONT, 4, rue du Bouloi. - Paris, 1er Arrt. - 58.2.1901 (Cl.)



A l'Académie des sciences, MM. Lertet et Geneud preposent l'emplei d'un appareil très simple pour l'application de la mélhode photolhérapique de Finsen. Au lieu de se servir de l'arc électrique ils utilisent, avec quelques medifications de détail, le condensateur à balleu du cinémategraphe Lumière, L'appareil est de dimensiens très restreintes et peut être meuté n'imperte eù. Il ceusemme à peu près 10 à 12 ampères, alers que, dans le dispositif Finsen, il faut un arc de 70 à 80 ampères.

A l'Académie de médecine, la discussion est euverte sur l'appendicile. A prepos de la cemmunication de M. Dieulafey sur le vemito negre appendiculaire, M. Lucas-Championnière aberde la questien de l'appendicite au peint de vue général et au peint de vue de sen étielegie. Sans creire qu'il s'agisse d'une maladie nouvelle il est cependant hers de deute qu'elle diffère de la typhlite et de la pérityphlite de nes devanciers. Et la fréquence croissante de l'affection deit être la conséquence de l'augmentation des causes d'infection intestinale. Ne résulterait-elle pas du discrédit teut à fait immérité dans lequel sent tembés les purgatifs? M. Lucas-Champiennière, rempant de frent avec la pratique ceurante. recemmande l'emploi des évacuants et la diminutien de l'alimentation carnée peur prévenir ben nembre de cas d'appendicite.

M. Albert Rebin appuie l'epinion émise par M. Lucas-Champiennière sur le rôle de l'alimention carnée excessive TOME CXXXXI 9 LIVE

322 BULLETIN

dans la production de l'appendicite et il rappelle qu'en 1897 il a signalé chez ces malades la fréquence de l'hypersthénio gastrique. Quant aux purgatifs il n'a jamais cessé do les employer.

- A la Société de chirurgie, il est longuement question du traitement des tumeurs malignes par le sérum anticellulaire, autrement dit par lo sérum de Wlaeff. On sait quo ce sérum particulier est obtenu en inoculant des oiseaux avec des blastomyeètes pathogènes, cellules de levures isolées des tumeurs caneéreuses de l'homme. M. Roynier qui l'a utilisé relate avec détails les faits cliniques qu'il a observés et croit pouvoir conclure que le sérum do Wlaeff a une action évidente sur les néoplasmes, démontrée par la diminution do la douleur, les tendances à la régression, par le retour de l'appétit. du sommeil, l'arrêt de l'amaigrissement et quelquefois l'engraissement du malade. Malheurensement cette action n'est pas durable. Comme le fait remarquer M. Wlaeff, si on eosse les injections, on voit le mal, qui a subi pendant les injections un temps d'arrêt, reprendre sa marehe et les malades finissent par succomber. L'action bienfaisante du sérum anticellulaire est incontestable et M. Reynier estime qu'il mérite d'être essavé. Mais on ne partage pas son optimisme et M. Lucas-Championnière en particulier pense que si le sérum de Wlaeff peut améliorer, comme le fait n'importe quel sérum, on n'a pas jusqu'ici obtenu de réelle guérison.
- A la Société médicale des hôpitaux, MM. Gaucher et Bernard sont d'avis que le pronostie de la syphilis fotale n'est pas aussi grave qu'on pourrait le croire, si lo tratiement de la syphilis pendant la grossesse est institué assez tot, s'il est régulièrement suivi et si la médication employée et le mode d'administration de eette préparation sont assez actifs. Los sels mercuriels solubles seront utilisés à l'exclusion de toute autre médication hydrargyrique, le sublimé pour l'usage interne, le benzoate de soude pour la voio sous-

BULLETIN 323

cutanée. Le sublimé sera prescrit en pilules de 1 centigramme, associé à une doso égale d'extrait thébalque; co sont les pilules de Dupuyiren modifices; la dose ordinaire est de deux pilules par jour. Le benzoate de mercure doit étre également empleyé à la dose journalière de 2 centigrammes, en injection sous-cutanée profonde; sa solubilisation est obtenue par le benzoate d'ammoniaque. Quelle que soit la préparation mercurielle employée, on peut avantageusement ajouter l'fodure de petassium à la médication hydrargyrique, comme dans les syphilis graves. A noter que le traitement commence dès le debut de la grossesse ou dès le debut de la syphilis, lorsque celle-ci est postérieure à la conception, doit être continué d'une façon ininterrompue pendant toute la durée de la grossesse.

A la Société de biologie, M. Bard signalo qu'on peut tirer de l'examen des épanchements hémorrhagiques du pérition ou de la pièvre des données préciouses pour le diagnostic de la nature cancéreuse ou tuberculcuse des pleurésies et péritonites chemorrhaqiques dans les pleurésies et les péritonites cancéreuses; en effet, les liquides hémorrhagiques d'origine tuberculeuse, les globules sanguins sont intacts. Aussi suffii-il de soumettre à la centriquation ou à un repos prolongé ces épanchements hémorrhagiques et de rechercher dans la partie du liquide qui reste au-dessus des globules la réaction de l'hémoglobine au moyen de la teinture de gaiae et de l'essence de térébentinie : positive dans le cas de cancer, cette réaction est négative quand il s'agit de tuberculose.

Au Club médical de Vienne, M. Jolles communique un cas d'infosiciation par des bas contenant un composé d'étain. Il sagit d'une jeune fille de 27 ans qui se plaignit de troubles moteurs et sensitifs des membres inférieurs et dont les bas de soie contonaient une grando quantité de chlorure d'étain. L'examen de l'urine permit d'y constater de l'albu-

mine, diverses albumoses et des traces d'étain. Il s'ensuit qu'il peut y avoir danger à mettre directement en contact avec l'épiderme des tissus de soic, ces tissus contenant une forte proportion de chlorure d'étain qu'on y ajoute pour les «charger».

THÉRAPEUTIQUE GÉNÉRALE

Sur le traitement des fièvres.

Par M. Albert Robin

1

Pour M. Lépine, il faut traiter spécifiquement la fièvre, et quand on ne le peut pas, il faut surveiller la réaction de l'organisme, tantôt en la modérant avec les antipyrétiques, tantôt en la stimulant par l'hydrothérapie, enfin, en soutenant l'économie. M. Stockvis déclare qu'on ne doit combattre l'hyperthermie des fébricitants que dans les cas exceptionnels où des symptômes alarmants du côté des grandes fonctions vitales font craindre l'imminence du collapsus. Il faut alors recourir à l'hydrothérapie et à la médication analeptique et s'abstenir des antithermiques et des antipyrétiques.

A ces deux affirmations qui s'accordent sur le traitement spécifique de la flèvre, sur l'importance de l'hydrothérapie, mais diffèrent sur les autres points, on peut opposer une troisième manière de voir qui confirme l'accord et peut servir de terrain de eonciliation pour les points en désaccord. Cette manière de voir s'appuie sur l'étude des échanges dans les fièvres.

п

Dans les réactions fébriles simples, les ocydations générales et les oxydations respiratoires sont augmenties, c'est-à-dire, que le coefficient d'oxydation azotée s'élève, ainsi que les quantités d'0º et de Co² consommées et éliminées par kilogramme-minute. Il en est ainsi dans la searlatine au début, la pneumonie, la grippe et la fièvre typhoïde simple, même quand la température atteint temporairement du degrés.

Au contraire, dans les infections fébriles graves les actes d'oxydation sont relativement diminués, tandis que les actes primitifs de la désintégration organique (hydratations et dédoublements) sont acerus. Je eiterai quatre exemples sentement:

			d'exydation azotée a la période d'éta
10	Pneumonie	franche simple	
	_	plus grave à défervescence le 11° jour seulement infectieuse mortelle	79,6 0/0
2°	Fièvre typh	oīde bénigne	84,7 0/0
	_	rechute bénigne forme grave	72,9 0/0
	_	 trés grave 	72 0/0

3º Infection biliaire avec pleuro-pneumonie. (Échanges respiratoires.)

Pendant les deux premiers jours, avec des températures oscillant de 39 à 40°,3 et un état général très grave, le malade absorbe 4°°,6 d'O par minute et par kilogramme de poids; il rend 3°°,6 de CO".

L'état s'améliore, la température baisse à 37°6-38 degrés; aussitôt l'absorption d'O monte à 7°,3 et 8°,02, l'exhalaison de CO* à 4°,7 et 5 centimètres cubes. Deux jours plus tard, nouvelle poussée fébrile, aggravation de l'état général, symptômes typhoïdes; le malade n'absorbe plus que 4°,02 d'O et ne rend plus que 2°,64 de CO*.

4º Dans la fièvre typhoide, la gravité de la maladie ou l'aggravation passagère entraîne un abaissement des échanges respiratoires dans tous leurs termes.

Je conclus qu'il y a diminution de l'oxydation des principes ternaires et quaternaires de l'organisme dans les infections graves et compliquées d'état typhoïde, tandis que ces oxydations sont accrues dans les cas simples qui évoluent spontanément vers la guérison. Par conséquent, l'indication de l'antépyrèse, telle que la comprenaient ses promoteurs, c'est-à-dire restreindre les oxydations pour abattre la température, cette indication est dangereuse, puisur d'ella garit dans le même sens que la maladie.

Or, les oxydations donnent naissance à des déchets solubles, donc facilement éliminables et dépourvus de toxicité. Les autres actes de la désintégration organique engendrent des résidus peu solubles, donc difficilement éliminables, et toxiques (corps amidés, complexes, leucomaines, etc.). Ces résidus s'accumulent dans le sang et les tissus où l'analyse les a démontrés. Ils sont la cause de l'état typhoide qui peut être subordonné aux termes suivants : désintégration augmentée, oxydation relativement diminuée, rétention des déchets.

La thérapeutique doit avoir pour but de régulariser la destruction organique, afin que les produits de la fonte des tissus, ayant subi une évolution plus parfaite, soient facilement éliminables et aussi peu nocifs que possible.

Ce qui résulte, en somme, de toutes les recherches qui m'ont servi à établir cet exposé, c'est que la seule vraie thérapeutique antipyrétique est celle qui s'inspirera des réactions naturelles de l'organisme à l'encontre de l'acte morbide et qui cherchera à les imiter. Or, quand une maladie infectieuse fébrile guérit, que voyons-nous? Toujours des oxydations augmentées, des éliminations urinaires, intestinales, sudorales, pulmonaires, qui sont en rapport direct avec la masse des destructions organiques, des décharges que j'ai nommées précritiques, qui entralment subitement au dehors d'énormes quantités de déchets toxiques et dont la conséquence est toujours une amélioration traductive de la victoire du terzain

Ce sont ces procédés réactionnels et spontanés de l'organisme en état de défense que nous devons nous efforcer de favoriser par des interventions thérapeutiques qui doivent aboutir, en dernière analyse, à l'élimination des produits toxiques ou à leur destruction par focudation.

L'augmentation de la désintégration, la diminution des oxydations, la rétention des produits toxiques fabriqués par les microbes et de ceux qui proviennent des activités réactionnelles et anormales des cellules vivantes, constituent donc autant d'éléments morbides auxquels pourra s'adresser le traitement de la flèvre. Il en découle trois indications maieures.

III

PREMIÈRE INDICATION. — Diminuer la désintégration sans diminuer les oxydations. Accroître la résistance organique.

La médication analeptique de M. Stockvis répond à cette indication. A côté d'elle, plaçons les agents qui diminuent la désassimilation, et au premier rang la quinine.

Aux doses modérées de 0°,50 et 0°,80 par jour, prises en deux fois, à huit heures d'intervalle, le sulfate de quinine diminue la désassimilation azotée totale et augmente le coefficient d'oxydation; il tend à relever le rapport de l'acide phosphorique à l'azote total, ce qui serait la preuve de son action sur le système nervenx; il diminue le soufre de l'urine de 25 à 20 0/0, tandis que l'azote total ne diminue que de 10 à 20 0/0, ce qui montre qu'elle amoindrit non seulement la destruction des matières albuminoïdes, mais aussi celle des éléments riches en soufre. Et comme il se produit, en particulier chez le typhique, une dénutrition exagérée des principes sulfurés, cette propriété de la quinnie est loin d'être indifférente.

Mais si, au lieu d'employer des doses modérées de quinine, on administre des doses élevées - et j'entends par ce mot des doses dépassant 1 gramme d'un coup - les préparations quiniques diminuent les oxydations d'une manière très sensible et elles restreignent notablement aussi l'absorption de l'oxygène. Par conséquent, les fortes doses de quinine vont tout à fait à l'encontre du but proposé qui est de diminuer la désassimilation sans amoindrir l'oxydation des produits désassimilés. Ce qu'il faut demander à la quinine, c'est donc simplement son action tonique, et on doit se garder de régler son administration sur la température. C'est pourquoi, au lieu des doses massives et troublantes auxquelles la doctrine antipyrétique a habitué les praticiens, ie recommande les doses minimes et fractionnées, Par exemple, 0gr,50 à 0gr,80 par jour, en deux doses, à huit ou dix heures d'intervalle, pendant les dix à quinze premiers jours, alors que la destruction, étant plus active. doit être plus particulièrement combattue.

Les considérations précédentes s'adressent aussi à l'ectrait de quinquina, au café, à l'alcool, etc., à la condition qu'ils soient, eux aussi, employés à petites doses.

Par contre, il faut soigneusement éliminer du traitement des infections aigués tous les médicaments qui ralentissent les oxydations. Et c'est pour cela qu'il importe de faire une sévère revision des moyens actuellement employés, afin de fixer l'action qu'ils exercent sur les combustions.

Tout d'abord, rejetons nettement tous les antipyrétiques actuellement en vogue : actde phénique, résorcine, acétantide, exalgine, phénacétine, salophène, lactophénine, kairine, thalline, autipyrine, sulipyrine, tolyprine, etc. Tous ces médieaments out une action restrictive sur les oxydations, de sorte que la chimie apporte son appui aux cliniciens qui se sont insertis contre leur emploi.

T 7 7

Deuxième indication. — Favoriser les oxydations, puis soutenir l'énergie du système nerveux directeur des échanges.

On favorise directement les oxydations par l'aération, les inhalations d'avygène, et en luttant sans relàche contre les stasses pulmonaires qui rétricissent le champ de l'hématose. Mais il n'y a pas de médicaments caydants qui soient actuellement recommandables. Toutefois, les boissons abouloules et particulièrement le lait agissent dans ce sens.

L'hydrothèrapie, qui stimule l'activité nerveuse directrice des échanges, demeure le meilleur moyen de réaliser cette deuxième indication. D'après les recherches faites avec M. Binet, elle diminue la température en amoindrissant les actes d'hydratation et de dédoublement, premières étapes de la désintégration cellulaire et producteurs de toxines. Elle exagère les actes d'oxydations qui transforment en produits solubles, éliminables, peu nocifs, les toxines bactriennes et celles qui proviennent de la désintégration cellulaire. Elle augmente la tension artérielle, relève l'activité cardiaque et la diurèse, d'où balayage et plus facile expulsion des résidus. Ses effets paraissent s'accomplir par

la voie d'une action réflexe sur le système nerveux, comme semble le prouver le relèvement du rapport urinaire de Ph²0⁵ total à l'azote total. La plus grande quantité de l'O³ absorbé par les tissus pendant l'action des bains froids paraît être l'un des mécanismes à l'aide desquels se relèvent les actes d'oxydation. (L'O³ absorbé par les tissus monte de 360/0.)

v

TROISIÈME INDICATION. — La lutte contre la rétention des résidus organiques. Cette indication comprend quatre termes: Solubiliser les résidus, leur formir un dissolvant qui les entraîne au dehors, maintenir l'énergie circulatoire, assurer l'intérnité des portes de sortie.

1º Le problème de la solubilisation peut être abordé de deux côtés : solubiliser les résidus ou en les oxydant ou en les combinant avec des médicaments qui les solubilisent et les rendent plus facilement entraînables.

Parmi ces solubilisants, le benzonte et le salicylate de soude semblent remplir les conditions nécessaires. Ces deux agents, au lieu de s'oxygéner dans l'organisme, s'y combinent avec des éléments azotés, dont le glycocolle peut être considéré comme le type, et se convertissent en acides azotés beauvoup plus solubles que l'extractif qui entre dans leur composition.

L'acide salicylique se retrouve donc dans l'urine sous forme d'acide salicylarique, et l'acide henzoique sous forme d'acide hippurique. En un mot, on introduit dans l'organisme un composé ternaire, et on retrouve dans l'urine un corps quaternaire qui s'est chargé d'azote au passage.

Avec le benzoate de soude, il faut se garder des doses élevées. On peut calculer qu'en moyenne 75 0/0 de l'acide benzoique ingéré passent dans l'urine sous forme d'acide hippurique; 4 0/0 se retrouvent à l'état de benzoate de soude, et 21 0/0 sont décomposés et s'éliminent par une voie autre que l'urine. Au-dessus de 2 grammes, cette proportion d'acide benzoique inutilisé croît considérablement, d'autant qu'on sait, depuis Th. Weyl et B. von Ancep, que l'organisme des fébricitants transforme l'acide benzoique en acide hippurique avec moins d'intensité que celui des individus sains. La dosse de benzoate de soude variera done entre 2 et 4 grammes. L'irritabilité gastrique et l'alluminurie notable contre-indiquent l'usage du benzoate, parce que J. Jaarsweld, J. Stockvis et F. Kronecker ont découvert que la synthèse de l'acide hippurique était sensiblement diminué dans les néchrites airusé.

Tout ceci s'applique au salicylate de soude; mais celui-ci rencontre une grosse contre-indication dans l'action nocive qu'il exerce souvent sur le rein.

Les acides benzoïque et salicylique ne sont pas les seuls composés qui jouissent de la propriété de fixer de l'azote dans leur passage à travers l'organisme.

Un grand nombre de produits se transforment dans l'économie en acide benzoïque et en acides aromatiques par un procédé d'oxydation, et ceux-ci s'éliminent à leur tour par les urines en combinaison avec le glycocolle.

Le tobiène, le sujène, le méstihylène, le cymène, sont dans ce cas. Il en est de même de l'éthyl et de la propylbenzine, des dérivés bromés, chlorés et nitrés des carbures aromatiques et de plusieurs autres substances aromatiques comme la benzylumine, la benzamide, l'acétophénone, l'acéte cinnamique, l'acide phénylpropionique, l'acide quinique.

Les dérivés substitués de l'acide benzoïque se convertissent aussi en dérivés substitués de l'acide hippurique; tels sont les acides métachloro-benzoïque, métanitrobenzoique, oxybenzoique, qui se retrouvent dans l'urine sous formes d'acides métachlorohippurique, métanitrohippurique, oxyhippurique, dont l'un n'est autre que l'acide salicylurique.

Enfin, les acides toluique, anisique, cuminique, phénylacétique se transforment dans l'organisme en acides analogues à l'acide hippurique. Ce sont les acides tolurique, anisurique, cuminurique, phénacéturique.

Mais en dehors de ce qui a été énoncé au sujet des acides henzoique et salicylique, tout est à faire dans cette direction. Il ne semble pas douteux qu'on ne trouve, parmi les corps dont l'énonciation précède, quelque composé qui jouisse d'utiles propriétés thérapeutiques et dont l'on puisse poursuivre l'application.

Ce qu'il est possible de dire de suite, c'est que les acides métanitro et métachlorobenzoïque ne sauraient êtreemployés à cause de la très faible solubilité de leurs dérivés, les acides métanitro et métachloro-hippurique; les acides tolurique, mésitylénurique, cuninurique, qui se dissolvent aussi dans l'eau avec grande difficutié, neouvent le même reproche. Au contraire les acides paratolurique et phénacéturique, qui passent dans l'urine après ingestion du totol et de l'acide phéruplacétique, sont beaucourp plus solubles.

L'acide méthylsuicylique et ses sels sodiques peuvent étre administrés aux mêmes doses que l'acide salicylique et le salicylate de soude; ils paraissent moins nocifs que ces derniers, mais leur action inmédiate sur la température est aussi moins marquée.

L'acide autsique, dont Bertagnini a déjà étudié les transformations et l'action sur l'organisme peut être ingéré à la dose de 6 grammes d'anisate de soude sans le moindre inconvénient. Il abaisse légèrement la température, mais la plus grande partie de la dose passe inaltérée dans l'urine, et l'acide anisurique formé est en minime proportion. En outre, l'acide anisurique jouit d'une très faible solubilité, ce qui est une contre-indication à l'emploi que nous en voulons faire.

L'acide phénylacétique jouit, d'après Kernieh, de propriétés antiseptiques assez accentuées. L'acide phénacéturique paraît être le seul produit auquel il donne naissunce; il est très soluble dans l'eau chaude et beaucoup plus soluble dans l'eau froide que l'acide hippurique.

Dans l'état actuel de nos connaissances, nous ne pouvons compter que sur les acides benzoique et salicytique, et j'avoue que toutes mes préférences sont pour le benzoate de soude, qui est moins nocif pour l'estonace et qui, à dose égale, entraîne plus d'azote que l'acide salicytique.

Voilà done une étude nouvelle dont les applications s'étendent à toutes les maladies dans lesquelles il est nécessaire de faciliter l'élimination d'extractifs contenus en excès dans les plasmas, et qui ne peut manquer de donnier de féconds résultats, d'autant que la plupart des composés dont il s'agit jouissent aussi des propriétés antiseptiques;

2º La dissolution des résidus toxiques solubilisés est réalisée par les boissons abondantes qui ont aussi une action accélératrice sur les oxydations sans augmenter la désintégration cellulaire:

3º L'hydrothèrapie, le lait et, à l'occasion, les médicaments cardiaques maintiennent l'énergie circulatoire;

4º L'hydrothérapie et les boissons abondantes en augmentant la diurèse et les éliminations cutanées ouvrent deux des plus importants émonctoires;

5º Enfin les purgatifs salins et les irrigations réctales entrainent les matières fermenteseibles et excitent les sécrétions éliminatrices du foie et de l'intestin.

En résumé, d'après la statique chimique des échanges, il y a des fièvres qu'il faut respecter, et il y en a d'autres qu'il faut combattre, non pas en abaissant simplement ce 334 Variétés

symptome extériorisé qui s'appelle l'hyperthermie, mais en modérant la désintégration, en accroissant les oxydations et en obviant à la rétention des résidus, tous éléments qui sont au rang des principales conditions génératrices de cette fièrer neoive.

BIBLIOGRAPHIE DES TRAVAUX D'ALBERT ROBIN,

SUR LA FIÈVRE.

Essai d'urologie clinique. — La fièvre typhoide, 1877. — De l'influence des grandes ingestions de liquides sur les échanges organiques et sur le traitement de l'obésité. Société médicale des hôpitaux de Paris, 1886.

Leçons de clinique et de thérapeutique médicales, 1887. L'antipyrine, son action sur la nutrition, son indication

thérapeutique. Bulletins de l'Académie de médecine, 1887.

Traitement des fièvres et des états typhoïdes. Archives

générales de médeeine, 1888.

Des décharges précritiques dans les maladies aiguës.

Comptes rendus de la Société de Biologie, 1889.

Les échauges respiratoires dans la fièvre typhoide (en col-

laboration avec M. Binet). Archives générales de médecine, 1896.

De l'action thérapeutique de la balnéation froide dans la fièvre typhoide (en collaboration avec M. Binet). Archives générales de médecine, 1896.

Traité de thérapeutique appliquée. - Pascicule IV, 1896.

VARIÉTÉS

Action de l'eau oxygénée sur le sang. — Moyen facile de différencier le sang de l'homme de celui des animaux.

Par S. Cotton.

La propriété bien connuc que possède le sang, quelle qu'en soit l'origine, de décomposer l'eau oxygénée, n'a pas été étudiée jusqu'ici, que je sache, au point de vue du volume d'oxygene dégagé. C'est ce travail que j'entreprends et l'on verra par les premiers résultats obtenus l'intérêt qu'il offre pour la tozicologie et même la physiologie; car il s'ea faut de beaucoup que tous possédent le même pouvoir décomposant, et dans ce nouveau geure de sport c'est le sang de l'homme qui détient le record.

Pour l'intelligence du sujet, passons en revue les propriétés les plus saillantes de l'eau oxygénée et du sang.

Eau oxygénée. - 1º Elle joue le rôle d'acide;

2º Sa propriété la plus caractéristique est d'être un oxydant énergique, tout en agissant d'une manière moins brusque et moins destructive que le chlore et les hypochlorites. C'est pour cela que dans l'industrie elle tend de plus en plus à les remplacer dans le blanchiment des tissus, la meme reison fait qu'elle a detrone le soufre dans le blanchiment de la soje;

3º Su stabilité, à l'etat de pureté, est plus grande qu'on ne le croit communément puisqu'on est arrivé à l'obtenir à 200 volumes;

4º Les alcalis facilitent sa décomposition et les acides minéraux sont favorables à sa conservation.

5º Elle attaque toutes les matières organiques en se décomposant plus ou moins rapidement;

6º Par l'ebullition elle se concentre au lieu de se détruire. On peut ainsi l'obtenir à 30 velumes sans trop de difficulté. Par la congélation on arrive au même but;

7° L'or et l'argent la décempesent en s'oxydant eux-mêmes; mais cemme les oxydes formés sont peu stables, il n'y a en réalité qu'un dégagement d'oxygène;

8º Les corps péroxydés tels que les permanganates et l'acide iodique, en présence de l'eau exygénée, se décemposent en meme temps qu'elle.

Que se passe-t-il en réalité? Les cerps en présence tendent réciproquement à s'oxyder encore, s'arrachant en quelque serte leur oxygène et comme le neuvel exyde de l'un et de l'autre est instable c'est encore l'oxygène qui se dégage. Si le métal qui est en jeu peut produire un oxyde relativement stable capable de résister à l'entraînement, c'est lui qui se forme dans les conditions de l'expérience.

Les permanganates sont dans ce cas. Au contraire, la réduction de l'acide iodique va jusqu'à la précipitation de l'iode puisque ce métalloïde ne forme pas d'oxyde capable de limiter la réaction.

Dans ces décompositions réciproques il y a un dégagement important de chaleur et l'électricité n'est pas étrangère au phénomène;

9º L'eau oxygénée perd plus facilement ses premiers volumes que les autres, ce qui revient à dire qu'elle est d'autant plus stable qu'elle est moins concentrée;

10° Elle se décompose au contact des ferments et des microbes vivants en les brûlant. C'est sur cette propriété qu'est basé son emploi comme antiseptique.

Sang. — La composition chimique de ce liquide est, comme on le sait, variable avec sa provenance.

Le globule lui-même n'est pas un élément aussi uniforme qu'on est souvent porté à le croire.

Outre la forme et les dimensions (1) qui varient avec

a	Homme	(Y)= .=	.0069	
-	Bouf	00.	0059	
	Cheval	00.	0057	
	Chien	00.	0072	
	Chameau	00.	0083	elliptique
	Eléphant	00.	0096	
	Lapin	00,	00713	3
	Mouton	00,	0048	
	Porc	00.	.0060	
	Oiseaux	00.	01518	elliptique
	Grenouille	00.	0226	

Le jeune fœtus a beaucoup plus de globules que le mammifére après sa naissance.

Les jeunes en voie de développement en ont moins que l'adulte. Pendant la vie embryonnaire les globules ont un diamètre presque double de celui de la vie extra-ulérine.

les espèces animales, on peut, avec une grande habitude du microscope y découvrir des particularités sensibles même pour la détermination des sexes.

La plus typique qui ait été signalée est la suivante : Si sur une surface plane, on suppose un certain nombre de pièces rondes, les globules de la femme seront représentés par ces pièces empilées les unes sur les autres; ceux de l'homme par ces mémes pièces jetées pèle-méle.

En anatomie comparée, la même différence, entre le mâle et la femelle, se poursuit dans tout le règne animal; ce qui revient à dire que les globules de la femelle se tiennent sensiblement mieux accolés que ceux du mâle.

Le mode de déformation que subit le globule en se desséchant ou s'altérant peut aussi servir d'indication (1); ainsi celui de l'homme, de méme que celui du cheval, se bossèle dans tous les sens; celui du cobaye se rétracte le plus souvent en rosaco; celui du mouton se plisse sur toute sa surface, etc. On pourrait multiplier les exemples.

Malheureusement ces caractères ne sont pas absolument constants et peuvent s'enchevêtrer les uns dans les autres pour amener parfois la plus grande incertitude.

C'est pour cela que l'examen du sang reste dans le domaine de la micrographie la plus délicate et a été jusqu'ici le privilège de quelques savants tenaces et dévoués.

J'espère que le procédé que je donne n'aura pas cet inconvénient.

⁽¹⁾ Rouvier. — A 50 degrés le globule offre de nombreuses dépressions, étranglements, fornation de petites masses arrondies qui se détachent ou restent fixées par un très mines pédicule. Chauffé à 60-70 degrés et refroidi brusquement il se retourne en forme de calotte.

Le nombre des globules, chez l'homme ne tombe pas au-dessous de cinq millions par millimètre cube sans inconvénient pour la santé.

Procédé expérimental

Marche de l'opération. — Le sang caillé et non battu est exprimé fortement dans un linge jusqu'à ce qu'il ne reste que la fibrine; on a ainsi le sérum et les globules moins la fibrine.

Après avoir rendu le liquide bien homogène par agitation, je mesure 1 centimètre cube dans un petit flacon à large opportune.

D'autre part, je mots dans un flacen de la capacité d'un litre 250 centimètres eubes d'eau oxygénée du comnerce à 12 volumes. Par les transvasements quo nécessito la manipulation cette cau est ramenée à 11 volumes cuviron. On attend du reste qu'il nes dégage plus de bulles.

On laisse alors tombor doucement le flacon contenant le sang et l'ou bouche rapidement. Le gaz ne tardo pas à so dégager et se rend sous la cuve à eau où il est mesuré.

L'opération dure moins d'une heure.

RÉSULTATS OBTENUS MOYENNE DE PLUSIEURS EXPÉRIENCES

culo de sang	minimum	maximum
Homme	580 e.e.	610 e.c.
Cheval	320 -	350 —
Pore	320 -	350 -
Boeuf	165	170 —
Cobaye	115 —	125 —
Mouton	60 —	65 —

Il y a uno petite différence on favour de la femelle et des jeunes. Cette différence serait encore plus prononcée en tenant compte de la numération des globules.

C'est une preuve que la qualité a plus d'influence que la quantité puisque, d'après les auteurs, le sang du mâle est plus riche en globules que colui de la femelle.

Pour la sensibilité de la réaction il est préférable do n'opèrer que sur 1 centimètre cube de sang; les premiers volumes d'oxygène se dégageant plus facilement que les autres, la force de chaque variété de globule se mesure avec un plus grand écart. Do plus, ramenée à cette simplicité, le procédé peut devenir clinique.

Il n'est pas douteux, en effet, que les ehiffres indiqués eidessus se trouvoraient sensiblement modifiés par les maladies graves, surtout colles où un micro-organisme s'attaque aux globules, par exemple, dans la malaria, le eharbon, do même que dans la leucoevthémie.

Il y aurait là le sujet de recherches intéressantes.

Théoriquement, on doit aussi s'attendre à trouver des écarts plus grands avec de l'eau oxygénée à hauto tension.

Cette propriété décomposante va en s'accentuant, pour lo saug de l'homme, pendant les six premières heures de son exposition à l'air comme si le globule avait besoin de se sursaturer d'exygène. Elle reste stationnaire pendant doute à vingt-quarte houres sefon la température ambiante; c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas ou d'altération. Elle va ensuite en diminuant sans cependant atteindre 0.

Le sang des animaux présente cette particularité d'une manière beaucoup plus faible et moins durable.

L'eau oxygônée agit sur le sang non comme sur les permanganates qui ne sont jamais complétement réduits, mais bien de la même façon que sur l'acide iodique; la réduction est compléte, le globule entièrement détruit et décoloré. Il perd tout son oxygênée et l'eau oxygênée une partie du sien.

On peut aussi rapprocher cette action de celle qu'elle exerce sur les ferments et les micròbes.

L'albumine du sérum n'a pas d'action. La fibrino, quoiqu'on en dise, n'agit quo très faiblement lorsqu'elle est réellement débarrassée d'hémoglobine.

Quello explication deuner à ce fait matériel que le sang de l'homme dégage quatre fois plus d'oxygène que celui du bouf, et dix fois plus que celui du mouton. Il y a là évidemment une échelle de mesure de la force vitale des espéces animales et qui peut même avoir un certain rapport avec 340 vaniérée

leur longévité pourvu qu'on établisso la comparaison entre animaux de même ordre et de même régime, ruminants, herbivores, omnivores, etc.

On sait déjà que l'homme est beaucoup plus résistant que les animaux aux décharges électriques et qu'il n'est pas tué par le courant qui foudroie le cheval et le bouf.

Certaines substances étrangères au sang ou faisant partie de ce liquide, agissent ou n'agissent pas pour modifier cetto force décomposante. On peut les diviser en trois catégories.

1º Corps retardants;
2º — indifférents;

3º - accélérants.

Je ne mentionnerai que pour mémoire les coagulants qui teus stérilisent le globule et l'empêchent de fonctionner.

Le chloral, copendant, mérite une mention spéciale. Il n'arrive jamais à éteindre complètement l'action du globule sur l'eau oxygénée. Du sang desséché en présence du chloral et conservé pendant plusieurs années donne eucore de la matière colorante et dégage do l'oxygéne.

1™ catégorie. — Retardants :

Chlorure de sodium,

Eau.

L'eau surtout fait décroître rapidement le pouvoir décomposant. 7 volumes d'eau ajoutés à un volume de sang raménent le dégagement.

Il semble réellemeut que le glebule ne possède toute sen activité qu'autant qu'il est vivant et que sa constitution intime n'a pas subi de modification.

L'eau et le chlorure de sodium ont pour effet d'en extraire l'hémoglobine.

2º Catégorie. — Indifférents. — La plupart des sels neutres ou papier de tournesol, Sulfate de soude,

de magnésie.

Arséniate de potasse.

3º Catégorie. — Accélérants. — Les alcalis et les sels à réaction alcalino :

Borate de soude,

Arséniate de soude,

Cacodylate de soude.

Ils ont pour effet de donner de l'instabilité à l'eau oxy-génée.

L'addition de 1 gramme de ces sels à 1 centimètre cube de sang permot le dégagement de la totalité de l'axygène conteuu dans 250 centimètres cubes d'eau, soit 11 volumes, mais avec le sang de l'homme seulement. Les autres agissent en raison de leur force initiale.

L'alcalinité provonant do l'altération du sang ne produit pas les mêmes effets.

Los déductions à tirer do ees observations sont les suivantes :

1º Lo sang de l'hommo possède un pouvoir décomposant sur l'eau oxygénée bien supérieur à celui des animaux. Le volume dégagé est presque quatro fois plus considérable quo pour celui du bœuf et dix fois aussi fort que pour eelui du moutou;

2º En toxicologie. — Il sera désormais facile de différencior le saug de l'homme de celui des apimaux;

3º En physiologie. — Le sang des animaux transfusé à l'homme serait asphyxique pour ce dernier.

Il en serait de même ontre eux pour les animaux d'espèce différente.

C'est là une nouvello ligne de démarcation entre les espèces aussi importanto que celles déjà admises par Cuvier;

4º En bactériologie. — Les mierobes pathogènes pour l'homme, chez lequel ils acquièrent leur maximum de développement, transportés dans le sang des animauxoù les eonditions de vitalité sont si différentes, deviennent eux-mêmes malades par asphyxie partielle et perdent une partie de leur activité, c'est-à-dire de leur virulence. C'est là le secret des sérums et des virus atténués.

REVUE DES TRAVAUX FRANÇAIS ET ÉTRANGERS

Pharmacologie

A propos des aceidents attribués à l'orthoforme. —
L'orthoforme avait toujours passé pour un médicament
d'une innocuité absolue, presque tous les auteurs l'avaient
considéré jusqu'ici comme une poudre inerte, déunée de toxicité. M. Maillaud, interne du Dr Pollosson, à Lyon, a, le premier, attiré l'attention sur des accidents dus à l'emploi de ce
médicament (Procince médicade, 25 mars 1850). l'aus l'une
des observations de cet auteur, il s'agissait d'une fenume que
l'on avait pansé au moyen de l'orthoforme pour une plaie
vaginale. La malade présenta une très forte-éruption, de plus,
l'état genéral fut troublé : anorexie, céphalalgie; les urines
renfermaient des traces d'albumine; notable élévation de la
température. Toute trace d'orthoforme ayant disparu, grâce
à une aboudante irrigation, les symptômes morbides disparurent aussitôt.

Mêmes accidents chez un malade qui était pansé à l'orthoforme pour plaie du visage. Eruption intense de la face qui fit croire à un érysipèle; disparition des accidents avec la suppression de l'orthoforme.

Ces observations furent suivies d'un certain nombre d'autres (Rollet, Lannois, Michel, etc.). On constata des phènomènes d'intoxication maternelle survenant après l'application d'orthoforme sur les crevasses du mamelon. Le professeur Pouchet a montré que les enfants, allaités par une nourrice dont les crevasses du sein avaient été ainsi pansées, perdaient du poids Tel n'est pas l'avis do Teisseiro (Thèse de Paris. 1898), qui rapporte 29 observations d'enfants allaités dans ces conditions et qui affirme que l'innocuité a été absolue pour la mère et pour l'enfant. A la suite des observations citées plus haut, M. Maillaud a conclu à la toxicité du médicament : d'après M. Villa (Thèse de Luon, 1900) et auteur de l'article que nous analysous (Echo médieal de Luon, nº 6, 15 juin 1900). cette toxicité est réelle, incontestable, mais faiblo; d'après cet auteur. l'eruption no reçoit pas toujours la forme caractéristique décrite par Maillaud, à savoir : des plaques rouge foncé, quelquefois papuleuses, confluentes ou isolées, indolores, ouctueuses au toucher, sans cedome; olle peut consister en uno rougeur intense et diffuse de la poau qui semble indurée, rugueuse, et parsemée de petites vésicules laissant écouler une sérosité plus ou moins abondante, elle peut être, de plus le siègo d'un prurit très intense.

Les accidents généraux, plus rares, simulent le plus seuvent, à s'y méprondre, l'embarras gastrique fébrile,

Des accidents cutanés ont été, également signalés par Brocq comme étant dus à l'emploi de l'orthoforme en pommade à 50/0; par Epstein, de Breslau, et par Portocalis, de Constantinople.

M. Villa cite in extenso, une observation du D^{*} Tixier, de Lyon, dans laquelle une pommade à 10 0/0 d'orthoforme aurait donné des symptômes d'intoxication assez semblables à ceux décrits par M. Maillaud.

Wunderlich (Münch. méd. Woch., 1899, n° 17), puis Miodowski (même jeurnal) ont constaté des accidents de dermatite à forme gangréneuse humide, survenus après l'emploi d'une pommade à l'ortufoforme. M. Vogt, enfin, siguala, le 11 octobre 1899, à la Société de Thérapeutique, une éruption phlycténulaire avec ordeme et rougeur intense simulant une dermite cantharidienne, qui s'était produite sur le thorax d'un malade, après application de pommade ortufoformée.

M. Villa a été frappé de voir combien sont différents les accidents que détermine l'orthoforme chez l'homme, comparativement à ceux qu'il provoque chez les animaux.

Chez l'animal qui a absorbé de l'orthoforme, on observe presque uniquement des symptômes nerveux : agitation. titubation, efforts de vomissements, prostration, paralysie, anesthésie. Villa attribue cette différence d'action du médicament à ce que les conditions dans lesquelles il a pu agir sont très différentes; il met en doute que les accidents cutanés observés chez l'homme soient dus à l'absorption du médicament; il a essavé de reproduire chez les animaux ces éruptions caractéristiques signalées en clinique; mais les résultats furent négatifs sur trois lapins albinos qui lui servirent de sujets. Chez l'un de ces animaux, il associa l'orthoforme au carbonate de soude afin de faciliter sa solubilité en le plaçant dans un milieu aussi alcalin que possible, et e'est seulement dans l'urine de ce lapin ainsi traité, que l'auteur put obtenir la réaction des produits diamidophénoliques (coloration noire par adjonction de quelques gouttes de perchlorure de fer), prouvant que l'animal avait réellement absorbé une certaine quantité d'orthoforme appliqué sur la plaie qui lui avait été faite.

L'auteur, eu présence de ces faits, se demande s'il ne s'agit pas dans les faits observés chez l'homme, soit d'une réduction quelconque de la substance concurremment employée dans le pansement (lanoline, etc.), soit de la formation par modification chimique de l'orthoforme d'une substance agissant à la façon du phénol.

On sait, en effet, que l'orthoforme est un agent réducteur et très altérable. La première hypothèse doit être écartée puisqu'on a vu des accidents se produire en présence de la poudre d'orthoforme employée seule, la seconde peut être vraisemblable; on peut enfin supposer qu'il existe une susceptibilité particulière à certains individus, une idiosynerasie analogue à celle qu'on observe pour l'orthoforme, ou que l'orthoforme devient le point de départ d'une excitation périphérique, d'une action propulsive (Soulier) qui détermine, par voie réflexe, des accidents divers (étuptions cutunées).

Etude de la tri-acétylmorphine. — M. Chanoz public uno tos ure los recherches physiologiques prédimianires faites sur le dérivé triacétyle de la morphine découvert par M. Causse (Lyon médical, mai 1900). — On employait des dissolutions au 1/10, 1/20, 1/30, 1/100, fraichement préparées en dissolvant la tri-acétylmorphine dans l'eau pure, additionnée d'une suffisante quantité d'acide acétique. La dissolution étuit injectée dans le sac lymphatique ou l'abdomen de la gronoulle ou daus une veine de cobaye, etc.

Chez la grenouille, une dose 1 à 4 milligrammes provoque un état de torpeur très net; une dose supérieure produit des effets convulsivants. Avoc 20 milligrammes : mort.

Cobaye, chien, lapin. 1º Une doso inférioure à 0sr,02 par kilogramme d'animal produit de la torpeur, sommeil profond;

2º Une dose supérieure à 0º.02 auténo d'abord une période d'hyperexcitabilité qui augmente avec la dose. L'animal salive abondamment, machonne, il y a des sécrétions lacrymale, nasale, etc. L'animal semble influencé par lo bruit, quolque-fois un simple choe produit une attaque épilophiforme avec contractions toniques. Chez le chien, il y a de la parésie du train postérieur. Pendant les crises convulsives la température anule s'élève;

3º Avec les doses supérieures à 0º7,20 par kilogramme d'animal, 0º7,30 pour le chien, la mort survient avec attaques épilentiformes et arrêt de la respiration.

Médecine générale.

Quedques ens d'empoisonnement. — 1. INTONICATION ADUÉ
PAR LE PLOMB. — Ziun (Berlin. Klin. Wochens., 1899, n° 50)
rapporte l'histoire d'une femme qui, croyant prendre du
bicarbonate de soude, avale du sel de plomb (environ
20 centigrammes). Ce sel contenii 75 0/9 d'oxyde de plomb
et 25 0/0 de sulfate de baryte. Six houres après : douleurs,
vomissements. L'urine nanlysée montrait des traces de plomb.
La malade soumise à un règime énergique se tira d'affaire
au bout de quelques semaines et sortit de l'hôpital où on
l'avait conduite lors de son accident.

- Gill publie dans le British Medicad (19 mai 1900) l'observation d'un empoisonnement par le plomb. Il s'agissati d'une femme âgée de 60 ans qui avait pris environ 15 grammes de sucre de plomb. Les symptômes de l'intoxication disparurent grâce à de fortes dosse de sulfate de soudre.
- 2. INTOXICATION CHIRONIQUE PAR LE LATTOX, Murray (Brit. Med., 1906), juin à eu souvrent l'Occasion d'observer des synthemes d'intoxication occasionnés par le laiton, chez des ouvriers travaillant co métal. Le cuivre qui se trouve dans le laiton occasionne une intoxication lente, les symptômes du début passent souvent inaperçus, puis surviennent des maux de téte, de l'anémie, de la tentyezerdie et de la dyspepsio. On constate assez fréquemment la présence d'un liséré verdatre sur les genévies des malades. Puis surviennent de la bronchite, séchiercesse de la gorge, névrites périphériques. Comme truitement, le phosphore rend de grand services. On emploie comme moyen prophylactique une eau de boissen dans laquelle on ajoute de petites quantités d'acide phosphorique.

Intoxication par l'arsenic. — Barker (Brit. Med. Jour.,
 août 1900) a eu l'occasion de voir une intoxication chronique par l'arsenic, se produire chez une fillette de 10 ans

qui étati atteinte de chorée et qui prenait trois fois par jour 2 gouttes de liqueur arsenicale. On avait insensiblement augmenté la dose, si bien qu'an bont de quelque temps on put constater de la pigmentation de la peau, de la faiblesse des extrémités inférieures, de la constipation et des vomissements. Les symptômes d'intoxication disparurent assez rapidement.

4. INTOXICATION PAR LA COCAÏNE. — Herz (Wiener. Med. Wochens., 1900, n° 3) rapporte l'observation d'une jeune ouvrière de 22 ans, anémique et faible à qui l'on fit, pour une petito opération du cuir chevelu, une injection avec 0e-20 de cocaine. Une demi-heure après l'injection survint de la faiblesse générale, sensation de froid, et dilatation des pupilles. Le visage était fortement coloré. On employa tous les moyens pour combattre cette intoxication; deux heures et demicaprès la respiration était encore rapide, la bouche était séche et le pouls irrégulier. Cet état dura environ trois heures, puis le café, le nitrate d'amyle et autres moyens thérapeutiques firent disparaltre ces troubles. La malade était tout à fait rétablie le lendemain.

Bergmann (München. Med. Wochens., nº 12, 1900) a observé également un cas d'intoxication par la cocaine chez un solide paysan de 14 ans qui souffrait depuis quelque temps d'une sciatique. On lui avait fait une injection contenant 0°,05 de occaine qui réussit admirablement. Cinq minutes après le malade n'avait plus aucune douleur, il put même rentrer soul chez lui. Mais les douleurs revinrent, et on lui refit une injection avec 0°,30 de cocaine.

Mais trois minutes après cette injection, le malade fut pris de faiblesse, de palpitations. Le pouls était fréquent (120), la respiration (32). Dix minutes après, il fut pris de crampes dans les jambes, avec mouvements cloniques. Le visage était rouge, les pupilles dilatées, le réflexe cornéen aboli. Après des soins énergiques, le malade reprit connaissance et revint

à la santé; mais ces deux exemples montrent avec quelle rapidité l'absorption de la cocaîne peut se faire.

5. UN CAS MORTEL D'NYTOXIGNTON PAR L'OPIUN. — (Deutsch. Arch. f. Klin. Medic., nº 60) rapporte l'observation d'une fomme qui avait absorbé 30 grammes de teinture d'opium en deux fois. Tous les symptômes de l'intoxication par l'opium rurent censtatés; la malade meurru au beut de deux jours.

G. INTOXICATION PAR LA PARAPHÉNYIÁNEHIANINE (Wiener, Kilin. Wookens., nº 31, 1900). — Uno damo voyant ses cheveux devenus blancs eut l'idée de recourir à la teinture dite « Phénix », trois jours après elle était atteinte d'une dormatic d'intensité extraordinaire. L'enquéte montra qu'il s'agissait d'un cas d'intoxication par la paraphônylènedianino. La dose toxique de ce corps est de 0°,10 par kilo du poids d'animal.

7. Intoxication par la phénylhydrazine. - Kaminer (Therap. Monatsch., avril, 1900, p. 435) rappolle que la phénylhydrazine est très texique à do petites doses, il a injecté à des animaux 0gr,10 de la substance en solution aqueuse, les urines des animaux injectés contenaient de l'albumine et des éléments figurés du sang, douze heures après l'injection, do plus l'urine réduit le sulfate de cuivre, mais ne contient pas de sucre. Après dix-huit heures survient la mort. Il faut une dose de 50 centigrammes peur obtenir les mêmes effets par application du moins du romède sur la peau. Dans les organes des animaux intoxiqués, on constate tenjours do l'hyperhémie, des hémorrhagies dans les uretères, et une destruction considérable de l'épithélium réual. En outro il v a un état pneumonique pronencé sans cocci. Dans l'intoxication chronique par la phénylhydrazine, tous ces déserdres se retrouvent atténués. Le sang rappelle celui de l'anémie pernicieuse.

Action des levures sur la virulence du bacille de Læffler et sur la toxine diplitérique (M. P. Nobécourt, Soc. de biologie, juillet, 1900). — Le bacille de Lorfiler cultivé dans du bouillon ordiuaire, ensemencé largement à plusieurs roprises avec de la levure de boulanger, tue le cobaye à des doscs auxquelles il est inactif, quand il est seul, avec des lésions caractéristiques des capsules surrénales; la levure parait donc favoriser son action. Par contre, la toxinc métangée à du bouillon glucosé, sur laquelle les levures ont végété un certain temps, a pordu une grande partie de son activité; elle ne tue pas le cobaye à des doses deux ou trois fois supérieures à la dose strement mortelle de toxine pure conservée dans des conditions identiques; cependant, deux fois sur dix-faction des levures a été nulle. Ces expériences, avec celles relatées plus haut, pouvent expliquer, dans une certaine mesure. Taction théraneutique des levures

Maladies infectieuses.

Traitement de la flèvre typhoide par le pyramidon. Gerest et Rigot (Loire médicale, 15 nov. 1900) publient une intérressante étude qui vient ajouter une page nouvelle à l'histoire de ce remêde encore peu vulgarisé. On sait que le pyramidon est un dérivé de l'authyrine employé pour la première fois en thérapeutique par Filelum, de Breslau, en 1806; puis étudié dans le service du Dr Lépine, de Lyon. MM. A. Robin et Bardot out tout dernièrement montré que le pyramidon doit être préfère saus réserve à l'antipyrine. La raison expérimentale de cette supériorité tient surtout à ce que le pyramidon active les échanges organiques alors que l'antipyrine les diminue dans une notable persperiorité.

Les avantages « cliniques » du remède sont les suivants :

- 1º Il agit à doses trois fois moindre que l'antipyrine;
- 2º Il agit plus vite et son action persiste plus longtemps;
- 3º Il ne détermine aucun malaise.

Après s'être convaincu de l'utilité du pyramidon dans un grand nombre d'affections (céphalée banale, fiévre des tuberculeux, rhumatisme articulaire aigu, etc.), le D' Gerest a eu l'occasion d'employer systématiquement co reméde chez une dizaine de typhiques, il public les résultats fort satisfaisants qu'il a ainsi obtenus. Bien entendu, l'auteur, parisan conzaineu de la alinéation, n'a eu recours au pyramidon que dans

les cas où les malades se refusaient énergiquement à co moyen thérapeutique.

Dans l'observation n° 1, il s'agit d'une fièvre typhoide d'intensité moyenne traitée pendant vingt jours par une dose quotidienne de 50 centigrammes à 1 gramme de pyramidon.

La médicament a été parfaitement supporté par le malade qui n'en a, à aucun moment, éprouvé lo moindre malaise. Pag de sucurs, ni d'éruptions, pas de troubles digestifs. Une albuminurie legère existant au début a disparu au bout d'une dizaine de jours de traitement, la quantité d'urino qui citait au début de 1,500 centimètres cubes s'est maintenue pendant toute la durée du traitement ontre 1,500 et 2,000.

La malade qui fait l'objet de l'obscrvation n° 2, présente également une tolérance parfaite du médicament; il s'agissait d'une fièrre typhoide certaine, d'intensité moyenne, traitée pendant huit jours par une dose quotidienne de 50 centigrammes à 1 gramme de pyramidon. Guérison remarquable-

ment rapide, pas d'incidents.

Dans l'observation n° 3, il s'agissait d'un alcoolique invétéré
atteint d'une fièvre typhoïde très grave, le malade mourut au
treizième jour par suite d'une série d'hémorrhagies intestinales. On lui avait donné pendant huit jours une dose quotidienne de 50 centigrammes à 1 gramme de pyramidon. Il est
à remarquer que ce malade présentait des vomissements fréquents et une albuminurie considérable avec olicurie, et que

chez lui le pyramidon a été cependant toléré puisque : 1- la quantité d'urins s'est maintenue entre 1,500 et 1,800 ; 2º l'albuminurie a notablement diminué ; 3º les cachets n'ont jamais été rejetés.

L'observation n° 4 est cellc d'une enfant de huit ans atteinte

de fièvre typhoide latente, révêlée par le séro-diagnostic, traitée au quinzième jour par une doss quotidienne de 25 à 50 centigrammes de pyramidon. Tolérance parfaite. Pas de sueurs, ni troubles digestifs, ni albuminerie.

Les résultats furent aussi militants dans les observations 5 et 6. Choc ces malades on constatait la diminution rapide de la céphalée et de l'insomnie. Défervescence progressive et régulière dies le début du traitement. Pas de vonissements, pas de malaises, pas d'albuminurie. Le seul incident à noter consistait. en une légère éruption sudorale que présentèrent les deux malades en question.

Il ressort nettement de ces observations que le pyramiden est très utile dans le traitement de la diothénentérie, et qu'il est parfaitement teléré par les malades.

Lorsqu'an typhique refuse d'être mis au bain, ou qu'il se présente une contre-indication à l'emploi du bain froid (hémorrhagie, âge avancé, obésité trop prononcéo), on peut donc avoir recours au pyramidon, la présence d'uno affection cardiaque n'est pas une contre-indication à son emplo.

Il est bon de faire prendre la température du malade toutes les trois houres et de donner un cachet de 25 centigrammes de pyramidon toutes les fois que la température dépasse ou atteint 39 degrés. Il est rare que lo malade prenne ainsi chaque jour plus de 1 gramme du médicament.

Au bout de quelques jours, la températuro tond à rester au-dessous de 39 degrés. Il est alors bon de donner la même does de pyramidon toutes les fois que la température atteint ou dépasse 38°,5. On commencora à le faire dès que la température n'aura pas dépassé plus de deux fois 39 degrés dans les vingt-quatre dernières leures.

Quelques jours plus tard, on donnera 25 centigrammes de pyramidon chaquo fois quo la température dépassora 38 degrés. Dés qu'il n'y aura plus 38 degrés, on supprimera le médicament.

FORMULAIRE

Traitement du chalazion (Strzeminski.)

lode pur. Lodure de potassium Lanoline. Huile de vaseline. Eau distillée. Additional de la distillée.	4	sr,20 sr,60 gramme sr,80
Elixir tonique		
Phosphate monocalciquo crist. Extrait de feuilles de nover Sirop de sucre Vin de Colombo	10 10 50 250	gramme

Faire dissoudre le phosphate dans le mélange des deux vins; ajouter ensuite l'extrait de noyer dissous dans le sirop de sucre, laisser reposer et filtrer.

Trois à quatre cuill. à soupe par jour.

Traitement du délire aigu
(Huchard.)
Potion:
Uréthane
A prendre en une fois.
Ou bien:
Hydrate de chloral 3 grammes. Sirop thébaïque 30 — Eau de menthe 100 —
A donner on quetre feie

L'Administrateur-Gérant: O. DOIN.



Réunion plénière de Societas médicales de Paris. — Récompenses officielles <u>La machine</u> à coudre la peau, du docteur Pierre Michel. — La loi sur les incompatibilités relativement à la situation de quelques médecine.

Une intéressante tentative a eu lieu au commencement du mois do mars, c'est une réunion plénière des trois principales sociétés médicales libres de Paris. En outre des groupements dits officiels, parce qu'ils groupent généralement des personalités pourvess de titres universitaires ou administratifs, on parce que leur situation prépondérante leur procure une autorité incontostable vis-à-vis du public, en outre des sociétés spéciales, c'est-à-dire s'occupant de questions particulières, Paris compte un certain nombre de sociétés qui no sont certainement pas sans valeur, quoiqu'elles ne soient pas très connues du public médical provincial, en reison du silence injuste que gardent le plus grand nombre des journaux sur leurs actes : ce sont la Société de médecine de Paris, la Société de médecine de Paris, la Société de médecine et de chirurgie pratiques et la Société médico-chirurgiaele.

Cos groupes ont vraiment un intérêt, car ils réunissent les trois ou quatre cents médecien praticions qui travailleut, lour permettant de publier leurs recherches et de se trouver avec un certain nombre de médecins tirés qui savent comprendre que les praticiens, aux prises journellement avec des difficultés sans nombre, sont les plus aptes à juger de la valeur récelle de bien des questions prématurément données en hant 354 BULLETIN

lieu comme rósoluos. Mais il y a une objection à l'existence de ces sociétés, c'est leur trop grand nombre : en dehors des sociétés qui s'occupent de spécialités, comme la Thérapeutique, la Biologie, la Dermatologie, la Médecine légale, etc... il n'y a vraiment place à Paris que pour une grande société qui réunirait les travailleurs en un bloc solide dont la véritable et très juste importance se ferait de suite sentir. Au contraire, le morcellement diviso les forces et amène de temps à autre, dans chacun des groupes, une anémie dangereuse et des plus regrettables. Jadis, sous l'impulsion très libérale de son distingué secrétaire général, notre collaborateur Dignat. la Société de médecine pratique, qui justement venait de sortir d'une crise dangereuse, prit l'initiative d'une fusion avec les deux autres groupes, proposant de se réunir à la Société de médecine de Paris, reconnue d'utilité publique et dont le titre s'imposait absolument. Dans toutes ces choses qui engagent les personnes, il y a malheureusement dos questions qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général. aussi la généreuse tentative de Dignat échona.

Nous voudrions espérer que la réunion plénière qui a eu lieu le 7 mars dernier et qui groupait dans la grando saile des sociétés avantes environ 150 médecins, pour entendre les très remarquables rapports de MM. Edmond Vidal, H. Gillet et Hallion sur les résultats de la médication par la séroultérapie, nous voudrions avoire que cette réunion sera le prélude, à plus ou moins bref délai, d'uno fusion dont les véritables intérêts du corps médical auraient tout lieu d'être satisfaits.

Dans tous les cas, nous ne pouvions nous empécher de constater combien pronâti de gravité la discussion ainsi engagée devant un auditoire véritablement imposant et les membres de ce petit congrés peuvent être assurés d'une close, c'est que lo jour où ils auront formé la seule réunion médicale scientifique qui soit digne de Paris, cette presse, dont ils regrettent justement l'indifférence, sera la première BULLETIN 355

à tenir compte de leurs délibérations, attendu qu'elles aurent alors une incontestable autorité

M. le docteur Pierre Michel a remporté le prix Barbier à la Faculté de mèdecine : c'est justice, car depuis bien longtemps on n'avait rien vu en instrumentation d'aussi ingénieusement remavquable que sa pince récolter à agrafas, véritable petite machine à coudre la peau qui permet de faire une minute une suture, avec la plus grande facilité. Tous nos compliments à l'inventeur de ce joil appareil.

Le ministre de la guerre vient d'accorder un témoignage de satisfaction à M. le docteur Bourrot, mèdecin militaire, et à un jeune c'tudiant, M. Wachenheim, pour leur dévouement pendant une épidémie de fièvre typhoide qui a exercé ses ravages dans le corps d'armée de Tarbes. — Sigualons aussi la médaille de bronze accordée à notre confrère de la marine, M. Duville, pour actes de dévouement et de courage. Ce sont là des faits quon ne saurait trom mettre en évidence.

Le Sénat vient de voter, sur la proposition de M. Combes, et avec l'appui de M. le professeur et sénateur Labbé, une modification à la loi sur les incompatibilités, qui tranche en favour des médecins une question controversée. L'article adopté est ainsi conqui:

ARTICIE UNIQUE. — Est ajoutée à l'article 10 de la loi du 10 août 1871 la disposition suivante : Ne sont pas considérés, comme saluriés et compris dans les cas spécifiés au paragraphe précédent les médecins chargés, à titre de médecins cantonaux, des services de l'assistance médicale gratuite, de la protoction de l'enfance et des enfants assistés, nen plus que des services des épidémies, de la vaccination ou de tout autre service analogue ayant un caractère philanthropique.

La même exception s'applique aux vétérinaires chargés, dans les cantons, du service d'épizooties.

HYDROLOGIE

Le traitement de la tuberculose pulmonaire par l'emploi des caux minérales.

Par le Dr F. GARRIGOU.

Chargé de cours (hydrologie) à la Faculté de médecine et de Pharmacic de Toulouse.

De nombreux et savants auteurs ont écrit sur le truitement de la tuberculose pulmonaire par les eaux minérales, des pages remplies d'intérêt et d'observations cliniques fort importantes. Malbeureuscementil est arrivé que les opinions émises ont suscité des discussions passionnées, par trop personnelles, et, forcément, moins utiles pour la science, qu'elles auraient pu l'être.

Telles, les discussions relatives au soufre et à l'arsenic, entre Pidoux et Mascarel, au sujet du traitement de la phtisie pulmonaire.

Ce résultat étati inévitable, car les praticiens dont je viens de donner le nom, et dont j'ai pendant des années suivi les écrits et les luttes, se sont appuyés tour à tour, ainsi que beaucoup d'autres, sur la présence du soufre (acide sulfhydrique, monosulfure alcalin, sulfhydrate de sulfure de calcium et de sodium) dans diverses eaux, pour vanter leur pouvoir antiphymique, pendant que, d'autre part, on cherchait à faire jouer à l'arsenie, un rôle prépondèrant dans le traitement de la même maladie, au Mont-Dore.

De quel côté était la vérité? Pour arriver à la démêler,

il fallait attendre de connaître la composition absolument eomplète de chacune des sources.

De mon étude comparative de la souree Vicille des Eaux-Bounes, et de diverses sources du Mont-Dore, il résulte que l'arsenio existe en quantité notable dans chacune des sources. De plus, à côté de l'arsenio, se trouvent réunis de part et d'autre, de nombreux oxydes métalliques, plus aboudants à Eaux-Bonnes qu'au Mont-Dore, la source Vicille avant encore l'avantage d'être notablement sulfurée.

Il résulte done de ces faits, que toutes différentes sont aujourd'hui les bases de la diseussion sur l'influence de chacune des stations que je viens de nommer, dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. M. le D' Cazaux, des Eaux-Bonnes, a porté le problème sur sa véritable voie de solution.

Mais, ce n'est pas sculement au sujet des Eaux-Bonnes et du Mont-Dore, que les hydrologues ont fait fausse route. Ils ont méconnu, à peu près partout où l'on traite les phtisiques, la véritable eause de l'action des caux minérales sur la maladie.

Il ne pouvait en être autrement, faute de documents aualytiques complets. En effet, je suis arrivé à démontrer que toutes les analyses d'eaux minérales publiées jusqu'à ce jour, sont absolument incomplètes et ont, sur toute la ligne, faussé l'opinion des observateurs et des théoriciens. Tous les elaimistes ont négligé, de parti pris, pour la plupart, de rechercher dans les eaux thermo-minérales, non seulement tous les métaux qui y existent très souvent en quantité pondérable, mais encore, toutes les matières organiques (philotion, alealoïdes, acides organiques, matière organique colloïde) que j'y ai signalées, dans quelques-unes même, en quantités considérables, et confondues sous le titre fallacieux et insignifiant de matière organiques consenies.

C'est en s'appuyant sur la présence en quantité plus ou

moins grande, de dix à douze substances minérales toujours les mêmes, alors que certaines en contienment plus de 40 à l'état de corps simples, que les médecins d'eaux minérales discutent et présentent des théories chimicobiolqiques, expliquant disentils, l'action de leurs eaux dans tel ou tel cas déterminé, et s'extasiant quelquefois, lorsqu'ils savent que leur source contient une trace de substance rare, ou peu commune

C'est là, non seulement un piétinement sur place, mais dans certains cas, une véritable pénétration dans l'absurde.

Au xix siècle, discuter sur le mode d'action d'un remède que l'on ne connaît pas à fond, est chose inoufe! Depuis les discussions de Pidoux et de Mascarel, l'école du vide, en thérapeutique thermale de la tuberculose et de toutes les maladies, a ainsi règné partout, et donné asile à des disserteurs ne s'apercevant pas que leurs discussions manquaient de base.

Il faut pour assister à un spectacle nouveau en thérapeutique hydrologique, arriver à la séance du 9 novembre 1898, de la Société d'hydrologie médicale de Paris.

Ce jour-là M. le D' Cazaux, des Eaux-Bonnes, station par excellence, de la tuberculose pulmonaire, frappé des faits mis en lumière sur la richesse minérale exception-nelle de la source Vieille, et reprenant les explications chimiques que j'ai données depuis des années (reconstitution du globule rouge par la série métallique de la source) a fini par avouer que la source Vieille ne pouvait agir, ainsi que je l'avais dit, sur les tuberculeux, que par sa richesse métallique (1) principalement, et la Société ne s'est pas refusée à accepter cette idée.

⁽¹⁾ Le fer manque dans cette eau d'une manière presque complète, et mémoins, l'anémie se guérit très bien dans certains cas à Eaux-Bonnes, chez des malades non sensibles au fer, mais sensibles métal-

Rappelons d'abord, que si la tuberculose peut atteindre tous les tissus et tous les organes, en y développant les produits analogues à ceux que peut faire naître toute inflammation, il y a en elle un élément spécial, figuré, vivant, qui vient compliquer la situation, ainsi que les accidents de l'élément inflammatoire, que cet élément soit primitif ou secondaire.

Le bacille de Kooh, secondairement aidé par d'autres (staphylocoque, streptocoque, etc.), est le vrai sujet actif, déterminant, contagieux. Il découle de là, que, suivant l'expression très exacte de Peter, on ne naît pas tuberculeux. mais ante à le devenir.

Cette vérité étant admise, on ne peut nier que l'action du bacille puisse s'exercer sur tous les tempéraments, et que ceux qui seront les plus aptes à favoriser cette action, c'està-dire, les conséquences de cette implantation du bacille spécifique, seront les faibles, issus de phtisiques, et les faibles par acoursistion.

Bien entendu, ces tempéraments forts en apparence, mais chez lesquels le développement graissexu cache une faiblesse réelle de constitution, ne sauraient échapper à la contagion, qui peut aussi frapper les plus robustes et les plus résistantes des charpentes lumaines, pour peu qu'elles s'exposent à des causes passagères ou permanentes d'affaiblissement.

loscopiquement, au cuivre, à l'argent, à l'étain, à l'alumine, etcmératux présents dans la source Vitille). Elle guérit si bien chez certein principal de la commentation de la commentation de la commentasi profundes, que les vaisseaux dévoriqués par le mal, se rompent dans les poumous, sous l'influence de la réfection du sanç et de ses réporter l'augmentation de tension arrierlete. De la, ces lémophyser le la commentation de tension arrierlete. Le la, ces lémophybenophysies qu'il est impossible ou à peu près, de prévir de l'avance, mais que l'état général, et surtout local, peuvent seuls faire soupçonner, comme possible de

En résumé, nous sommes tous exposés à la tubereulose pulmonaire, dans des proportions d'intensité plus ou moins grande, et plus qu'à aucune autre maladie; et il n'est pas étonnant que la nature prévoyante, ait mis à la portée des tubereuleux, des moyens naturels de guérison aussi nombreux que ceux qui relèvent de ses ressources directes,

La loi générale de l'équilibre universel, et la philosophie de la science, permettent parfaitement, l'admission d'un semblable axiome.

confiées aux caux minérales.

Aussi vaut-il la peine de bien connaître les ressources auxquelles je viens de faire allusion.

Etablissons, avant tout, un fait d'une importance majeure, et qui domine la situation dans le traitement de la phtisic any cany minérales. Ce fait le voici

Les auteurs anciens qui ont indiqué les résultats obtenus dans les cas de traitement de la phitisie, aux caux minénales, permettent de constater par leurs écrits, qu'ils ont vu la phitisie pulmonaire guérir aussi bien à Ax qu'à Luehon, à Cauterets qu'à Eaux-Bonnes, à Bagnères de Bigorre qu'à Aulus, etc., nour ee qui regarde les Pyrénées.

Et si nous sortons de cette région pour voir ce qui se passe aux caux d'Auvergne, et à celles des Alpes, nous trouvons cités également les cas de guérison de phisie aux eaux sulfurées et sulfatées, aux caux chlorurées ou carbonatées, et même aux caux dites indéterminées.

Connaissant ces faits, mis en relief par la littérature de les caux dites ferrugineuses avaient aussi leur part dans la revendication des cas de guérison de tuberculose pulnonaire, je me suis décidé il y a près de 30 ans à faire le nécessaire pour arriver à connaître à fond la composition complète de toutes les sources, et pour expliquer, si possible, leur mode d'action, d'abord dans la tuberculose pul-

monaire, puis dans la syphilis, pour arriver à donner plus tard la cause de la guérison de toutes les autres maladies chroniques dont le traitement est confié aux caux minérales.

Ces recherches n'ont pas été vaines. Elles ont permis de faire un premier pas dans l'étude de ces questions. J'ai pu relier l'action reconstituante de la source Vieille des Eaux-Bonnes et la guérison de certains cas, assez nombreux. même de tuberculose, à la richesse minérale et organique de ces eaux.

De même, j'ai pu rattacher à la même cause, l'action reconstituante de certaines sources d'Auvergne sur les anémiques et les albuminuriques, à leur richesse minérale métallique vraiment exceptionnelle, pour celles qui semblent les plus actives.

L'action antisyphilitique de certaines stations, comme autrefois Aulus, se rattache également à une composition exceptionnellement riche en métaux spécialement recommandés par tous les auteurs, comme antisyphilitiques.

Mais c'est surtout de la tuberculose pulmonaire dont nous avons à nous occuper ici, et dont nous devons chercher à expliquer la guérison aux caux thermo-minérales, par une action générale encore peu étudiée :

Action reconstituante du sujet tuberculeux, dominant, mais aidant aussi, l'action plus ou moins spécifique de certainc catégorie de sources sulfurécs, qui sembleraient, d'après teut ce qui est admis, privilégiées dans le traitement de cette terrible affection.

Après ce préambule qui met à peu près au point la question si difficile que nous avons abordée, et qui permet de la discuter avec des bases scientifiques et nouvelles, nous pouvons entrer dans le cœur du suiet.

Disons d'abord, que tous les tuberculeux ne se ressemblent pas. Celui qui veut hydrologiquement les traiter d'une 26

seule et même manière, se trompe d'une façon désastreuse pour ses malades. Lei, comme en présence d'autres maladies, il faut se rappeler cette assertion médicale de Pidoux : « Il n'y a pas à proprement parler de maladies, il n'y a que des malades.

La multiplicité des traitements qui ont été appliqués à la tuberculose pulmonaire, tous avec des cas de guérison, est telle, qu'il est bien facile de comprendre combien doit être exacte l'assertion de Pidoux.

Passons en revue les principaux de ces moyens de traitement, ceux, surtout qui semblent avoir une portée sérieuse, pour nous aider à nous guider dans la question du traitement hydro-thermal.

Les moyens sont de deux sortes : Hygiéniques et médicaux. Etudions-les successivement.

1º Mojens hygiciniques. — Ils sont constitués par une grande aération, la vie à la campagne, l'habitat à une grande altitude ou au bord de la mer, ou dans une région de pins, des voyages maritimes, le séjour prolongé dans les hautes régions glacées, l'absence de mouvement, le séjour au soleil, l'amplication des ravons Roentzen, etc.

2º Moyens médicoux. — Le nombre de ces moyens est tel, aujourd'hui, et la quantité des substances antiplymiques se trouve tellement multipliée, qu'il est impossible d'énumérer même les plus connues, sans s'exposer à en oublier un certain nombre.

Nous les diviserons en deux groupes :

1º Moyens dirigés pour relever l'action générale de l'économie en souffrance.

2º Moyens dirigés contre le microbe spécifique.

Citons parmi l'innombrable quantité des moyens divers, ccux qui sont les plus connus.

1º Moyens dirigés pour relever l'action générale de l'économie en souffrance. — La suralimentation, le gavage, la viaude, soit crue, soit cuite, son jus, les peptones, le lait, l'Itulie de loie de morus sous toutes ses formes, la glycérine, l'alcool, le fer, le mauganèse, le cuivre, l'argent, le plomb, le mercure, l'arsenie, l'or, et divers autres métaux, la lumière du soleil, les rayons Roentgen, les caux sulfurées, les caux arsênicales, l'hydrothérapic, l'aérothirapie, etc.

2º Moyens contre le microbe spécifique. — Créosote, thymol, terpine, bemoate de soude, baume du Pérou, cueaphylo, essence de thérébentine, bains thérébentinés, camphre, aniline, iodoforme, air froid, air très chaud, acide sulfhydrique, acide fluorhydrique, acide pyroligneux, tontes les préparations issues du goudron et de la résine, en inhalations, en boisson, en lavement, en injections sous-cutanées, etc.

Tous, ou à peu près tous ces moyens, se retrouvent dans notre arsenal hydro-thermal, et tous facilement utilisables contre le bacille de Koch, et aussi, contre les microbes secondaires streptocoques, staphylocoques, etc.

Il ne dépendrait que de l'intelligence humaine, de les grouper tous sur un même point, pour en faire l'application rationnelle, et cliniquement combinée, de manière à pouvoir attaquer la maladie, par une sorte de mitraille médicamenteuse bienfaisante et harmonicuse, calculée sur la résistance du malade, sur le degré de la maladie, sur les aptitudes spéciales du sujet, etc.

C'est imbu des idées qui peuvent résulter de la comnaissance de la médication antiphymique, médication des plus délicates et des plus complexes, que je me suis appliqué à tracer, pour ma pratique personnelle, les grandes lignes de la médication hydro-thermale à mettre en usage avec des maladies de poitrine graves, microbiennes, en ajoutant à ces grandes lignes, mais d'une manière secondaire, les détails qui regardent chaque cas particulier. Mais avant tout, il faut songer au relèvement général de l'organisme, qui scul, même dans des cas graves, peut conduire à des résultats presque inattendus.

Avec une cause d'affaiblissement, les tempéraments de tout genre peuvent ouvrir la porte à la phtisie pulmonaire, de même qu'avec une médication reconstituante de tout l'organisme, on peut fermer cette porte d'entrée de la tubereulose, même chez ceux qui par leur naissance sembleut prédisposés à être atteints par le mal dont nous nous occupons.

Nous ne sanrions faire perdre le temps à ceux qui voudront bien nous lire, en citant nombre de cas d'arrêt du mal en question, sur des tempéraments résistants, mais affaiblis. Ces cas se présentent assez souvent dans la pratique.

Mais, voici un cas caractéristique d'arrêt de la phtisie débutant chez un jeune enfant issu de phtisique diabétique (6 ans), par un traitement médical rationnel et suffisamment prolongé.

M. Auguste X..., de Toulouse, est le fils d'un phtisique diabétique, ayant lui-même des antécédents fâcheux de tuberculose pulmonaire, dans la famille. Cet enfant nous est amené à l'âge de 6 ans, pâle, chétif, toussant, la poirrine retrécie, ne pouvant supporter aucun médicament, et vomissant la nourriture. A l'auscultation, la respiration est obscure des deux côtés, et entremélée de craquements demi secs et de râles muqueux, sensibles principalement à la partie postérieure droite de la cage thoracique.

Il est immédiatement soumis à un examen métalloscopique, et après douze séances, eet examen donne une indication de sensibilité cuivre, étain, argent. Je fais prendre les trois métaux réunis en potion, dans le premier verre d'eau et de vin que l'enfant pourra boire aux repas

Après quelques jours, l'état de l'enfant est amélioré. Il

ne vomit plus sa nourriture, il la digère parfaitement, et prend un habitus extérieur un peu meilleur. Après avoir alissé s'affirmer, ce commencement de restauration générale, je soumets mon malade à l'huile de foie de morue, qu'il vomissait auparavant, et qu'il digère maintenant et s'assimile très hien.

En quelques mois, le développement de cet enfant, primitivement si chétif et si maigre, est manifeste, et les accidents des deux sommets disparaissent. L'appétit se maintient et augmente.

Je supprime alors le traitement métallique, avec une rétrocession graduée et méthodique, et j'abandonne complètement le sujet à ses forces acquises, en exigeant néanmoins une hygiène parfaite et régulière.

Après un an d'un régime alimentaire tonique, l'enfant est tellement transformé et solide, qu'en peut le mettre à toute pension. Plus tard, il fait son service militaire sans le moindre incident. Il se développe au contraire, encore mieux, et on le regarde comme l'un des plus solides et des plus beaux hommes de son régiment. Il est aujourd'hui marié et d'une santé admirable.

Nous pouvons donc penser en présence d'une série de cas du genre de celui que je viens de décrire suceintement, que la reconstitution, par l'emploi ptemier de métaux appropriés, d'un sujet jeune, chez lequel la tuberculose pulmonaire est en voie d'évoluer par suite de causes héréditaires prédisposantes, peut arrêter complètement la marche de la maladie.

(A suivre).

SOCIÉTÉ DE THÉRAPEUTIQUE

SÉANCE DU 27 FÉVRIER 1901

PRÉSIDENCE DE M. Albert ROBIN

Le procès-verbal de la dernière séance, lu et mis aux voix, est adopté.

Le Président adresse à M. Saint-Yves Mesnard, présent à la séance, les félicitations de tons ses collègues pour son élection à l'Académie de médecine.

Correspondance

En outre, des imprimés ordinaires adressés à la Société, la correspondance comprend :

- 1º L'envoi d'un travail d'histoire intitulé: Doit-on combattre la fièvre? par M. le professeur Stockvis, correspondant honoris causă.
- 2º L'envoi d'un travail d'histoire de la médeeine, intitulé: La thérapeutique oculaire au xuº siècle, par M. Coulomb, correspondant national.
 - La correspondance manuscrite comprend :
- 1º Une lettre de M. le secrétaire général de la Société de médecine pratique, invitant les membres de la Société de thérapeutique à vouloir bien assister à une réunion plénière des Sociétés de médecine de Paris, Médico-chirurgicale et

Médecino pratique, qui doit so tenir le 7 mars, à l'hôtel des Sociétés savantes. La réunion deit avoir lieu à quatre heures. (Le bureau ongage vivement les membres de la Société de thérapeutique à assister à cette tentative de congrès des Sociétés parisiennes.)

2º L'envoi des titres de M. Hallion, qui se porte candidat dans la soction de médecine. Des lettres de candidature de MM. Touvenaint et Vidal.

Présentation.

M. Larat. — J'ai Phonneur de dépaser sur le bureau, pour on faire hommage à la bibliethèque de la Société, une nouvelle délition de mon Traité pratique d'électricité médicale. Cette édition représente une augmentation considérable du promier ouvrage, car, au lieu d'un petit volume in-16, je présente aujourd'hui, au public médical, un grand in-8, de serte, que j'ai pu donner à l'euvrage, l'extension que comporte à présent lo sujet. On sait, en effet, que, depuis quolques années, les découvertes de la physique et de l'électro-biologie ont singulièrement agrandi le champ de recherches des électriciens. Il suffira de citer la radiographie, la haute fréquence et les courants sinusofdaux, pour faire comprendre la grande importance des claegements que j'ai du apperter dans mon ouvrage.

A l'occasion du procès-verbal.

I. Action antithermique du Pyramidon,

Par M. G. BARDET.

A l'appui de la communication do M. Bertherand relativement à l'action du pyramidon sur la nutrificion et des arguments apportés par M. Albert Robin, je viens apporter une observation qui n'à d'autre intérêt que de fournir une analyse dans un cas d'administration du médicament chez un fébricitant, Comme les analyses urologiques, un peu complètes, sont difficiles à réunir en clinique, je donne celle que j'ai pu faire.

Il s'agissait d'un cas de grippe comme il y en a depuis quelsemaines; chez une femme de trente-deux ans, très excitable et partienlièrement sujette aux deuleurs, se déclare un accès de grippe avec fièvre, état infectieux caractèrisé et douleurs vives dans les lombes; la température se tenait à 38º toute la journée et montait régulièrement à 39º on 30°,5, vers le soir, depuis trois jours. Consulté par la malade sur une médication capable de lui enlever ses douleurs et de faire disparaître la fièvre, je conseillai une dose unique de 0°,30 de camphorate de pyramidon, administré à quatre heures du soir, c'est-à-dire, au moment de l'acué fébrile. Mais, au préalable, je fis l'analyse des urines de la journée précédente. Les principaux éléments fournis sur l'examen chimique, donnent :

Volume	600
Deusitė	1032
Urée	15,65
Azote urée	7,20
Azote total	9,23
Acide phosphorique	1,35
Chlorure de de sedium	6,8
Azote urée à azote total	78
Acide phesphorique à azote total	14,52
Indican	sensible
Urobiline	abondante

En un mot, c'est une urine fébrile chez une malade qui mange peu et mal.

Le né-licament fut administré, sans qu'il soit besoin d'en augmenter la dose, pendant trois jours de suite, il diminua d'abord, puis, supprima les douleurs lombaires et fit tomber la fièvre, qui ne dépaséa pas 38°, 21 le premier jour, pour tomber les jours suivants à 38° et 37°, 8, et cela sans souurs et sans malaise aucun. L'amélioration fut assez grande pour que la malado put manger légérement. Voiei le résultat de l'analyse des urines après les trois prises de pyramidon :

Volume	1050
Densité	1021
Urée,	18,2
Azoto urée	8,37
Azoto total	10,08
Acide phosphorique	1,68
Chlorure de sodium	8,4
Azote urée à azote total	83,0
Acide phosphoriquo à azote total	16,6
ludican	traces
Urobilino	id.

Commo on le voit, par un simple examen, le coefficient azoturiquo est auguenté de 78 à 28, ce qui est une quantité notable. Je ne tiens pas compte des autres renseignements, car ils sont simplement sous la dépondance de l'amélioration de l'état général et, par conséquent, ne fournissent quo des données sur l'action indirecto du médicament. En résumé, dans cette observation nouvelle nous tirerons, encore une fois, la confirmation des faits que M. Albert Robin et moi avons avancé en juillet dernier et que M. Bertherand confirmati de son côté, dans la communication qu'il a faito à la précédente séance.

M. Lixossuz. — Je relève dans la communication de M. Bortherand sur lo pyramidon, uno phrase que je n'aurais pas laissé passer sans protestation, si J'avais assisté au début de la dernière séance. Constatant l'insuccès du médicament dans le rhumatisme zigu, l'auteur ajonte : » Je m'attendais d'aitleurs à ce résultat, les aromatiques du genre antipyrine étunt inactifs contre cetto maladie. »

Or, j'ai été attaché longtemps, à la Faculté de médecine de Lyon, au service de clinique médicale de M. le professorr TONE CXXXI. 10° LIVE. 27 Bondet, où tous les malades atteints de rhumatisme articulaire aigu sont traités systèmatiquement par l'antipyrine, à la dose de 3 à 4 grammes par jour, et, je puis iaffirmer à M. Bertherand que ce n'est pas là une médication inactire.

En vingt-quatre houres, quarante-huit heures au plus, on voit disparative, chez les malades ainsi traités, les douleurs, le gonflement articulaire, les sueurs, la fièvre, et, à la condition que la médication soit continuée un temps suffissant, cette sédation est définitive.

L'antipyrine manifeste done, sur les différents symptomes de rhumatisme articulaire sigu, une action très comparable à celle du salicylate de soude, sans les phénomènes d'intolérance, nausées, vertiges, bourdonnements d'orcilles quo produit fréquemment es dernier médicament. J'ajouto qu'elle a la mêmo action préventive contro les localisations cardiaques du rhumatismo.

Pendant quelques années, M. Bondet a employé comparativement dans son service les deux médicaments; l'expérience clinique a fixè son choix sur l'antipyrine. Je ruppelle que plusicurs autres cliniciens, et, en particulier, M. Chauffard, se sont rangés au même avis. Je ne veux pas soulever ici, à propos d'une phraso incidente dans le travail qui nous a été présenté, la grosse question du traitement du rhumatisme articulaire aigu. Nous possédons centre cette affection, dans le salicylate de soude, un médicament qui a fait ses preuves, et dont la valour est universellement reconnue, mais ce médicament est parfois mal toléré; il a ses contre-indications, et il importe de no pas laisser jeter un discrédit sur d'autres substances qui, bien maniées, peuventrendre d'excellents services.

II, Avantages thérapeutiques de la base hexaméthylène tétramine ou formine

par M. G. Bardet

Je viens appeler l'attention sur un médicament que j'ai été le premier à signaler, en 1894 (C. R. de la Société de thér.. 11 avril 1894 : Recherches sur l'action thérapeutique de quelques dérivés du formol). Dans ce travail de pharmacologie, j'ai signalé un certain nombre de produits qui avaient été retirés du formol par M. Trillat, au cours de ses beaux travaux sur le formol et entre autres la bromoformine, l'iodoformine, la brométhule-formine et l'iodéthule-formine, produits obtenus du traitement d'une base déià connue, l'hexaméthylènetétramine, qu'en raison de son origine formolique j'avais dénommée formine, en acceptant le baptême du chimiste qui avait obtenu ses dérivés. Le susdit travail a surtout mis en relief les propriétés de la brométhyle-formine que j'avais plus spécialement étudiée avec la collaboration de M. Fóré, mais cependant je m'exprimais ainsi à propos de la base formine.

« Cest une base cristallisee, bien soluble dans l'eau. J'ai pu la donner impunément et à très hauto dose à des animaux, sans observer aucun trouble dans leur état général. In citro, elle dissout facilement l'acide urique et les urates, se rapprochant en cela do la piperazino. Mo basant sur cetto ressemblanco d'action, J'ai cru pouvoir l'essayer dans deux cas de riumatisme goutteux, mais les conclusions à tirre de cette expérimentation trop sommaire sont trop peu nettes pour que J'en tienne compté jusqu'à nouvel ordre. »

Commo on le voit, et la réflexion a, commo on le verra tout à l'heure, son importance, ces quelques lignes résument en peu do mots, mais de manière aussi complète que possible, l'action des médicaments qui, comme la pinérazine, la lithine ou l'acide quinique ont la propriété d'exercer une actien favorable sur l'exerction de l'acide urique.

Depuis et à diverses reprises, j'ai eu l'occasion de faire de nouveaux essais très favorables, et, avec la confirmation personnelle de M. Albert Robin qui a une grande expérience du médicament, qu'il a eu l'occasion d'essayer et d'apprécier souvent, tant à l'hôpital que dans sa clientèle privée, je puis les résumer de la manière suivante :

1º La Formine ou hoxaméthylenetétramine, prise à l'intérieur, jouit de la prepriété de favorisor énergiquement l'élimination de l'acide urique. In citro, et en solution aqueuse, elle est un excellent dissolvant de cette substance, mais, chose curieuse et un peu paradoxale, la solution urinaire obtonue artificiellement ne nous a pas paru présenter la même propriété, tandis que l'urine des malades qui premnent le médicament peut dissoudre l'acide urique, et avec une grande facilité. Il semblerait que le dédoublement, possible dans l'économie, joue un ribé daus la circonstance.

2º La Formine doit, suivant toute probabilité, mettre du formol en liberté dans l'organisme et elle deit à ce fait d'être pout-être le meilleur antiseptique des voies urinaires, dans tous les cas où il est nécessaire d'exercer une action antiseptique par voie interne, mais il est à bien spécifier qu'on n'obtient aucun résultat si l'on introduit le médicament directment dans la vessie; ce fait est dà è ce que la décomposition signalée tout à l'heure est nécessaire peur produire le phénomène.

On jugera peut-être que j'aumis dù m'étendre davantage sur ces conclusions et donner les faits qui m'ont servi à les établir; c'est assurément ce que je me serais empressé de faire, mais en rassemblant les documents nécessaires et en cherchant les renseignements bibliographiques, j'ai eu l'étonnement de constater que le médicament que j'avais le premier signalé en 1894, se trouvait connu et très employé déjà, mais sous un autre nom et comme un médicament déceuvert en Allemagne par M. A. Nicolaier, médeein principal de la Clinique médieale de Gœttingue et lancé par une maison allemande, sous le nom d'urotropine.

Dans ses Annales de l'année 1885, parues en 1896, Merek range lo médicament sous la dénomination Formine, mais en ajoutant déjà le synonyme Urodropine; il signale mon travail de 1891, puis il ajoute: « De son côté, et indépendamment de Bardet, A. Nicolaire (Deutsche med. Wochens., 1895, n° 30) découvrit la propriété de la formine de dissoudre l'acide urique et embarrassa encoro la nomenciature en l'appolant Urotropine. »

Je me demande comment un auteur a pu découvrir en 1895, indépendamment de mon travail de 1894, les propriétés de la formine? Dans tous les cas, les dates sont là et j'avoue que cette manière de procéder ne me paraît pas d'une correction absolue, surtout lorsque le travail postérieur a pour effet de parler d'un produit, déjà connu et de le dénommer sous un nom déposé qui a la prétention de devenir la propriété d'une maison de commerces.

Romarquons bien quo je răi nullement l'intention de trover mauvăis qu'un industriel profite de son travail, j'ai au contraire, à co point de vue, les idées les plus larges, mais ce droit je ne crois pas qu'on puisse l'admettre quand il s'agit de cerrje dèjà connus, dejà étudiés, et jamais je ne croirai que le lanceur du mot « Uretropine » n'ait pas connu, en 1895, mon travail de 1894, d' p'ai de droit de supposer quo si jo n'avais pas rédigé ma note, l'Urotropine dormirait encore dans les limbes.

Cotto manièro de faire est d'autant plus fachouse que, comme le dissit fort justement M. Mercè, dans le passage cité plus haut, il ombarrasse encore la nomenclature, pourtant déjà si peu claire, des produits nouveaux. Le procédé de démarquage dont je me plains a cu pour moi un résultat qui montre bien le peu de délicatesse du système: j'étais si loin de pouvoir supposer un pareil sans-géne, qu'en faisant la onzième édition de mon formulaire des nouveaux remèdes, j'ai eu la naïveté de faire un article formine et un autre urotropine, tant j'étais loin de m'imaginer que ces deux noms cachassent un seul et même produit!

Du reste, dans une brochure de M. Nicolaier, que j'ai reçue comme presque tous les médecins, brochure qui est sans doute la reproduction d'un article dont je ne connais pas l'origine, l'auteur me cite et je ne trouve plus aucune menton, cette fois, de la prétention d'avoir « découvert, indépendamment de mon travail, les propriétés de la formine», comme le disait la citation empruntée aux Annales de Merck, et c'est ce qui m'autorise à faire cette réclamation de priorité.

En résumé, la base hexaméthylénetétramine ou formine est un produit qui a été étudié en France pour la première fois, le nom urotropine a été donné au produit sans aucune nécessité. Quand un pharmacologue allemand a pris la peine d'étudier un corps, nous l'utilisons sous le nom indiqué par lui et nous le prescrivons de même, il me paraît, en conséquence, que nos confères allemands auraient bonne grâce à nous imiter, car ils sont assez riches en la matière pour n'avoir pas le besoin de sembler démarquer les travaux des autres.

DISCUSSION

M. Patux. — A l'occasion des propriétés de la base hexaméhylènetétramine, ou formine, ou urotropine, je dirai simplement que la théorie, comme je l'ai déjà exposé, permettait de prévoir les propriétés dissolvantes de l'acide urique, car tous les dérivés méthyléniques amidés ont cette propriété, telle, par exemple, la pipérazine qui est un corps de la même famille. On peut même dire que si l'on voulait faire une étude d'ensemble sur le sujét, ou trouverait beaucoup de médicaments intéressants qui présenteraient des propriétés analog gues ou très voisines. J'ajouterai que je me souviens fort bien de la communication que nous fit jadis M. Bardet, sur la formine et ses dérivés, ce travail a même êté pour moi l'occasion de parler ensuite de certains dérivés de l'antipyrine.

M. Albert Konix.— Je ne puis que confirmer les observations relatées tout à l'beure par M. Bardet sur les bons effets de l'urotropine... ou formine, puisque c'est sous ce nom que notre collègue la présenta ici même pour la première fois. Ce médicament mérite en effet d'être connu et d'entrer de la manière la plus largo dans la thérapeutique courante, non seulement des affections uriques et uratiques, mais encore des maladics urinaires. L'hexaméthylènetétramine possede certainement une action des plus puissantes sur les infections de ces organes, notamment dans les bactériuries qui sont dues au coll-bacille; dans ces ess, ja' av a plus d'une fois disparatire des accidents, jusque-là très tenaces, par l'administration d'une simple dose de un gramme par jour du produit. On ne saurait dont trop le recommander.

Et puisque nous sommes sur le terrain de la médication uratique, je dirai que, depuis quelque temps nous voyons s'enrichir la thérapeutique de manière très heureuse par l'apparition de toute une série de médicaments capables d'influencer l'élimination et même la formation de l'acide urique dans l'organisme. C'est ainsi que j'emploie avec avantage, depuis quelques mois, un médicament encore peu connu en France, jo veux parler du sidonal. C'est l'association de l'acide quinique et de la pipérazine, sous la forme de qu'inate de cotto base. La pipérazine est un bon dissolvant de l'acide urique dèjà formé, et quant à l'acide quinique, c'est uu corps qui a la propriété de se transformer dans l'organisme en acide acide hippurique, de sorte que, dans les cas de diathèse uratique on obtient vraiment, J'ai eu plus d'une fois à le constaur, des sorte pue de l'une fois à le constaur, des ces remarquables. C'est particulièrement aux

dépens du glycocolle que l'acide quinique fixe de l'azote et c'est ainsi qu'il empêche la formation d'acide urique.

Communication

L'appareil circulatoire chez les neurasthéniques au point de vue du régime alimentaire et du traitement

par le D' Maurice de Fleury

La maladie neurasthénique est faite de symptômes si divers qu'il est bien difficile de trouver dans ces alternatives de fatigue et d'excitation, une notion directrice pour l'institution d'un traitement rationnel. Ici même, comme je conclusis, à propos de l'état mental, à l'adoptien du traitement tonique, quelqu'un m'a fait observer que nos névropathes se trouvent bien tantôt d'une médication stimulante et tantôt d'une médication stimulante et tantôt d'une médication lyposthénisante. Mais c'est là une thérapeutique purement symptomatique, alors que tous, ici, nous nous efforçons de ne faire qu'une thérapeutique pathogénique, toutes les fois que ça nous est possible.

Un très grand nombre de graphiques recueillis au jour le jour sur des malades observés avec beaucoup de soin et de persévérance, nous aideront certainement à résoudre cette question de savoir si le mot de nourasthénie est vraiment synonyne d'émisément nerveux.

l'ai recherché chez mes malades des signes objectifs de la fatigue. L'épreuve du dynamomètre ne saurait suffire, le malade sorrant moins qu'il ne pourrait le faire alors qu'il est distrait, ou bien oncore dans les moments où, voulant à tout prix apitoyer son médecin, il cherche, par tous les moyens, à lui démontre sa faiblesse.

On s'accordo généralement pour reconnaître la fatigue réelle aux symptômes suivants:

1º La tension artérielle est basse, par faiblesso d'impulsion du cœur;

- 2º L'activité de réduction du sang rouge en sang noir se fait avec une rapidité inférieure à la moyenne;
- 3º Lo nombre des globules rouges subit une diminution apparente par suite du relâchement de l'arbro artériel et de l'hyperhydratation du sang;
- 4º Le seuil de la sensibilité, mesuré au compas do Weber s'élargit;
 - 5º Le coefficient d'utilisation azotée s'abaisse.
- Or chez un grand nombre de mes malades, tous ces signes ont donné des indications parallèles, ce qui me permet d'être assez affirmatif.
- Cos graphiques que je fais passer sous vos youx se classent d'eux-mémes en deux catégories très tranchées. Les uns affectont une forme générale ascendante sous l'influence du traitoment, les autres affectent la forme inverse. Il s'agit cepondant, dans l'un et l'autre cas, de maidaes présentant, à quelques muances près, los stigmates considérés comme enractéristiques du mai de Beard.

Occupons-nous tout d'abord des premiers :

Co sont tous de vértitables déprimés à vitalité basse et à nutrition raloutie. Tous ces malades ont été très améliorés par un régimo alimentaire supprimant toute fausse excitation de leur système nerveux et par des stimulations mécaniques; injections salines, étincelles statiques, frictions, massages, etc. Sous l'influence de ces moyens, nous voyons, d'uno façon pour ainsi dire tangible, le cœur augmenter de puissance, l'arbre ratéroir eprendre as tonicité, les muscles de la vie de relation suivant une courbe à peu près parallèle; l'activité de réduction de l'oxyhémoglobine augmente dans une forte proportion; l'analys od 'urine révele l'accelération de la nutrition.

La plupart des malades appartenant à cette première categorie sont dévenus neurasthéniques par surmenage plysique, intellectuel ou moral, évoluant sur un terrain héréditairement prédisposé. Mais quelques-uns d'entre eux sont manifestement atteints de neurasthénie symptomatique; voici le graphique d'un cancéreux, celui d'un tabétique, celui d'un tuberculeux. Qu'il s'agisse de neurasthénie essentielle (si Joso dire) ou secondaire, l'évolution du graphique vers l'amélioration reste la même. Ici et la, l'état mental caractéristique, tend à la guérison un peu après que l'ensemble des énergies vitales a commencé de se reconstituer. Cette série se termine par un tracé assez intéressant, en ce qu'il montro les variations de la pression sanguine chez un malade atteint d'inflienza et de neurasthénie consécutive; on y peut suivre pas à pas la genése de la rechute de névrose après infection grippale.

Voici maintenant une série de diagrammes, fort différents des précédents. Il s'agit de malades considérés comme nouvasthéniques par les médecins qui les avaient soignés, et tous, en effet, présentaient des maux de tête, des troubles gastriques, de la fatigue, des troubles un sommeil, des idées noires, une tendance anormale aux larmes et à la colère. Mais tous ceux-là sont des neurasthéniques à hypertension. Souvait leurs forces sont diminuées et leur nutrition ralentie, mais leur système cardio-artériel est en éréthisme au lieu d'être en affaissement.

C'est que ce ne sont plus de simples déprimés, mais des intoxiques. Voici un cas d'artério-sclérose, un cas de névrose toxi-alimentaire, deux cas de petit brightisme avec phénomènes nerveux accentués, deux cas de demi-alcoolisme, un cas de diabete. — Tous étaient, par prédisposition héréditaire des névropathes, mais une intoxication avait déterminé l'éclosion des principes neurrasthéniques. Cette seconde catégorie de névropathes guérit ou s'améliore par un régime très sévère, par la diéte lactée ou le régime lacto-végétarien, par les massages, les bains carbonigénes, les bains statiques et autres moyens permettant l'élimination des toxines et l'ouverture de la périphérie artérielle.

Ces graphiques me paraissent avoir un intérêt théorique assez considérable en ce sens qu'ils nous éclairent sur la valeur réelle de la théorie dite vasculaire de certaines émotions (Théorie do Lange). Mais ils ont aussi quelque importance au point de vue thérapeutique, le seul qui doive nous occuper ici. Pour moi jo les considère comme un guide fort précieux, non seulement pour la direction d'ensemble d'un traitement, mais encore pour la direction quotidienne, au jour le jour, car il est important de savoir si, à l'heuro même où il vient nous consulter, un névropathe sera immédiatement secouru par une médication stimulante ou cellmente.

En somme, si nous voulons adapter aux données fournies par nos figures un traitement rationnel, nous sommes amenés aux conclusions suivantes :

Cluz les neurathéniques à hyposthénie vraie, le traitement doit consister eu stimulations méthodiques du systéme nevreux central. Il fau préfèrer les stimulations mécaniques aux médicaments toutes les fois que cela est possible. Le but à atteindre cet une véritable rééducation des cellules cérébrales, auxquelles on fait reprendre l'habitude d'un cran plus élevé do touts.

Chez un grand nombro de malades, l'hypotension foncière est masquée par une excitation toute factice que leur donne le repas. (La plupart d'entre nous voient leurs malades pendant la digestion du déjeuner). Il importe de supprimer ectte excitation nuisible par un régime alimentaire qui, tout en réduisant de beaucoup les symptômes gastriques, permette de se rendre un compte beaucoup plus exact de l'état réel des forces. Au bout de quelques jours de régime, accompagné ou non de bains statiques, le système nerveux est, si jo puis dire neutralisé; toute excitation artificielle est aboile, et il ne reste plus qu'à toufiler le malade d'une manière progressive.

S'il s'agit d'un tuberculeux, le plus sage est de ne pas utiliser sans do grandes précautions, les injections salines qui parfois donnent à la flèvre et à l'évolution morbido une impulsion nouvelle.

S'il s'agit d'un neurasthénique intoxiqué, à hypertension, le seul traitement vraiment indiqué, est celui qui consiste dans l'emploi des moyens d'élimination des toxines actuellement à notre disposition : régime, lavage du sang, diurétiques, sudorifiques, etc., etc.

Telles sont les principales conclusions pratiques qu'en me parait devoir tirer des tracés que je viens de vous soumettre.

M. CAUTRU. — Dans des travaux déjà nombreux, entre autres dans une communication faite en 1899 à l'Académie de Médecine, l'ai démontré que le massage abdominal était un régulateur de la tension artérielle.

Dans l'hypertension, le massage doux et profond abaisse la pression et est diurétique; dans l'hypotension, les lachures et le massage excitant superficiel, remontent la prossion et la rapproclient de la normale.

Je tenais à signaler ce moyen pour l'ajouter à ceux que M. de Fleury vient de nous indiquer dans son intéressanto communication.

M. DE FLEURY. — La remarque de M. Cantru est justo et je reconnais que lo massage et notamment le massago abdominal a la propriété de relever et régulariser la tension artérielle. Il en est ainsi d'ailleurs do tous les agents physiques, et jo me souviens que notro collègue Dignan tous a, il y a quelque temps, apporté des observations dans lesquelles il montrait que les bains d'électricité statique execraient une action très manifeste sur la tension sanguine.

M. DIGNAT. — Puisque M. Maurice de Fleury veut bien rappoler les recherches que j'ai entreprises, il y a cinq on six ans, je me permettrai do présenter à ce sujet une légère observation.

Je crois avoir établi, d'une façon positive, que les bains statiques augmentent, en général, la tension artérielle et qu'ils modifient la forme du pouls. Mais, j'ai fait remarquer, en même temps, que cette augmentation de tension et ees modifications du pouls ne sont asa durables, ne se maintiennent arére plus de 12 à 24 heures et ne deviennent définitives qu'après de fort nombreuses séances.

J'ajoute, d'autre part, aujourd'hui, quo l'électricité statique no m'a pas fourni, dans lo traitement de la neurasthénie, tons les effets heureux que j'en attondais.

Est-ce à dire qu'on doit rejeter ce modo de traitement? Loin de moi, mesicures, pareille pensée. l'estime, en effet, que l'électricité statique rend des services très sérieux à certains neurasthéniques. L'emploi de cette médication se trouve donc parfuilement justifié dans ces cas. Mais, je dois avoure que les injections de sérum artificiél, à faibles doses, ont souvent une action plus promute et plus énergique.

Catarrhe utérin fétide chez une femme âgée

nar M. Paul Dalcué

La fétidité d'un catarrho utérin assoz abondant est un accident qui n'est pas absolument rare chez la femme àgée, plus ou moins longtemps après la ménopause.

Il existe uno forme d'endométrite sénile, caractérisée par une leucorrhée intermittente, où nous voyons la cavité utérine dilatée expulser à certains moments un liquido épais, sanieux quelquefois sanguinoleut, mais toujours horriblement fétide. Si le museau de tanche ne présente pas do graves altéraines, la muyeusse intra-cervicale garde une apparence qui rappelle certains sphacèles (Maurange), et la nature de l'écoulement, jointe au dépérissement de l'état général, a souvent fait penser au cancer. En réalité il s'agit d'une endométrite qui ne guérit que par le curettage.

Mais la fetidité du catarrhe utérin chez une femme agée ne doit pas toujours rossortir à cette étiologie et ne comporte pas surtout, dans tous les cas, un pronostic aussi sorieux et une intervention opératoire comme le curettage. Je viens d'en observer un curieux exemple. Une femme agée de 76 ans, entra à l'infirmerie de l'hospice Debrousse, en juin 1900, à cause d'une leucorrhée tellement fetide que ses voisines de dortoir incommodées par l'odeur, se plaignant, l'avaient pour ainsi dire obligée à venir à l'infirmerie.

Le début de ces pertes remontait à cinq mois seulement; à cette époque elles avaient commencé très brusquement, et en très peu de jours elles étaient devenues très abondantes.

Copendant cette leucorrhée épaisse, jaunâtre, qui paraissait sortir en jets intermittents, restait quelquofois un jour sans se manifester.

La malade, dont la ménopause s'étaitétablie à l'âge de 48 ans, était affectée depuis l'âge de 22 ans d'un prolapsus utérin pour lequel elle portait un hystérophore.

A l'examen, je trouvai un utérus très abaissé, mobile, mais en légere rétroflexion. Aucune ulcération n'existait sur le col et la muqueuse intra-eervicale ne présentait aucun aspect partientier.

J'introduisis difficilement dans la cavité utérine une sonde n° 12 à cause de la coudure produite par la rétroflexion d'une part, et d'un certain degré d'étroitesse de l'orifice interno de l'autre.

Mais, dés que la sonde fut dans la cavité utérine, il sortit un jet de pus d'une fétidité horrible.

Les jours suivants, je fis une légère dilatation du col, je passai des soudes d'un calibre progressivement croissant, et je pratiquai plusieurs séances de lavage intra-utérin à la simple eau bouillie. Le caturrhe perdit sa fétidité encore assez raplement, il diminua daus des proportions très considérants, se tarit presque, au point que la malade, se considérant comme guérie, ne voulut plus entendre parler d'aucun soin au bout de deux mois environ.

Ce catarrhe fétide, débutant tout d'un coup chez une femme de 76 ans, qui ne présentait aucun signe de métrite depuis la ménopause, disparaissant assez vite an moyen du lavage et de la dilatation, ne me semble pas pouvoir être attribué à l'endométrite sénile telle que nous la connaissons.

Je croirais plutôt que, négligeant des soins de propredé journaliers, ayant un pessairo plein en ceputhoue en contact perpétuel avec le cel et l'orifice peur supporter le prolapsus utérin, cette femme a subi une infection passagére exogène que facilitaient l'étroitesse de l'orifice interne et la coudure du eanal par rétroflexion en empéchant la libre évacuation de la leucorrhée.

S'il y a eu lésion de la muqueuse, elle a dû être bien légère, secondaire, et de toute façon n'a pas nécessité, pour guérir, le eurettage inévitable contre l'endométrite sénile d'allure sphacélique.

Etaient présents à la séance : Trutaurs. — MM. Bardot, Bolognesi, Boymond, Brun, Cadiot, Catillon, Cautru, Champigny, Chassevant, Courtade, Créquy, Dalehé, de Fleury, de Molènes, Dignat, Duchesne, Joanin, Le Gendre, Larat, Mathieu, Muselier, Patein, Pouchet, Albert Robin, Seint-Yees Messiard, Sevestre, Vogt et Yvon. — Corresseonaxys : MM. Dubois, Dultoureau, Fourrier et Linossier.

La séance est levée à six heures.

Le secrétaire des séances.

BOLOGNESI.

384 VARIÉTÉ

VARIÉTÉ

Guérison miraculeuse de maladies d'apparence organique. Rôle du système vaso-moteur

Le docteur Regnault a relaté, à la Société d'Hypnologie et de Psychologie, quelques faits très impressionnants qui ouvriraient, si les observations étaient multipliées, une voie toute nouvelle et des plus eurieuses à la thérapeutique.

Les guérisons regardées autrefois comme miraculouses sont expliquées par la suggestion. Couvaisions, contractures, paralysies, douleurs, et en général toutes les manifestations hystoriques peuvent être guéries par la suggestion; que celleci soit produite par la foi ou qu'elle soit due à l'habileté d'un guérisseur, elle est toujours de même nature. Mais un certain nombre de cures restent cependant difficiles à expliquer; ce sont celles qui ont trait à des maladies d'apparence organique,

Au XVIII° siècle, nombre de guérisons de cancers et autres maladies organiques auraient été observées au tombeau du diacre Pàris.

Charcot, dans un travail publió en 1893, revenait sur une observation détaillée d'un cancer du sein guéri par l'intercession du faneux thaumaturge. Il rapportait, dans lo même travail, la guérison par la foi religieuse, d'ulcérations et de plaies.

Le docteur Fowler aurait guéri, par le traitement psychique huit eas de tumeurs du sein, uniques ou multiples dépassant par'ois le volume d'un œuf de poule.

M. Kokernikoff, de Moscou, a rapporté un eas de guérison, de sycosis parasitaire, complétée en trois jours grâce aux prières d'une femme. VARIÉTÉ 385

M. Regnantt nous rapporte l'observation détaillée d'un phelgmon de la main et de l'avant-levas, réapparaissant par poussées successives pendant plusieurs mois, malgré de fréquentes incisions, et guéri radicalement après un bain do cinq minutes dans la pisicine de Lourdes.

C'est du reste à Lourdes que l'on verrait le plus grand nombre de ces cas surprenants.

S'il faut n'accepter qu'avec bénéfice d'inventaire certains détails, tels que l'instantanété de la guérison de plaies, d'abcès et de fractures, pourtant le fait même de la guérison ou an moins de l'amélioration de nombreux malades paraît certain.

Il existe des maladies d'origine hystérique qui simulent les maladies organiques au point que les médecins s'y trompent. En particulier, l'ordème bleu et dur de l'hystério, accompagné ou non d'ulcérations et de plaies, peut fairo penser à une tunner cancéreuse ou à un pillezmon.

Or depuis longtemps on connaît l'influence du moral sur le physique; en d'autros termes, on sait que les centres psychiques peuvont impressionner les nerfs vaso-moteurs, et conséquemment la circulation et les sécrétions.

Des pilulos do mio de pain peuvent donnor la diarrhée; uno sensation psychique désagréable peut suspendro la sécrétion lactée d'une nourrico.

D'autre part, on peut aggraver son mal en y ponsant trop. Le volume d'une tumeur augmente rapidement si le malade en est constamment préoccupé. Une tension de l'esprit dirigée sur un point particulior de l'organisme peut, en effet, modifier l'afflux sanguir vors cette partie.

Rien d'étonnant alors que l'on observe faciloment chez les hystériques, la guérison de maladies d'apparence organique. Bien plus, il ne répugne pas à l'espiri de croire que des maladies réelloment organiques paissent être influencées par le psychique. Les troubles vaso-moteurs, qui cryent des états pathologiques à apparence organique, peuvent aggravor aussi des muladies réelles. Et dans les deux cas, la suggestion ou l'autosuggestion peuvent avoir une heureuse influence et amener une guérison ou une amélioration (Albert Robin).

BIBI INGRAPHIE

Biarritz, ses ressources hygieniques et thérapeutiques, par J. Lourr: un volume in-8º de 190 pages.

Ce n'est pas un plaidoyer : pro dono «, ce n'est pas une apologic partiale de lliarrit que M. Lobit expose, c'est une étude succinic, purement médicale, destinée à faire connaître les ressources générales que possède la localité au point de vue hygienique et thérapeutique. L'auteur montre que le climat maritime fait de celle ville une station internale de premier ordre, que les bains de mer peuvent y étre pris en toute saison, enfin que l'installation des Thermes sallias y permet, pour l'auteur de l'auteu

Des lésions du fond de l'œil dans les infections générales aiguës, par P. Protinon; un volume in-8° de 136 pages; O. Doin, éditour

On peut avoir, au cours de maladies générales, des lésions coulaires, vasculaires on nerveuses, qui rélevent directement de l'infection même, sans qu'il soit nécessaire de clercher leur origine dens les inflammations de violenage, chans des lésions mémignées, rémales ou certifiquées de l'appendie de l'appendie de l'appendie de l'appendie de l'appendie de biene cut-mêmes qui créent la lésion, mais leurs toxines, les nérvies infectienses sont ainsi assimitées aux évrirées loxques,

Recherches expérimentales sur l'élimination dans l'alcoolisme. — Détermination d'un atrootisme congénital, par M. Nicloux; un volume in-8 de 68 pages; O. Doux, éditeur

L'alcool ingéré sous forme d'alcool à 10 0/0 passe dans le sang. L'accesse légère correspond à 0°,3 d'alcool absolu pour 100 centimètres eubes de sang. L'ivresse profonde est produite par 0°-4,0°-5,0°-6,0°-4; coal absolu pour 100 centimètres cubes de sang. L'alcool passe en outre dans tous les liquides de l'économic, constituant un mole partier. emiler d'élimination, mais aussi, par le fui même de l'imprégnation active du tissu glandulaire, un facteur important des an octive. L'alcool ingéré passe encore de la mêre au fortus. D'expérientes nombrouses et variées, conduites avec toute la rigueur sicentificadésirable, il semblerait logique d'admettre à céde des différentesformes d'éthylisme déciris par les ourrages de punhologie une ouvelle forme d'alcoolisme: celle de l'embryon dès sa conception et pendant son d'evolution, un salecoolisme congénital ».

De l'accouchement spontané dans les bassins rétrécis rachitiques, par J.-L. Valency; un volume in-8° de 152 pages; O. Doin, éditeur.

Il résulte des faits nombreux rapportés par M. Valency que dans les sons seins rachitiques dont le diamètre promato-sons-publica est con-pris entre les limites de 8°-5 à 11 ceclimètres, l'acconchement spondrée st possible 81 l'axists pas une trop grande disproportion entre la capacité du bassin et le volume de la téte fortale; si les contractes; s'il n'exists pas du côté du col une cause quelcompre s'opposantes; s'il n'exists pas du côté du col une cause quelcompre s'opposant la dilatation; s'il niexiste pas du côté du col une cause quelcompre d'opposant de dilatation; s'il niexiste pas du côté du col une cause quelcompre s'opposant pas d'anneau vulvaire n'opposent pas à la sortie du fortus une barrière infranchissable.

Technique des appareils plâtrés (spécialement pour l'orthopédie), par M. F. Michel; un volume in-8° de 98 pages; O. Doix, éditeur.

Exposé des reuseignements pris dans la pratique journalière du dispensaire Purtado-Heine que l'anteur a vouln reunir et présenter. On y trouve l'indication des précautions à prendre et la description des tours de mains indispensables pour la bonne exécution des appareils plátrés à bandes routées qui fournissent au praticien un moyen économique, lacile et sir de soulager ou de guérie.

La constipation habituelle, son traitement, par M. Herschell, traduit par M. Michel Cohendy; un volume in-18 de 89 pages; O. Doin, éditeur.

Il importe de bien établir le diagnostie de la variété chimique de la constipation pour instituer une boane thérapeudique. L'auteur donne aux moyens mécaniques une grande importance. Il insiste surrout sur l'emploites grands lavages répétés, de l'électrisation et du massage vibratoire. Il décrit avec détails les instruments qu'il emploie et la technique dont ils seret habituellement.

REVUE DES TRAVAUX FRANÇAIS ET ÉTRANGERS

Maladies du tube digestif et de ses annexes.

L'hyperchlorhydric comme contre-indication de la morphine dans les affections douloureuse de l'estomac. (Semaine médicate, septembre 1900.) — On sait depuis long-tomps que la morphine, introduite dans l'organismo par la voie sous-cutanée ou d'une autre façon, est éléminée en grande partie par la muqueuse stomacale. Sans que l'influence exercée par ce médicament sur la sécrétion du son gastrique, et notamment de l'acide chlorhydrique, soit bien connue, on admet genéralement qu'il s'agit en l'espèce d'une action inhibitrice. Aussi, contre les douleurs intenses ayant l'estomac pour point de départ, a-t-on recours indifféremment soit aux préparations opincées, soit à la belladone ou à son alcaloïde, soit même à un mélanze de morphine et d'atropine.

Or, M. le docteur F. Riegel, professeur de clinique médicale à la Faculté de médecine de Giessen, a pu se convainere par des recherches expérimentales instituées d'abord sur des chiens, puis sur l'homme, que la morphine, employée on injections hypodermiques ou sous forme de suppositoires, a pour effet constant d'augmenter la sécrétion chlorhydrique de l'estomac. Cependant, tout au début de l'expérience, cette sécrétion est plutôt d'aiminée et ce n'est qu'après une période de latonce dont la durée varie selon la quantité de morphine administrée par le taux de l'acide chlorhydrique s'élève, et cela proportionnellement à la dose d'alcaloide absorbé.

Ces résultats furent constatés de la façon la plus évidente chez les chiens porteurs d'une fistule gastrique pratiquée d'après la méthode de Pavlov, qui, comme on sait, per unt d'observer directement la muqueuse de l'estomac: mais une constatation analogue put être faite chez l'hommo; en effet, après administration de 0º/01 à 0º/02 centigr. de morphine par la voie sous-cutanée ou en suppositoires, notre confèrer a tonjours trouvé — au bout d'un laps de temps variant de une à deux heures — que la quantité d'acide chlorhydrique libre de l'estomac était sonsiblement supérieure à son taux habituel chez les mêmes suiets.

La considération thérapeutique qui découle de ces faits, c'est qu'en no doit pas "abresser à la morphine pour combattre les douleurs gastriques des hyporchlorhydriques en général et dos malades atteints d'ulcère de l'estemac en particulier; en peut pratiquer dans ces cas des injections sousentanées d'atropine, alcaloide qui diminue la sécretion chlorhydrique. Quant au mélange de morphine et d'atropine si fréquemment employé en injections hypodermiques, il faut également s'en absteuir chez les mêmes patients, afin de ne pas affaiblir l'effet thérapeutique désiré par l'administration simultanée de deux agents médicamenteux dont l'action sur l'acidité stomacale est opposée.

La levure de bière dans le traitement des entérites. — M. Thieroelin avait, on se le rappelle (voir Gazette des hopitaux, 1900, n° 3), préconisé, il y a quelques mois, la levure de bière dans les entérites infantiles. M. E. Blancher, reprenant cette idée, vient de consacrer sa thése (Paris 1900, à l'étude de cette médication dans les différentes formes d'inflammation intestinale. Les résultats obtenus par M. Blanchor, avec de la levure séche, ont été ontièrement favorables dans les gastrooutérites aigues et chroniques, de mêmo que dans l'entérite nuco-membraneus. Il procéde de la façon suivante :

Chox Padulte, en môme temps que la diète eu le régimo approprié aux différents états, M. Blancher, donne la levure en lavement à la dosse de 2 à 3 cuillerées à bouche par jour, chaque cuillerée étant délayée dans 150 grammes d'euu bouillie; en même temps le malade prend, per os, 3 fois dans

les vingt-quatre heures, une cuillerée à café de levure sèche délayée dans un peu d'eau.

Chez Penfant atteint de gastro-entòrite, quand la diarrhée résiste au traitement elassique, l'auteur denne, après un grand lavage de l'intestin, un lavement contenant ame cuillerée à café de levure délayée dans 60 grainmes d'eau beuillie tiéde, et qui est intreduit dans l'intestin de l'enfant au meyen d'une sende adaptée à une peire. Ce lavement peut étre renouvelé 2 ou 3 fois dans la jeurnée. Si la diarrhée persiste, en denne en outre par la beuche 1 à 2 cuillerées à café de levure délayée dans un peu d'eau bouillie. D'après l'auteur, l'injectien par la beuche réussit mieux que par lavements. Il précenise la dese de 2 à 3 cuillérées à café per os.

Chirurgie générale.

Du traitement de la rétention biliaire au cours du cancer de la téte du paueréas (M. Platol, Lyon médical, 7 octobre 1900). — L'auteur rapporte trois observations de cholecystogastrestomie qui peuvent se résumer :

- gastrestonne qui peuvent se resumer : 1º letère chronique. Néeplasme de la tête du pancréas. Chelécysto-gastrostemie. Survie de quatorze meis ;
- 2º Ictère chrenique. Distension de la vésicule biliaire. Cachexie. Choléeyste-gastrestomie. Néeplasme de la tête du pancréas. Mort quatre meis après;
- 3° Ictère chrenique. Température, Néeplasme de la tête du pancréus. Cholécyste-gastrestemie pratiquée le 30 août 1900. La malade vit encere.
- M. Platel, en discutant ces trois faits et les quelques autres qui ent été nubliés, en tire les conclusions suivantes :
- 1º Il faut intervenir dans les cas d'ebstructien du chelédeque, ear :
 - a) Le diagnostic entre eancer et calcul est souvent hésitant;
 - b) Même si l'en a pesé le diagnestie de cancer, en peut faire

déversor la bile dans l'estomac, opération utile pour lo malade, en ce sons que l'on pent supprimer l'ictère s'il n'y a pas de cirrhose concomitante;

2º Il faut préférer la cholécysto-gastrostomic, opération rationnelle au point de vue physiologique, opération plus facile que la chlolécystoduodénostomie, moins dangereuse que la cholécystentérostomie.

Pratiquée avec le bouton anastomotique de Jaboulay, ollo so fait avec une assez grande rapidité pour êtro entrepriso sur des malados déjà affaiblis.

Nouveau procedê d'extirpation des hémorrhoides (M. Potherat, Soc. de chir., juillet 1900), — Vous m'avez clargé do vous présenter un rapport sur un travail de M. Dupraz (de Genévo) concernant le traitement des hémorrhoides. Pour romédier aux inconvénients de la méthode de Whitelbacd, notre confrère unit la muqueuse décollée à la peau par quatre points de suture opposés deux à deux; puis il sectionne la muqueuse et preud chacun des lambeaux intermédiaires aux quatre premières sutures entre deux tubes de Girard (de Berne), destinés à obtenir un accolument parfait des parties, Pour tout le reste de l'opération, il suit d'ailleurs la méthode de Whitehead. Les tubes sont enlevés au bout de luit jours, et la cicatrisation est compléte à co moment. M. Dupraz a appliqué ce procédé dans 3 cas, et il a obtenu chez les 3 malades un résultat excellent.

La cocainisation des gros trones nerveux comme méthode d'amesthésie chirurgicale. (Jaboulay, Sem. méd., nov. 1900).

— Un des inconvénients de la cocainisation médullaire par le procédé de Bier est que l'amesthésic ainsi obtenue n'est pas limitée à la zoue opératoire. Pour éviter à la fois cette insensibilisation trop étendue et les troubles qui résultent parfois de l'action directe de la cocaine sur la moelle, M. le docteur Jaboulay, chirurgien de sobjetax de Ivon, a cu l'idée decteur Jaboulay, chirurgien de shojitax de Ivon, a cu l'idée

de cocainiser simplement les gros troncs nerveux de la région sur laquelle portera l'intervention.

Notre confrere s'est servi avec suecès de ce procedé dans un cas de désarticulation scapulo-humérale où l'existence d'une septicémie empéchait l'emploi de l'anesthésic générale. Chez co malade, l'incision pratiquée pour la ligature préalable de l'artère sous-claviere servit à l'insensibilisation du pleable de l'artère sous-claviere servit à l'insensibilisation du peut brachial: dans ce but, après anesthésic locale des parties molials cours d'artère, on lia ce vaisseau et on injecta quelques gouttes d'une solution de cocaine à 2,5 0,0 dans les deux branches principales du plexus. Des qu'on eut constaté que la partie supérieure du bras était devenue insensible, on procéda à la désarticulation de l'épaule qui se fit sans doulour. Le patient eut soulement une secousse au moment de la section de la partie interne du lambeau, région que contribuent à innorver les nets interesclaux.

C'est surtout aux membres supérieurs que l'anesthésic des troncs nerveux est facile à réaliser et peut rendre des services; mais on peut l'employer aussi aux membres inférieurs et dans d'autres régions, par exemple pour le territoire du triumeau.

Ajoutons que M. Jaboulay n'espère pas voir cotte méthodo d'anesthésio locale dovenir courante, ses indications so limitant aux cas où l'anesthésie générale ne saurait être mise en œuvro.

Sérothérapie.

De la sérothérapie de la flèvre typhoïde (M. Lagriffaul, Montpellier méd., 7 octobre 1900). — L'auteur a fait uno sôrie d'expériences sur la propriété préventire du sérum et de certains extraits d'organes d'animaux immunisés à l'égard du bacille d'Éborth et du bacillus coli. Il est arrivé aux conclusions suivantes: On peut obtenir des sérums doués de la propriété préventive à l'égard du B. d'Eberth et du B. Coli à l'aide des méthodes d'immunisation les plus diverses.

La méthode qui nous a paru la plus efficace est l'immunisation par cultures filtrées. Mais il est nécessaire d'injecter la plus grande quantité possible de toxique en rapproclant los injections autant que le permet la façon de réagir de l'animal. Nos sérums sont actifs à l'égard de l'infection intraveineuse que nous considérons comme la meilleure méthode d'épreuve des sérums. Ils n'agissent pas seulement comme bactéricides, mais comme antitoxiques.

Notre sérum coli est actif à l'égard de l'infection par le B. d'Eberth ot réciproquement.

Les sérums obtonus ne sont jamais doués d'une grande puissance. Cola tient, creyons-neus, à ce qu'ils ne contiennent pas de produits noutralisants pour tous les éléments toxiques des cultures du B. d'Eberth et du B. coli.

Lo preduit splénique des animaux immunisés no présente pas do propriété préventive nettement supérieure à celle du sérum; la moelle osseuse lour ost notablement inférieure.

Succès de la sérothérapie dans les cas de diphtéric. — Le deruier numéro du périodique édité par le D'Dainer « das Oasterreichische Sanitatuerera » contient une très intéressante statistique du D' Otto Jelinck, statistique basée sur les cas tirés de tous les hópitaux du monde aussi bien que de la pratique particulère des médecins. Toutes données montrent que la mertalité chez les diphtériques a grandoment diminué depuis l'emploi de la sérothérapie, et ce traitement est d'autant plus efflence qu'il est appliqué à une période moins avancée de la maladie. Les satistiques prouvent qu'en 1888, en Autriche, sur 16,963 malades traités sans le sérum, 0,697, soit 39,30 0/0 moururent, tandis que sur 15,333 traités par le sérum 2,428, soit 15,38 0/0 succombérent.

A Vionne, la mortalité dans la diplitérie, depuis l'usage de

la séroutiérapse (1855) n'est plus que le tiers de ce qu'elle était auparavant. Le chiffre des déces qui était de 1,578 en 1880, de 1,637 en 1894, n'est plus depuis l'emploi du sérum que 695 en 1895, 611 en 1896, 568 en 1207 et 524 en 1898. Il est de la plus grande importance d'employer le sérumtout à fait au début de la maladie. Parmi les malades traités par le sérum te premier et le deuxième jour seulement 7-60 (9) succombérent; pour ceux qui furent traités le troisième jour, la mortalité stati étà de 15,560 (9).

Maladies de la nutrition.

For, areaic ou cuivre dans la chlorose (1)º Liégois, Journ. des Prat., septembre 1900). — « Gardez-vous de croire que le seul traitement à employer dans la chlorose est la médication ferrugineuse! 1 S'il n'y en avait pas d'autre, 50 0/0 des chlorotiques ne guériraient jamais » (Jaccoult).

50 0/0 guèrissent par le fer ; 35 0/0 par l'arsenic ; 15 0/0 par le cuivre (statistique personnelle).

Le fer exagère, l'arsenic améliore l'émotivité cérébrale, spinale, cardiaque et artérielle des chlorotiques excitables, des chlorotiques névropathes ou hystériques. Après une vingtaine de jours de l'emploi de l'arsenie, le visage, les gencives, les conjonctives palpébrales commencent à recouvrer leur coloration rouge d'autan.

Voilà ce que la clinique nous apprend.

Elle nous apprend, en outre, que les névralgies des chlorotiques névropathes, herpétiques, hérèdo-herpétiques, guérissent par l'arsenie.

Elle nous apprend enfin que les chlorotiques névropathes dyspeptiques supportent mieux l'arsenic que le fer : la gastralgie bénéficie particulièrement du traitement arsénical.

L'arsenic fournit ces beanx résultats à la condition d'être administré d'une certaine façon : jamais sous forme de liqueur de Fowler ni de liqueur de Pearson que l'on se gardora d'associer, comme quelques-uns, à une teinture de mars tartarisée ou au tartrate ferrico-potassique. Des arsenicaux, le mieux tolèré est l'arseniate de soude en granules : un granule à 0°,001 au déjeuner, un au diner, pas davantage. Encore faut-1i, après quinze jours, suspendro le médicamen peudant une semaine pour y revenir quinze jours durant, et ainsi, si c'est nécessaire, pendant deux mois, deux mois et demi. L'humble clinicien se borne à constater l'heureuse influence de l'arsenie; il laisse aux bio-chimistes le soin de faire connaître son mode d'action.

Le cacodylate de soude —ce nouveau venu — est-il appelé à détrôner l'arséniate monosodique?

La disposition qu'ont les hématoblastes à donnor naissance à des hématies malformées, la disposition qu'ont les hématies à périciliter après leur formation — double disposition qui domine, l'histoire de la chlorose — ont parfois leurs sources - dans les profondeurs de l'hérédité ». La chlorose est aiusi préparée par une tare héréditaire de dégénérescence de la nutrition : parmi les facteurs de sa congénitalité, l'héréposcrofulose ou tuberculose figure, dans notre statistique, pour 15 0/0 des cas.

Depuis dix ans, je truite avec le plus grand avantage les chlorouses à hérédité servíuleuse par l'acéto-phosphate de cuivre. Je me suis servi de ce sel cuprique à doses fortes sans fatiguer ni révolter l'estomac : 2 piules à 0e,01 au milieu du dépouner, autant au milieu du diomer, pendant un, deux, trois mois. Plus tard, jo me suis assuré, par l'équirance, lence des résultats, que les piules à 1/2 centigramme, une seule à chaque repas, remplissent aussi bien le but. Et améun en pourraiton s'adresser à des doses plus faibles? Après tout, on vient à bout à Saint-Christau de l'aménorrhée chlorotique avec 2 ou 3 litres pro die, pendant une saison, d'eau de la source des Arceaux I Or, ces 2 ou 3 litres représentent 6 à 9 miligrammes seulement de sulfate de cuivre (es sais bien qu'il faut également tenir compte des maigres

quantités de earbonate de fer et de manganèse, d'arséniates, de chlorure de sodium que recèle cette cau).

J'ajoute que H. Hare, professeur de thérapeutique de Jefferson Medical College, a proposé en 1892 l'arsénite de cuivre (1 à 2 milligrammes trois fois par jour, après les repas).

Maladies des voies respiratoires.

Le thlocol dass le traitement de la tuberculose pulmonaire.

— Les observations et les expériences de Schwarz, Rossbach,
Maramaldi, de Renzi, et Boeri, Selmirer, Otto Marcus, ont
établi l'efficacité du thiocol, sel potassique de l'acide sulfogaicolicue, dans le traitement de la tuberculose vulmonaire.

M. Fasano (Archivio internazionale di medicina e chirugia, 1899, Décembre, An. XV, fane. 12, p. 432-467), a repris la question et a suivi vingt-sept tuberceuleux et dix serofuleux prenant régulièrement le thiocol, tandis qu'une série de vingtautres malades, comparables aux premiers par la nature et l'intensité de leurs lésions, étaient soumis à un traitement par d'autres dérivés de la créostet.

Dans les cas de tuberculose au début, on peut obtenir avec ce médicament la guérison complète. Dans les cas de moyenne intensité, si 7 on répéte l'administration du reméde pendant des périodes judicieusement espacées, on arrive à une amélioration voisine de la guérison. Dans les cas avancés, on peut espérer plus qu'un arrêt du processus tuberculeux, une notable amélioration qui peut persister assez longtemps ; aueune autre préparation de crécoste ou de ses dérivés ne donne de résultats aussi favorables. De plus, fait de hante importance, le thiocol ne trouble en rien l'appareil de la digestion; il semble même le ramence à la normale s'il est altéré.

Sous l'influence du thiocol, la toux, la fièvre, les sueurs nocturnes disparaissent, l'expectoration est tarie, cela assex rapidement dans les cas légers ou de gravité moyenne; dans les cas graves, il y a souvent atténuation de ces symptômes. Dans les cas de début lo nombre des bacilles diminue tout d'abord dans l'expectoration, ce qui semble bien indiquer une action directe du thiocol sur le processus tuberculeux; puis lorsque les bacilles ont disparu de l'expectoration lorsque l'expectoration a cossé d'exister, les signes physiques des lésions nulmonaires s'évanouissent.

Le thiocol, n'ayant ni odour ni saveur désagréable, estiacilement accepté du malade; il ne produit jamais d'irritation ni aucun trouble digestif à la dose quotidienne de 1 à 3 grammes.

Dans les tuberculoses chirurgicales, dans la scrofulose, les bronchiectasies et d'autres maladies du poumon et des bronchies, le thiocol peut aussi se montrer d'une grande efficacité. En somme, dans les maladies broncho-pulmouairres, dans les tuberculoses et en particulier la tuberculose-pulmonaire, le thiocol semble être un médicament do choix laissant loin derrière tous les produits qui ont été successivement proposés pour combattro ces affections.

Gynécologie et obstétrique.

Quelques considérations sur la sécrétion lactée chez les femmes.— « Plus on demande de lait aux femmes plus ellesen ournissent » a dit M. Budin et les faits (obstétrique du 15 nov. 1900) démontrent surabondamment l'évidence de cet axiome.

M. Budin rapporte un certain nombre d'observations dans lesquelles la sécrétion lactée, absolument insuffisante quelques jours après l'accouchement, était devenue de plus en plus abondante jusqu'à étro, à elle scule, tout à fait suffisante, et cola grâce à l'allatioment mixte.

D'autres faits vionnent ensuite montrer quo chez les femmes dont les seins fonctionnent, on peut obtenir une quantité de lait qui varie avec la demande.

Ainsi des nourrices qui le 1^{er} octobre 1895, au service des Débilos de la Maternité fournissaient en moyenne 1657 grammes ont vu leur quantité de lait augmenter jusqu'à 2230 grammes, le 29 uovembre, et cela sous l'influence d'un allaitement intensif. A cette époque survint une épidémie étre? les nourrissons qui diminua, par conséquent, la demande du lait. Le 10 décembre les nourrices ne donnaient plus que 1690 grammes, le 11 jauvier, 1431 grammes.

Enfin, le professeur Budin cite le cas d'une femme qui, ayant dû sevrer son enfant et ayant été huit jours, sans la moindre goutte do lait dans les seins, a vu son lait réapparaitre de nouveau en donnant à têter à un gros enfant.

Contribution à l'étude des métrites cervicates. — Après avoir élevé quelques doutes antrefois sur l'indépendance do cette métrite, M. Pozzi croît aujourd'hui qu'elle peut exister soule, soit à l'état aigu, soit à l'état chronique. (Recue de Gunce. et de Chir. add.).

L'étude clinique et l'examon anatomo-pathologique d'utérus prolabés enlevés par hystérectomie démontrent l'existence de la métrite cervicale.

En ce qui concerne le traitement, M. Pozzi recommande au début l'asepsie ou plutôt l'antisepsie du vagin et des attouchements de la surface ulcérée avec le nitrate d'argent, la teinture d'iode, la créosote.

A une période plus avancée, il faut exciser les tissus malades à l'aide de l'instrument tranchant, et l'auteur recommande l'amputation biconique lègèrement modifiée dans certains cas.

M. Pozzi étudie ensuite un cas particulier de métrite cervicale rencontré exclusivement chez les nullipares.

Le trait principal de celle-ci consiste en une étroitesso récelle ou relative de l'orifice externe du col. De cette étroitesse résulte un engouement muqueux, une accumulation de mueus dans l'intérieur du col qui vient à se dilater. Cette étroitesse se rencontre surfout dans le conique.

L'agent de l'infection est parfois le gonocoque plus ou moins atténué. Le plus souvent il est difficile d'affirmer cette origine, et M. Pozzi incline à penser qu'il s'agit d'infections purement saprophytiques.

Ce qui domine dans cette métrite cervicale, c'est la leucerrhée et la dysménorrhée.

Dans les cas invétérés, on peut rencontrer des végétations polypeuses, isolées ou multiples.

La dilatation est un mode de traitement illusoire,

Le débridement latéral est insuffisant et non sans dangers. Le traitement de choix consiste dans la réfection de l'oridice externe, dans la stomatoplastie par évidemment commissurel.

Quand le libro drainage de la sécrétion du col est assuré, il reste à guérir la muqueuse malado et, à ce point de vue, les antisoptiques et l'exérèse treuvent leur application.

Le traitement de l'éclampsie. — Depuis trois ans M. Stregonev fait suivre aux éclamptiques de son service clinique d'accouchement de St-Pétersbeurg le traitement suivant : (Wratch 16 nov. 1900.)

Après le premier accès, on prescrit les hypnetiques pendant 12 à .48 heures, selon les cas ; la morphine jeinte au chloral donne les meilleurs résultats. Il faut veiller attentivemont au bon fenctionnement des poumons et du cœur ; dans ce dernier but on introduit du sérum physiologique par voio buccale ou, si la malade est sans connaissance, par veie rectale. Au besoin ou prescrit la digitale. On évitera teute causo d'irritation physique, psychique eu autre. L'accouchement doit étrà, haté artificiellement ou prevoqué.

Les résultats de ce traitement sent des plus encourageants: sur 92 éclampsiques, l'auteur n'a ou que 5 cas de mort, encere dans trois d'entre eux la mort a-t-elle été provoquée par des complications plus ou meins tardives (pneumonie, septicèmie, hémorrhagie).

FORMULAIRE

Lavements calmants contre l'éclampsie

Il est reconnu que l'association de plusieurs médieaments doués d'une action thérapeutique analogue renforce la puissance curative de chacun d'eux. C'est ainsi qu'un mélange de chloral, de bromure de potassism, d'extrait de jusquiame et d'extrait de chanvre indien est employé couramment par les neurologistes comme hypnotique dans tous les états où l'évâthisiae du système nerveux empéche le sommeil.

M. le doeteur Popeseul, assistant à la Maternité de Czernowitz, a en l'idée d'utiliser une préparation analogue contre les erises d'éclampsie. Voiei la formule préconisée par notre confrère:

Bromure de potassium	44 90 ansuma
Chloral	aa oo gramme
Extrait de jusquiame de chanvre indien	64 OFF 95
 de chanvre indien 	ata Uniya
 de réglisse liquide 	90 grainme
Essence d'écorces d'oranges amé	
1908	V conttes

On administre ee mélange en lavements, à la dose d'une cuillerée à bouche; il est rare qu'une quantité plus élevée soit nécessaire.

M. Popescul aurait employé eette médieation dans un grand nombre de cas d'éclampsie ayant débuté avant ou pendant le travail, et toujours avec un suecès complet.

L'Administrateur-Gérant: O. DOIN.



La responsabilité médicale. — Les présentations pour les nouvelles chaires de clinique. — La question du baccalaurést au point de vue médical. — Soins médicaux gratuits aux officiers de réserve.

Nous appelens l'attention sur un jugement prenencé par le tribunal de la Seine dans un procès relatif à une radiographie suivie de brûlure graye. Les censidérants de ce jugement ne sont pas tendres peur l'auteur de l'accident, non plus que peur lo corps médical en général. Sans vouloir entrer dans la discussion du litige, il est pormis de dire que la tochnique radiographique est encore loin d'être fixée, que l'action physiclologique des rayens cathediques est mal cennue et quo certainement les praticiens ne peuvent pas être facilement rendus responsables d'accidents qui se produisent parfois de manière déconcertante. C'est co qu'avait tonté de faire ressortir l'expert nemmé par le tribunal, mais celui-ci n'a pas admis ces raisens et, après des censidérants rudement motivés, eù le rôle de l'export lui-même est attoint, le médecin considéré comme rosponsable est cendamné à 5.000 francs de dommages et intérêts et à des frais censidérables. Notons surtout une argumentation qui peut être dans l'avenir gravo do conséquences : lo tribunal considére que, quand il agit comme spécialiste chargé de l'emploi d'un moyon physique de traitement, le docteur en médecine se transforme on industriel chargé d'exécuter les ordonnances du véritable médecin traitant et qu'en conséquonce il perd la qualité de médecin. C'est là une facon d'appréciation qui mérite sérieusment d'être envisagée par les médecins

402 BULLETIN

aujourd'hui si nombreux qui pratiquent les applications des procédés physiques de traitement.

Une intéressante question vicnt de se régler : on sait que le Conseil municipal s'est décidé à imiter les autres municipalités des villes universitaires et qu'il a consonti à participer aux améliorations de l'enseignement à la Faculté de médecine. par la création de deux chaires de cliniques spéciales dont il fera les frais. Ces deux chaires sont attribuées à la gunécologie d'une part et d'autre part à une clinique chirurgicale des entants, lei, ce n'est point la Faculté qui avait à donner son avis de classement, mais bien la commission mixte créée pour traiter les rapports de la Ville avec l'université de Paris, commission qui comprend dix délégués du Conseil municipal contro douze membres du Conseil de l'université. M. Pozzi a été présenté en première ligne pour la chaire de gynécologie et M. Bouilly en seconde ligne; pour la chaire de chirurgie infantile, très disputée, M. Kirmisson a été présenté en première ligne et M. Brun en seconde ligne, Il est difficile d'apprécier ces nominations, nous sommes en présence de candidats très éminents. M. Pozzi l'a emporté et il le mérite, mais son concurrent, M. Bouilly, I'un do nos collaboratours, n'était pas moins digno de devenir professeur de clinique; nous ne pouvons quo féliciter le corps médical des hôpitaux d'être si riche en hommes éminents que le choix devienne très difficile.

Un médecin a-t-il besoin d'avoir fait ses humanités? Cette question se posait de nouvoau ces jours-ci devant le Conseil supérieur de l'Université, pour répondre au désir de certains qui auraient bien voulu ouvrir une porte aux possesseurs de ce fameux baccalauréat moderne qui ne peuvent l'utiliser pour rien.

Pour tout homme qui raisonne il n'y a qu'une réponse possible: le médecin doit possèder la plus grando culture et c'est à lui surtout que les fortes études sont nécossaires. La seule critique à faire, c'est que le baccalauréat classique actuel ne réponde vraiment pas aux nécossités de la vio moderne; le candidat aux études médicales dovrait possèder une baco scientifique plus sérieuse et nous voudrions que le baccalauréat de philosophie ne soit pas exclusivement exigó, mais bien, au choix de l'intéressé, le diplôme de mathématiques ou de philosophie.

Cos deux ordres d'études pourraient parfaitement se suppléer et, par la liberté laissée aux élères, on assurerait certainement un recrutement plus varié et cela pour le plus grand bien de l'élévation du niveau des études.

Il est parfois utile de liro les journaux politiques et d'y relever les questions susceptibles d'excreer une influence sur les intérêts professionnols du corps médical. La Chambre s'occupe en ce moment d'améliorer le sort des officiers de réserve, dans l'espoir de rendre le rocrutement plus facile; or, parmi les conditions acceptées par la commission, se trouve la possibilité pour les officiers d'avoir gratuitoment, pour oux et lour famille, les soins médicaux des médecins militaires, Etant donné que le nombre des officiers de réserve est considérable et que pour une bonne part ils font partie de la clientèle des médecins civils, on peut craindre que ceux-cine se trouvont lésés de manière plus ou moins grave. Dans une nation où tout le monde est soldat, il semble que l'on aurait tort d'aller trop loin dans la voie des concessions dont les contribuables au fond, sous une forme ou sous une autre, so trouvent faire tous les frais. Les impôts augmenteront tandis que le champ du travail national se trouvera do plus on plus réduit, tout cela ne laisse pas d'ouvrir de graves questions pour l'avenir de notre pays dont les affaires ne sont déjà pas si brillantes.

GYNÉCOLOGIE

Le traitement de la tuberculose pulmonaire par l'emploi des caux minérales,

Par le D' F. GARRIGOU.

Chargé de cours (hydrologie) à la Faculté de médecine et de Pharmacie de Toulouse

(Fin.)

Je viens de dire qu'avec ce malade, comme avec beaucoup d'autres, j'avais employé la métalloscopie comme premier guide.

C'est, en effet, marcher à coup sur, que d'employer cette méthode d'investigation, et d'en suivre les indications. Elles sont formelles, i'ose même dire, à peu près infaillibles.

Mais la méthode est longue à appliquer, je l'avoue. Le médecin pratiquant ne peut se soumettre à ses détails. Il lui faut un ou plusieurs aides, pour s'en servir dans la pratique.

C'est après l'avoir étudiée par moi-même directement sur le malade, et cela sans le secours d'aucun aide, pendant sept années consécutives, que j'en ai apprécié la valeur, et que j'ai dressé des aides à son application, de manière à supprimer la perte de temps que cette application m'ocassionnait.

Elle mériterait, dans l'intérêt exclusif des malades, d'être mise en usage d'une manière régulière telle que Burq l'avait établie, et d'après les modifications que je lui ai fait subir, et que j'ai décrites.

Elle est absolument indispensable pour faire correcte-

ment, scientifiquement, la médecine des gens nerveux, principalcment, et pour établir le choix de tout traitement thermal. Elle indique quels sont les métaux auxquels les malades sont sensibles, et, par conséquent, ceux qu'il faut rechercher, pour tel ou tel cas déterminé, dans les eaux minérales.

Or ceci, ne peut se faire qu'en ayant des analyses d'eau complètes. Et je puis affirmer que dans les cas où l'examen métalloscopique et la composition d'une eau concordent, les résultats thérapeutiques hydrothermaux, sont absolument sirs, et la guérison ou l'amélioration des malades, est la règle presque absolue.

Il est indispensable de faire des catégories de tuberculeux au point de vue du traitement thermal. Je les classe en tuberculeux arthritiques, lymphatiques, nerveux, syphilitiques.

Ces derniers m'ont offert, je dois le dire, sans tarder, une particularité très instructive : c'est que dans plusieurs cas, le traitement spécifique pousse vigoureussement à une influence réelle et favorable sur la marche de la tuberculose. Je reviendrai sur ce sujet un peu plus lom.

Voyons ce qui peut intéresser chaque genre de tuberculose, d'après notre division précédente :

- 1º Tuberculose arthritique. Ces tuberculeux, sous l'influence de la médication thermale, telle qu'elle est appliquée empiriquement, suivant l'habitude, soit avec les eaux sulfurées, soit avec les caux dites arsénicales, peuvent présenter deux ordres de résultats.
- A. Une modification locale des phénomènes inflammatoires locaux, avec résolution ou induration des tubercules.
- B. Une métastase, avec une disparition lente, mais complète, de toute lésion locale.

Examinons les deux cas séparément.

A. Modification locale des phénomènes inflammatoires locaux, avec résolution ou induration des tubercules.—
Cette modification n'est pas rare chez les phisiques, et j'en connais des cas traités à Eaux-Bonnes et au Mont-Dore.
Ces cas ne sont pas dus à une médication calculée pour atteindre le but de l'induration, mais au hazard.

Et comme c'est là une terminaison heureuse de la lésion pulmonaire microbieme, nous devons, aujourd'hui où la science nous en fournit les moyens, pousser à la transformation calcaire, des tubercules du début, ou en évolution, en donnant aux tuberculeux arthritiques des eaux qui fournissent chez eux une production anormale, maladive, d'incrustations pierreuses, devenant, dans le cas qui nous occupe, une solution des plus heureuses de la terrible affection.

Voilà pourquoi je donne bien souvent aux phitsiques qui présentent des présomptions sthetoscopiques d'induration, des eaux calcaires, et l'addition, dans les Baux-Bonnes, par exemple, d'une certaine quantité de préparations calciures.

Il faut, chez ces malades, surveiller de près la médication, afin que les dépôts tophacés adventifs du tissu pulmonaire, n'y produisent pas des effets irritants locaux de même ordre que les tophus articulaires, et ne soient par leur excès de développement, le point de départ de phénomènes inflammatoires.

Bien entendu, je ne néglige jamais, avec cos malades, Pexamen métalloscopique, qui donne toujours l'indication principale, basique, pour le relèvement des forces, et celle pour le choix de la source thermo-minérale à mettre en usage.

B. Métastase avec disparition lenie mais complète de toute lésion locale. — J'ai vu des cas très nets, de la coincidence d'apparition de phénomènes aigus et secondairement chroniques, du côté de la peau, chez des tuberculeux arthritiques, avec la disparition lente, mais absolue, des phénomènes pulmonaires phymiques, sous l'influence de traitéments normaux bien choisis, et plus ou moins action. Aussi la pratique acquise me porte, déjà depuis bien des années, à agir sur les tuberculeux de l'ordre de ceux qui m'occupent on ce moment, avec des caux et des moyens hydropathiques capables de ramener des affections de peau disparues, ou d'en créer de toute pièce lorsque cela se peut. En voici un exemple :

Une jeune fille que j'ai pu suivre depuis la plus tendre enfance, m'a présenté un cas absolument typique de l'action dérivatrice dont je viens de parler. En voici l'exposé :

M¹⁰ V. X... aujourd'hui agée de 25 ans, fut prise, dès sa première aunée d'existence, d'une affection gourneuse, coîncidant avec le tempéramment arthritique de ses parents, surtout de son père. En grandissant, elle devint psoriasique à un tel point, que vers l'âge de huit ans, son psoriasis était rénéralisé.

Aulus en boisson, lui fit le plus grand bien, diminua d'une manière très sensible l'état de sa peau. L'état général de cette enfant était excellent.

Sous l'influence d'un traitement cutané local, intempestif, et auquel je m'étais opposé, la lésion cutanée diminua presque au point de disparatire. En quelques semaines les deux poumons furent pris d'une congestion très étendue. Sommet gauche et sommet droit, celui-ci, opendant, moins que l'autre, présentèrent des craquements secs et des rules sibilant se manifestèrent dans toute la hauteur de l'arbre aérien, des deux côtés de la politrine. Avec cela se déclare une fièvre presque constante. La perte de l'appétit devient coissante, la malade maigrit, tousse, crache du muco-pus

avec des stries sanguines qui effrayent autant la famille, que le médecin ordinaire.

On m'envoie cette enfant à Luchon, avec un diagnostic (tubercules en évolution) et un pronostic désespérants, porté par l'excellent médecin qui la soigne.

Mon premier soin est de m'informer où en est le psoriasis, car je n'avais pas vu la malade depuis un an.

On me fait savoir qu'il avait presque complètement disparu sous l'influence d'un traitement empirique local, mais, depuis quelques jours, il tendait à reparaître.

Par une vigoureuse action dermique, en dehors de tout traitement thermal, je ramène une véritable poussée psoriasique. Après quelques jours, les phénomènes pulmonaires s'arrètent, l'appétit renaît, la malade s'améliore. A Pauscultation on suit nettement la diminution des bruits stéthoscopiques, et je puis conseiller quelques cuillerées d'une eau sulfurée minérale et goudronneuse, qui depuis des années me donne d'excellents résultats avec les phtisiques qui peuvent la supporter (l'eau de Saint-Boës), eau essentiellement antiphymique et reconstituante.

Cette médication donne un résultat local des plus heureux, et je puis soumettre la malade à quelques inhalations sulfurées, après un séjour de plus d'un mois à Luchon.

J'envoie ensuite la jeune enfant à Aulus, où l'eau de la source Darmagnac en boisson (source purgative et des plus métallières) produit, tant sur l'état pulmonaire restant, que sur le psoriasis, un effet vraiment merveilleux. Le psoriasis disparat; tous les phénomènes locaux pulmonaires deviennent insensibles au sthétoscope, après ce long traitement.

Il ne reste plus à la malade qu'une tendance asthmatique, qui donne lieu à quelques accès dans le courant de l'hiver.

Une seconde saison à Aulus, affermit les résultats obte-

nus, et une série de humages à Luchon tonifie la muqueuse pulmonaire, l'année suivante (1890).

Quelques tendances psoriasiques se manifestent encore, de loin en loin, pendant quelques années. Aulus en a raison chaque fois. Seule reste la tendance asthmatique, cachet définitif de l'état arthritique du sujet.

Le frère de cette jeune enfant a présenté, lui aussi, pendant qu'il faisait en Afrique son service militaire, des phénomènes thoraciques tels, qu'on l'a réformé comme tuberculeux au début. Quelques vésicatoires, des frictions ioidées et l'eau de Saint-Boës m'ont permis, comme pour sa sœur, de tirer ce jeune homme du mauvais pas dans lequel un simple refroidissement l'avait engagé.

Comme sa sœur, il jouit aujourd'hui d'une santé parfaite, et plusieurs bronchites commençantes, greffées sur les poumons qui avaient été le point de départ de sa réforme, n'ont eu pour lui auœune conséquence.

Des cas nombreux du genre de celui que je viens de rapporter existent dans ma clinique thermale. Mais celui-ci est l'un des plus remarquables et, pour moi, des plus concluants, parce que j'ai le sujet à ma portée depuis son enfance, et que je le tiens encore sous mon observation.

2º Tuberculeux lymphatiques.— Si les tuberculeux arthritiques sont nombreux, et assez facilement accessibles au traitement par les caux sulfurées, les phitisiques lymphatiques constituent la plus grosse part de l'armée tuberculeuse réclamant en même traitement.

Mais si la métastase était la base favorable du traitement à préconiser contre la tuberculose des arthritiques, toute autre est la manière de se comporter vis-à-vis des tuberculeux lymphatiques.

C'est, avant tout, en reconstituant le malade, par les moyens généraux, et en usant des indications métallosco-

piques, qu'il faudra agir, en même temps qu'on assoiera le traitement sur la médication thermominérale antiscrofuleuse. Les eaux chlorobromurées fortes devront être mises au premier rang, non seulement pour être la vraie base du traitement actif de la maladie déclarée, mais la base aussi du traitement préventif de la maladie, chez les prédisposés.

Les eaux chlorurées fortes, Salies-de-Béarn, Salies-du-Salat, Briscous-Biarritz, Salins-du-Jura, Dax, Bex, Nauheim, etc., etc., sont des eaux qui doivent, malgré l'habitude que l'on a de pas baigner les malades phisiques, être préconisées et préférées pour remonter la constitution des victimes de cet état pathologique. On doit user concurremment de tous les adjuvants indiqués, soit par la métal loscopie, soit par les autres movens mis à la disposition des médecins traitants, par la science et par leur instruction personnelle. La médication chlorosulfurée est parfaite.

En complétant ce traitement général par la suralimentation, par l'usage d'eaux minérales métallifères appropriées, par l'application des moyens modificateurs directs de l'état local des noumons, la phtisie des lymphatiques guérit parfaitement et. souvent, d'une manière définitive.

La médication salée forte prévient également la maladie chez les prédisposés.

La manière de voir du vieux médecin de Salies-de-Béarn, sur les observations duquel on s'est appuyé pour créer la station, mérite d'être rappelée à ce sujet. Voici ce que disait le Dr Nogaret :

- « Avant que l'on couvrit la fontaine Salée, nous envoyions
- « se baigner en tout temps les enfants qui semblaient pré-« disposés à la tuberculose, et nous n'avions jamais de
- « phtisiques à Salies, Aujourd'hui que le lac salé est cou-
- « vert, et que les enfants ne peuvent plus s'y plonger, la

« phtisie s'est implantée dans la localité, avec toutes ses « conséquences.

Mes observations personnelles, m'ont confirmé depuis, dans cette idée, que la médication chlorurée forte était le meilleur préservatif de la maladie qui nous occupe. Et je crois, depuis près de 20 ans, avoir rendu cette maladie plus attaquable, encore, en joignant ensemble la médication chlorurée et la médication sulfurée, comme traitement balnéaire.

Une longue expérience me permet de dire, qu'il n'y a pas de médication générale, soit curative, soit préventive, plus active et plus efficace que cette médication complexe aidée de tous les adjuvants indispensables, hygiéniques et médicamenteux, pour combattre à la fois, et avec plein succès, les accidents généraux et les accidents locaux de la tuberculose pulmonaire.

3º Tuberculeux neurastheniques. — Ce genre de tuberculeux est le plus difficile et le plus délicat à traiter. Les moyens que je viens d'indiquer pour les appliquer aux tuberculeux lymphatiques, sont également applicables aux nerveux tuberculeux, mais avec une moins grande énergie.

Les bains sédatifs et toniques, composés au moyen des sources métallières que fera choisir la métalloscopie, et additionnés de sel et d'eau mères bromurées, constitueront pour eux, un traitement de reconstitution et de calme vraiment remarquable dans ses effets immédiats. Mais à la moindre excitation, il faut user avec ces malades de bains exclusivement calmants, bains de tilleul et d'eaux mères. Après chaque bain d'une durée de 1/4 d'heure à 1/8 heure à une température de 35° au maximum, le sujet devra se coucher dans un lit hors de froid, et dans le calme le plus absolu. La boisson d'une eau métallifère appropriée est l'adjuvant indispensable du traitement par le bain sédatif.

Fai vu chez des phtisiques nerveux traités à domicile, par des bains métalliferes et salés, en même temps que la boisson de la source Vieille d'Eaux-Bonnes, était devenu le complément métallique du traitement, obtenir des résultats tenant de la merveille. La surveillance constante de l'état des poumons était l'objet de toute ma sollicitude, afin d'éviter les congestions locales et les hémoptysies qu'occa-sionnent quelquefois l'emploi de cette source.

Je ne sauraí oublier de mentionner les effets surprenants dans le cas qui nous occupe, de l'eau de Saint-Boës très fortement suffurée (0 gr. 156 de monosulfure de sodium par litre), à métallisation assez variée, et naturellement goudronneus

Elle peut-être considérée comme l'eau la plus complète, par sa composition, qu'il soit possible d'ordonner à un phtisique. Les doses doivent être limitées, au début, à la valeur d'un evre à Bordeaux, et peuvent être portées, dans certains cas, à 200 grammes matin et soir.

4º Tuberculeux syphilitiques. — C'est à Aulus que j'ai pu constater et apprécier l'influence du traitement antisyphilitique sur la marche de la phtisie.

Des malades de cette catégorie de tuberculose, ont été guéris à la fois, de leur syphilis et de leur tuberculose, qu'ils aient ou non subi un traitement mercuriel antérieur, en suivant le traitement spécial à Aulus, c'est-à-dire, la boisson à laute dose. Guidé par cette observation, et sachant par mes propres analyses, que les eaux de cette station étaient métallières à un très haut point, j'ai pensé d'après ce qui est connu en matière médicale et en thérapeutique, que les métaux que ces eaux contiennent (chrome, fer, manganèse, cuivre, mercure, argent, arsenic, antimoine, fer, manganèse, cuivre, mercure, argent, arsenic, antimoine,

etc., etc...) ont été en cause, dans les cas de guérison de la maladie spécifique, en même temps que dans ceux qui regardent l'anémie concomitante, accompagnée des accidents pulmonaires microbiens.

Depuis lors, mes observations ont été assez souvent répétées, pour que je puisse indiquer les eaux d'Aulus, bien que moins actives aujourd'hui qu'il y a 20 ans, aux tuberculeux syphilitiques, avec certitude qu'elles leur seraient très utiles encore.

Je ne m'étendrai pas plus longtemps sur le sujet que j'ai abordé dans ce court mémoire.

Les points principaux et nouveaux que j'ai voulu mettre en saillie, sont les suivants:

1º Les eaux minérales doivent devenir un jour l'une des bases les plus solides des traitements de la tuberculose, mais il faut, pour s'en servir utilement, en connaître à fond la composition, ainsi que les effets physiologicothérapeutiques, qui tiennent à cette composition.

2º La tuberculose pulmonaire n'a pas à proprement parler d'eau minérale spéciale à son actif thérapeutique, puisque cette maladie peut guérir dans des stations thermales variées pour leur genre d'eau, mais toutes se trouvant métallifères, à un point très-élevé.

3º Les eaux à métallisation la plus variée, paraissent être les plus actives dans le traitement de l'anémie et de la phtisie, par le remontement général des malades.

4º Elles agissent suivant toute probabilité en relevant l'état physiologique du globule sanguin, et en refaisant ainsi la constitution, ce qui rend au malade une bonne partie des forces perdues.

5º La qualité de sulfureuse possédée par une eau très métallifère, augmente sa valeur dans le traitement de la phtisie, car le soufre peut agir non seulement comme reconstituant secondaire, mais comme topique local contre les actions microbiennes secondaires et contre le microbe de Koch lui-même.

- 6º S'il est une source qui puisse être signalée comme convenant par sa composition chimique à un très grand nombre de phtisiques, c'est celle de Saint-Boës, qui, en même temps qu'elle est riche en métaux, est très fortement sulfurée, et abondamment pourvue en goudron naturel et en produits roudronneux.
- 75 A chaque genre de phtisique, il faut son traitement spécial, dans lequel on combinera les eaux capables de relever les forces par leur métallisation sérieuse, en même temps que celles dans lesquelles abondent le chlorure de sodium, et le brome, ainsi que les eaux sulfurées, qui, soit en boisson, soit en inhalation, soit en lavement (truitement Lerjeon) peuvent agir directement sur la muqueuse pulmonaire, et, par conséquent, contre le microbe de Koch et contre les microbes de second ordre, plus facilement atteints que celui qui est considéré comme spécial à la phthásie.

THÉRAPEUTIQUE GÉNÉRALE

Les indications de la saignée et le rôle de la potasse dans l'urémie

Par ALBERT ROBIN

1

M. Hayem, dans un rapport sur les indications de la saignée, vient d'exposer les idées courantes sur la valeur et l'action des soustractions sanguines. En réalité, celles-ci sont à peu près abandonnées. Elles ne sont plus la médication de la tradition; la physiologia déclare que leurs effets immédiats sont fugaces et que leurs effets secondaires sont plus ou moins fâcheux. La physiologie pathologique ne reconnati aucun processus morbide où elles soient indiquées, et comme M. Hayem vient de le dire, les cas dans lesquels la saignée est encore pratiquée sont ceux où la vie est mise en danger immédiat soit par troubles de circulation, soit par toxémic. Alors, les offets de la saignée se rattacheraient d'un coté à l'effet mécanique produit par la soustraction brusque d'une certaine quantité de sang, de l'autre à une décharge de noisons.

Donc, dans les cas rares où l'on saigne encore, on ne demande à la soustraction sanguine qu'une action mécanique ou évacuatrice, et comme cette action est transitoire et qu'on ne veut pas épuiser l'organisme pour la renouveler, on no saigne plus, ou l'on ne saigne qu'à la dernière extrémité quand la déplétion devient urgente. Aussi, cette urgence de la déplétion demeure-t-elle, à notre époque, l'unique et exception-nalla indication de la saignée.

Mais, laissons pour un instant de côté les statistiques incertaines que fournit la clinique ainsi que los renseignements d'une physiologie déjà clinitaine, et considérons l'action des émissions sanguines sur la nutrition élémentaire; aussitot, la question s'élargit et l'action chimique considérable que celles-ci exercent sur l'organisme devient la source d'indications nouvelles dont la précision prend un caractère mathématique.

11

J'ai fixé cette action des émissions sanguines sur la nutrition en étudiant les échanges généraux et les échanges respiratoires. Ces derniers ont été déterminés avec la collaboration de Maurice Binet (de Saint-Honoré). Voici le résumé sommaire de mes recherches:

A. — Dans une maladie aiguë, comme la pneumonie, prise pour type, une saignée de 150 grammes augmente légèrement la quantité d'urine (80/0), les matériaux solides, les matériaux organiques, l'urde, l'azote total, le coefficient d'oxydation azoteke, l'acide plossphorique, le rapport de l'azide plossphorique de l'azote total. Ceci équivant à dire que la saignée augmente les échanges azotés, améliore l'évolution des produits azotés de la désintégration en accroissant leur oxydation, et relève les actes chimiques qui s'accomplissent dans le système nerveux.

H. 30 ans. - Preumonie grippale.

Les échanges généraux avant et après une saignée de 100 grammes.

DÉSIGNATION	Avant	Après
DES CARACTÈRES UROLOGIQUES	la saignéo	la saignée
Quantité	750 gr.	800 gr.
Densité	1023	1021
Matériaux solidos	31 gr.	40er,08
- organiques	274,90	341,20
- inorganiques	6er,10	5e-,60
Azoto total	1117,410	1217,950
Urée	194,630	25r.590
Acido urique	0er,473	0er,464
Matières extractives azotées incomplètement		
oxydėes	647,280	34,048
Chlorure do sodium	147,500	0rr,800
Acide phosphorique	0¢r,825	147,600
Coefficient d'oxydation azotéo	80¢r,3	915,7
- do déminéralisation	174,8	13e-,7

Dans les *états urémiques*, l'action d'une saignée de 250 grammes produit exactement les mêmes résultats. Il en est de mème chez les cardiaques, avec une saignée de 150 grammes.

B.— Les hémorrhagies naturelles, comme les règles, agissont à peu près de la même manière que les hémorrhagies provoquées dans un but thérapeutique. Les oxydations acotées sont augmentées, mais la désintégration acotée, c'est-à-dire la destruction des matières abluminoïdes, est diminuée.

C. — Les hémorrhagies pathologiques, ou tout au moins certaines d'entre elles, comme les hématémèses de l'ulcère rond de l'estomac ou du duodénum, ont la même influence.

En résumé, qu'il s'agisse d'hémorrhagies naturelles, pathologiques ou thérapeutiques, une perte sanguine minime augmente les échanges généraux et accroît les oxydations.

Ш

Que se passe-t-il dans le chimisme respiratoire?

Toutes les hémorrhagies, qu'elles soient normales comme les règles, pathologiques comme l'épistaxis et l'hématémése, ou enfin provoquées dans un but thérapeutique, produisent des effets presques analogues.

Le chimisme respiratoire pendant les règles.

с. с,
121
4,87
6,01
1,13

B. Le chimisme respiratoire avant et après une saignée par des ventouses scarifiées (1).

DÉSIGNATION DES ÉLÉMENTS du CHIMISNE RESPIRATOIRE	Avant les ventouses	Après les vontouses	
Par kilogramme-minute	с, с.	с. с.	
Ventilation	206,3	250,9	
Acide carbonique produit	7,63	9,4	
Oxygèno total consommé	10,11	12,42	
absorbé par les tissus	2,48	3,01	

C. Le chimisme respiratoire avant et après la saignée du bras.

DÉSIGNATION DES ÉLÉMENTS	SS ÉLÉMENTS SAIGNÉE DE 250 GR.		SAIGNÉE DE 200 GR. (2)	
CHIMISME RESPIRATOIRE	Avant	Après	Avant	Après
Par kilogramme-minute.	c. o.	c. c.	с. с.	с. с.
Ventilation	130,8	231	61,45	88,9
Acide carbonique produit	3,65	7,39	2,324	3,20
Oxygène total consommé	4,7	9,70	2,56	3,91
 absorbė par les tissus. 	1,05	2,31	0,24	0,71

⁽i) F. Mal do Bright chronique avec myocardite chronique, épanchement pleural et troubles urémiques. Sans lièvre, rendant 10 grammes d'albumino par litre d'urine. Est soumise au régime la préside que avec hypertrophie considérable du cour, insuffissance sorique et unitrale. Urémio.

⁽¹⁾ Pneumonie grippale, 6 ventouses. 60 grammes de sang. (Moyennes de cinq observations.)

En faisant le pourcentage des expériences précèdentes, voici les chiffres qu'on obtient:

D. Augmentation 0/0 du chimisme respiratoire

DÉSIGNATION DES ÉLÉMENTS du CHIMISME RESPIRATOIRE	Après les règles	Après les ventouses scarifiées	Après la saignée
Par kilogramme-minute. Ventilation	c. c.	c, c.	c. c.
	12,73	21,62	61,01
	19,73	23,27	70,08
	12,73	22,85	79,12
	7,57	21,62	155,32

ıv

Et maintenant, je puis ééjé concluve. L'ancienne médecine nous avait déjà appris que la saignée activait la rénovation du sang, diminuait sa tension et évacuait une certaine quantité de poisons. Nos recherches démontrent, en outre, qu'elle favorise les oxydations gráce à la suractivité qu'elle donne aux échanges nutritifs de tous ordress. Une soustraction moderte de sang devient aussi un moyen d'oxydation générale.

De ces faits découlent pour l'emploi thérapeutique des émissions sanguines les indications suivantes :

1º Lour action sur la tension sanguine, en d'autres termes leur action mécanique, légitime leur emploi dans les stases sanguines des cardiaques asystoliques, dans l'exèdeme aigu du poumon, et dans la congestion et l'hémorrhagie cérébrales, au début, chez les malades ayant de l'hypertension artérielle.

2º Elles trouveront leur emploi dans les affections où la

nutrition est en déchéance, quand cette déchéance ne dépondra pas d'une dénutrition exagérée, mais d'une insuffisance des actes nutritifs caractérisée par l'abaissement des échanges respiratoires, du taux de l'urée, des divers coefficients d'oxydation

Les émissions sanguines ne sont pas indiquées dans telle ou telle entité morbide; ce qui les indique, dans des états pathologiques souvent fort dissemblables, c'est cet élément morbido commun de l'insuffisance des oxydations organiques.

3º Mieux que la théorie de la déplétion, les faits chimiques qui précèdent montrent comment la saignée peut réussir dans quelques cas de pneumonie, alors que les accidents dominants qui imposent à la maladie sa haute gravité sont causés par des poisons d'origine microbienne, et par ceux que fabrique l'organisme dans sa lutte contre l'agent infectieux. Il ya deux espèces de fièvre, l'une réactionnelle, favorable, constituant un acte de défense : l'autre toxique, due à l'action des poisons microbiens et organiques. La première espèce de fièvre, il faut la respecter; la seconde, il faut la combattre. Or, cette dernière n'est pas justiciable de l'antipyrèso, olle n'est attaquable que par les movens visant directement les toxines. De celles-ci, l'organisme ne peut se débarrasser que de deux facons, soit en les éliminant, soit en les oxydant (A. Gautier), ce qui los transforme en produits solubles, facilement éliminables, dépourvus de toxicité.

Or, les émissions sanguines qui accélèrent si puissamment les oxydations, sont destinées à devenir un agent thérapeutique important dans certaines infections et dans quelques auto-intoxications à la condition qu'on les manie avec prudence et habiloté. La preuve en est faite pour la pneumonie, et nous ne doutons pas que l'heure vienne bientôt, où l'on discutera, tout au moins, la possibilité de leur emploi dans d'autresinfections.

4º Dans les auto-intoxications, dont l'urémie est le type, les émissions sanguines n'agissent pas tant en soustrayant une minime partie du poison qu'en activant les actes d'oxydation qui transforment ce poison en un principe soluble et non toxique.

Quelquos-unes do mes recherches pratiquées chez des uréniques démontrent nettoment, en effet, un énorme accroissesement des oxydations.

v

A ce propos, ces recherches tendent encore à prouver combien est inexacte la théorie qui fait jouer à l'intoxication par les sels de potasse un rôle prépondérant dans l'urémic. Si cette théorie était exacte, il faudrait, pour que la saignée est une action efficace, retirer une grande masse de sang afin d'extraire une plus grande quantité du poison, et personne ne met en dout l'action souvent définitive d'une saignée de 200 à 250 grammes, soit d'une bien minime partie de la masse totale du sang.

Mais je puis fournir une preuve bien plus forte encore.

D'après les auteurs, la quantité de potasse contenue dans le sang normal serait de 1º,570 à 1º,739 0/0. Mes recherches personnelles m'ont donné le chiffre de 1º,640 0/0. Or, voici les chiffres trouvés dans le sang de quatre urémiques :

La potasse dans le sang des urémiques.

```
1º Salle Valleix nº 12 Potasse. .
                                   1:,272 0/0
90
                                  15,379
3° Salle Serres
                   8
                                  1rr.518
40
                   10
                              . . 15,568
                                              1re saignée.
5∘
                   10
                              . . 15,635
6a
                  10
                                  157,382
```

Voilà six analyses dans lesquelles la potasse a été cinq fois au-dessous des chiffres physiologiques; une seule fois, elle s'est rapprochée de la normale. Comment admettre l'intoxication parla potasse, quand le sang de ces urémiques n'en a jamais renfermé une quantité extra-physiologique? Comment admettre un empoisonnement quand il n'y a pas de poison?

D'autant que l'erreur des partisans de la toxicité des sels de potasse tient, en partie, aux procédés inexacts employés pour le dosage de celle-ci, ainsi que je l'ai démontré jadis.

J'espère que ces faits feront justice d'une opinion eucore trop répandue et qui a servi de base à une thérapeutique illusoire (1).

LITTÉRATURE MÉDICALE

A propos du licre: Les maladies de l'estomac, diagnostic, et traitement de M. Albert Rober, de l'Académie de médecine. Un très fort volume gr. in-8, chez Rueff et C⁹ (les deux premiers fascicules sont en vente, le troisième est sous presse).

Le proverbe a bien raison de dire que « les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés » car voici déjà plus de

⁽¹⁾ Bibliographie des travaux d'Albert Ronin sur ec sujet :

Sur la question des erreurs auxquelles expose le dosage de la potasse par le procédé du bitartrate de potasse. Société de Biologie, 1889.

Les éohanges respiratoires dans les hémorragies (en collaboration avec Maurice Binet). Archives générales de médecine, Juin 1897. Les éohanges respiratoires dans l'hémoglobiunire paroxystique (en collaboration avec Maurice Binet). Archives générales de médecine. Soutembre 1897.

La saignée. La Semaine Médicale. Décembre 1897.

La saignée, les vomitifs et le vésicatoire. Le Bulletin Médical. 21 janvier 1898.

six mois que le premier fascicule du bel ouvrage de M. Albert Robin est en vente et il n'a point encore été annoncé aux lecteurs du Bulletin de Thérapeutique/Je sais bien que ceux-ci étaient prévenus d'avance puisqu'ils ont eu la primeur des principales leçons de l'œuvre du maitre, mais enfin il n'en est pas moins vrai que l'annonce de l'apparition du livre est fort tardive puisque nous avons attendu que l'ouvrage fut presque complet pour en parler. Pour m'excuser je répéterai ce que i'ai déià dit plus d'une fois : ie me trouve très embarrassé d'avoir à parler de M. Albert Robin chez lui-mêmo et je me suis, d'autre part, tellement identifié avec sa manière de comprendre la maladie de l'estomac, que i'ai comme une fausse honte à le louanger. Cependant, comme après tout, personne n'ignore que j'ai mon franc parler à l'occasion, je n'hésito pas à proclamer que l'œuvre magistrale que publie aujourd'hui lo maîtro de la Pitié est une des plus importantes du siècle qui vient de finir, car elle représente assurément la manière dont soront désormais comprises les affections gastriques, au siècle qui commence.

C'est l'œuvre de toute sa vie que nous offre M. Albert Robin, consacrée avec une patience méritoire à l'étude physiologique et clinique des maladies du tube digestif: certes l'autour a attaché son nom à bien des questious, il a touché de manière originale bien des sujets, mais il ne me démentira certainement pas si j'affirme hautement que c'est toujours avec un entuin sans pareil qu'il revient à ectte question des affections de l'estomac, qu'il connait si bien et que cependant il étudie toujours sans se lasser. C'est que parmi les maladies de la nutrition, celles de l'estomac forment une classe à part, la principale assurément, et par elles, quand on sait les approfondir, on a la clef de presque toutes les autres.

Le grand mérite de M. Albert Robin, dans son étude de la maladie gastrique, c'est d'y avoir apporté un esimplicité extréme, malgré la complexité du sujet; il a éclairci ce qui était obscur, il a mis en lumière des faits importants; grâce à sa grande expérience de la chimic biologique, (n'oublions pas en effet que M. A. Robin, quoique médecin avant tout, fait partie de la section de chimie à l'Académie) il a réussi à faire un tout des symptômes et des faits analytiques, ce qui lui a permis de poser de manière, pour moi absolument évidente, l'histoire de la maladie de l'estomac.

On remarquera peut-être que je répète souvent cette phrase - la maladie de l'estomac », c'est que justement l'immenses mérite de l'auteur est à mon avis le lien qu'îl a su établir entre la plupart des phénomènes pathologiques qui se succèdent dans les troubles gastriques et formaient jadis des affections spéciales, pour le plus grand dam du médecin, qui ne voyait pas clair, et du malade qui se voyait fort mal soigné. Avec la conception éminemment simpliste de M. Robin, tout s'éclaire avec une telle intensité de lumière que le plus myope est obligé de voir et que, surtout, car c'est le plus important, la thérapeutique trouve une base absolument solide. Je prétends qu'un médecin qui connaît bion les idées de M. Albert Robin est cortain de guérir ses malades et de leur rendre les plus grands services, j'en ai d'ailleurs maintes et maintes preuves, aur les succès obteuns par ses éléves.

Mais bien des fois fai entendu faire aux travaux du maitre un grave reproche: « tout cela est très beau, m'a-t-on dit, mais que voulez-vous que nous fassions de toutes ces belles théories pathogéniques? nous sommes des praticiens, de nodestes praticiens et nous sommes incapables de faire dela chimie pour acquérir la sûreté de diagnostic qu'exige une pareille méthode; c'est de la science, tout cela, ce n'est point de la ratique.

All que de belles vérités, que de choses simples et éminemment pratiques n'a-t-on point écrasées avec ces terribles reproches, qui n'ont cependant pas le sens commun l'Rien de plus faux, rien de plus absurde en effet, et cependant c'est avec des phrases comme celle-là qu'on rocule d'un demisiècle l'ère des progrès et qu'on se prive à plaisir de procédés merveilleux de traitement.

Or, je vous le dis en vérité, rien de plus faux que ces reproches adressés à l'œuvre essentiellement pratique réalisée par M. Albert Robin pour la thérapeutique des dyspepsies. Certes il a fait de la chimic, beaucoup de chimie et il en fera encore, jo serais même désolé s'il y renonçait, mais s'il en a fait c'est justement pour vous éviter d'en faire, car le résultat de ses recherches a été tel qu'il lui a permis d'établir sur les simples signes cliniques le diagnostic des différentes phases de la maladie de l'estomac. Lisez avec soin les belles lecons consacrées aux dyspensies, et vous verrez comme c'est facile de savoir si le malade est un excité fonctionnel ou si au contraire il est un insuffisant: s'il est arrivé à la période où l'affection devient lésionelle et constitue la gastrite! Mais grâce à ses recherches chimiques l'auteur a pu connaître les réactions qui accompagnent les symptômes et établir la thérapeutique rationnelle à opposer aux phénomènes pathologiques.

Je ne ferai point l'analyse d'un ouvrage aussi important car c'est alors presqu'un livre que je serais obligé d'écrire moimême et d'ailleurs les lecteurs du journal ont déjà pu appécier un grand nombre de chapitres. Ce livre essentiellement original et doctrinal en même temps que pratique contient toute l'histoire des affections diverses de l'estomac : la nathologie étudiée est traitée avec un détail méticuleux; tous les procédés techniques sont décrits et critiqués; mais aussi la partie thérapeutique est merveilleusement traitée de son côté, des chapitres entiers sont consacrés au traitement et au régime et rédigés avec un soin du détail, un luxe de conseils ingénieux que je n'ai jamais rencontrés ailleurs. On ne trouvera pas dans cet ouvrage ce qu'on pouvait constater malheureusement dans des livres qui datent à peine de quinze ans, à savoir une partie clinique exagérément développée et, en regard, vingt lignes de thérapeutique l L'œuvre actuelle au

contraire est traitée avec une homogénéité qui fait le plus grand honneur non-seulement à son auteur, mais encore à l'école française où une pareille œuvre a pu naître.

G. BARDET

REVUE DES TRAVAUX FRANÇAIS ET ÉTRANGERS

Chirurgie générale.

Traitement local de la tuberculose externe (ce qu'il est, ce qu'il devraitére). — Si les coxalgies suppurées guérissent toujours à l'heure actuelle à Berck, déclare Calot, c'est parce qu'il ne les opère jamais. No pas les opèrer, c'est ne pas ouvrir le foyer tuberculeux, ne pas ouvrir la porte aux microorganismes du delors. Si bien que l'expérience de M. Calo (Archices prosinciales de chirurgie, 1900, Octobre) peut teuir en ces termes.

Une coxalgie ou un mal de Pott fermés guérissent toujours; une coxalgie ou un mal de Pott ouverts ne guérissent jamais.

Le vieux proverbe ubi pus ibi enceua est absolument faux pour ce qui est de l'abcés froid. Cette ouverture, en effet, est désastreuse parce qu'elle donne entrée à des microbes qui, venant du dehors se mèler au bacille tuberculeux de la parci, vont centupler la virulence de ce bacille. Calot émet le principe que « les tuberculoses externes guérissent toujours à Berck, pourvu qu'on ne les ouvre pas et qu'on ne les laisse pas s'ouvri».

Pour lui: 1º lés tuberculoses locales sont toujours curables tant qu'elles ne se compliquent pas d'infections secondaires;

- 2º L'on n'ouvrira jamais la porte à ces infections secondaires en s'abstenant d'ouvrir au bistouri les foyers tuberculeux;
- 3º La thérapeutique consistera à attaquer activement le mal chaque fois que le foyer tuberculeux sera reconnu ou accessible, au moyen d'injections modificatrices;
- 4º Cette thérapeutique donnera des guérisons plus sûres et plus durables et exemptes de mutilation.

De tous les liquides medificateurs qu'on ossaiera tour à tour, si l'un d'eux ne réussit pas (eau oxygénée, gipcórine formolée au 1/106, el)torure de zine au 1/56, glycérine iodoformée, teinture d'iode au 1/3, essence de térébenthine au 1/4, liqueur de Villatte, essence de giroffe ou de thym, teinture d'aloès très étendue, sulfate de zine en solution au 1/50, deux restent plus employés: ce sent l'éther, l'iodoformé à 10 0/0 et le naphtol camphré. Ce demier ne devra être injecté que dans une cavité (abécs freid, articulation remujie de vus).

Lo melange à parties égales d'éther iodoformé ot de naphtol camphré parait étre le plus efficace et celui que Calot emploie. Dans les cavités articulaires il fait précéder l'injection de ce mélange d'une injection de chlorure de zinc au 1/50 et non au 1/10, celle-ci étant trop douloureuse.

Maladies de la peau.

Le métan, topique nouveau pour les plaies. — Pour activer la cicatrisation des plaies et ulcières les plus variés, M. Horovitz (Centr. f. d. ges. Therap., novembre 1960), se sert depuis lengtemps du mélan, extrait cencentré du melliotus caerulcus, papilionacée existant à l'état sauvage dans l'Eurepe méridionale. L'extrait, qui contient de la coumarine, probablement combinée à de l'acide mélliotique, et de l'essence de mélilot, présente un aspect huileux, une coloration vert noirêtre et une odeur aromatique accentuée.

L'action siccative de ce liquide se manifeste dès le premier

pansement, et l'épidermisation est accélèrée. Avant l'applicaion, il est indiqué de procéder à un minutieux lavage de la
plaie ou de l'ucière. Le pansement sefait de la façon suivante,
Un morceau de gaze stérilisée, plusieurs fois replié sur luiméme, est bien imbibé de mélan et placé sur la plaie: par-dessus, un peu de batiste de Billrotti; le tout est maintenu par
une bande. Le pansement est en général laissé en place pendant 3 à 1 jours. Sion se trouve en présence d'une ulcération
recouverte d'une croête épaisse et adhérente, on fait précéder l'application du mélan d'une pulvérisation phéniquée à
5 0/0 et on change le pansement tous les deux jours. Les plaies
du plus mauvais aspect, même avec tendance au phagédénisme,
sont rapidement détergées et définitivement guéries par l'ac-

son represent ouergees et countrement guerres par la citon du topique (plaies buboniques gangréneuses par exemple).

On n'observo jamais d'accidents attribuables à une action irritante ou textique du mélan, qui possède sans conteste des propriétés kérato-plastiques, siccatives et antiputriès

Le mélan peut être utilisé sous forme de pommade (cire jaune 3, mélan 2 ou 1).

Les indications principales sont: les gommes ulcérées, le chancre mou et les hubons suppurés, l'ulcère de la jambe, les fissures à l'anus (l'application sera dans ces cas précédée d'une cocaninsation), l'herrès préputial et la balante, les ezamas suintants et pustuleux, les brûlures à tous les degrés. Dans ce dernier cas, les malades éprouvent sous l'influence du topique une sénation de fruicheur agréable.

Du traitement des végétations vulvaires par l'aeide phénique. — M. Coquille (*Th. Paris* 1900) préconise l'emploi de l'acide phénique en attouchements pour détruire les végétations de la vulve.

D'après lui, ce mode de traitement n'expose pas aux hémorragies, ni aux complications des plaies. Les applications de l'acide phénique sont peu douloureuses, elles s'appliquent à tous les cas, même à ceux où les végétations étant sessiles et volumineuses, l'excision en devient dangereuse. On peut sans inconvénient user de ce procédé dans la grossesse, et dans les cas où il y a complication de diabète, d'anémie, d'hémophille.

Le seul inconvénient possible, c'est l'érythème phéniqué des parties voisines, mais il est facile de l'éviter en faisant le badigeonnage avec quelques précautions.

Il n'y a jamais eu d'accidents d'intoxication.

Maladies du système nerveux.

Do l'épillepsie fonctionnelle, primitive et héréditaire particulièrement de cause et d'origine alcooliques, de son traltement médical par le bromure de strontium et un réglume adjavant approprié. — L'alcoolisme chronique, démontre M. Touraille (Th. Paris, 1890-1900, n° 20) peut déterminer chez les descendants tous les symptômes de la névrose épilentique.

Cotte épilepsie revêt chez les enfants issus de parents alcooliques tous les caractères de l'épilepsie vraie. Qu'elle soit caractérisée par de simplos convulsions, le vertige ou le petit mal, ou par de grands accès, elle sera susceptible du traitement bromuré auquel on devra adjoindre le régime lacté exclusif ou le régime lacto-régétarien.

Le bromure de strontium chimiquement pur pourra êtro employé à l'exclusion des autres bromures, en raison des avantages qu'il présente : d'être parfaitement toléré par l'organisme sans provoquer d'accidents de bromisme.

La condition première et essentielle est d'administrer le bromure de strontium à l'état de pureté la plus parfaite, à la dose efficace, c'est-à-dire suffisante pour juguler les accès épileptiques et pour avoir raison de la maladie. L'indication du médicament étant bien posée, il ne faut pas craindre d'en augmenter rapidement la dose jusqu'à l'obtention du résultat visé : la diminution et la suspension des attaques épileptiques, sanf à diminuer ensuite progressivement cette dose maxima efficace jusqu'à la dose primitive et moyenne de 2 à 4 grammes

parjour, laquelle devra être maintenue plus ou moins longtemps afin d'assurer le résultat et de prévenir un retour offensif toujours imminent chez les malades prédisposés.

Médecine générale.

Contribution à l'étude des rapports de l'alcoolisme et de la paralysie générale. — Pour expliquer l'irrégularité constatée dans le processus de la paralysie générale, M. Chantemille (Th. Paris, 1899-1900, n° 90) se base sur une série d'observations qui montrent des différences en rapport avec les précédents héréditaires du malade, suivant qu'il est porteur de tares similaires (alcoolisme, artério-sclérose, lésions congestives ou qu'il en est indemme.)

L'hérédité non similaire ne semble pas retarder l'évolution de la paralysie générale.

Enfin le pronostic est variable dans l'un ou l'autre cas.

Chez un malade porteur de tares alecoliques ou similaires, Placolisme chronique se manifeste d'abord, le plus souvent par des léssons d'alcoolisme pur, puis plus tard, d'alcoolisme, auxquelles se mélent des lésions passagères de paralysis générale, pour finir par des lésions définitives de paralysis générales. Si l'intoxication cesse, la paralysie peut s'arrêter dans son évolution.

Recherches sur la perméabilité réuale chez les personnes atteintes de cataracte senile. — Des recherches antérieures sur l'urologie des cataractes avaient permis à M. Frenkel (de Lyon) de supposer l'existence, chez les personnes atteintes d'orqueites cristallienne d'une altération de la perméabilité rénale ou des échanges nutritifs des tissus, mais sans indication positive de la cause nettement productrice des effets observés, à savoir la diminution de la sécrétion rénale, des sels urinaires et des substances toxiques. Par l'iniection sous-entanée de les

de méthyléne, M. Frenkel est parvenu à résoudre ce problème intéressant.

Il a constaté comme règle dans la cataracte une élimination troublée, à savoir une élimination retardée ou prolongée, et comme exception une élimination normale ou accélérée. La raison de ces exceptions réside dans ce fait que la cataracte était due soit au diabète sucré, soit à une causse locale.

Il est très probable qu'une des causes de la diminution de la perméabilité rénale dans la cataracte sénile tient à l'âge et aux lésions scléreuse des reins qui sont de règle chez les vieillards. Il est néanmoins possible que, chez les cataractés, cette perméabilité soit encore plus faible que chez les vieillards non cataractés, car le retard dans l'élimination du bleu n'est pas proportonnel à l'âge et s'observe aussi bien chez des cataractés relativement ieunes.

Sérothérapie.

Traitement des hémorphagies bronchiques par le sérom géstaine. L'action hémostatique de la gelatine aurait été encore mise hors de doute chez trois mahades du service de M. Spillmann(Soc. med. de Naney) atteintes de bronchectasies avec hémorphagies fréquentes. L'une d'elles surtout qui, par suite de ses pertes de sang abondantes, était tombée dans un état de cachesie profonde, a repris actuellement ses occupations et les hémoptysies ne so sont plus reproduites dopuis le début du traitement.

M. Demange emploie un sórum gélatiné stérilisé à 5 0/0 et en injecte tous les deux jours 50 centimétres cubes. Cette dose est parfaitement supportée. Il importe, pour favoriser l'action de la gélatine, que le malade garde le repos au lit et soit mis à un régime alimentaire très léger, de préférence lacté.

FORMULAIRE

Collyres contre les kératites ulcéreuses

(R. WILLIAMS et PUECH.)

Sulfate neutre de quinine... 10 centigrammes. Eau distillée...... 10 grammes.

F. S. A. - Usage externe.

Sulfate neutre de quinine..... 10 centigrammes. Sulfate neutre d'atropine.... 5 — Eau distillée........... 10 grammes.

F. S. A. - Usage externe.

La première solution est employée dans les ulcérations de la cornée sans symptômes d'irritation du côté de l'iris. La secondo est destinée aux cas où ces symptômes d'irritation existent.

Le sulfate neutre de quinine modific avantagousement les sécrétions conjonctivales irritantes et agit comme un astringent spécial sans irriter la surface ulcérée de la cornée. Il est surfout utile dans les ulcères infectieux de la cornée.

Elixir polybromuré

Bromure de potassium	8 grammes.
— do sodium	8 —
- d'ammonium	8
Alcool à 90°	24 —
Teinture de gentiane	2 -
	120
Eau Q. S. pour	200 cc.

F. s. a. Une cuillerée à bouche représente sensiblement 2 grammes du mélange des 3 bromures.

L'Administrateur-Gérant: O. DOIN.



MM. Albert Horix et Maurice Biner ont fait à l'Académic de médecine la communication sensationnelle d'une importante découverte, qui est de nature à bouleverser d'abord le diagnostic et peut-être aussi le traitement de la tuberculose. Tous les efforts faits jusqu'à présent pour traiter la tuberculose en agissant sur le bacille qui la produit ont écheux Aucun des antisoptiques proposés n'a tenu la promosec de son inventeur, et aucune des tontaitves de vaccination préventive ou curative n'a réusse.

MM. Albert Robin et Maurice Binet ent recherché, au contraire, quelles étaient les conditions qui rendaient un individu apte à la tuberculose, on d'autres termes, qui en faisaient un milieu de culture favorable pour le bacille. Ces conditions très inattendues sont la déminéralisation de l'organisme et l'exagération des combustions respiratoires. Le candidat à la plutisie est un individu qui absorbe trop d'oxygene et fabrique trop d'actide earbenique. Il se consume, en quelque sorte, lui-même, et c'est cet état de consomption qui permet au bacille de se développer.

Par conséquent, c'est eette consomption, cette oxydation exagérée antérieure à la phitisie qu'il faut combattre pour évitor le dévoloppement de celle-ci.

Cet état particulier de l'organisme prédisposé à la tuberculose se reconnait très facilement par l'analyse des gaz de la respiration. Cette analyse permet de déclarer si un individu quelconque est prédisposé à la phisso. S'il est prédisposé, il faudra lo traiter, c'ost-dire modèrer l'asure organique et spécialement la consommation en oxygène, co qui est en contradiction avec les idées médicales ou poupulaires. 434 BULL PTIM

L'analyse des gaz de la respiration permet aussi de décider si une personue est tuberculeuse ou non. Et cela a une grosse importance, car, au début de la tuberculose, il n'y avait pas jusqu'à préseut de signe décisif qui permit de poser le diagnostic.

Diagnostic de la tuberculose d'avec les unaladies avec lesquelles on put la confondre, diagnostic précoce de la tuberculose au mouent où ses signes classiques ne sout pas évidents, diagnostic de la prédisposition à la tuberculose, voie nouvelle ouverbe sur le traitement de la maladie et surtout de la prédisposition, tels sont les points essentiels de cette découverte considérable pour la santé publique.

Certains auteurs avant soutenus que les animaux placés dans une atsmosphère d'oxygène comprimé résisteut à des proportions d'oxyde de carbone mortelles en toute autre circonstance, M. Grénant rend compte à l'Académie des sciences des expériences qu'il a entreprises pour vérifier et préciser l'exactitude d'une semblable assertion. La valeur de l'oxygène dans le traitement de l'intoxication par l'oxyde de carbone ost fournie par ce fait qu'un chien respirant de l'air contenant 1 0/0 d'oxyde de carbone meurt en vingt minutes au lieu qu'un mélange d'oxygène et d'oxyde de carbone dans les mêmes proportions peut être respiré parfois pendant plus de deux heures sans causer la mort. En outre, si l'on fait respirer à un animal empoisonné par l'oxyde de carbone et menacé de mort de l'oxygène à 90 0/0, au bout d'une heure 100 cc. de sang artériel contiennent 18,8 d'oxygène et seulement 1,1 d'oxyde de carbone, tandis que si l'on fait respiror de l'air pur après un empoisonnement semblablo, au bout do trois heures, c'est-à-dire en un temps triple, 100 cc. de sang artériel contiennent 16.6 d'oxygène et encore 4.5 d'oxyde de carbone, soit quatre fois plus de ce gaz qu'après une heure do respiration d'oxygène. L'élimination et la disparition du poison sont donc considérablement accélérées par l'emploi de BULLETIN 435

l'oxygène qui s'impose dans le traitement de l'intoxication oxycarbonée.

L'appendicito est en train de redevenir une affection médicale après avoir été du domaine chirurgical le plus absolu. On signalait récemment les bienfaits préservatifs des purgations périodiques auxquelles il conviendrait parfois de revenir. Voilà M. Metchnikoff qui indiquo à son tour la vertu curatrice des vermifuges. Il a lu à l'Académie de médecine un travail intéressant sur les appendicites causées par la présence des vers intestinaux. M. Metchnikoff cite quatro cas où il a trouvé des œufs de ces parasites, puis il rappelle qu'il y a longtemps Becquerel, Natale et Davaine ont trouvé à l'autopsie des ascaris dans le péritoine et dans l'appendice vermiformo et plus récemment Brun et Guinard out, en opérant, rencontré de ces vers. Il y a certainement des appondicites qui ont une autre origine ; néanmoins il est indiqué en présence du grand nombre de sujets portours de nématodes, de soumettre les matières fécales à l'examen microscopique en cas d'appendicite. Dans tous les cas où il y aura possibilité de le fairo, il conviendra d'appliquer le traitement vermifuge avec de la santonino contre les ascarides et du thymol contre le trichocéphale. La proscription des aliments crus et des eaux impures constituera en outre uno excellente mesure prophylactique.

Faut-il intervenir dans les cas de rupture traumatique de la rate M. Aurax l'a fait et son malade spidenctomisés guéri. M. Hartmann, qui fait à la Société de chirurgie un rapport sur cette intervontion heureuse, qui serait la troisième comme, estimo que la question pout se poser, car il y a cu des cas de guérison spontanée. Pour lui, la splénectomie doit être pratiquée dans les cas de rupture de rate saine et non adhérente; dans les cas de grosse rato adhérente, il vaut mieux se contenter de la suttre. 436 BULLETIN

Des faits communiqués par MM. MAUCLAIRE et ROGER (d'Agde) montrent la raleur de la contracture de la paroi ablominale dans les contaisons de l'ablomen. La présence de cette contracture suffit à indiquer avec certitude l'existence de lésions intrapéritonéales et nécessite une opération immédiate : son absence ustifie au contraire l'abstention

L'accord n'est pas fait sur l'opportunité du traitement de l'infection puerpérate par l'hystérectomie. Pour M. Turrisce octe opération est justifie forsqu'il y a rétention placentier et lorsque les accidents sont compliqués de la présence d'un cancer ou d'un fibrome. L'examen du sang aurait son importance puisque dans tous les cas où le stroptocoque y a été trouvé, les malades sont mories, tandis que lorsque le streptocoque n'y existait pas elles ont guéri. M. Poraura pense, lui, que les lavages intra-utérius et les curcttages doivent suffire. Dans un cas qui paraiysait désespéré, il a refusé de faire l'hystérectomie et cenendant la malade a fini par guérir.

M. Soutatur apporto à la Sociaté médicale des hôpitaux sa contribution à l'étude de l'aérophagie. Pour lui, on dout distinguer l'aérophagie involontaire propre aux hystériques, véritable tie nerveux comparable à la toux et au hoquet lystérique et l'aérophagie volontaire qu'on observe chez se névropathes dyspeptiques qui répond au syndrome habituelles névropathes dyspeptiques dejspeptie flatlente. A force de so répéter l'aérophagie involontaire devient inconsciente; elle cat toujours accompagnée de troubles dyspeptiques. Les gaz éructés sont formés en grande partie par de l'air atmosphérique mélangé en proportions variables de gaz contenus dans l'estomac. L'aérophagie ne demande pas un traitement spécial. Elle disparait ou s'atténue parallèlement aux troubles dyspeptiques locaux et à l'état nerveux général.

M. Soca a rapporté récemment l'observation d'une jeune fille qui fut atteinte d'un sommeil prolongé pendant sept mois et chez laquello on trouva à l'autopsie une tumeur comprimant le plancher du quatrième ventricule. M. Dusois (de Lyon) fait remarquer à la Société de biologie que cotte observation vient à l'appui des faits expérimontaux qui l'ont amené, il y a déjà plusieurs années, à admettre l'existence entre la bulbe et le cerveau d'un centre jouant un rôle prépondérant dans le méeanisme du sommeil et aussi du réveil, qu'i appelle plus spécialement le centre du sommeil.

REVUE DE PHARMACOLOGIE

Par le D' Bolognesi

Ancien interne des hôpitaux de Paris.

Acctonyrine.

Parmi les nouveaux remèdes qui ont fait ces derniers temps, leur apparition dans l'arsenal thérapeutique, il en est quelques-uns qui méritent d'attirer l'attention des thérapeutislos

L'un d'eux, l'acétopyrine, est à la fois un antiseptique et un analgésique, joignant à ces deux propriétés intéressantes celle d'être un antirhumatismal de premier ordre tant par son action thérapeutique que par sa facile et inoffensive ingestion, n'apportant aucun trouble dans l'organisme. L'acétopyrine n'a pas encore été étudiée en France et nous nous sommes proposés de l'expérimenter et de contrôler les expériences faites par nos devanciers à l'étrancer.

L'acétopyrine est une combinaison chimique d'acide acétylsalicylique et d'antipyrine.

Ce nouveau médicament est une poudre blanchâtre cristalline, rappelant un peu l'odeur du vinaigre, avant son point de fusion à 64-65 degrés, très difficilement soluble dans l'eau froide, plus facilement soluble dans l'eau chaude, légèrement dans l'alcool, le chloroforme, difficilement soluble dans l'éther. Cette poudre possède la réaction de l'antipyrine : elle donne

avec le perchlorure de fer une coloration rouge tournant au jaune éclatant par l'addition de quelques gouttes d'acide sulfurique concentré.

La solution aqueuse bouillie avec un peu d'acide sulfurique étendu, laisse dégager une forte odeur de vinaigre. Il se précipite alors des cristaux qu'on peut extraire au moyen de l'éther, cristaux qui donnent avec le perchlorure de fer la réaction caractéristique de l'acide salicylique.

Le Dr Wolmann a fait avec cette préparation des expériences intéressantes sur la digestion :

- 1º Il a soumis à l'étuve à la température de 37º C. 100 grammes de suc gastrique artificiel mélangé à 1 gramme du produit, en agitant ce mélange toutes les heures pour le retirer et l'étudier au bout de quatre heures. La plus grande partie des cristaux était restée au fond du liquide, ce qui permottait de conclure que ces cristaux étaient difficilement solubles dans un milies acide.
- Le liquide filtré, clair comme de l'eau, donnait la réaction de l'antipyrine et nullement celle de l'acide salicylique.

Une partie de la solution aqueuse neutralisée rigoureusement et agitée avec du chloroforme pour enlever l'antipyrine, donna, après avoir été acidifiée et agitée avec de l'éther, en séparant par décantation et en faisant évaporer, une petite quantité d'une substance qui, dissoute dans l'eau et additionnée de perchlorure de fer, présents la réaction jaune de l'acide acét-lyalievileus.

Voilà, d'après Wolmann, ce qui s'était passé :

En présence du suc gastrique, une petite partie de l'acétopyrine s'était dissoute en se dédoublant en acide acétylsalicylique et antipyrine, tandis que la majeure partie était de l'acétopyrine non transformée; 2º En expérimentant avec le suc intestinal dans les mêmes proportions, à l'étuve, et en agiant, le liquide, examiné une heure après, permet de constater que la totalité du produit s'était dissoute. Douze heures après, le liquide toujours maineun à l'éture, présentait encore une réaction faiblement acide; après refroidissement, fortement acidifé par l'addition de quelques gouttes d'acide sulfurique étendu, puis agité avec de l'éther, le liquide laisas précipier un residu difficilement soluble dans l'eau froide, plus facilement soluble à chaud, donnant avec le perchlorure de fer la réaction violette de l'acide salicylique. Il se produisait donc dans le milieu intestinal un dédoublement du produit donnant naissance à de l'acide salicylique libre.

Les expériences de Wolmann étaient intéressantes à signaler, car elles montrent clairement que l'acétopyrine est complètement inoffensive pour l'estomac.

Si ses propriétés cliniques sont justifiées, il y a un grand intérêt à employer ce médicament à la place du salicylate de soude et de l'acide salicylique dont on connaît les nombreux inconvénients et les troubles produits dans l'organisme par l'incestion de cos substances.

Il en est de même pour la salipyrine qui présente les mêmes inconvénients. Seule, l'aspirine se rapproche de l'acétopyrine, car on sait que l'aspirine n'est autre que de l'acide acétyl salicylique pur.

L'acétopyrine a pour elle l'avantage de sa combinaison avec l'antipyrine et chacun sait qu'il est d'usage courant d'associer les préparations de salicylate de soude à l'antipyrine.

L'acétopyrine, réunirait à elle seule, les avantages du salicylate de soude sans en avoir les inconvénients et celle de l'antipyrine, réunis en une même substance.

En effet, les médecins étrangers qui ont essayé l'acétopyrine dans près de 100 cas, ont pu observer qu'il ne s'était jamais produit dans aucun cas, le moindre trouble digestif, ni le moindre phénomène fâcheux. Dans plusieurs cas chroniques, l'acétopyrine a été donnée pendant plusieurs semaines à dos doses quotidiennes de 3 à 5 grammes, sans présenter la moindre influence nocire sur l'estomac u' l'intestin: l'estomac n'était le siège d'aucune sensation désagréable, ni douloureuse, l'appêtit était conservé et les malades ne rossentaient aucun trouble de l'organisme.

Les effets thérapeutiques de l'acétopyrine ont été éprouvés dans plus de 100 cas tant au point de vue antirhumatismal 40 cas) qu'au point de vue analgésique et antithermique.

Comme antirhumatismat dans le rhumatisme aigu, voici ce que l'on a pu obsorver : Dans les cas récents, n'ayant encore subi aucun traitement antérieur, l'acétopyrine à la dose de 3 grammes répartis en 6 prises de 50 centigrammes, la température, dès les promières prises, commençait à baisser d'un 1/2 à 1 degré dans les premières heures en même temps que le pouls et la respiration diminuaient de fréquence; les goullements articulaires entraient rapidement en règression, de même que la douleur allaite en diminuant. Les susurs profuses qui tiennent a la fois et du processus morbide et de l'ingostion du médicament ne tardaient pas, elles aussi, de provire de leur intensité au fur et à mesure que la maladio s'amendait et la guérison pouvait être obtoque dans un laps de temps variant entre quatre et dis jours.

Dans les cas ancions, datant de deux à trois somaines, dejà traités par les préparations salicylées telles que salicylate de soude, salipyrine, on remarquait une efficacité beaucoup plus grande avoc l'acétopyrine et on voyait en même temps disparatire les phénomènes fácheux provoqués par les préparations salicylées, tels que douleurs gastriques, nausées, vomissements, bourdonnements d'oreilles, etc.

l'in un mot, l'acétopyrine présontait les mêmes avantages, môme plus efficaces, des autres préparations salicylées, sans en avoir les inconvénients.

Dans le rhumatisme chronique, les effets de l'acétopyrine sont aussi les mêmes que ceux des autres préparations sali-



Préparé par !

Dépôt génér

EAU MI

Facile à dige

DĖS

GOUD

Ces tro

COM

dont l'amertun inasquée par vin authentiqu Glycéro-phosph Glycéro-phosphs Extraitde quinqu



TRAIT!
DRAGES T
Caféine
Dépot 6

PASTILLES de CI-

OR

RDIN

CHE

AIS CIALES :

IALES

MINE

et transformé : en pilules caro-

)pitaux de Paris,

9° C.
goutte, pss des orgaindies neritions, etc.

t d'eaux de toules L'hggiène modern

CÉLÈBRES S AU KURHAUS DES BAINS eylées, e'est-à-dire nuls ou presque nuls. De temps en temps on a pu voir la douleur devenir plus faible sous l'influence analgésique du remède nouveau, mais nullement la guérison de l'affection.

Dans les affections rhumatismales de la plèvre et du péricarde, l'acétopyrine s'est montrée l'égale des autres préparations salicyliques, toujours avec l'avantage de son inocuité.

Comme analgésique, l'acétopyrine s'est aussi montrée comme une médication très efficace et il fallait s'y attendre, étant donnée la composition chimique du nouveau remède. En effet, dans 25 cas environ de céphalées névralgiques, de migraines, de polyuévrites et dans un cas do seiatique où il fut donné jusqu'à 14 prises, soit 7 grammes du reméde par vingt-quatre heures, l'amélioration et la guérison du symptome douleur suvrenait raidement.

Comme antithermique, l'aeétopyrine fut administrée dans 4 cas bénins et amena l'abaissement de la température avoc disparition de la prostration et du mal de tête après chaque prise. Le médicament parut avoir une influence favorable sur la durée de la maladie, étant données les propriétés antiseptiques de l'acétopyrine pour l'intestin.

1 eas de méningite eérébro-spinale épidémique, 2 cas d'influenza, 2 cas de bronchite furent également heureusement traités par l'acétopyrine.

Dans 2 cas de septicémie, le nouveau remède exerça son action antitlermique, mais ne produisit aucune amélioration des phénomènes septiques. Dans quelques cas de tuberculose pulmonaire fébrile, l'acétopyrine amena un abaissement considérable de la température avec sucurs profuses ot grand abattement, sans cependant aller jusqu'au collapsus.

Voiei done le bilan des expérimentations faites avec l'acctopyrine, tendant à démontrer que nous avons en notre possession un excellent médieament salicylé pour combattre le rhumatisme articulaire aigu, possédant en outre des propriétés antithermiques et analécisques certaines, ne se décomposant pas dans l'estomac, par conséquent ne pouvant produire aucun effet facheux sur cet organe, et possédant, par sa décomposition dans l'intestin des propriétés antiseptiques non douteuses.

C'est ce nouveau médicament que nous avons expérimenté dans 10 cas que nous publions sous la forme d'observations abrégées et qui vout nous permettre de poser des conclusions:

RIIUMATISMES.

Nous avons administré l'acètopyrine dans 3 cas de rhumatismes articulaires aigus et 1 cas de rhumatisme musculaire.

Observation I. - Jeune homme de 21 aus ayant eu une première attaque de rhumatisme articulaire aigu généralisé en novembre 1900 d'une durée de trois semaines, traitée avec succès par le salicylate de soude et l'antipyrine à la dose de 3 grammes de salicylate et 1s,50 d'antipyrine par jour. Ce malade avant repris trop tôt ses occupations eut une rechute en décembre, ce qui nous permit de lui donner de l'acétopyrine à la dose de 3 cachets de 50 centigrammes par jour, matin, midi et soir. Cette reclute, grace à la médication nouvelle fut enravée en quatre jours. L'interrogation du malade a permis de constater qu'après la prise du cachet d'acétopyrine est survenue unc transpiration abondante bientôt suivie d'un abaissement de la température, d'une diminution de la douleur et du gonflement articulaire. Chaque cachet produisait cette accalmic pendant quatre heures environ et les phénomènes douleur et gonflement réapparaissaient sous l'influence de la seconde prise et des suivantes. Au bout de quatre iours et après 12 priscs d'acétopyrine par cachets de 50 centigrammes, la recliute fut enrayéc. Ce malade n'avait eu aucune complication cardiaque ni à sa première, ni à sa secondo atteinte do rhumatisme. Le médicament ne lui a pas produit de phénomènes fâcheux du côté de l'estomac.

Obs. II. — M^{me} J..., 34 ans, est atteinte pour la première fois d'un rhuinatisme articulaire aigu qui débute par l'épaule droite et présente une acuité très grande au point que la

malade se croit paralysée. Néanmoins elle attend deux jours pour me faire appeler, surtout parce que elle est en proie à une angoisse cardiaque très grande, accompagnée de violentes palpitations. Le rhumatisme a gagné le coude et le genou droit. Nous voyons la malade à ce moment et ne constatons rien d'anormal du côté de son cœur. On preserit 3 prises d'acétopyrine de 50 centigrammes chaque, disseminées dans la journée et trois jours après la malade va mieux, n'a plus de douleur, ni de fièvre; on la croirait guérie lorsque le lendemain le côté gauche se prend avec ascension de la température et sueurs profuses. La malade allant mieux avait cessé un jour la médication. Nous la mettons à 4 prises d'acétopyrine par jour. Le médicament est bien supporté: la malade n'accuse aucun trouble du côté de l'estomac, ni du côté du cœur, elle n'a pas de nausées, ni de bourdonnements d'oreille. Cinq jours de traitement suffisent pour enraver l'attaque.

Oss. III. — M. Suct. 47 ans, a déjà eu plusieurs attaques de rhumatisme articulaire aigu généralisé et la dernière remonte à deux ans : elle a duré deux mois.

En novembre 1900 le malade est atteint d'un érvsinèle sérieux de la face pour lequel nous lui donnons des soins. Cet érysipèle guéri au bout de quinze jours est suivi d'une attaque de rhumatisme articulaire aigu qu'on traite par de fortes doses de salicylate de soude et d'antipyrine : 5 grammes de l'un et 257,5 de l'autre par jour. Cette médication amène un soulagement dans les douleurs et le gonflement articulaire, mais produit des sueurs profuses avec nausées, bourdonnements d'oreilles et un peu de surdité. Cette attaque dure trois semaines et le malade reprend ses occupations, mais incomplètement débarrassé. Quinze jours après il est repris à nouveau de douleurs et gonflement dans toutes les iointures avec température et nous lui donnons cette fois de l'acétopyrine à la dose de 4 prises par jour, soit 2 grammes. En cinq jours la crise est enrayée; il présente seulement de la gêne des mouvements de l'épaule que quelques massages font disparaître rapidement.

OBS. IV. - Il s'agit d'un homme de 37 ans jouissant d'uno excellente santé, arthritique et goutteux qui, depuis dix ans, présente des poussées de rhumatisme musculaire suraigu à chaque refroidissement, à chaque changement de temps et surtout à la suite de dincrs copieux et d'écarts de régime. Ces crises de rhumatisme musculaire sont généralement accompagnées d'excrétion d'urines rares très chargées en acide urique et en urates, et d'un léger mouvement fébrilc. Les douleurs lancinantes des muscles sont insupportables et empêchent souvent le malade de dormir. Les attaques de rhunatisme ont ordinairement une durée éphémère de vingt-quatre, trente-six à quarante-huit heures au plus, Elles sont calmées par les analgésiques habituels, antipyrinc, quinine, phénacétine, lactophénine, mais toutes ces substances amènent des tiraillements d'estomac avec pyrosis. Nous lui donnons à sa dernière crise d'abord un cachet de 50 contigrammes d'acétopyrine qui produit quelques sueurs, mais aucuno accalmie. Nous lui en donnons une deuxième priso, une heuro après, puis enfin une troisième qui parvient à calmer la douleur et à permettre au malade de dormir et de ne plus ressentir ses élancements douloureux.

Aucun effet facheux sur l'estomac. Sueurs abondantos comme après la priso de l'analgésine et de la phénacètine. Le lendemain main les douleurs ont dispara. Ce malade présentant une idiosynerasie pour les préparations iodées est aussi incommodé par les préparations de salicylate de soude que son estomac ne peut supporter sous aucuno forme et qui d'ailleurs ne lui produisent aucun résultat.

Comme analgésique, nous avons expérimenté l'acétopyrine dans 2 cas de névralgie, 1 cas de sciatiquo et 1 cas d'arthrite aigue de l'épaule.

Ons. V. — M. Thib. est atteint depuis quelques jours d'une norvaigie du nerf cubital que frictions, limiments et analòsiques n'ont point enrayée. Nous lui donnons 2 prises d'acétopyrine par jour pendant trois jours et le malade nous revient avec une amélioration allant presque jusqu'à la guérison. Obs. VI. — M. Pes. est atteint d'une névralgie de l'épaule datant de quelques jours et pour laquelle il n'a rien fait. En deux jours avec 2 prises de médicament par jour la douleur est amendée.

Oss. VII. — M. Delerque est atteint depuis un mois d'une névralgie sciatique traitée sans succès par différentes médications. Nous lui donnons 3 prises d'acétopyrine par jour pendant cinq jours et la névralgie, améliorée dés les deux premiers iours. ne tarde pas à disparaitre completement.

Ons. VIII. — M. Bourn, 42 ans, ost atteint pour la première fois d'une violente artirite de l'épaule gauche que nous traitons par un liuiment au salicylate de méthyle mentholé et pardes caclests de salophène et d'antipyrine. Malgré cotte médication, le malade les deux premières nuits ne peut dormit tant la douleur est vive. Le troisiéme jour nous remplaçons le salophène par l'acétopyrine à raison de 3 prises dans la journée. La douleur est moins violente et le malade peut dormit. Malheureusement, manquant de cachets, nous ne nouvous continuer l'exadérience.

Nos deux dernières observations ont trait l'une à un cas de grippe et l'autre à un cas de blennorrhagie.

Ons. IX. — Mar Fan, 32 ans, est prise brusquement de violents frissons avec courbature, douleurs vives aux reins et élévation rapide de la température. Ces jours derniers, de nombreux cas de grippe se sont montrés à Paris et il s'agit cortainement d'une attaque d'influenza. Nous soumettons la malade au traitement par l'acétopyrine et nous lui donnons un cachet à doux heures, un second à six heures de l'aprésmidi et enflu un troisième au moment de s'endormir.

Des la première prise une sucur abondante, accompagnée d'un abaissement thermique notable avec diminution du pouls et des respirations, apporte un soulagement à la malade et le lendemain matin cette attaque de grippe est pressue terminée. Obs. X. — Cette observation est celle d'un malade atteint dopuis six mois d'une blennorrhagie dont il ne peut se défaire.

M. T... a été traité par les moyens habituels, permanganate, balsamiques, santal, etc. Il nous arrive fréquemment de traiter les blennorrhagies par le salol à la dose de 3 grammes par jour. Ce traitement employé depuis de longues années est inoffensif et produit souvent d'heureux résultats. On sait qu'il agit comme antisentique de l'urêthre par l'acide salicylique qu'il fournit. En outre il nous est arrivé de soigner les blennorrhées par l'antipyrine soit en ingestion, soit en injections et cela avec succès. Cette méthode non plus n'est pas nouvelle et nous a donné quelques guérisons. Nous avons donc pensé qu'un médicament qui fournit dans l'organisme à la fois l'antipyrine et l'acide salicylique dans une plus grande proportion que le salol, devait a fortiori nous donner de bons résultats. Malheureusement nous n'avons pu expérimentor que sur un seul cas. M. T ..., 28 ans, fut donc soumis exclusivement au traitement par l'acétopyrine, un cachet de 50 centigrammes trois fois par jour, et le troisième jour l'écoulement matinal avait complètement disparu.

Le lendemain matin du premier jour de traitement, la goutte qui était blanche la iteuse était devenue claire comme de l'eau de roche; le surlendemain elle était à peine perceptible et toujours incolore, et enfin le troisième jour elle avait totalement dispara, et il n'y avait plus de filaments dans l'urine pas plus que les jours suivants, le malade ayant été mis en observation pendant luit jours et ayant sub l'épreuve do la bière et l'épreuve du coît sans voir revonir son écoulement.

Conclusions. — De tous les faits qui précèdent, nous sommes donc autorisé à conclure :

Que l'acétopyrine est un nouveau reméde absolument inoffensif pour l'estomac et l'organisme tout entier. Il présente comme toutes les préparations salicylées une action prompte et sûre, principalement dans le rlumatisme articulaire aigu qu'il jugule très rapidement. Il a l'avantage sur toutes ces préparatiens de ne pas amener de troubles gastriques, tiraillement, brûlures, nausées, vomissements, ni bourdonnements d'oreille, ni surdité. Il me paraît donc être le meilleur médicament antirhumatismal.

Comme antithermique, c'est aussi un des meilleurs. Des la première prise il produit son actien et au bout d'une heure environ la température baisse de 1 degré 1/2, et se rapproche de la normale pendant quelques heures pour remonter progressivement jusqu'à la prise nouvelle. Cet abaissement de température qui peut atteindre 2 degrés comme en a pu le voir clez les tuberculeux, améue en même temps une diminution du nombre des pulsations et des respirations, diminution parallèle à celle de la température. Même cliez les tuberculeux où l'acétopyrine a pu produire de l'abattoment, elle n'a jamais produit de collassus.

Comme analycique, neus avons vu qu'elle ne cède en rien son action aux autres romèdes semblables et parait agir avec rapidité et durée dans de graves névralgies comme la sciatique. Elle (semble être aussi un antiblennorrhagique qui demande encere à être étudié. Un point excellent à considerer, c'est que l'élimination du preduit qui se fait en grande partie par l'urine sous la forme d'acide salicylique et aussi d'antipyrine, n'améne jamais de troubles dans le parenchyme rénal ainsi que le démentrent les analyses d'urines, lesquelles n'ent jamais décelé la moindre trace de sucre, ni d'albumine.

Cemme mode d'administration, l'acétepyrine se donne en cachets de 50 centigrammes, depuis 2 à 3 prises jusqu'à 6 prises, et plus par jour, disséminées dans la journée.

Pour les malades qui ne peuvent avaler les cachets on peut administrer l'acétopyrine en petions sirupeuses. Celles-ci présentent même un geût acidulé des plus agréables.

(A suinre.)

SOCIÉTÉ DE THÉRAPEUTIQUE

SÉANCE DU 13 MARS 1901

Présidence de M. Albert Robin

Le procès-verbal de la dernière séance, lu et mis aux voix, est adopté.

Correspondance

En outre des imprimés ordinairement adressés à la Société, la correspondance manuscrite comprend une lettre de candidature de M. Sainton, qui se porte candidat à l'une des places vacantes dans la section de médecine; une autre de M. Brocchi qui se porte candidat au titre de correspondant national.

Elections

- La liste de candidature est close et se trouve ainsi composée:
- 1º Titulaires (trois places). MM. Balzer, G. Baudouin, Chevalier, Hallion, Isch-Wall, Legrand, Moutier, Riohe, Sainton, Touvenaint et Vidal.
- 2º Correspondant nationaux. MM. Broechi et Odilon Martin.
- 3. Correspondant étranger. M. Perez Noguera (de Madrid).

Les titres des candidats seront examinés par la commission et M. Hirtz déposera son rapport le 27 mars : les élections auront donc lieu à la séance suivanto, c'est-à-dire le 17 avril.

Discussion

A propos de la zomothérapie.

par le Dr E. Duhourcau, correspondant.

En rolisant le compte rendu que MM. les D°-Josias et Roux nous ont apporté de leurs expériences sur la zomothérapie dans la tuberculose pulmonaire chez les enfants, et dont J'ai entendu le récit avec un vif intérêt, j'ai été frappé de certains détails sur lesquels je désire vous présenter certaines réflexions en vous citant, entre autres, quolques faits récents dans losquels j'ai pu constater la réelle valeur thérapeutique du sòrum musculaire et de la viande crue.

Peu de temps après la publication de MM. Ch. Richet et Héricourt, j'ai eu à utiliser le suc de viande de façon à en surveiller de près les effets : un de mos fils, de 19 ans, fatiguéen avril dernier par la préparation d'un concours, fut obligé d'abandonnor son travail quelque temps avant les vacances de Pàques. Je l'ommenai à la campagne et là, en plus du ropos et du grand air, comme il ne mangeait guère, je lui fis prendre chaque jour le suc de 500 granmes de viande de beurl, préparé en mettant à macérer, pendant deux à trois heures, la viande hachée menu avec la moitié de son poids d'eau et un peu de sel, en ayant soin de remuer de temps à autre.

La viande était ensuite exprimée avec une presse de ménage sous laquelle elle était placée enveloppée dans une toile, pour éviter les éclaboussures et pouvoir l'exprimer à sec.

Les 280 à 300 grammes de suc obtenus étaient partagés en

deux doses, dont l'une était prise vers les dix heures du matiu, entre les deux déjeuners, et l'autre vers les quatre heures du soir, heure à laquolle elle ne paraissait avoir encore subi aucune altération. Aux repas, j'alimentais le malade le mieux qu'il était possible. Pendant les huit premiers jours de ce régime, il ne parut pas y avoir grande amélioration: mais celle-ci s'accusa tout d'un coup, si bien qu'après une seconde semaine de ce seul traitement, lojeune homme était remonté, revigoré, avait repris son appêtit et se galité, et il rentrait au collège pour y terminer heureusement ses études et son con-

Il y a un mois environ, fatigué de nouveau par la vieun peu dure de wai surmenage qu'il doit mener à l'école centrale, il m'a redonné quelques inquiétudes; je l'ai soumis de nouveau à l'usage du suc de viande; mais cette fois, seulement le soir, à sa rentrée des cours, il absorbait 150 grammes de suc préparé avec 250 à 280 grammes de viande de boux! Une douzaine de jours ont suffi à lo remettre complètement, à le débarrasser d'une toux qui m'inquiétait, et à lui permettre de continuer son travail de quatorze leueres par jour.

Si j'ai songé à administrer iel lo suc de viande, c'est comme aliment supplémentaire, comme un reméde préventif, et je crois qu'il scrait appelé à rendre de plus grands sérvices contre la tuberculose, si on recourait à lui avant que le mal fut déclaré ouvertement, c'est-à-dire dans la période prétuberculeuse, à la fin des bronchites tenaces ou suspectes, de la coqueluche, dans la convalescence des fièrres druptives, dés qu'il se montre de l'amaigrissement, de la fatigue choz les jeunes gons, etc...

De quello façon co suc agit-il 7 Je ne tenterai pas de l'expliquer, mais je ne puis m'empécher de songer à la réconte lecture que je vous faisais ici au nom de M. le D' de Rey Pailleade sur le rôlo du philothion dans les phénonèmes de nutrition. « Les aliments ordinaires de l'homme, écrivait mon savant ami, contiennent peu de philothion, mais on en fournit au contraire aux malades en lour faisant prendre de la viande crue, qui produit de tres bons résultats. • ϵ Les substances ingérées par les animaux ne subissent pas seulement des oxydations; mais elles peuvent contracter des hydrogénations faibles permettant un rat et rient qui peut activer chimiquemont toutes les cellules de l'organissne. •

Quoi qu'il en soit de cette explication, peut-être Insardée, le sue musculaire m'a rendu égalemont service, cet été, chex une vieille dame que j'avais soiguée l'année d'avant pour une bronchite catarrhale qui, malgré as guérison, l'avait laissée faible, maigre, avec une apparence délicate et toujours souffreteuse. En plus du traitement thermal analogue à cetui de l'année précèdente, j'ai prescrit à ma cliente le suc de 300 grammes de viande crue à prendre chaque jour en deux dosse, et l'augmentation des forces a été bien plus sensible et plus rapide; la malade s'est promis d'user de nouveau de ce suc chez elle, à l'occasion.

A co propos, je dirai que je ne crois pas nécessaire de faire absorber aux malades des doses três considérables, de 15 grammes par exemple de viande par kile de leur poids! J'ai revu cet étê un malade que J'avais soigné plusieurs années de suite pour une tuberculose grave des poumons, par nos eaux et par un sérum antituberculeux, et auquel, au princemps dernier, son médecin traitant avait prescrit le sue musculaire de 1,500 grammes de viande par jour. Il y avait eu une augmontation de poids de quelques kilogrammes, mais l'état Cocal et les forces ne paraissaient pas avoir tiré grand profit de cette énorme quantité de viande crue consommée sous cette forme de suc.

Par contre, j'ai pu voir un autre tuberculeux, très annigri par sa maladie pulmonaire, datant d'un an à peine, mais compliquée de troubles graves dyspeptiques, de vomissements, de toux gastrique, retirer un grand bénéfice d'une cure thermalo rodoublée dans l'été et combinée avec la zomothérapie à la dose de 150 grammes, puis 200 grammes, puis 250 grammes au plus de sue de viande. Les lésions pulmonaires es sont arrêtées, ciertisées pour ainsi dire, mais Talimentation n'est suffisante que grâce à un complément de 250 grammes de viande crue pulpée prise en nature le matin, et 150 grammes de sue de viande pris le soir, en plus des repas; j'attribue à cette zomothérapie continuée chaque jour depuis des mois le maintien de l'état actuel du malade qui résiste à sa tubercu-lose, somble l'avoir enrayée, et n'est plus tourmenté que par son estomac.

Inutile de dire que chez mes quatre malades le fonctionnement des reins a été toujours des plus satisfaisants.

Pour conclure, J'appuierai cette proposition de MM. Josias ot Roux, que le traitement par le s'erum musculaire peut améliorer notablement et guérir peut-être un malade atteint de lesions tenant seulement au beaille tuberculeux, mais que plus tard, avec des lésions plus avancées, secondairement infectées, mixtes pour ainsi dire, lo sue de viande n'a plus ou'une action théraneutique très relative.

Avec le D^r Garnault et le professeur Grancher, je recommanderai l'ingestion journalière de petites quantités do viande crue plutôt que des doses atteignant ou dépassant un kilogramme.

Et enfin, j'insisto pour qu'on traite davantage et plus énergiquement par la zomothérapio les candidats à la tuberculoso, bronchitiques, coquelacleux, fièvreux, dyspeptiques, surmenés, etc., ceux surtout qu'on suppose à la période prétuberculeuse, à cette période où le bacille de Koch n'est pas encoro implanté dans la placo, mais où la congestion pulmonaire, la pnoumonie, la pleurésie, etc., peuvent si faciloment lui ouvrirune norte d'entrée.

Communications.

 Note sur le traitement des hémorrhagies intestinales de la fièvre typhoïde par les grands lavements chauds et le chlorure de calcium.

par M. Albert MATHIEU

La dernière épidémie de fièvre typhoïde a, on le sait, présenté une gravité relativement grande, et pour notre part nous avons observé parmi les malades entrés à l'hôpital Andral un assez grand nombre d'hémorrhagies intestinales. Peu satisfai des traitements habituels, nous avons cherché à nous constituer une méthode meilleure en mettant en œuvre deux moyens hémostatiques récemment préconisés, les grands lavements à température clevée et le chlorure de calcium,

. Les grands lavements très chauds ont été employés avec succès par R. Tripier (de Lyon), contre les hémorrhagies de l'estomac (1).

Contre les gastrorraghies, R. Tripier conseille d'administre trois fois par jour un grand lavement d'eau à la température de 48° à 50°. Ces lavements doivent être continués au moins matin et soir pendant luit jours après la fin de l'hémorrhagie. Le malade doit rester immobile dans la situation horizonte, on lui impose une diéte absolue au moins pendant trois jours.

Le but de l'auteur est d'amener la contraction des petits vaisseaux à distance. Ce mode de traitement ne s'appliquerait pas aux seules hémorrhagies de l'estomac. « Du moment,

Des gastrorrhagies dans leurs rapports avec les ulcérations stomaeales et de leur traitement par les lavements d'eau chaude. — Semaine médicale, page 241 — 1898.

ditil, où l'on sait que le lavement d'eau chaude agit efficacement à distance, il n'y a pas de raison pour ne pas l'employer dans tous les cas d'hémorrhagie interne ou externe, quels qu'ils soient.

Si R. Tripier parvenait à amener l'hémostase par le resserrement des petits vaisseaux, P. Carnot insistait sur des moyens capables de favoriser la production de caillois oblitérateurs dans les vaisseaux béants. Il a de la sorte expérimenté dans le laboratoire et essayé cliniquement la gélatine et le chlorure de calcium.

La gélatine paraît avoir cu plus de succès près des médecins que le chlorure de calcium. Cependant P. Carnot lui-même donnait la préférence à ce dernier agent.

« L'emploi de la gélatine à distance et en injection souscutanée, dit-il, est encore une méthode mal réglée et dangereuse. Le traitement par ingestion, ou injection de chlorure de calcium qui procuro les mêmes avantages, est plus simple, mieux connu et exosos à moits de dancers (h. »

Il était logique d'essayer ces deux moyens dans le traitement des hémorrhagies intestinales de la fièvre typhoïde. C'est ce que nous avons fait depuis un an dans les sept ou huit cas qui se sont présentés à notre observation, timidement d'abord, puis avec plus de confiance, l'expérience clinique avant été fayorable.

Voici comment j'institue actuellement le traitement dès qu'une hémorrhagie se produit chez un malade atteint de flèvre typhoide.

Le malado est immobilisé le plus complètement possible; les bains froids sont donc suspendus et remplacés par de simples enveloppements à l'aide d'un drap mouillé.

Le lait est supprimé et remplacé pendant deux ou trois jours par une certaine quantité d'eau.

Indications et contre-indications de l'hémostase par la gélatine, page 295. — 1898.

On donne tous les jours un ou deux lavements d'un litre d'oau bouillie à 48° à faible pression à l'aide d'un bock à injections placée de 20 à 40 centimètres au-dossus du lit.

A chaque lavement on ajoute 4 grammes do chlorure de calcium ot on en fait prendro 2 grammes par la bouche en solution aqueuse.

Il me parait utile de complèter le traitement par une petite dose d'oxtrait thébaïque, 4 ou 5 centigrammes en pilules d'un centigramme ospacées. L'administration de l'opium a pour but d'immobiliser l'intestin

Dans quelques cas, j'ai de plus donné trois doses espacées de 5 grammes de sous-nitrate de bismuth. Ce médicament a la propriété de désodoriser les selles d'une façon remarquable. Il était, m'a-t-on dit, fort employé par Vulpian.

Les grands lavements peuvent évidemment ramener du sang rouge, soit liquide, soit en caillots lorsque l'hémorrhagie n'est pas encore arrêtée ou que l'intestin ne s'est pas encore débarrassé du sang déversé dans sa cavité; mais je ne connais pas encore de cas dans lequel l'hémorrhagie n'ait pas fini par être arrêtée. Cotte éventualité pourrait évidemment se produire

si le vaisseau saignant était de calibre trop considérable.

Le plus souvent, le premier lavement a ramené des caillots de sang plus ou moins noir; les lavements ultérieurs en étaient exempts.

Jo considère comme un sérieux avantage de débarrasser l'intestin du sang extravasé. En offet, lorsqu'il séjourne dans le tube digestif, il s'y patréfie, ce qui devient une cause noucolle d'intoxication et de fièvre. La fièvre se voit quelquois après les hémorrhagies de l'ulcère simple de l'estomac sous l'influence de la putréfaction du sang dans l'intestin; les selles mélobémorrhagiques sont toujours très fétides.

Le lait est rendu au bout de quelquos jours, en petite quantité d'abord. Au bout de cinq ou six jours, si le sang n'a pas reparu dans les selles, le traitement normal et les bains froids sont repris. En cas de grave hémorrhagie, il peut être utile de faire de grandes injections sous-cutanés de sérum chloruré; il me semble qu'on pourrait y ajouter une certaine quantité de chlorure de calcium. P. Carnot a quelquefois ajouté du chlorure de calcium aux solutions de gélatine administrées par la vois sous-cutanée.

Il y aurait lieo, du reste, d'établir d'une façon précise la posologie du chlorure de calcium. M. P. Carnot m'a dit que ces propriétés coagulantes ne sont pas proportionnelles à sa quantité. Aux environs de 10 grammes, au contraire, la coagulabilité du sang aurait tendance à diminuer. La dose utile serait de 4 à 5 grammes.

4 grammes de chlorure de calcium sont absorbés par la voie stomacale sans inconvicient en solution un peu étendue. Depuis un an environ, je l'ai administré à cette dose, dans du lait, dans tous les cas d'hémoptysie qui se sont présentés à mon observation. Les résultats m'ont naru encouraceants

Discussion.

M. LE GENDRE. — La communication de M. Mathieu est intéressante à plusieurs points de vue; d'abord par les nouveaux faits qu'il nous apporte sur un médicament encore peu employé, puis par a pratique des grands lavements trés chauds qu'il substitue à l'immobilisation de l'intestin jusqu'ici recherchée. Abandonne-t-il systématiquement les applications de glace, jusqu'ici considérées comme le meilleur moyen à opposer aux grandes hémorrhagies?

l'ai moi aussi une certaine expérience du chlorure de calcium, mais je ne l'ai employé que dans les hémoptysies; il m'a réussi, je le reconnais, mais je ne le trouve certainement pas supérieur comme résultat, en ce cas spécial, aux applications de glace sur les testicules, conseillées par Daremberg.

Reste à apprécier l'opportunité des grands lavements : j'a-

voue qu'à première vue, tout au moins, il me semble un peu dangereux d'injecter dans l'intestin d'un malade en train de faire une grande hémorrhagie une masse d'eau relativement considérable; il faudrait que les expériences favorables fussent plus nombreuses pour me décider à handonner le traitement classique. M. Mathieu nous dit bien que le lavement débarrasse l'intestin de la masses sanguine en putréfaction et je reconnais qu'il y a avantage évident à combattre les fâcheux effets de l'autointoxication putride; mais nous avons d'autres moyens, que je trouve meilleurs, pour faire de l'autisepsie intestinale. Le lavement ne peut entraîner que le sang qui séjourne dans la partie inférieure du tube intestinal, tandis que si l'on administre un antiseptique par la bouche, le naphtol par exemple, on obtiendra d'excellents effets au voint de vue de la désinfection des selles.

M. MATHEU. — Dans ces cas, je renonce sans grand regret aux applications de glace. Certes la glace exerce au moment de son application une action vaso-constrictive sérieuse, mais des que l'on supprime le froid, la circulation se rétablit avec état congestif d'antant plus marqué que l'action de la glace a été elle-même plus prolongée. L'eau très chaude améne aussi la vaso-constriction, sans dilatation consécutive; elle l'amène même à distance. Par les grands lave-ments donnés lentement, à faible pression, je ne crois pas mobiliser l'intestin. Du reste dans tous les cas qui me sont connus, l'hémorrhagie s'est arrêtée. Je puis donc dire, modestement tout au moins, que je n'ai pas fait saigner mes malades.

Au point de vue de la désinfection, je préfère le lavement parce qu'il a une action purement mécanique, mais si j'employais un antiseptique interne, ce n'est certainement pas au naphtol que je m'adresserais, car je reproche à ce médicament une action irritante et même caustique et J'avoue que chez des typhiques son action me paraît dangereuse; je préfère les sels de bismuth. M. Baner. — Je partage complètement l'opinion de M. Mathieu sur les inconvénients du naphtol comme antiseptique; c'ost un corps non seulement irritant mais encore caustique et quiconque a pu sentir l'impression de ce corps appliqué sur les muqueuses buceales et pharyagées se rend immédiatement compte de l'effet qu'il est capable de produire sur la muqueuse digestive, surtout quand elle est irritable et à plus forte raison irritée. Je rappellerai à M. Le Gardeq que nous avons jadis assisté ensemble dans le service de Dujardin-Beaumetz à des essais intéressants d'un désinfoctant aujourd'hui délaissé, le sulfure de carbone sous forme d'eau sulfocarbonée, dans le traitement de la fièvre typhoide, d'arrès la formule suivante.

A la dose de dix à douze cuillerées par jour dans une boisson quelconque, ee médicament excree une action désinfactante remarquable, les selles ne sont plus odorantes et je ne mo souviens d'aucem inconvénient au cours de la médication. Certainement ce procédé très anodin méritait d'être conservé et de ne pas tomber dans l'oubli.

M. Le Gexora:. — Je suis bien obligé de reconnaître que le naphtol n'a plus l'heur de plaire à un grand nombre do nos collègues; mais vraiment doit-il ainsi servir de boue émissaire par suito des abus qui ont pu se produire, comme il arrive toujours, dans l'emploi des antiseptiques internes? Je reconnais do bonne grâce que l'on a abusé de cette médication, que beaucoup do médiceins ont preserti lo naphtol à tort et à travers sans roster fidelos aux indications formulées par les initiateurs, mais le principe do la méthode est là qui reste dobout et la méthode elle-même a readu des services et on read oneore tous los jours. J'ai une grande expérience du naphtol,

or je me refuse à admettre qu'il soit aussi caustique qu'on veut bien le dire pour le condamner: J'enn ai fait un usage personnel considérable et J'en suis encore à éprouver des inconvénients. Si on met du naphtol en contact avec la mueuse buccale, il y cause une sensation de cuisson pénible, nais qui n'est pas une preuve de causticité destructive quand le naphtol arrive dans l'estomac mélangé à une poudre inerte ou insoluble, comme le bismult, la craie ou la magnésie, si d'ailleurs il est véhiculé par un liquide, il ue cause en général aucune sensation pénible, hormis dans les ces d'liproesthésie gastrique ou de gastrite ulcéreuse. L'administration de petites doses de naphtol, régulièrement réfractées à intervalles égaux et rupprochés assure, sinon l'antisepsie absolue, que personne n'a jamais prétendu réaliser, au moins une très réelle désinfection du tractus intestinal.

Notre collègue Bardot rappelle les essais de l'eau sulfo-carbonée dans lo servico de Dujardin-Beaumetz; certes je mo garderais d'oublior cos expériences qui ont été relatées dans l'excellente thèse de Sapelier, mais cette médication ne me parrait pas mériter d'être opposée avantageusement à d'autres untiseptiques, car elle agissait surtout commo désodorisant, et de plus le sulfure de carbone est loin d'être un corps inoffensif, puisqu'on lui a imputé des paralysies.

D'ailleurs il est passible des critiques formulées contre tous les antiseptiques solubles. L'antisepsio intestinale ne peut être réalisée qu'au moyen do corps finement pulyérulents et insolubles.

M. Albert Ronx. — Pai suivi avec le plus grand intérêt la communication de M. Mathieu qui donne une forme concrète à une médication relativement nouvelle contre les lièmorrhagies intornes, phénomène si grave et contre lequel nous no sommes pas toujours séricusement armés. Pai moi-même une expérience assez longue du chlorure de calcium depuis que Wright l'a proposé pour la première fois, car c'est Wright qui a eu le premier l'idée d'appliquer cette drogue dans le

traitement des hémorrhagies internes. C'est surtout contre les hémoptysies que fai eu l'occasion de l'employer et jai constaté que la doss optima est de 4 grammes par vingt-quatre heures; mais je dois dire que très souvent Jai eu à constater de l'intolèrance de la part des malades, car le médicament est irritant et souvent l'estomac regimbe contre la médication; aussi je conseille de l'administer de préférence associé avec le sirop d'opium, procédé qui a l'avantage de diminure considérablement l'action offensive du produit.

Voici la formule que j'emploie :

 Chlorure de calcium
 4 grammes

 Sirop d'opium
 30

 Eau distillée de tilleul
 120

Une cuillerée à soupe toutes les heures.

Les observations de M. Mathieu, relativement aux dangers de la putréfaction du sang retenu dans l'intestin après les hémorragies de ce viscère sont parfaitement justes : j'ai eu lieu de constater quelquefois chez les typhiques un signe très important en ce sens qu'il peut justement permettre de diagnostiquer une hémorragie sans melaena, je veux parler de l'apparition du scatol et des corps sulfoc niugués dans l'urine. Si l'on étudie l'urine des typhiques, on constate que l'acide azotique versé le long de la paroi du verre ne donne généralement pas de coloration rouge; mais après les hémorragies on voit, au contraire, une coloration rouge ou rosée plus ou moins intense due à la présence du scatol Ce signe, en l'absence de toute autre indication doit faire supposer une hémorrhagie latente. Je me souviens à ce propos d'un cas typique intéressant : il s'agit d'un malade qui fournit un jour ce signe de manière particulièrement intense et qui mourut le lendemain. A l'autorsie, on trouva dans l'intestin un véritable boudin de sang en voie de putréfaction,

Cola prouve que l'antisepsie de l'intestin est une mesure très indiquée; mais, comme M. Mathieu, je crois qu'à ce point de vue, le meilleur moyen, de beauccup supérieur aux drogues et notamment au naphtol, consiste dans l'administration de lavements qui font de grands lavages. L'antisopsie mécanique me semble certainement de beauccup préférable à l'antisopsie médicamenteuse.

II. Traitement de l'otite moyenne aigué commençante par les insufflations d'air

par le De A. Courtade

Dans le cours d'un coryza aigu, généralement du 4º au 8º jour, il est assez fréquent de voir apparaître une otite moyenne aigué, caractérisée, tout d'abord, par une sensation de géne, de plénitude dans l'oreille, suivio bientit de douleurs vives, lancinantes, à exacerbation nocturne; la surdité survient à un degré variable et augmente à mesure que la caisse se remplit de sécrétions. Quant aux phénomènes généraux, ils sont plus ou moins accusés, car leur intensité est subordonnée à l'üge, au tempérament de l'individu et aussi au degré plus ou moins intense du processus inflammatoire.

Si on examine le tympan, dans les premières heures, on constate une nijection vasculaire très marquée, le long du manche du marteau et dans toute la région de la membrane de Schrappnell: plus tard, la membrane du tympan ellemême est atteinte par l'inflammation, elle perd son poli et se vousse en dehors quand une sécrétion abondante est retenue derrière elle.

Quel traitement instituer quand on est appelé dès le début? Je crois inutile de rappeler les nombreuses formules d'instillations calmantes et de moyens antiphlogistiques que l'on peut employer, car j'ai en vue d'attirer seulement l'attention sur un mode de traitement qui est à la fois sédatif et curatif; ce moyen c'est l'insufflation d'air.

Si on pratique une insufflation d'air, dans le cas d'otite

moyenne aiguë à sa première période, on constate, à l'aide de l'otoscope, que l'air vient barboter dans le liquide sécrété et produit un bruit de gros râles muqueux.

Très souvent, dès la première insufflation, le malade se sent soulagé, la tête lui semble plus libre, la surdité diminue et les douleurs disparaissent.

Dans bien des cas, si on pratique l'insufflation dès les premières leures, l'amélioration est telle qu'il n'y a pas lieu d'y revenir et que la guérison en est la suite; c'est au moins ce que j'ai observé chez de nombreux enfants et mème des adultes qui étaient guéris de leurs violentes douleurs par une seule insufflation.

Si le cas est moins récent, comme cela a lieu chez l'adulte qui néglige de se soigner dès le premier avertissement de la maladie, on est obligé d'y recourir à plusieurs reprises.

Dans cet ordre de cas, je me bornerai à relater les trois observations suivantes qui sont suffisantes, je crois, pour juger de l'efficacité du moyen.

Oss. 1.— Mes X..., agée de 30 ass, a éprouvé fréquemment, vers 14 ou 15 ass, des douleurs d'oreilles qui n'ont jamais été suivies d'écoulement ; ces poussées congestives étaient causées très probablement par des végétations adénoides dont elle porte encore des traces; d'ailleurs, sa fillette, àgée de 8 ass, présentait aussi des adénoides que nous avons opérées.

Le 19 novembre 1807, elle vient nous consulter parce que depuis quelques jours les oreilles se sont mises à couler après une période de douleurs assez longue; la surdité est si prononcée qu'elle n'entend que la voix laute. Le fond des conduis auditis, reunplis de débris épidermiques et de grumeaux purulents, est nettoyé; le tympan droit apparait alors d'un rouge vif avec voussure du segment postero-supérieur; le tympan gauche présente le même aspect et en plus un enfoncement du segment antérieur dà à des adhérences anciennes; les perforations sont si petites qu'elles ne peuvent être distinguées.

Après la première insufflation, il y a une amélioration instantanée de l'audition qui dure 48 heures; l'insufflation est répétée le 20 et quand nous revoyons la malade, le 25, la suppuration est arrêtée et l'audition revenue à son état antérieur.

Ons. II.— M. X.., ágé de 30 ans, est atteint de suppuration de l'oreille gauche depuis plusieurs années. Mais depuis 3 jours, à la suite de coryza, il a éprouvé dans l'oreille droite des douleurs très vives qui troublent son sommeil et qui s'irradient vers la pointe de l'apophyso mastoide.

A l'examen, pratiqué le 21 décembre 1897, nous constatons, à gauche, l'existence d'une perforation siègeant dans la 1/2 antérieure de la membrane de Schapnell, le reste du tympan étant intact mais de couleur un peu opaque et épaissi.

L'oreille droite, malade depuis 3 jours, a son tympan uniformément rouge foncé, sans dépoli de sa face externo; le triangle luminoux est dissocié; il n'y a pas de voussure appréciable.

L'insuffluation d'air donne lieua un bruit de gros rides muqueux, perçus avec l'otoseope; l'amélioration de l'oule est immédiate. Après quelques séances d'aération de la caisse, l'ouie est redevonue co qu'elle était autrefois, mais des la premièro séance les douleurs avaient dissaru ainsi que l'autohlonie.

Nous laissons de côté, chez ee malade, la question de la suppuration de la région de la membrane do Schrapnell qui n'est qu'incidente au sujet que nous traitons.

Obs. III. — M¹⁰⁰ de X..., 20 ans, estatteinte de coryza depuis deux semaines, mais, il y a trois jours, elle a commencé à éprouvor dans l'oreille droite des douleurs, quiont augmenté, au point de devenir assoz violentes pour l'empêcher de dormir.

Quand nous l'examinens, le 8 juin 1900, nous constatens l'existence d'un coryza très intense en pleine évolution, et du côté de l'oreille droite, douloureuse, les lésions suivantes: en plusieurs points du tympan existent de petitos eroûtes brunâtres, séches, vestiges très probable de phlyctènes hémorragiques desséchées; injection très accusée du marteau et de la membrane de Schrapnell.

Pour calmer ces douleurs, la malade a instillé des solutions de eocaine ou d'acide phénique, sans en éprouver de soulagement.

L'insufflation donne naissance au bruit de gros râle muqueux, l'ouïe est améliorée par l'intervention et les douleurs cessent.

Après six insufflations, faites à deux jours d'intervalle, et sans autre traitement local, les bourdonnement disparaissent et l'ouic redevient normale.

L'opportunité des insufflations d'air dans l'otite moyenne aigué catarrhale est discutable. Politzer les proseri au début de l'affection » parce que d'après l'expérience, di-i-i, peudant la période de réaction, l'accroissement subit de la pression de l'air dans la caisse augmente, en général, la douleur et l'irritation. Laconclusion est: qu'aussilongteunys qu'une forte douleur existe dans l'oreille, il n'y a pass pratiquer la douche d'air et que c'est seulement après la cessation des symptômes de réaction et lorsque l'ouie commence à diminuer rapidement que les insufflations d'air dans l'oreille moyenne sont indiquées. >

Troltsch pense, au contraire que « plus tôt on faitdes injections d'air, plus on abrège la durée des symptômes de réaction inflammatoires et plus aussi on amoindrit les suites fácheuses du processus morbide ».

Nous nous rangeons évidemment, et au nom de l'expérience, du côté de Treolisch; déjà en 1885, dans notre Manuel de Traitement des maladies de l'oreille, nous exprimions le même avis, qu'une expérience plus prolongée n'a fait que confirmer.

La crainte, assez chimérique, de repousser les sécrétions dans les cellules mastoidiennes ne doit pas faire rejeter un mode de traitement aussi simple ctaussi efficace. Il faut ajouter qu'il est loin d'être applicable à tous les cas d'otite moyenne aiguë; tels sont ceux ou en 24 ou 48 heures après le début de l'Affection, l'oreille moyenne suppure. Voici un exemple récent de ce mode d'évolution. Men X..., atteinte depuis huit jours d'un coryza grippal très intense, est prise brusquement de douleurs extrémement vives dans l'oreille gauche; à l'examen pratiqué quelques heures après nous constatons sur le tympan gauche la présence de plusieurs phlyctènes hémorrhagiques. tandis que le tympan droit ne présente aucune altération.

Deux jours après il y avait perforation spontance des deux tympans avec issue de liquide séro-sanguinolent puis de pus: l'écoulement de l'oreille droite cessa au bout de quinze jours de traitement, et celui de l'oreille gauche, beaucoup plus gravement atteinte, mitquartre à cinq semantes pour disparatire.

Dans les cas aussi intenses que celui-ci, il faut se garder de recourir aux douches d'air qui seraient inutiles, douloureuses et détermineraient très probablement une perforation immédiate du tympan que le malade ne manquerait pas d'imputer au médecir.

Les cas les plus favorables sont ceux où l'inflammation de la muqueuse de la caisse ne se traduit encore que par une injection très accusée du manche du marteau et de la membranc de Schrapnell ou même par une rougeur de toute la membrane du tympan, mais sans infiltration de la couche cutanée; dans ces cas, le meilleur calmant est encore l'insufflation d'air qui présente encore l'avantage d'arrêter le processus inflammatoire.

Si nous voulions sortir du domaine des faits, qui sont inatiquables, pour entrer dans celui de la théorie, toujours discutable et variable selon les idées du jour, il y aurait à discuter comment agit la couche d'air et comment, si l'otite moyenne est toujours le résultat d'une infection microbienne, l'insuffation peut enrayer le processus inflammatoire Y Nous laisserons de côté la discussion de ces questions subsidiaires, pour nous en tenir au côté purement pratique qui est l'objectif de notre communication.

III. L'albuminurie produite par l'antipyrine. Inconvénients de l'antipyrine chez les albuminuriques

Par M Albert ROBIN.

On a signaló quelques-uns des ineonvénients de l'antipyrine. Or, il en est un qui n'a point encore était décrit et sur lequel je désire appeler votre attention. Quand l'antipyrine est administrée d'une manière continue, pendant dix à quinzo jours de suite, et aux dosse de 4 grammes par jour, à des individus dont le rein est absolument sain, il est fréquent de voir apparaître, du douziéme au quinzième jour, des traces d'albumine dans l'urine. Cette albuminurie, très l'ègrer, disparaît rapidement, d'ailleurs, quand on cesse l'usage du médieament.

Chez les sujets qui, pour une raison quelconque, présentent de l'albumine dans leurs urines, l'emploi de l'antipyrine fait rapidement augmenter la teneur en albumine, ainsi qu'en témoizment les cas ei-dessous.

Un homme de 70 ans, atteint de pyélite ehronique conscutive à une ancienne rétention d'urine, à liminait par viugquatre heures 0er,101 d'albumine. On lui donne 3 grummes d'antipyrine pour essayer de calmer des doulours rhumatoides cratiques; à partir du quatrième jour, l'albumine monte à 0er,182, puis le cinquième jour à 0er,182 Malgré la suppression du médicament, l'albumine se maintint encere à 0er,202 et à 0er,200 pendant les deux jours suivants, après quoi, elle redescendit aux environs de son taux initial.

Une vicille diabétique est traitée par l'antipyrine, à la des de 4 grammes par jour. Sou urine renfermait, avant le traitement, des traces pour ainsi dire indesables d'albumine. Pendant les douze premiers jours de l'administration de l'antipyrine, l'albumine ne paraît pas augmenter sensiblement. Mais le douzième jour, comme elle paraissait s'être subtiement accrue, on fit le dosage qui donna 0°F,500. L'antipyrine, l'antipyrine, l'antipyrine de l'antipyrine d

fut aussitôt supprimée, et cependant, le dosage, pratiqué les trois jours suivants, donna 0°,700, 0°,648, 0°,810; puis l'albumine s'abaissa presque subitement, de sorte que six jours aprés la cessation de l'antipyrine, elle n'existait plus qu'à l'état de traces.

Ainsi, comme l'administration prolongée de l'antipyrine peut déterminer le passage dans l'urine d'une certaine quantité d'albumine, il importe, quand on administre ce médicament, de surveiller attentivement la sécrétien rénale, afin de le suspendre aussitôt qu'apparaissent des traces d'albumine.

En eutre, cette albumine, si fugace qu'elle soit, constitue une contre-indication à l'emploi de deses trop élevées eu trop longtemps continuées. Elle implique aussi l'abstentien de l'antipyrine dans les affections rénales.

Si j'insiste sur ces faits qui ne sont ras connus, c'est peur veus mettre en garde contre l'emploi de l'antipyrine chez, les albuminuriques; et cela est d'autant plus utile qu'il y a quelque temps, en a présenté à la Société de Bielogie de Paris un tavail sur le traitement de l'albuminurie par l'antipyrine. Comme il y aurait un réel danger à suivre les prescriptions énoncées dans ce travail, je creis veus être utile en veus mettant sur ves gardes.

M. Datācac. — Jai observé plusieurs faits analogues à ceux de M. Albert Robin. Pen citeral deux qui me viennent à la mémeire. Le premier concerne un diabetique de 45 ans qui avait eu, 7 et 8 ans auparavant, des crises de coliques hepatiques. Le foie était hypertrophie; le tronc et les membres portaient de nombreux xanthômes. Le taux quotidien des urines était de 2 litres et demi, avec de l'azoutrie, 112 grammes des seure et 1er,20 d'albumine par vingt-quatre heures. M. X. . . . voulut essayer du traitement du diabete par l'antipyrine dont il prit 2 grammes par jour. Au septieme jour, le taux quotidien des urines était abaissé à 2 litres, celui du sucre à 81 grammes, mais le taux de l'albumine était monté à 1er,56.

Le secend eas concerne un malade ayant eu 2 ans auparavant des celiques hépatiques ; le foie débordait les fausses côtes de près de deux travers de deigt. M. D... présentait des symptômes manifestes de dyspensie hyperchlorhydrique de moyenne intensité avec fermentations anermales et une albuminurie permanente d'origine dyspeptique, car elle était aggravée par le régime lacté, le coefficient urotoxique était augmenté, les urines ne contenaient pas de cylindres; on ne constatait ni œdème, ni symptômes de brightisme; il avait de l'urobilinurie et de l'indicanurie. Le taux quotidien des urines était de 50 ce. seulement, avec 40 centigrammes d'albumine. Un médecin consulté pour une névralgie intercestale, conseilla 3 doses de 50 centigrammes d'antipyrine. Or, une heure après la première dose apparaissait une éruption ortiée dans les espaces interdigitaux, et rapidement survenait un érythème de la face simulant un érvsipèle. L'examen des urines, pratiqué le surlendemain, décela 78 centigrammes d'albumine par vingt-quatre heures.

Me basant sur ces faits, je suis d'avis, avec M. Albert Rebin, que nous devons être réservés sur l'administration de l'antipyrine aux albuminuriques de teute nature.

IV. Rhino-pharyzgite typhoïdique

Par M. BARBARY, correspondant.

Dans le Bulletin médical du 15 décembre 1900, M. le D'Galleis a décrit deux eas de « rhino-pharyugite typheidienne » pris au début pour des manifestations grippales.

Nous avons l'henneur de cemmuniquer à la Seciété une observation personnelle de rhine-pharyngite typheidique dont le diagnostic a été confirmé et par la marche et les symptômes de la maladie et aussi par l'examen bactériologique. Notre observation concerne un jeune garçon de 15 ans auprès duquel nous avons été appelé le 10 éécembre dernier. L'enfant, très dévelopé pour son âge et gros mangeur, se plaignait depuis quelques jours de troubles digestifs. A notre première visite, au dire des parents, il avait eu depuis deux jours des frissons, des maux de tôte. Lui-même se plaignait surtout, en insistant sur le fait, que ses fosses nasales étaient obstruées comme par un coryza et que sa gorge était douloureuse.

A l'examen, langue sale, épaisse, recouverte d'enduits blanchâtres : l'arrière-gorge nous permet de constater une rhino-pharyngite aiguê avec muco-pus descendant de l'arrièrecavité des fosses nasales.

Le cœur ne présente rien d'anormal; de même pour les poumons où l'auscultation et la percussion n'indiquent aucune lésion.

Le foie déborde légèrement les fausses côtes. L'estomac est dilaté.

L'abdomen paraît très sensible à la palpation à droite. La rate est grosse. La température est de 39.5.

Nous faisons des réserves pour une dothiénentérie au début. Nous instituons le traitement local pour la rhino-pharyngite et le traitement général pour la dothiénentérie à craindre.

1º Traitement local. — Lavages du nex à l'eau bicarbonatée bouillie; lavages de la cavité buccale et de l'arrière-gorge avec le même liquide; en outre, quatre fois par jour, gargarisme avec de l'eau bouillie contenant quelques gouttes d'une solution: menthol, alcool, acide phénique;

2º Traitement général. — Lotions vinaigrées quatre fois par jour; lavements, lavages pratiqués très lentement et sous très faible pression avec de l'eau bouillie boriquée. A l'intérieur, naphtol, lait, eau de Vichy.

Les quatre jours suivants l'état est stationnaire, les symptômes abdominaux et gastriques sont les mêmes. Les symptômes de rhino-pharyngite aiguë prédominent toujours et, nous le répétons à dessein, l'enfant ne cesse de nous dirc que son nez et sa gorge le génent, que là seulement est son mal. La température oscille entre 39°,5 le soir et 38°,4,38°,5 le matin.

Notre opinion de typhoide se confirmant malgré tout, nous ajoutons au traitement des injections de quinine—solution de Clermont ou formule de Villejean—soir et matin, 50 centigrammes, suivant l'indication du moment.

Entre le sixième et le septième jour, apparitiou très nette de taches rosées abdominales; en même temps, les phênomènes de rhino-pharyngite paraissent s'amender. La muqueuse buccale et pharyngée est cependant encore très rouge: sur l'amygdale droite parait une ulcération de la largeur d'une pièce de cinquante centimes que nous cautérisons au nitrate.

A partir de ce jour, la maladie évolue avec toutes les allures d'une dothiénentérie bénigne et à marche très rapide.

A ce moment, voulant confirmer notre diagnostic, nous prélevons du sang en vue d'un sèro-diagnostic qui nous a douné un résultat positif.

Nous avons joint à notre observation l'examen bactériologique ainsi que l'examen des urines, la feuille de température.

La défervescence extrémement rapide a cu lieu vers le quinzième jour de la maladie; à partir de cette date la température est retombée à la normale.

Au cours de la maladie nous n'avons remarqué comme faits particuliers que des phénomènes d'hypotension cardiaque et artérielle — au reste intermittents; — nous avons eu recours avec une extréme réserve à quelques gouttes de la solution de digitale de Miahle et aussi à la théobromine. Actuellement, au trentième jour, le malade se lève quelques heures depuis trois jours et, soumis à un régime alimentaire rigoureux, va aussi bien que possible. Deux faits nous ont paru dignes d'être signalés dans notre observation :

- 1º Le début d'une typhoïde caché par des symptômes évidents de rhino-pharyngite aiguê pouvant simuler une infection grippale;
- 2º l'évolution extrêmement rapide de la dothiénentérie consécutive et sa défervescence précoce.

Au point de vue de l'observation clinique elle-même, MM. Potain, Ménétrier, Rendu, Le Gendre, Syredey ont décrit des cas de dothiémentèrie secondaire à une grippe qui, au lieu d'être graves, ont été très bénins et out eu une défervescence brusque et précoce.

Dans ses deux observations publiées dans le Bulletin médical du 10 décembre, M. Gallois fait de la rhino-pharyngite du début une rhino-pharyngite franchement typhotidique qu'il faut même différencier de toute manifestation grippale

Pour nous, nous ne pensons pas pouvoir aussi affirmativement trancher la question. Toutefois, comme M. Gallois, nous croyons que les rhino-pharyngites typholdiques méritent d'être signalées et qu'il peut être utile, en rapprochant des faits semblables. d'étudier leur véritable étologie.

Étnient présents à la séance: TITULAIRIS. — MM. Bardel, Blondel, Bolognesi, Brun, Burlureaux, Champigny, Courtade, Crinon, Dalché, de Crésantignes, Delpech, Désesquelles, Desnos, Dignat, Hirtz, Joanin, Le Gendre, Lépinois, Leredde, Mathieu, Moreigne, Pouchet, Albert Robin, Triboulet, Vogt.

Correspondents. — MM. Duhourcau, Fourier, Linossier, Schmith.

La séance est levée à six heures.

Le Secrétaire de service, Vogt

BIBLIOGRAPHIE

Hygiène de la grossesse et des suites de ceuches, par L. Vorlet; volume in-8° de 91 pages; O. Doin, éditeur.

Persuadé que l'hygiène de l'enfant commence dès sa conception, l'autuer a truit tout d'abord la grossesse, l'accoulchemnet el los suites de couches, envisagés aussi liten au point de vue de la mère qu'à celui de l'enfant. De la il d'uision de son livre en trois section comportant chaeunce un aperce physiologique et pathologique du suiçt, un résumé des anomalies, ets aceidents et des troubles divers qui peuvent surrenir, enfin l'indication des précautions bygéniques destinées à les précent de treitment médical ou même chirurgical propre à los provenir de treitment médical ou même chirurgical propre à los

Maladies des femmes, par M. l'OLAILLON; un volume in-8° avec 71 figures; O. Doin, éditeur.

Ce livre n'est pas un traité de gynéeologie, mais un recueil de faits complétés par les réflexion d'un clinicien. C'est assez dire qu'il ne saurait s'analyser. Il faut lire les chapitres relatifs au traitement des affections organiques de la mamelle, de ses tumcurs, des malformations, pour voir que le but que se proposait M. Polaillonde dégager les indications et les contre-indications thérapeutiques par l'étude d'un grand nombre de malades et de préconiser la simplicité des procédés opératoires a été parfaitement atteint. Chirurgien sagace et interventionniste prudent. l'auteur recommande de ne iamais considérer le suecès opératoire comme synonyme de thérapeutique. Il estime en outre que l'indication d'user de l'instrument tranchant est souvent diffleile à saisir dans l'immense classe des inflammations de l'utérus, des trompes et des ovaires. Si le curetage, si l'ablatien ovaro-salpingienne guérissent rapidement nombre de malades, il en est d'autres qui continuent à souffrir. Et ce qui est plus troublant encore, c'est que ecrtaines malades arrivent à la guérison sansonération, par le repos, l'hygiène et un traitement purement médical, ll a donc fallu. avoue M. Polaillon, revenir de cette conception abusive et fausse, que toutes les phlegmasies des organes génitaux internes sont justiciables de la chirurgie.

Vade mecum de thérapeutique chirurgicale, par H. Fischer; un volume in-18 de 328 pages; L. Boyer, éditeur.

Il est un certain nombre d'opérations courantes, usuelles, bien défi-

nies, nécessaires, que tout médecin doit savoir partager. C'est dans le but de venir à son aide que M. Fischer a essayé de réunir en ce livre, aussi succintement que possible, les connaissances réellement indispensables au praticien et qu'il n'a pas le droit d'ignorer.

Formulaire d'hydrothérapie, par Odilon Martin; un volume in-18 eartonné de 252 pages; J.-B. Balllière et fils, éditeurs.

On a une tendance à croire généralement que l'hydrolérspice est un traitement d'exception dont une catégorier très limité de malades est appelie à bénéticare: c'est là une grosse erreure rafreteme par le defant d'emeglement officiel de cette branche de la thérapeulique, en France du moins, et jar le nombre encore lieu restrictur d'établisse. L'est l'avent de l'est entre le ration et de l'avent de ration et ration et de l'avent de l'est en ration et notice les les de l'est de

En écrivant son livre, M. Martin a eu pour but de mettre entre les mains des médecins non familiarisés avec la technique hydrothérapique un guide sûr, véritable formulaire, qui lui permette d'avoir présentes à l'esprit les ressources que peut leur offiri Phydrothérapie et d'en faire bénédieir leurs malades dans la plus large mesure.

Paris-Médical, assistance et enseignement; un volume in-8° eartonné de 492 pages; Masson et C*, éditeurs.

Ce livre écrit à l'occasion du XIII* congrès international de médecine, établit le bilan des ressources de l'aris en 1900 comme assistance et enseignement.

Obstétrique d'urgence, par M. Demelin; un volume eartonné in-18 de 376 pages; O. Doin, éditeur.

Chacun sait qu'il peut se présenter pendant la période puerpéralo des accidents exigeant une intervention plus ou moins immédiat peublemorrhagies, les troubles dus à l'asphyxie ou à l'anhématosie, les hémorrhagies, les troubles dus à l'asphyxie ou à l'anhématosie, les amifectations sinéctieuses sont capables de compromettire la vie de la mère et du produit de la conception. Il importe done d'être armé pour parer à toutes les éventualités. Il suffira de mettra à profit les consulque donne M. Demelin, conseils sages et présis complétés par les nificacions nécessires à la pratique de la laparomée dont l'urgenopeut se poser pendant la grossesse, l'acconchement et les suites de couches.

Revues et mémoires d'obstétrique, par M. Demelin; un fort volume in 8° avec figures dans le texte; O. Doin, éditeur.

C'est en rassemblant ses travaux parus dans les diverses publica-

tions médicales que l'auteur a donné un bon et beau livre réficant sou enseignement. La plus grosse part à été rescrée à la physiologie et à la pathologne obsétéricales, mais ce qui touche à la thérapeutique et a partinologne obsétéricales, mais ce qui touche à la thérapeutique dans ce volume qui ne saurait se préter à l'analyse. A noter toutefois qui le diagnossie précoce de la grossesse, les infections intra-utérines fortales, l'éctire grave chez la femme enceinte, l'hystéropexic consistérie au point de vue obsétireal, le bassie coxo-aberquelux, l'ancs-tisés par l'éther, l'accouchement prématuré provoqué, l'embryotomie architisme, la mort apparentie de noverau-se, l'Allatiement natemel, l'anchitisme, la mort apparentie de noverau-se, l'Allatiement natemel, l'anchitisme, la mort apparentie de noverau-se, l'Allatiement natemel, l'allatiement autement de l'accellance de la caractérisant les travaux di savant accouchement.

Conseils aux mères de famille pour les soins à donner à la première enfance, par Louis Vonlet; 1 voi de 308 pages; O. Doin, éditeur.

Donner des directions aux néres de famille, aux sages-femmes, à toutes les personnes, enfin, chargées d'élever les enfants, tel est le but de cet ouvrage, inspiré par le désir de diminuer la mortalité infantile. Il est divisé en trois parties : éducation physique, éducation intellectuelle et éducation morale.

M. Vortet a consacré, on médecin, la plus grando partie de son livre au corps, c'esté-dire au développement de l'enfant, à l'Alimentation, au vétement, à l'habitation, à l'exercico. Il insiste, chemin faisant, sur la symptomatalogie des maladies auxquelles l'enfant plus particulièrement exposé, dans le but de mieux les connaître et afu que le médecin puisse truver auprès des mètres des auxiliers intelligents pour le plus grand bénéfice des petits malades. Il réserve même à l'alcole et à ses funesces effets un chapitre sysicial qu'il de aux mères de familles chargées du soin de nourrir et d'éduquer leurs enfants, de direre leurs nechants et leurs assirations.

Après l'hygiène du corps, celle de l'esprit et du caractère a préoccupé M. Vorlet. Il moutre la nécessité de donner à la constitution physique de l'enfant vigueur et force, afin que ses facultés intellectuelles et morales jouissent de toute leur puissance.

Les conseils que M. Vorlet donne sont des plus judicieux et leur lecture est des plus attrayante. Il n'en faut pas davantage pour leur prédire des succès, qu'ont déjà prévus MM. Itapin (de Lausanne) et Auvard (de Paris) dans les préfaces qu'ils ont écrites pour cet ouvrage.

REVUE DES TRAVAUX FRANÇAIS ET ÉTRANGERS

Sérothérapie.

Action thérapeutique du sérum anti-pueumonique (Panne, Riforna med., octobre 1889. — L'inoculation sous-cutanée à l'âne ou à la génisse de cultures virulentes de pneumocoques donne, après plusieurs injections, un sérum anti-toxique des plus efficaces, puisqu'il neutralise une quantité vingt fois mortelle de cultures de pneumocoques. Administré a 10 pneumoniques gravement atteints, à la dose de 20 centimètres cubes tous les deux jours, ce sérum amena une amélioration rapide et complète, dés la deuxiéme injection, chez 7 malades; les 3 autres succombérent cependant; mais il s'agissait d'individus ágés, alcooliques et atteints antérieurement de néphrites seléreuses.

Les injections de sérum artificiel dans le traitement général de la fêver typhoide. — M. le professeur Bose (de Montpelier) vient de consacrer un très intéressant travail (Montp. méd., 25 novembre 1990) à l'étude des grands moyens thèrapeutiques employés actuellement : les bains, l'administratio de caféine et les injections de sérum artificiel (solution de chlorure de sodium de 7 à 10 0/00).

Il s'étend plus longuement sur ces dernières.

Les injections sous-cutanées d'eau salée réunissent les effets des bains et de le caféine, et, en outre, elles modifient de telle sorte l'état général qu'elles peuvent déterminer de véritables réactions ayant la plus grande analogie avec des phénomènes critiques.

M. Bosc, qui emploie ces injections depuis 1896, décrit

les diviser en deux phases :

ainsiles effets qu'elles produisent. Ces effets se produisent

a. Les phénomènes réactionnels, ordinairement peu intenses, et qu'il faut rechercher (élévation de température parfois précédée d'un léger frisson, nausées, sueurs, mictions, etc.);

dans les trois à cinq heures qui suivent l'injection; on peut

b. Les phénomènes post-réactionnels qui, par lour degré et leur durée, marquent l'amélioration obtenue. La pression sanguine est élevée, par chaque injection, de 11 à 15 centimètres par exemple, et cette élévation peut se maintenir à 13 ou 14 pendant un temps variable. Le pouls, d'abord accèléré, dimitue de fréquence, augmente de force; son dicrotisme diminue.

Chaque injection augmente nettement l'énergie du cœur et abaisse la température, de la troisième vers la lutitème heure, de 1 à 1,5 et même 2 degrés. Les effets de la première injection pouvent être très faibles : ils s'accusent au bout de quelques injections, et à la cinquième ou à la sixième heure, la température tombe de 40 à 39, 38 degrés. Parfois l'action antillemnique est rapide : la température tombe brusquement de 40 à 38 et même à 37 degrès, cette chute s'accompagnant d'une déblech uniaire.

Les urines des vingt-quatre heures deviennent plus abondantes, et l'on peut même parfois observer des débâcles précoces : la peau devieut moite, des sueurs abondantes apparaissent, l'état général se remonte. En somme, les injections salées provoquent dans l'organisme des réactions durables qui agissent sur les principales fonctions, elles sont de plus hémostatiques. Elles peuvent être employées chez tous les malades, à toutes les périodes de la flèvre; elles n'ont pas de contra-indications.

Les indications des trois médications précèdentes sont ainsi exposées par M. Bosc :

1º Dans les formes légères : les lavages intestinaux froids,

les compresses froides sur l'abdomen suffisent. Si, malgré ec traitement, la température s'élève et tend à demeurer à 39 degrés : bains à 30-28 dogrés.

- 2º Dans les formes mogennes: bains à 28 degrés, refroidis jusqu'à 24 degrés, et répètés chaque fois que la température atteint 39 degrés dans l'aisselle. Caféine en lavemonts des que le premier bruit s'affaiblit. Si, malgré la caféine, les bruits demeuront faibles, on suivra attentivemont la marche de la pression sanguine. Dés que celle-ci tombe au dessous de 12 centimètres, on fera, sous la peau du flanc, une injection d'eau salée de 800 centimètres cubes à 1 litre en une fois chez l'adulte.
- 3º Dans les formes graces: bains froids à 25 degrés, refroids rapidement à 20 et 2º C. Affusions à 15 degrés. Caféine on injections hypodermiques d'emblée, dès le premior jour à la doss de 1º 750 à 2 grammes dans les vingt-quatre heures. Si malgrée et traitement, l'état s'aggrave, pratiquer une ot même deux injections d'eau salée d'un litre tous les jours. Enfin, dans la convalsecence, on utilisera ces injections lorsque apparaîtrent des symptômes nets d'asthènie cardio-vas-culaire.

Médecine générale.

Sur les causes de l'accoutumance à la morphine. — L'accoutumance à un poison peut se produiro de deux manières différentes : ou bien le système nervoux perd peu à peu sa sensibilité vis-4-vis du toxiquo, de sorte que l'effet d'uno dose déterminéo est de plus en plus atténué; ou bien l'organisme acquiert progressivement la faculté do détruire ou de transformer le poison, et de le rondre ainsi inactif. Pour arriver à déterminer auquel de ces deux facteurs est due l'accoutmance à la morphine, M. Faust (Arch. f. experim. Pathol. u. Pharmakol., XLIV, 3 et 4) a administré à des chiens des doses croissantos de cet alcaloide en injections sous-cutanées, puis il a dosé cette substanco dans les féces. Voici les résultats auxquels il est arrivé:

Après une intoxication aiguë, on retrouve dans les ávacuations alvincs 70 0/0 de la morphine injectée. Au cours de l'intoxication chronique, ce taux diminue repidement, si bien qu'âu bout de trois somaines les feces ne renferment plus que 26 0/0 et, au bout de six semaines, plus que 4 0/0 de la quantité de toxique injectée sous la peau. Dans un cas de morphinisme chronique d'une durcée de trois mois, et où la dose quotidienne s'était peu à peu élevée de 0°7,45 à 3°7,50, les fêces ne contensient plus trace de morphine à la fin da second mois. La recherche de ce poison dans les organes d'animaux morts dans le marasme a régulièrement donné un résultai négatif.

L'auteur conclut do ces recherches que l'organismo acquiert peu à pou la faculté de détruire la morphine, ot que c'est ainsi que l'on doit expliquer l'immunité dont il jouit. Cette immunité n'est que relative, car si l'on injecte uno doss de morphine supérieure à celle que l'économie peut détruire, les symptômes d'intoxication apparaissont. Pour M. Faust, il est certain qu'il s'agit bien d'une destruction par oxydation de molécule de morphine, avec synthèse des produits de décomposition et formation de corps absolument différents du composé primitif, et non pas de la transformation do la morphine en un composé inoffensif, car il n'est pas possible de retrouver la moindre trace de cet alcaloide ou d'un de ses dévirées

L'organisme possédant à l'état normal cette faculté de détrive la molécule de morphine, l'accoutumance ne saurait étre considérée comme une fenction nouvelle, mais simplement coumne l'exagération d'une propriété existant à l'état rudimentaire chez tout individu.

Maladies vénériennes.

Les injections intra-velneuses de subliné dans le traitement de la sphilis. — M. Claudio Hernandez signale (Déctine official del Colegio de la Proc. de Murcio) qu'il a eu l'occasion de traiter un malade atteint de syphilis grave, se manifestant par de fortes cèphalalgies, la perte de la mémoire et l'insomnie, par les injections intra-veineuses de sublimé d'après la méthode du professeur Baccelli.

Il a injecté tous les deux jours, dans les veines souscutanées des avant-bras, 1 centimètre cube d'une solution de bichlorure de mercure au 4/1000 additionnée d'une petite quantité de chlorure de sodium. Peu à peu il augmenta les doses jusqu'à injecter 10 centimètres cubes à la fois, saus qu'il ait observé aucune conséquence fâcheuse.

L'injection n'est pas doulourense, surtont si on entre bien dans la lumière du vaisseau, et au bout de quelques instants on observe la formation d'un esillet dans la veine, caillet qui remente plus ou moins haut et se transforme en un cordon dur, qui disparait anrès oucleuse heures.

Les effets généraux furent remarquables. Les symptômes cérébraux disparurent au bout de quinze ou vingt jours : les ulcères cutanés et pharyngés se cicatrisèrent rapidement, si bien qu'au bout de deux mois le malade ne s'était jamais si bien porté.

Le malade fut ensuite perdu de vue : il eut au bout de quelque temps une iritis et, après, une péri-encéphalite diffuse qui l'emporta.

Malgré ce résultat fâcheux, l'auteur se montre très partisan des injections de sublimé et il est décidé à les empleyer teutes les fois que l'occasion se présentera,

FORMULAIRE

Posologie de la ferropyrine

La ferropyrine, une combinaison d'antipyrine et de perchlorure de fer, se présente sous forme d'une poudre fine, de couleur rougeâtre, soluble dans cinq fois son volume d'eau. C'est un hémostatique précieux, nullement caustique, qui, en solution à 15 ou 20 p. 100, peut rendre de grands services dans les hémorragies, telles que l'épistaxis, les métvorragies, les hémorragies alvéolaires. Dans les hémorragies stomacales, la ferropyrine peut remplacer avantageusement le perchlorure de fer. On formule;

Ferropyrine Sirop d'écorces d'oranges amères. Eau distillée.	20 130	gramme
Eau distillee	130	_

Prendre la moitié de la fiole.

La ferropyrine réussit encore dans la chlorose avec troubles dyspeptiques :

Ferropyrine	60 centigrammes.
Acide chlorhydrique dilué.	V gouttes.
Pepsine	5 grammes.
Eau distillée	200

Une cuillerée à bouche après chaque repas.

Lavement antithermique pour enfants

Antipyrine	1 gramme.
Bromhydrate de quinine	0gr,40
Eau de tilleul tiède	150 grammes.

A donner en une fois.

L'Administrateur-Gérant: O. DOIN.



Les étudiants étrangers à Paris. — Isolement des contagieux des maisons d'éducation. — Suppression des inspections médicales militaires. — Rétablissement des exercices spèciaux du service de santé. — Les femmesmédecins. — Les maladies vénériennes dans la garnison anglaise de Sainte-Hélène. — Les injections de cocaîne dans le canal rachidien. — L'appendicite et l'helminthiase.

Après avoir subi pendant cinq annéos successives une certaine diminution à la suite des nouveaux réglements universitaires, le nombre des étrangers étudiant la médecine en France a augmenté sensiblement pendant la présente année scolaire. Cot accorissement est d'autant plus significatif que parallèlement le nombre des étudiants français a baissé d'une manière notable. Peut-étre, pour retrouver l'ancien contingent des jeunes gons qui venaient demander à notre pays l'enseignement médical, conviendrait-il de ne plus les envoyer en province coutre leur gré, mais de les laisser étudier à l'aris où ils tiennent essentiellement à demourer. Pour ce motif, beaucoup d'entre eux préférent rester chez eux ou vont se faire immatriculer ailleurs.

In présence de la difficulté où ou se trouve de procéder à Fisolement des malades contagieux provenant des maisons d'éducation, on se présocupe de savoir quel serait le meilleur système à adopter, soit du pavillon d'isolement dans l'établissement scolaire, soit du pavillon payant dans un hôpital pari482 BULLETIN

sien, soit d'un pavillon central commun à tous les lycées et collèges de la capitale, soit d'une « infection house » par l'initiative privée, analogue aux maisons médico-chirurgicales de santé.

Comme conséquence de la suppression par le ministre de la Guerre, des inspections générales, les médecins-inspecteurs de l'armée » finspecteront plus », et un changement d'appellation s'impose. « Cette mesure, dit le D' Noël, que la logique réclamait depuis bien longtemps, a été bien accueillie dans le monde militaire et surtout dans le corps de santé, car elle fait disparaître un des rouages qui ont le plus contribué à fausser l'avancement de nos confrères.... Ce ne seront plus désormais les médecins-inspecteurs, mais les généraux comandant les corps d'armée qui auront la laute main sur le classement des médecins militaires. Ceux-ci, ajoute-til, trouvennt désormais justice égale dans tous les corps d'armée, ceux dont les directeurs sont des principaux cessant d'être des.... d'éshérities! »

Los exercices spéciaux du service de santé en campagne qui avaient été laissés de côté l'année dernière seront repris cette année. Ils auront lieu au camp de Châlous pour les 1º-, 2º, 0º et 2º corps; à Paris pour le gouvernement militaire de Paris et 2º corps; à Lyon, pour le gouvernement militaire de Lyon et pour les 7º-, 14º et 15º corps; à Clermont-Ferrand pour les 8º 13º et 10º et 11º corps; à Lyon, pour le gouvernement militaire de Lyon et pour les 10º corps. Ces exercices que suivent avec intérêt beaucoup de médecins de réserve et de territoriale sont absolument nécessaires pour familiariser le personnel sanitaire avec le matériel de campagne. L'an dernier aux manœuvres d'armées ou ayait essayè de faire procéder à la relève des blessés, mais ep service a été forcément défectueux, étant donnée la rapidité avec laquelle sont conduites les opérations en de pareilles circonstances, c'est-à-dire plors qu'il n'y a pas de balles dans

tes fusils et qu'il y a un programme préalablement établi à remplir.

Le nombre des femmes-médeeins s'est aceru eu Amérique avec une rapidité vertigineuse. En 1889 elles étaient 3,000, à l'heure actuelle elles dépassent le chiffre de 6,000. Elles ont acquis des situations tout aussi séricuses que prospères au double point de vue scientifique et pécuniaire. Elles sont aussi employées au service de l'armée! Le docteur Mr Mac-Gée a été reçu chirurgienne dans l'armée américaine à l'orto-Riico. Mr Anita porte la tunique d'ordonnamee avec les épaulettes de chirurgien de l'armée. Son costume est mi-partie soldat, mi-partie femme avec la juy equi le termine.

En Russio, il y a beaucoup de fommes-médeeins, quelquesunes ont des traitements amuels de 100 roubles (2,500 à 3,000 francs) avec le logement, d'autres en plus grand nombre sont employées par le Zemskwo moyennant la modeste somme de 1,200 francs par an.

Les femmes-médecins sont devenues très nombreuses en Angleterre. On en reneontre aujourd'hui partout dans chaque grande ville d'Angleterre et dans les cinq parties du monde. Le rôle le plus original des doctoresses anglaises est celui de médical missionaries ». Munies d'un begage médical et théologique, leur prosélytisme est à la hauteur de la tiche qui leur incombe, les faits déjá accompils prouvent qu'elles expentaves ardeur leur minombe, des faits déjá accompils prouvent qu'elles expentaves ardeur leur ministère de seience et d'évancélisation.

La dernière statistique indique à Paris 77 femmes-médecins qui sont loin d'être toutes françaises. En principe les places de médecins dans les lycées de filles leur sont réservées. Une d'elles a été récemment nommée médecin des bureaux de bienfaisance. Une femme est médecin de l'Opéra, deux sont médecins des Postes et des Telégraphes. C'est dire que nos confrères du sexe, qu'on n'ose plus appeler faible, ont su rapidement prender vang parmi les officiels.

La statistique de l'armée anglaise pour 1898 signale qu'à

484 RILLETIN

l'ils Sainte-Hélène où sont déportés les Boèrs, sur un effectif de 177 hommes il y ent 178 entrées à l'hôpital (les mêmes malades ayant en plusieurs admissions), dont la moitié euviron (435 pour 1000) pour maladies vénériennes. C'est, semble-t-il, a plus forte proportion de maladies vénériennes qu'on nit jamais enregistrée dans les troupes de l'armée de terre. Cette proportion est d'autant plus extraordinaire qu'elle concerne des troupes entrepéennes et que les troupes coloniales de Sainte-Hélène ne sont pas plus frappées. Pour que les soldats curopéens fassent une telle concurrence à leurs frères d'armes des colonies, il faut que les maladies vénériennes soient réellement devenues un véritable fléau pour les troupes stationnées à Sainte-Hélène.

On s'occupe fort depuis quelque temps, dans le monde chirurgical de la méthode d'anesthésie par les injections de cocaine dans le canal rachidien. Déià l'Académie de médecine a été plusieurs fois saisie de cette question. M. Reclus l'v a portée de nouveau dans un rapport documenté. Il rappelle les premières tentatives qui ont été faites, la question comprend plusieurs étapes : en 1891, Quineke a, le premier l'idée de faire la ponetion lombaire; dans une seconde période Sicard. Corning proposent, cette ponetion faite, d'introduire dans le eanal rachidien des substances médicamentenses. Enfin Rier (de Kiel) en avril 1898 fait ses premiers essais d'injection de coeaine dans le but d'obtenir l'anesthésie et le premier réalise la méthode vers la fin de 1899. La méthode nous vient donc d'outre-Rhin. M. Tuffier l'a vulgarisée en France et il possède aujourd'hui plus de 300 observations qui lui ont permis de bien faire connaître ce mode d'anesthésie et qui l'ont conduit à des conclusions trop favorables aux yeux de M. Reclus. Pour celui-ci l'injection de cocaine dans le canal rachidien n'est pas sûrement innocente. On compte actuellement au moins 6 cas de mort, alors que le nombre des injections faites n'atteint pas 2,000 tandis que le chloroforme ne donne qu'un eas de mort pour 2,300, l'éther 1 cas pour 7,000, M. Tuffier, dans son travail ne fait aucune allusion à ces catastrophes; M. Reclus plus prudent crie : Prenez garde!

A quoi peut bien être due l'appendicite? Résulto-t-elle de la grippe, d'une alimentation trep carnée, ou de l'helminthinse? C'es trois opinions ont en leurs défenseurs, mais c'est surtout M. Metchnikoll qui, avec l'autorité qui s'attacle à son om, estreun aœuser les trichocephales et les assarides du plus grand nombre des appendicites. D'où il suit que le vermitige cet le curateur par excellence et la pureté des œux, la proscription des légumes erus le plus puissant moyen de prophylaxie.

Mais M. Guiart à la Société de biologie ne partage pas du tout l'avis du savant hactéviologiste. Pour lui, les triéhocéplusles et les ascarides ne jouent pas un rôle particulier dans l'étiologie de l'appendicite. Ces parasites ne peuvent agir qu'en inoculant sous la muqueuse les hactéries pathogénes contenues dans les matières fécales et auxquelles l'épithélium oppose normalement une barrière infranclissable. S'ils jouent ce rôle dans l'appendicite, c'est au même titre que dans la fièvre typhoide ou la dysenterie; toutefois ee sont des agents inoculateurs beaucoup plus actifs pour ces dernières affections, la présence de ces nématodes dans l'appendicite constituant une vértable rarché pathologique.

THÉRAPEUTIQUE GÉNÉRALE

Les conditions et le diagnostie du terrain de la tuberculose pulmonaire (1)

Par AIM, Albert Robin et Maurice Biner

Pendant ces dernières années, dans la lutte contre la tuberculose, on ne s'est occupé que du bacille, et toutes les

⁽¹⁾ Académie de médecine, 19 mars 1901.

règles d'hygiène prophylactique qui ont été proposées par l'Académie de médecine et par les Commissions officielles s'adressent à l'agent de la contagion.

Si l'on a réalisé des progrès dans l'étude des moyens de propagation, le traitement de la maladie n'a retiré aucun bénéfice des innombrables travaux que le hacille de Koch a suscités. Aujourd'hui, le sanatorium, pour lequel on professe un enthousiasme sans limites, résume la thérapeutique de la phitsie, et encore son efficacité réclame-t-elle un diagnostic précoce qu'on est bien rarement à même de lui fournir avec certitude.

La comasisance des conditions qui rendent l'organisme humain apte au hacille, cn d'autres termes, la connaissance du terrain serait d'une bien autre portée prophylactique et thérapeutique que la poursuite, souvent décevante, du bacille. Si l'on découvrait un mode de nutrition particulier aux prédisposés à la phtisie, si la recherche de co mode de nutritif particulier permettait de les distinguer, si, en un mot, on pouvait faire le diagnostic précoce du terrain, ce serait bien plus important, au point de vue de la prophylaxie, que de faire le diagnostic précoce du la prissie en évolution. Et puis, ces conditions du terrain, ces actes organiques préliminaires sans lesquelles le hacille ne saurait se développer, seraient l'origine d'indications thérapeutiques vraiment pathogéniques.

Et puisque la lutte contre le bacille n'a rien donné, an point de vue direct du malade, que tous los traitements antiseptiques ont successivement échoué, n'est-si pas permis d'espérer d'avantage de moyens qui, laissant de côté le bacille, ne s'adresseraient plus qu'au terrain? Si l'on sait par où pèche ce terrain, la réponse n'est plus qu'une question de temps.

La connaissance des causes qui rendent l'organisme humain apte à la tuberculose doit donc conduire:

- $1^{\rm o}$ A faire le diagnostic de la prédisposition et à traiter celle-ci, qui sera toujours plus accessible à la thérapeutique que la maladie confirmée ;
- 2° A faire le dignostic précoce de la tuberculose dans les cas où l'on hésite entre celle-ci et une autre maladic;
- 3º A orienter le traitement de la maladie confirmée dans une autre voie que celle où il s'est montré si impuissant. A la poursuite du microbe, il faudrait pouvoir substituer l'amendement du terrain.

Des études poursuivies depuis sept années, et portant sur 302 malades avec plus de 1300 examens du chimisme respiratoire, nous permettent d'aborder résolument l'obstacle insurmonté et d'apporter, à titre d'étude préliminaire, une solution aux deux premières questions posées. Nous n'avons rien voulu publier avant d'avoir fait nous-mêmes la critique de nos recherches, d'avoir disouté toutes les objections qu'elles comportaient, et d'avoir accumulé assez de faits pour n'être pas illusionnés par des coîncidences. En outre, nous nous défendons de toute théorie, de toute idée doctrinale; nous r'apportons que des faits.

П

Parmi les conditions du terrain de la tuberculose, il en est deux que nous sommes en mesure de faire connaître.

La première est la déminéralisation organique que M. Albert Robin a déjà signalée et étudiée dans ses grandes lignes (1) mais dont l'étude a été poursuivie sans relâche avec l'aide de MM. Bournigault et Bouilhon, et qui fera l'Objet de communications ultérieures.

Albert Robin. — Etudes cliniques sur la nutrition dans la phtisie pulmonaire (Archives générales de médecine, mai, juin 1891 et avril 1895).

La seconde est une modification particulière des échanges respiratoires, qui bouleverse toutes les idées courantes, médicales ou populaires.

En effet, tout le monde admet, et l'on a écrit partout qu'un phtisique respirait moins qu'un homme sain et que ses actes respiratoires et son hématose s'abaissaient d'autant plus que, l'étendue des poumons envahis était plus grande, qu'il était un affamé d'oxygène, et l'on s'est acharné à relever chez les notifrainres tous les phénomènes d'oxydation.

Or, il n'en est rien. Les échanges respiratoires sont beaucoup plus élevés chez les phisiques que chez les individus sains, et cela d'une manière assez constante, pour que sur 102 phisiques, nous n'ayons trouvé d'exception à cette règle que dans moins de 8 0/0 des cas, nous avons vu que l'abuissement des échanges respiratoires n'était souvent qu'un nhénomène transitoire.

Tel est le fait fondamental que nous ont montré nos recherches. Ce fait, nous allons d'abord en établir la réalité et en montrer les détails. Puis, nous l'appliquerons au diagnostic, et plus tard, dans des communications successives, nous en tirerons des applications thérapeutiques.

Ш

Le chimisme respiratoire des tuberculeux a un type spécial qui porte sur la capacité respiratoire, les proportions centésimales des gaz échangés dans l'air expiré, la ventilation, les volumes de l'acide carbonique exhalé, de l'oxygène consommé ou fixé par les tissus dans un temps déterminé et par rapport au poids du sujet.

A. — Dans le tableau I, nous donnons le chimisme respiratoire type de la phtisie pulmonaire chronique, en lui op-

posant, comme terme de comparaison, le chimisme respiratoire moyen de l'homme sain.

Tableau I

Le chimisme respiratoire type du phtisique chronique comparé à celui de l'homme sain

ÉLÉMENTS DU CHIMISME	LE CHIMISME typo du chro	LE CHIMISME respiratoire de	
HESPIRATOIRE	Fennies	remmes Hommes	
Pouls par minute		77,9 21,6	65 46
Capacité respiratoiro totalo	c. c, 1.279 »	c. c. 1.821 »	c. e. 3,300 .
Capacité respiratoire par centimètre de taille	8,31	10,9	20 "
Acide carbonique produit pour 160 par- ties d'air expiré	3,33	3,61	3,9
Oxygène consommé	4,60	1,60	1,8
Ventilation par minute	10,107 +	10.277 *	7,090 -
Acido carbonique produit par minute.	352,060	369,120	276 *
Oxygène total consommé	163,443	468,815	340 >
Oxygeno absorbe par les tissus	111,383	99,691	61 =
Ventilation par kilogramme-minute	225,228	192,889	107 -
Acido carbonique produit par kilm	7,767	6,851	4,17
Oxygène total consommé	10,298	8,721	3,13
Oxygène absorbé par les tissus par kilogrminuto	2,523	1,870	0,96
Quotient respiratoire	0,752	0,784	0,812

Sans entrer dans l'examen des détails, il résulte des chiffres de ce tableau que:

. 1° La ventilation pulmonaire croit de 110 0/0 chez la femme et de 80,5 0/0 chez l'homme ;

2º L'acide carbonique, exhalé par minute et par kilogramme Tome cxxxxi. 13º Live. 32 de poids, s'accroît de 86 0/0 chez la femme et de 64 0/0 chez l'homme:

3° L'oxygène total consommé s'accroît de 100,5 0/0 chez la femme et de 70 0/0 ehez l'homme;

4º L'oxygène, qui ne sert pas à faire de l'acide carbonique et qui est cependant absorbé par les tissus, s'accroît de 162,8 0 0 chez la femme et de 94,8 0/0 chez l'homme.

On va nous objecter que eette suractivité eolossale des échanges gazeux est illusoire et qu'elle tient uniquement à ce que le phisique, étant toujours plus ou moins amaigri, on divise la somme des échanges par un poids moindre. Mais l'on n'a qu'à loisser de otée, sur le tableau précédent, les chiffres rapportés au poids, et à regarder cœux qui représentent les volumes des gaz par minute : on verra que les échanges totaux sont beaucoup plus élevés ehez le phtisique que chez l'homme sain.

B. — Cette earactéristique si remarquable des échanges existe aussi dans les formes atquies de la phitisir. Il est curieux de remarquer qu'en moyenne les échanges ne sont pas plus élevés que dans la forme chronique; mais si le résultat ne vario pas, ses éléments constitutifs changent en es ense que la eapacité respiratoire diminuant encore et la proportion centésimale des gaz s'abaissant, l'exagération des échanges dépend surtout d'un accroissement de la ventitation.

C. — Dans la phitisie puthonacire chronique à évolution fibreuse, il y a, généralement, une légère atténuation dans l'excès des échanges gazeux, ainsi qu'on s'en rendra compte en comparant les chiffres du tableau II avec ecux du tableau I.

Tableau II

Le chimisme respiratoire des phtisiques chroniques à écolution fibreuse.

PAR KILOGRAMME-MINUTE	FEM	MES	-	s	
PAR KILOGRAJISHE-RINGTE	fre Période	3º Période	1** Période	2º Période	3ª Période
Acide carbonique produit Oxygène total consommé Oxygène absorbé par les tissus.	er. 5,548 8,675 3,127	cc. 7,233 10,423 3,168	or. 5,980 7,639 1,639	6,827 1,40G	cc. 5,200 6,748 1,348

D. — L'exagération des échanges gazeux existe à toutes les périodes de la phítsie. A mesure qu'elle progresse, la capacité respiratoire diminue ainsi que les proportions centésimales des gaz échangés, mais la suractivité de la ventilation maintient l'excès des échanges.

Tableau III

Le chimisme respiratoire des phiisiques chroniques aux trois périodes de la maladie.

PAR	FEMMES			поммея				
KILOGRAMME-MINUTE	Ire P	èriode	3.	3*	Ire P	briode	. 20	3.
ALLOGRAMME-MERC IS	fre Phase	20 Phase	Pétisde	Périole	1™ Phase	2. Phase	Période	Période
	_	-	-	-		-		-
Acide carbonique pro-	cc.	ec.	.33	ec.	ec.	ec.	ec.	ec.
duit	7,633	8,135	7.811	7,235	6,492	7,488	7,107	6,061
Oxygène total con- sommé	9,835	10,741	10,396	10,423	8,393	9,179	9,043	7,926
Oxygène absorbé par los tissus	2,211	2,669	2,496	3,168	1,901	1,691	1,936	1,862

Le tableau III donne le détail de ces échanges aux trois périodes de la pthisie, la première période comprenant deux phases, l'une indécise quant à l'auscultation, l'autre avec des signes d'auscultation précis.

E. — Jusqu'aux dernières limites de la vie, alors que les deux poumons, infiltrés de tubercules et crensés de cavernes, semblent fonctionnellement à peu près annihilés, cette exagération des échanges gazeux et de l'oxygénation persiste. En voici trois exemples, choisis purmi de nombreux autres (tableau IV).

Tableau IV

Le chimisme respiratoire des phiisiques chroniques
aux périodes ultimes de la vie.

PAR KILOGRAMME-MINUTE	HOXME	ROMME	PEMME
	deux jours	trois jours	sept jours
	avant	avant	avant
	la meri	la mort	la mort
Acide carbonique produit	e, e,	r. c.	c. c.
	6,472	5,902	8,932
	8,169	7,518	11,909
	1,997	2,312	2,997

F. — Cette stabilité dans l'exagération des échanges n'est pas immuable. Quand l'on suit un phisique pendant longtemps on voit son chimisme respiratoire évoluer suivant les progrès ou l'amélioration de sa maladie. Un de nos malades, entre autres, suivi pendant sept années, du début de sa maladie à la période cavitaire, et passé progressivement d'un exceptionnel chimisme ralenti au chimisme exagéré. Par contre, quand la maladie s'améliora, le chimisme s'atténua plus ou moins. La conclusion formelle qui se dégage de cette série de faits, c'est que les échanges respiratoires sont considérablement accrus dans 92 0/0 des eas de phtisie pulmonaire, quelles qu'en soit la période et la forme.

ΙV

Recherchons maintenant comment se comportent les échanges respiratoires dans les localisations non pulmonaires de la tuberculose.

Dans le mal de l'ott, dans la tuberculeuse osseuse, dans la tuberculose du testicule, la pleurésie tuberculeuse, les adènites tuberculeuses, il y a généralement exagération des échanges respiratoires. Mais lorsque les poumons ne sont pas atteints, la capacité respiratoire et la proportion centésimale des gaz demourent à peu près normales.

La méningite et la péritonite tuberculeuses font exception et ne s'accompagnent pas d'exagération dans les échanges respiratoires. Faut-il invoquer l'atteinte directe portée aux centres nerveux dans le premier cas, et un phénomène d'inhibition dans le second ? En tout état de cause, nous savons que les entérites et la diarrhée abaissent toujours ces échanges.

Dans le lupus localisé où le bacille de Koch végète, pour ainsi dire, sur place, sans se généraliser dans l'organisme, les cehanges respiratoires sont peu élevés et même un peu au-dessous de la normale.

V

La constance de l'élévation des échanges respiratoires dans toutes les périodes de la phtisie nous a donné aussitôt l'idée de l'utiliser au point de vue du diagnostic de la maladie. Pour cela, il fallait connaître la manière d'être de cès échanges dans toutes les maladies que l'on pouvait confondre avec la phtisie. Nous avons entrepris et poursuivi cet immense travail qui est à peu près terminé et dont nous avons déjà publié les premières parties qui ont été présentées à l'Académie l'année dernière. Nous reviendrons plus tard sur cette question des échanges respiratoires dans les diverses maladies parce que nous avons pu en tirer des indications diagnostiques et thérapeuthiques fort utiles, et nous n'en donncrons aujourd'hui que les points qui sont applicables au diagnostic différentiel d'avec la phtisé :

1º Fièvre typhoïde. — Ralentissement des échanges audessous de la normale, dans tous leurs modes.

2º Grippe. — Échanges ayant quelque ressemblance avec ceux de la phisie, mais moins exagérés.

3º Pleurésie simple. — La capacité respiratoire est diminuée; la ventilation et les échanges sont moins actifs.

4º Bronchites chez les emphysémateux. — Échanges respiratoires généralement faibles.

5º Chlorose. — Respiration moins trèquente, capacité respiratoire plus élevée, ventilation moins forte, échanges moins actifs.

6º Néphrites. — Échanges peu élevés, souvent au-dessous de la normale.

7º Goitre exophtalmique. — Échanges très élevès, souvent même plus que dans la phtisic, mais conservation de la capacité respiratoire.

8º Entérites chroniques. - Échanges ralentis.

9º Cirrhose atrophique. — Échanges très souvent inférieurs à la normale.

10º Ditàble sucré, — Échanges sensiblement plus élevés qu'à l'état de santé, mais n'offrant pas le même type que dans la phisiée. Cette exagération habituelle des échanges rend compte de l'aptitude des diabétiques à contracter la phisié.

11º Hémophilie. — Échanges respiratoires un peu augmentes, mais peu d'oxygène absorbé par les tissus. Conservation de la capacité respiratoire.

12º Cardiopathies asystoliques. — Échanges respiratoires très ralentis.

13º Myzadème. — Échanges respiratoires modérés, plutôt faibles. Capacité respiratoire faible.

Il résulte de cet exposé sommaire que nous compléterons dans d'ultérieures communications, puisque nous avons étudié plus de quavante états morbides différents, il résulte, disons-nous, que, si un certain nombre de maladies présentent aussi des échanges exagérés en bloc, cependant, dans chacune de ces maladies, le chimisme respiratoire diffère par quelque trait de celui de la phtisie.

Nous tirons done cette de de la concentration de la concentration de la phtisie pulmonaire et d'une autre affection, l'examen du chimisme respiratoire résoudra souvent la difficulté. Et comme les caractères de ce chimisme sont significatifs dès le début de la tuberculose, on aura ainsi en mains le moyen de réaliser le diagnostie précoce.

A ee propos citons quelques exemples :

l° Les échanges respiratoires permettent de distinguer la

pleurésie simple de la pleurésie tuberculeuse, ainsi qu'en témoignent les analyses ci-dessous :

Les échanges sont plus élevés dans la pleurésie tuberculeuse. L'oxygène absorbé par les tissus est plus élevé de 70%,

2º Mme D..., agée de vingt-sept ans, est malade depuis trois mois. Elle a maigri, elle perd ses forces et son appétit; elle tousse; elle a mauvaise mine. L'examen de la poitrine reste négatif; on discute la nature de quelques rales disseminés aux bases, et l'on perçoit vaguement une respiration plus ou moins prolongée au sommet droit. L'étude de ces échanges respiratoires, nous permet d'écarter toute idée de tuberulose commencante:

Par kitogramme-minute.

Acide carbonique produit	4 cc 413
Oxygène total consommé	5 » 191
Oxygène absorbé par les tissus	0 * 778

Nous revoyons la malade un an plus tard, en parfait état de santé.

3º Une jeune fille de dix-neuf ans a perdu sa mère de tuberculose il y a quatre ans. Il y a deux mois, elle se trouve mal en train, maigrit, voit ses forces fléchir, puis elle prend la grippe. Celle-ci affecte d'abord une forme normale, avec 38 à 39° de température et ur état gastrique marqué. Mais, après une huitaine de jours, apparut une broncho-pneumonie localisée à la base droite: la température s'éleva à 39°, 40°; puis le sommet droit se prit avec une respiration soufflante et de nombreux râles fins; enfin, les mêmes râles se généralisaient dans le poumon ganche. En raison des antécédents, de la prolongation de la maladic, de la localisation des accidents, des oscillations thermiques qui, au moment où nous finse l'analyse étaient de 11/28 2° qui, au moment où nous finse l'analyse étaient de 11/28 2°

dans la journée, du mauvais état général, on pensa à la tuberculose aiguë. L'examen des échanges respiratoires écarta ce diagnostic.

Tableau V

Les échanges respiratoires dans la pleurésie simple et dans la pleurésie tuberculeuse.

PAR KILOGRAMME-MINUTE	PLETRÉSIE TUBERCULEUSE Moyennes de trois cas	PLEUTIESIE NON TUBERCULEUSE Moyeunes de trois cas
Acide carbonique produit Oxygène total consomme — absorbé par les tissus.	c. c. 5,453 7,319 1,896	c. c. 4,591 5,696 1,105

Par kilogramme-minute.

Acide carbonique produit	3 cc 800
Oxygène total consommé	4 × 307
Oxygène absorbé par les tissus	0 × 507

La malade guérit parfaitement, et jouit depuis un an d'une bonne santé.

Nous nous en tiendrons à ces exemples choisis parmi nos observations, puisqu'il ne s'agit, aujourd'hui, que d'un exposè préliminaire et que chacun des points traités dans cette note fera l'objet de publications plus étendues où nous donnerons tous les chiffres de nos analyses.

VI

Dès le début de nos recherches, nous avons été frappés de la constance de l'élévation des échanges respiratoires à toutes les périodes de la tuberculose pulmonaire, même aux phases initiales, alors que les signes physiques sont nuls ou à peu près nuls, et nous nous sommes mis en quête d'une explication.

La première hypothèse qui nous vint à l'esprit, o'est que cette exagération des échanges était un acte de défense organique. Mais il était difficile d'admettre que la réaction défensive fut à peu près aussi intense aux derniers jours de la vie, alors que la lutte est pour ainsi dire terminée, qu'aux pèriodes de début de la maladie, alors que les activités organiques se manifestent encore avec plus ou moins d'encreje. El puis, comment expliquer, avec octe hypothèse, que les échanges respiratoires sont relativement moins exagérés dans les formes lentes, dans les formes fibreuses et chez les phitisiques qui guérissent? Dans tous ces cas oi la défense a été plus fructueuse, les actes qui la traduisaient devraient étre bien pluté exagérés qu'amoindris.

La deurième hypothèse que nous fimes, c'est que l'exagération des échanges provenait, non pas d'une réaction de défense, mais de l'attuque bacilitaire elle-même, et qu'elle était proportionnée à son intensité. Cette hypothèse avait pour elle la meindre exagération des échanges chez les phtisiques qui guérissent et dans les formes leutes ou fibreuses. Elle s'appuyait aussi sur l'expérimentation suivante: A quafre cobayes nous avons inoculé une dilution de

A quarre consystemos avons mocute une unmun ac culture pure de bacille de Koch, et à sept autres du pus d'abcès tuberculeux dans le péritoine : tous, sauf un, curent une augmentation considérable des échanges respiratoires.

Quelque probantes que fussent ces expériences, elles ne nous satisfirent pas, parce qu'il restait toujours cette grosse objection d'une permanence relative dans l'accelleration des échanges à toutes les périodes de la maladie. Si nous n'avions abor-le que la neuestion du diagnostie précoce de la tubereulose pulmonaire, cette objection n'aurait pas eu grande valeur, mais nous voulions faire aboutir nos recherches à la thérapeutique, et celle-ci demande impérieusement qu'on lui dise si l'exagération d'échanges est un acte de défense ou un acte d'attaque, parce qu'elle doit le respecter et le favoriser dans le premier cas, et le combattre, dans le second cas.

Tableau VI

Les échanges respiratoires chez les cobages acant et après
l'inoculation tuberculeuse (1).

PAR KILOGRAMME-MINUTE	i cobayes inocules avec la culturo du bacille do Kuch		avec la culture d'abcis tu		berculeux
	Avant	Après	Avant	Après	
Acide carbonique produit Oxygène total consommé — absorbé par les tissus	c. e. 15,211 20,651 5,410	c. c. 25,076 34,290 9,216	c. c. 16,889 21,419 1,560	c. c. 20,675 29,025 9,330	

Nous ne parvenions pas à résoudre la difficulté par les moyens directs que nous avions à notre disposition, quand un fait nouveau nous mit sur la voie d'une troisième hypothèse.

En examinant, en 1896, un garçon de dix-huit ans et demi, fils et frère de tuberculeux, nous avions noté que les

⁽I) Les chiffres de ce tableau représentent ces moyennes. Chez les quatre cobayes de la première série, l'exagération des échanges survint du 5° au 10° jour. Chez les six cobayes de la deuxième série, l'augmentation ne survint qu'à partir du 10° ou du 11° jour.

échanges respiratoires étaient exagérés, comme clez les tuberculeux. Deux ans plus tard, ce jeune homme, dont la sauté n'avait jamais inspiré de réclles inquiétudes et dont les poumons, souvent examinés par différents médecins, paraissaient absolument sains, était emporté en quatre mois par une plutise aiguê. Dans ce cas, il pouvait être question, pour expliquer l'acoroissement des échanges respiratoires, ni de réaction de défense, ni d'action d'attaque. Et nous pensâmes que ce mystérieux phénomène traduisait peut-être l'état du terrain. Toutes les recherches que nous avons effectuées depuis lors n'ont fait que confirmer cette troisème hypothèse.

Ainsi, les descendants de tuberculeux peuvent se diviser en deux classes : ceux dont les échanges sont exagérés et ceux dont les échanges sont profisiposés à la tuberculose. Deux des sujets che clesquels nous avons trouvé le premier type sont devenus tuberculeux plus tard. Les autres ont toute chance d'échapper à la contagion, parce qu'ils n'ont pas le terrain favorable. Un de nos malades, âgé de cinquante ans, fils de deux phitsiques, dont les deux frères et la sœur sont morts phitsiques, présente le chimisme suivant les présente le chimisme suivant par les deux frères et la sœur sont morts phitsiques, présente le chimisme suivant les deux frères et la sœur sont morts phitsiques, présente le chimisme suivant les deux frères et la sœur sont morts phitsiques, présente le chimisme suivant les deux frères et la sœur sont morts phitsiques, présente le chimisme suivant les deux frères et la sœur sont morts phitsiques présente le chimisme suivant les deux frères et la sœur sont morts phitsiques présente le chimisme suivant les deux frères et la sœur sont morts phitsiques présente le chimisme suivant les deux frères et la sœur sont morts phitsiques présente le chimisme suivant les deux frères et la sœur sont morts phitsiques présente le chimisme suivant les deux frères et la sœur sont morts phitsiques présente le chimisme suivant les deux frères et la sœur sont morts phitsiques présente les deux frères et la sœur sont morts phitsiques présente les deux frères et la sœur sont morts phitsiques présente les deux frères et la sœur sont morts phitsiques présente les deux frères et la sœur sont morts phitsiques présente les deux frères et la sœur sont morts phitsiques par les deux frères et la sœur sont morts phitsiques par les deux frères et la sœur sont morts phitsiques par les deux frères et la sœur sont morts phitsiques de la contrain de la co

Acide carbonique produit.... 3 cc 800 Oxygène total consommé..... 4 » 913 Oxygène absorbé par les tissus 1 » 053

Or, il jouit d'une parfaite santé et n'a jamais toussé.

Les descendants d'une même souche tuberculeuse n'ont pas tous des échanges exagérés. Il nous est arrivé de trouver des normaux et des ralentis à côté d'autres à échanges accèlérés et de faire ainsi le départ de ceux sur lesquels devait porter plus particulièrement le traitement préventif, c'estidire le traitement modificateur du terrain. En somme, sur onze héréditaires, nous avons trouvé les échanges exagérés sept fois, et normaux quatre fois.

Dans les états antagonistes de la phitisic, comme l'arthritisme, les échanges respiratoires sont, en moyenne, au-dessous de la normale. Voilà un fait très important qui donne la clef de cet antagonizme que tous les cliniciens, après Pidoux, élèvent à la hauteur d'une loi pathologique. Tabl. VII.

Il en est de même dans la scrofule, ce terrain où ne germent guère que des tuberculoscs locales.

Tableau VII Les échanges respiratoires des arthritiques comparés à la normale

PAR KILOGRAMME-MINUTE	Femmes	Hommes	Normale		
Ackie carbenique prednit	cc.	ce,	ec.		
	3 339	3 435	4 17		
	4 042	4 801	5 13		
	0 703	1 366	6 93		

VII

L'étude de la déminéralisation organique viendra complèter les caseignements de cette première série de recherches qui ouvre déjà des horizons nouveaux au traitement de la tuberculose et nous amène à la conception hippocratique : « La phítsie est une consomption. » C'est la consomption traduite par les échanges respiratoires exagérés et par la déminéralisation qui prépare le terrain à l'invasion bacillaire. Ces conditions de terrains étant connues il ne s'agit plus que de trouver les moyens aptes à les modifier, c'est-à-dire à diminuer le besoin des tissus pour l'Oxygène, à fournir à celur-ci des combustibles autres que les tissus eux-mêmes, et à reconstituer la minéralisation qui est un indispensable élément de vie et d'activité cellarie. Nous avons déjà fait la revision de la plupart des médicaments et des médications proposés contre la tuberculose pulmonaire et nous communiquerons bientôt à l'Académie les résultats de nos observations.

Mais, aujourd'hui, nous laisserons complètement de côté cette partic de la question pour insister uniquement sur l'aide que l'examen des éclanges respiratoires apporte au diagnostic différentiel de la phtisie confirmée, à son diagnostic précoce et enfin au diagnostic du terrain.

La prophylaxie de la tubercenlose pulmonaire n'est pas tout entière dans les mesures privées et publiques prises contre l'agent de la contagion. Si l'on peut reconnaître à l'avance les sujets prédisposés, il ne suffit pas d'écarter le bacille de leur route, il faut les soumettre aussitôt à une hygiène et à une thérapeutique capables de modifier le trouble fonctionnel et nutriif qui est la condition nécessaire du développement du bacille. La tuberculose pulmonaire ne sera réellement évitable que si l'on peut faire le diagnostic de la prédisposition et si l'on rend l'organisme des prédisposés réfractaire au germe de la maladie.

Or, ce diagnostic, nous donnons le moyen de le faire; quant au traitement, il fera l'objet d'une communication ultérieure.

PHARMACOLOGIE

Le Citrophène

Par le Dr Alf. Bolognesi Ancien interne des Höpitaux de Paris.

Le Citrophène n'est pas, à proprement parler, un nouveau remêde, car ce médicament a fait, déjà depuis plusieurs années, son entrée dans l'arsenal thérapeutique et il semble s'y être acquis une excellente place.

Fiddela mes principes et ne voulant ordonner un médicament que lorsquo je suis bien certain de ses effets thérapeutiques et de son innoeuité, j'ai tenu à expérimenter le citrophène sur quelques uns de mes maladés, et ee sont les résultats fournis par cette expérimentation quo je suis heureux de communiquer ici.

Le citrophène est, comme on le sait, un composé de la paraphénéthydine et de l'acide citrique qui est un acide tri-basique : il contient deux groupes de paraphénéthydine de plus que la phénacétine et la lactophénine dont la valeur thérapentique nous est bien connue.

Or, l'action antipyrétique et analgésique des composés de paraphénéthydine étant due aux groupes phénéthydine y contenns, on voir que, déjà théoriquement, le citrophiene doit l'emporter, de par son action antipyrétique et antinèvralgique sur les autres composès de la phénéthydine employés en médicaine.

Le citrophèmese présente sous la forme d'une poudro blanche, à odeur rappelant celle de l'acide citrique et à saveur légerement acidule nullement désagréable. Soluble dans 250 parties d'eau froide et dans 50 parties d'eau bouillante, facilement soluble dans l'eau chargée d'acide carbonique, peu soluble dans l'aleoul.

D'après les différents confrères qui out expérimenté ce médicament, le eltrophèse serait un antipyrétique et un analgésique antinèvralgique de premier ordre. Donné à la dose de plusieurs grammes par jour chez l'adulte et à celle do 50 centigrammes à 1 gramme chez les onfants par 21 heures, il ne produirait aueun effet fácheux sur l'organisme, n'amenant ni expunse de la face, ni bourdonnement d'oreilles, ni nausées, ni brufares de l'estomae, produisast au contraire une action sédative et calmante et procurant en même temps un sommeil tranquille et réparateur.

Nous l'avons administré à des doses variables chez douze de nos malades dont voici rapidement rapportées les observations et cela dans des eas très différents:

Observations

Obs. I. - Le premier malade est un homme de 32 ans, fatigué et surmené, présentant un peu d'asthénie nervouse avec insomnies dues tout particulièrement à des douleurs nocturnes changeant de place et ressemblant aux doulours laneinantes de l'ataxie locomotrice. Chez co malade, à qui nous ordonnons précédemment l'antipyrine, qui, à la doso de 1 à 2 grammes, lui procure des brulûres d'estomae, la phénacétino ameno une sédation de ses crises douloureuses et lui permet de dormir, mais lui occasionne des transpirations très abondantes; nous donnons le premier jour cinquante centigrammes de citrophène lo soir avant de s'endormir, délavé dans un demi vorre d'oau de Saint-Galmier. Le médicament est pris avec très grande facilité, le goût acidulé étant loin d'ètre désagréablo. Au bout d'un quart d'heure environ, les élancements douloureux cessent et le sommeil survient jusqu'au matin, moment où les doulours réapparaissent plus légères et disparaissent une fois le malade lové. La prise de citrophéne lui a permis de dormir sans souffrir et nous n'avons pas remarque, pendant les huit jours durant lesquels le malade a pris sa dose quotidienne, l'apparition des sueurs profuses et désagréables que lui procurait la phénacétine à doso égale. Lo citrophène, à faible dose, a done produit chez ce malade. un effet analgésique et sédatif certain sans amener aueun phénomène fâcheux du côté de l'organisme.

Ons. 2.— Cette observation est celle d'une jeune fille de 18 ans, atteinte d'une violente névralgie faciale due à la cario d'une grosso molaire, ayant amené un énorme gonflement de la région avec trismus. Nous ordonnons à cotto jeuno fille un gargarisme à l'eau oxygénée pour amener l'antisepsie buccale et nous lui prescrivons de prendre, dans la journée, trois cachets de cinquante centigrammes chacun de citrophène. Le traitement est commencé le soir même de notre visite et la malade prend deux doses du médicament. une avant de s'endormir, la seconde au milieu de la nuit. ayant été réveillée par la douleur. En même temps que la névralgie dentairo diminue d'intensité, le trismus est un peu moins prononcé et le deuxième jour nous envoyons la malade chez le dentiste qui lui extrait la dent, causo de tout le mal. Le surlendemain de l'intervention, la malade était guérie complètement ; le citrophène l'avait empêchée de souffrir, lui avait permis de dormir la nuit, de s'alimenter le iour et avait favorisé l'intervention du dentiste en diminuant le trismus. Chez cette malade également, nous avons pu observer l'absence de transpiration après la prise du médicament.

Ons. 3. — Notre troisième cas est celui d'un névropathe àgé de 26 ans, sujet depuis quelque temps a de violentes migraines qui le prennent au moment du révoil, disparaissent après le déjeuner et revienment avec une acuité plus grande le soir, vers cinq houres, pour ne plus disparaître qu'au repos au lit.

Co nerveux présente quelques troubles gastriques qui out fait ponser à Origine stomacale de sa migraine. Depuis un mois, tous les calmants de l'osiomac et les antinévralgiques y ont passé: migrainine, autifebrine, antipyrine, phénacétine, régime, etc., etc. lièn n'y fait et la migraine persiste.

Nous ordonnons au malade, sans changer son régime, une prise de cinquante centigrammes de citrophène dans un verre d'eau, le matin au réveil, une secondo à trois heures l'aprèsmidi, une troisième avant le diner, une quatrième avant le coucher. Le premier jour, la migraine persiste bien qu'atténuée et reparaît avec son exacerbation vespérale. Le deuxième jour elle no se montre plus le matin, mais revient avec son caractre périodique le soir vers cinq leuves. Il en est de même les deux jours suivants, enfin le cinquième jour elle disparait complétement pour ne plus revenir. Chez ce malade, très nerveux et très impressionnable, le citrophène n'améne aucen trouble, ni du côté du système nerveux, ni du côté du tube digestif. Lo goût acidité de la médication semble être très agréable pour son estomac, dontil n'a d'ailleurs jaunais souffert beaucoup. Nous revoyons le malade quelques jours après, pendant lesquels il avait diminué progressivement la médication : sa extréson persiste.

Ons. 4.— L'observation d'est celle d'un homme de 50 ans, sujet depuis quelques années à un lambago qui apparait périodiquement au moment du printemps. Nous lui avons donné des soins l'année dornière à pareille époque et malgré les friccitons avec un liminent chloroformé, des caches de phénacitine et antipyrino à doses assez élevées, le lumbago a persisté pendant 15 jours. Cette fois, nous nous contentons de lui preserire du citrophène à la dose do 2 grammes par jour, répartie en quatre prises espacées dans la journée. Nous faisons appliquer au niveau de la région douloureuse un épais coussinet d'ouate recouvert par un taffetas imperméable et une cointure de flandle. La guérison est survenue dans un laps de temps moitié moins considérable, car huit jours après lo malado revenait ses occupations.

Ons. 5. — Madame Ch..., ágée de 36 ans, présente à la jambe droite de volumineuses varices externes légèrement enflammées et se plaint depuis quelque temps d'une violente névralgio du côté de son nerf sciatique, névralgie amenant une douleur sur le trajet entier de la jambe, sciatique et sciatique ponité externe.

Pondant quelques jours nous la mettons au repos et nous lui faisons appliquer sur ses varices enflammées de l'onguent napolitain helladonné. Le gonflement vineux disparait très vite sous ectic influence ot nous faisons faire à Madame Ch... un bas à varice avec cuissart. Malgré cela, la névralgie sciatique persiste et devient douloureuse la nuit quand le bas est culevé. Nous ordonnous à notre malade trois cachets par jour de chacun cinquante centigrammes de citrophène et au bout de einq jours, la sciatique a disparu.

Oss. 6. — Madame Mon..., agée de 33 ans, femme tres norveuse, nous fait appeler pour un mal de gorge assex violent datant de plusieurs jours, d'après su missive. En effet, nous constatons que cette dame est atteinte d'angine pultacée banale, mais présente dans tout l'arrière-playmyx une rougeur et un vernissé indiquant une violente inflammation de l'arrière-gorge. Cette affection très douloureuse, empéchant toute déglutition, metobstacle au sommeil et cela maigré 2 gramames d'hydrate de chlorat pris le soir en sirop. Nous lui ordonnons un collutoire occainé qui ne produit aucune amélioration.

En présence de cet état, nous faisons prondre à la malade quatre prises par jour de citrophène: une le matin, une la près-midt, une le soir et une la mait, chacune de cinquante centigranmes. Est-ce la fin de l'affection, est-ce le citrophène, est-ce la suggestion, car nous avions promis à la malade que le médicament agirait à comp sûr et, de suite, la malade que les de cux premières prises se sent mieux, avale plus facilement et deux jours après elle peut assister à un réunion de famille sans aucun inconvénient.

Ons. 7.— Les trois observations suivantes sont celles de malades atteints d'influenza 'in Clau...) do ans, santé ordinairement excellente, se présente à notre cabinet, se plaignant d'un grand abattement accompagné d'une courbairre généralisée avec fièrre violente, nausées, rougeur de la face, frissonnements. Sa langue est typique et présente tous les caractères de la langue gripade. Nous lui annoncons le diagnostic de son affection en lui disant de no pas se tourmenter, de se reposer 48 heures, et que tout serait lini. Lo pouls cepondant est à 140, la respiration fréquente et anxieuse, le mal de tête violent. Nous prescrivons trois prises de cinquante centigrammes de citrophiene par jour, et à commencer des le jour même. Après la première prise, le malade se sent déjà mieux, la soif est moins vive, la peau moins bridante, la tête moins douloureuse. La seconde prise, absorbée en même temps qu'une tasse d'infusien de bourrache améne une sudation très abondante et le soulagement apportéest tel que le malade peut s'endormir. Le lendemain matin, la fièrre persiste bien qu'attémée, mais disparait dans la journée grâce aux prises du médicament, pour ne plus reparaître.

Ons. 8.— Jeune fille de 15 ans, prise de violents frissons et de rachialgie très vive. Elle attribue ce phénomène à un refroidissement survenu pendant ses règles encore présentes. A l'examen de la malade nous constatons qu'elle est atteinte de grippe, la maladie régnant actuellement et frappant justement les femmes en majeure partie au moment de leur menstruation, et nous ne remarquons rien d'anormal du côté du ventre. Nous prescrivons à la malade deux prises de chacune trente contigrammes de citrophène par jour et grace à cette médication la malade est rapidement soulagée et guérie en trois jours. La meustruation n'a subi aucune influence fâcheuse du fait du médicament et a suivison cours normal.

Ons. 9. — Joune homme de 20 ans, malade et couclé depuis trois jours. Nous sommes appelé auprès de lui pour un violent mal de tête que des cachets de quinine et d'antipyrine, erdonnés à la consultation, u'ont pa faire disparaitre. Ce malade, employé de magasin, était atteint de grippe, una potite épidémie légère régnant parmi le personnel de sa maison de commerce. Nous lui prescrivons trois doses de maison de commerce. Nous lui prescrivons trois doses de cinquante centigrammes chacune de citrophène à prendre par jour, une le matin, une l'après-midi et une le soir.

Dés la première prise du soir, le malade peut dormir; le leudemain, le mai de tête est moins violent, et le troisième jour, bien qu'en continuant la médication, le jeune homme peut retourner à son magasin.

Obs. 16. — Cette observation est celle d'un joune homme de 24 ans atteint d'une poussée légère de rlumatisme articulaire aign avec fièvre peu intense. Malade depuis quatre jours, ur voulant pas prendro de salicytate de soude qui l'incommode, nous lui prescrivons quatre doses de chacune cinquante centigrammes de citrophène à prendre dans la journée, et nous appliquous sur les jointures un liniment au salicytate de méthyle et au menthol. Le citrophène semble atténuer les doulours des jointures après chaque prise, mais n'améne aucune dimination du gonflement des jointures prises. L'essai est fait pendant quatre jours. Ne voyant pas une amélioration suffisante, nous ordonnous au malade du salicylate de soude en potion à la dose de 3 grammes par jour et le mieux se produt rapidement.

Oss. 11. — Fillette de 10 aus, atteinte de coquelucio légide (16 quintes par 24 heures), traitée par le sirop de grindein bromoformé; les quintes de toux sont longues et laissent après elles un ébrantenent doutoureux de la tête. Nous ordonnons à titre d'essat trois prises de citrophène de chacune vingt contigrammes à prendre dans un peu de tisane dans la journée. Le nombre de quintes n'est pas influencé beancup par le nouveau médicament prescrit, mais le mal de tête est d'abord moins violont, unis disearait arrêe au nitrophène.

Oss. 12. — C'est celle d'un hommo de 47 ans atteint de broncho-pneumonie tuberculeuse fébrile, avec exaspération vespérale assez accusée; Nous prescrivons au moment de la poussée fébrile, à 4 heures de l'aprés-midi, un cachet de 1 gramme de citrophène pendant plusieurs jours. Il se produit un abaissement thermique de 2º grâce à cette médication, mais il survient des transpirations profuses qui gènent beaucoup le malade et l'anéantissent, aussi sommes-nous obligé de cesser le quatrième iour.

Les douze observations que nous venons de passer en revue nous ont permis de nous faire une opinion sur la valeur thérapeutique du citrophène.

Disons de suite que ce médicament est d'une innocuité absolue pour l'organisme, u'amenant aucun phénomème ficheux du côté du tube gastro-intestinal, ne produisant ni nausées, ni vomissements, ni brûtures de l'estomac, n'amenant ni cyanose de la face, ni bourdonnements d'oreilles, ni vertige, ni sensation de vide écrébral comme certains de ces succèdanés. Il est aussi bien supporté par les enfants que par los adultes, et, pris seulement avec un peu d'eau, il est d'un goût acidalé très agréable, rappelant celui de l'acide citrique. Pour cette raison, il est très facile à administere et n'amème aucune répugnance de la part des malades.

C'est un excellent analgésique et il donne des résultats certains et rapides dans les névralgies et les douleurs les plus diverses: névralgie faciale, migraine, névralgie sciatique, lumbago, etc., etc., amenant une sédation rapide de la douleur et permettant, grâce à cette sédation, un sommeil paisible et réparateur.

Il ne présente pas clez tous les malades, comme on l'a dit, l'inconvénient d'amener des sueurs abondantes, comme l'antipyrine et la phénacétine, car plusieurs de nos malades observés n'ont pas été atteints de transpiration après la dosc du médicament.

Cependant, dans les maladies fébriles, la prise de citrophène, en mêmo temps qu'elle produit un abaissement certain de la température, amène avec cet abaissement des transpirations abondantes, particulièrement choz les phissiques. Dans certaines affections fébriles, comme les angines, les attaques de grippe, le citrophène produit, en même temps que l'abaissement de la temperature, une sédation de la douleur, de la courbature, et hâte la guérison de ces affections. Dans la coqueluche, le citrophène a calmé les douleurs de tête provenant de l'ébraulement, produit par les quintes de toux, mais n'a pas eu d'effet certain sur l'élément spasmodique et sur le nombre des quintes.

Il a agi à la manière d'un calmant comme dans le rhumatisme articulaire aigu.

Nous avons administré le citrophène aux dosse prescrites par les confivres qui ont expérimenté le médicament avant nous, par prises de cinquante centigrammes répétées 4,5 et 6 fois par jour et cela sans aucun inconvénient, car nous l'avons expérimenté sur nous-même à la dose de 3 grammes dans une journée sans en être incommodé.

Chez les enfants, on donnera des prises de 20 à 30 centigrammes chacune, suivant l'âge. Nous l'avons administré soit en cachets, soit simplement dans de l'eau acidulée ou non.

REVUE DES TRAVAUX FRANÇAIS ET ÉTRANGERS

Chirurgie générale.

L'excision de la fistule à l'anus sans section du sphinter. (sem. méd.1900). — Dans sa thèse inaugurale, M. le D' P. Bargo fait connaître un procédé de cure opératoire de la fistule à l'anus qu'il a vu employer avec succès par M. le D' Souligoux, chirurgien des hôpitaux de Paris.

Ce procédé consiste à pratiquer l'ablation du trajet fistu-

leux et des tissus indurés qui l'entourent, comme s'il s'agissait d'une tumeur, en se guidant sur une sonde cannelée. On doit éviter de sectionner le sphincter ot d'inciser le rectum et on excise simplement le pourtour du trejet au niveau de la muqueuse rectale; on ferme l'orifice interne de la fistule par quelques points de suture au catgut, puis on accole le rectum à la paroi externe de la fosse ischio-rectale, rapproclanta tiaris les bords de la plaie au moyen d'un plan de sutures profondes de façon à ne laisser aubsister aucun espace vide où du sang pourrait s'accumuler.

L'opération terminée, on applique, comme pansement, de la gaze stérilisée ou iodoformée recouverte d'une couche de coton lydrophile et maintenu parquelques tours de bandes, mais on n'introduit dans l'anus aucun tampon, mèche ou drain, ces corps d'arangers pouvant provoquer des contractions du sphincter défavorables à la réusion immédiate de la vlaic.

On obtient souvent de la sorte la guérison rapide des fistules les plus étendues et, en outre, on met le patient à l'abri de toute incontinence du rectum. Même dans les cas où la réunion immédiate ne se produit pas, le procédé de M. Souligoux n'en conscrere pas moins son utilité: le trajef fistuleux proprement dit et les tissus seléreux environnants — qui sont un obstacle à la guérison — ayant été excisés, la plaie se cicatrise bientôt par bourgeonnement, parce qu'elle est large et que, par suite, aucun produit septique ne peut y séjourner.

L'Administraleur-Gérant: O. DOIN.

Imp. PAUL DUPONT, 4, ruo da Bouloi, - Paris, 1*r Arri,- 64,4,1901 (CL.)



Infirmiers-dentistes militaires. — L'aliénation mentale à Toulouse. — A propos de l'Yerba Maté. — Congrès de la tuberculose. — Si la peste se déclarait à Londres. — Priseurs de cocaine. — Les fumées de Paris. — La peste en 1900. — Les injections intra-rachidiennes de cocaine. — Les intoxications par l'oxyde de carbone dans la marine.

Il a dè décidé par le ministre do la guerre quo los jeunes gens pourrus du diplômo de dentiste pourraient être incorporés dans les sections d'infirmiers militaires. Cette mesure donne en partie satisfaction au Conseil de direction de PEcole dentaire de Paris et à l'Association générale des dentistes de France demandant depuis longtomps que les étudiants en chirargie dentaire appelés sous les drapeaux fussent incorporés dans le corps de santé. 17 dento-logie donne le portrait du premier chirurgien-dentiste militaire allemand, spécialement désigné pour accompagner les troupes du corps expéditionnaire de Chine.

. * .

Toulouse est, somble-til, une villo privilégiée au point de vue de l'aliénation mentale. On n'y trouve quo 22 déments pour 150,000 habitants, la moyenne étant, en France, de 146 fous pour 100,000. Co résultat est attribué à une moiodre alcoolisation. Toulouse, en effet, occupe l'avant-dernier rang pour la consommation d'alcool dans les 18 villes de France ayant

plus de 60.000 habitants. En revanche, elle occupe un des premiers pour la consommation du vin. Il semblerait done que même avec une forte consommation de vin, une plus faible consommation d'alcool a pour corollaire un abaissement du taux des cas de folies.



L'herbe américaine moté tend à se substituer au the, an dive-d'olec ». Cest un agent d'épargne de premier ordre, un fébrifuge peut-être, un tonique cardiaque. Il contient d'après M. Parodi, 30 grammes d'acide cafe-tamique, 7 grames de matein opur 1.000 grammes, de la résine, de la graisse, de l'essence; é'est une plante de la famille des llicinices (Idea prayaugagness). Mais, comme le café, le the, Phyerba maté doit être prohibée aux rénaux : il expose, d'après M. Didot (de Martigny), à la lithiase oxalique.



Le prochain congrès général de la tuberculose, dont l'objet est l'organisation de la lutte internationale contre la pus universelle et la plus meurtrière des maladies, so tiendra à Londres, du 22 au 26 juillet prochain, sous la présidence du roi d'Angleterre. Le Congrès sera divisé en quatre sections : section d'Etat et de municipalité; section médicale, comprenant la climatologie et les sanatoria; section pathologique, comprenant la bactériologie; section vétérinaire, tuberculose des animaux.



Les Anglais prennent leurs précautions pour ne pas se laisser surprendre par le « nouvel incident regrettable » de la guerre sud-africaine. Comme ils s'attendent à l'apparition de BULLETIN 513

la peste à Londres, le conseil numicipal de la ville a voié les conclusions d'un important rapport du comité d'hygione publique réclamant un crédit de 50.000 livros sterling pour l'isolement des suspects ou des personnes soupcounces de contact avec un pestifére. Le rapport demande que les mesures soient prises en prévision de 100 cas de la première catégorie et de 1.000 de la seconde.

Dans ce but, Londres a été divisé en quatre sections et des aménagements distincts doivent être préparés dans chaque section pour chacune des deux catégories. Des locaux temporaires sont déjà aménagés pour 212 personnes et l'on demande que tout soit prêt pour pouvoir en recevoir en quelques heures 200 autres. En outre, des baraquements seront édifiés, sur un terrain appartenant au conseil, pour 600 personnes. Ces baraquements, qui peuvent étre prêts en quelques semaines, ne seront toutefois commencés qu'au cas où la peste serait constatée à Londres.

. .

Il parait que la cocainomanie sévit à l'état endémique dans certaines villes d'Amérique. Elle a pris de telles proportions qu'il n'est pas de nuit où l'on ne ramasso par les rues de trois à quatre cents personnes à l'état d'ivresse cocalinique. Les noirs et les blancs prisent avec fureur la cocaine, si bien que le conseil municipal a dù prendre un arrêté interdisant la vente de l'alcaloide sans ordonnance du médecin.

. * .

D'après M. A. Gautier, Paris brâle par surface 1 mètre carrè et par an, 37 kilogrammes de combustible minéral. Il se fuit par mètre superficiel une production annuelle de 2 grammes environ de suie solide; ce sont ces fumées qui produisent dans l'atmosphère de Paris ce trouble qui fait reconnaître de loin au voyageur la place de la capitale. La 516 BULLETIN

pollution de l'atmesphère et des menuments n'est pas le seul ni lo principal incenvénient des fumées. Les particules solides de celles-ci ent la prepriété singulière, reconnue par Tyndall, Gérardin, de condenser la vapeur d'eau autour d'elles et de former ainsi des brouillatvab plus ou moins légers qui arrêtent les radiations, précisément les plus refrangibles, c'est-à-dire celles qui sont le plus efficaces au point de vue antiseptique. Priver partiellement Paris de sa lumière, c'est done le priver de son plus puissant moyen d'assainissement et c'est là l'in-convénient le plus grave des funées.

Aussi M. Gautier demande-t-il la mise au coneours des meilleurs appareils destinés à faire disparaitre, nen seulcment la partie visible des fumées, mais autant que possible le urs produits gazeux les plus dangereux, l'acide sulfureux et l'oxyde de carbeme en partieulier, appareils applieables aux foyers industriels auss bien qu'aux fovers domestimes.

. * .

La peste fait toujours des progrés au Cap. Les blanes et les hemmes de couleur sont atteints. On vaccine à la hâte les habitants qui commencent à étre inquiets de la propagation du fléau. Le sérum de Yersin paraît être bien réellement un moyen prophylactique et thérapeutique de premier ordre. Cest M. Proust qui vient de l'affirmer à nouveau dans un rapport très documenté sur la Peste en 1900. Cemme preuve, il donne la petite épidemie qui a sevi sur le paqueto le Réyer sur huit personnes atteintes, dont deux médecins, il n'y cut qu'un décès, les sept autres ayant été guéries par la sérothèrapie. Gréce à ce moyen, l'épidemie s'éteiguit sur placo.

Parmi les eauses de contagion de la peste à Glascow, en particulier, M. Preust relève une coutume qui malgré toutes les défenses a èté suivie, celle des veillées funcères : il est de tradition, en effet, lersqu'un malade meurt, que les parents et les amis passent les nuits auprès de lui. Sur 29 cas de peste relevés à Glascow, 12 ont en pour eause ces veillées. BULLETIN 517

Pour ce qui est de notre pays, M. Proust estimo que si la pesto y pénétrait, elle y trouverait en raison des progrés de l'aygiene générale et de notre état de bien-être, un terrain très différent de celui qu'ello a rencontré à d'autres époques et qui subsisto encoro dans certaines contrées orientales et même dans quelques régions du sud do l'Europe. Et pour rassurer les plus timorés, il ajoute, que prêts à tout évênement nous possèdons une quantité plus que suffisante de sérum.

. .

Décidément les injections intrarachidiennes de cocaine recommandées par M. Tuffier ne sont pas favorablement accueillics. M. Reclus les trouve dangercuses. Quant à M. Laborde, au nom de la physiologic, il les ropousso absolument. Il fait remarquer, tout d'abord, que le fait de ponctionner la cavité arachnoïdicano n'est pas uno pratique banale quand on sait quello est l'importance et la délicatesse du liquido cérébre-rachidion, Il insiste ensuito sur la diffusion rapide do la cocainc, surtout lorsquo lo malade est couché, qui doit faire redouter son action sur le bulbe, susceptible de provoquer des accidentsgraves. Les chirurgiens doivent, suivant M. Laborde, rester fidèles aux injections sous-cutanées de cocaine, méthode très physiologique qui n'a jamais donné lo moindro accident. On pourrait mêmo cambover l'inicction intra-musculaire, si couramment employée pour l'injection d'autres substances médicamentenses.

. .

Les tractions rythmècs de la langue ont permis à M. Gibrat de ramener à la vie un homme intoxiqué par l'exydo de carbone. Mais là, n'est pas lo point capital de la communication faite à l'Académie de médecine, il réside dans la cause même de l'emnoisonnement. Il faut savoir que les chauffeurs de la

marine ent l'habitude, lorsque le bateau est arrêté et les foux éteints, de mettre à demeure dans la chaudière quelques boites de chaux vive et d'y faire pénétrer les produits de la combustion d'un réchaud de bois allumé dans la chaufferie. Grâce an dègagement qui se produit d'acide carbonique et d'oxyde de earbone on éviterait l'oxydation des parois des claudières. Au moment de l'armement du bateau il est prescrit d'aérer la chaudière pendant plusieurs heures avant d'y faire pénétrer un homme pour retirer les boites de chaux. C'est en pratiquant cette dernière opération que deux hommes ont étéritoxiqués: l'un a survéou, grâce aux tractions rythmées, le deuxième n'a put être rappelé à la vie. M. Riche fait losserver que la pratique ci-dessus devrait être absolument interdite à cause de ses graves dancers.

THÉRAPEUTIQUE MÉDICALE

Traitement de la goutte et du rhumatisme goutteux par le sidonal ou quinate de piperazine.

Par M. G. BARDET

Dernièrement, à l'occasion d'une réclamation de priorité que je faisais à la Société de thérapeutique sur la vulgarisation des propriétés de l'hexaméthylène-tétramène ou formine, M. Albert Robin rappelait les services rendus aujourd'hui à la thérapeutique par un certain nombre de médicaments de synthèse et, entre autres, par le sidonal ou quinate de piperazine.

Ce médicament, en effet, est très intéressant pour la thérapentique générale, car il représente, comme le disait M. Albert Robin, une trouvaille cherchée par la théorie: c'est une association chimique réalisée dans le but de faire une association de propriétés thérapeutiques; en conséquence, ce n'est point par simple empirisme qu'on est arrivé à son emploi et il provient au contraire d'une intervention calculée, pratiquée au laboratoire dans un but bien déterminé. Or, la médecine depuis quelque temps est particulièrement heureuse dans cette voie, qui est la seule rationnelle et qui lui permet de prendre définitivement rang parmi les sciences expérimentales. Il est possible que les premiers essais se soient montrés un peu rudimentaires. que l'on ait, comme on dit en industrie, beaucoup de ratés. mais il n'en est pas moins vrai que ce chemin est le bon et qu'il nous faut nous engager délibérément dans cette direction, si nous voulons obtenir des résultats sérieux.

Il est assez curieux que l'acide quinique ait mis si longtemps à entrer dans la thérapeutique, car son action est connue depuis longtemps; il est un produit commun. c'est un sous-produit banal de la fabrication de la quinine, et l'airelle ou myrtille en pourrait fournir de notables quantités. C'est ie crois Lautemann (Ann. de Ch. et Phy., 1863, t. LXVII, p. 82) qui le premier a étudié l'action de l'acide quinique, et il annonçait sa transformation dans l'organisme en acide hippurique. Rabuteau, qui on le sait a apporté sa contribution à l'étude pharmacodynamique de presque tous les composés connus à son époque, a combattu cette opinion et pour lui (C.R. Ac. d. sc. 22 juillet 1872) l'acide quinique jouerait simplement le rôle de tous les acides organiques. en brûlant et en se transformant en bicarbonate alcalin : il se base, pour soutenir cette opinion, sur le fait que, si l'on introduit par injection intraveineuse dans la circulation d'un chien une quantité notable d'acide quinique combiné à la soude, on voit les urines devenir alcalines, ce qui ne se produirait pas, au contraire, si le produit fournissait de l'acide hippurique. Je crois qu'il s'agit là simplement d'une question de dose. Il est fort possible en effet qu'ingéré en quantités notables l'acide quinique, ou plutôt ses sels alcalins, exerce une action purgative et sc transforme en bicarbonate, parce qu'il ne rencontre pas assez de glychocolle dans l'économie pour fournir une quantité d'acide hippurique proportionnelle à la quantité de sel quinique ingéré, mais les expériences récentes d'Adoue, citées dans un excellent travail de Brissemoret (Adoue, Encue, Frémy : Chimie des liquides et tissus de l'organ. II° par. t. V et VI, p. 886. - Brissemoret, Sur un nouveau et ancien procédé de traitement de la diatèse urique, in Journ. d. Prat., 23 sept. 1899), ces expériences, dis-je, confirment la théorie d'Ure et Keller qui affirment que l'acide hippurique se forme dans l'économie au moven d'acide benzoïque ingéré et de glychocolle provenant de la transformation de l'acide urique. Or, l'acide quinique fournit dans l'organisme de la quinone, puis de l'acide benzoïque et d'après Weiss (Berliner Klinisc. Wochensch., nº 14, 1899), la production d'acide benzoïque à l'état naissant au contact de l'acide urique est éminemment favorable à la fabrication de quantités notables d'acide hippurique. Il résulte donc de tous ces faits très étudiés que l'acide quinique représente un médicament intéressant.

Quant à la piperazine, c'est une base qui, tout le monde le sait, jouit de la propriété de former des urates particulièrement solubles et qui, ingérée, est capable d'entrainer l'acide urique. J'ai moi-même (Banostr, Action thérapeutique de la Piperazine, Soc. de thér., 28 janv. 1911) apporté joi une communication sur ce sujet, et montriè que ce inédicament pouvait rendre des services contre la goutte. Donc, la combinaison de l'acide quinique avec un médicament uratolytique est parfaitement rationnelle: l'acide quinique peut détruire une certaine quantité de l'acide urique formé dans l'organisme et la base peut entraîner, sous forme d'urates plus solubles, la quantité d'acide urique qui n'a pas été décomposée.

L'an dernier, une intéressante discussion a été provoquée à la Société de médecine interne de Berlin, sur les propriétés antigoutteuses du sidonal, ou quinate de piperazine par le docteur Blumenthal, discussion à laquelle ont pris part le professeur von Leyden et le professeur Ewald, nos collègues, comme correspondants à la Société de thérapeutique. Les faits apportés par les argumentateurs m'ont intéressé et je me suis promis d'apporter mon concours à une étude médicamenteuse certainement très attachante, J'aurais voulu pouvoir fournir un grand nombre d'observations. documentées par des analyses, mais malheureusement il est rarc de trouver des goutteux dont il soit pratique de faire consciencieusement l'analyse, et d'autre part les quelques mots dits l'autre jour par M. Albert Robin sur ce sujet m'incitent à publier les trois faits que je possède : plus tard je compte apporter des observations relatives à l'emploi isolé de l'acide quinique ou à son association avec d'autres corps.

J'ai pu grouper à la fin de l'année dernière trois maindes, une femme de 42 ans qui souffrait d'atteintes de rlumatisme goutteux (hérédité goutteuse manifeste), un homme de 50 ans en pleine crise de goutte avec fluxions articulaires et un homme de 45 ans qui autrefois a éprouvé deux ou trois poussées goutteuses manifestes et qui maintenant, grâce à un régime sévère, souffre seulement de crises de douleurs rhumatismales d'origine goutteuse fort nette.

J'ai administré le sidonal en cachets, à la dose de 3 à 5 grammes par jour au cours des mois de janvier et février;

les manifestations douloureuses ont cédé en dix jours chez la femme, en trois semaines chez le goutteux (qui était fortement atteint et en pleine période de poussées articulaires successives) et en quatorze jours chez le rhunatisant. Malgré la diminution ou la cessation des phénomènes douloureux j'oi fait continuer l'emploi du médicament pendant plus d'un mois, pour continuer l'action générale sur les humeurs et voici les résultats que m'ont foumi les quatre analyses que j'ai pratiquées successivement à quinze jours d'intervalle.

Tout d'abord, voici l'analyse résumée qui a été faite avant l'administration du médicament (1) :

Les numéros d'analyse se rapportent : n° 1, femme atteinte de rhumatisme goutteux; n° 2, homme, goutte franche; n° 3, homme, rhumatisme goutteux.

	N° 1	N* 2	Nº 3	
Volume	1450 cc.	1375 ec.	1200 cc.	
	Jaune rouge.	Orange fonce.	Orange.	
	Assez abondant.	Très abondant.	Abondant.	
	3,9 0/0.	4,8 0/0	4,2 0/0	
	0 gr., 96	1 gr., 10	1 gr., 04	

Le tableau suivant résume les analyses pratiquées, la première trois jours après le commencement de la médica-

⁽i) Le dosage de l'acide urique a dé pratiqué par la méthode LINCRAFT-DEROIDE, c'est-à-dire par la précupitation de l'acide urique au moyon de nitrate d'argent ammoniacal, l'urate d'argent obtenu dant redissous par l'acide azoùque et dosé par le sulfocyanate de notassium, en présence d'alun de fer.

⁽²⁾ Le dosage de l'acidité a été fait par le procédé de M. Joulie, le chiffre indique done le rapport en 0/0 de l'acidité (au litre) à l'excès de densité de l'urine sur l'eau à 0°, la normale (forte à mon avis) étaut indiquée par M. Joulie comme = 1,5 0/0.

tion et les deux autres après un intervalle de quinze jours chacune :

	N- 1		N° 2			N° 3			
	Λ	В	С	A	В	С	Α	В	С
Volume Couleur Dépôt Acidité Acide urique	norm. 2 prise 3,7 0/0	norm. nul 2,80/0	nel 3,1 0/8	r. or. ab. 1,96/)	j. fast faib. 4,5 0/0	faib. 1,60/0	j. fotré fails. 1,3 (9)	faib. 1,3 0,0	nul 4,4 0/0

Il est à remarquer que le n°2 est un malade indocile qui n'avait pas le courage de s'astreindre à un régime sérieux; o'est ainsi que, trouvant son état local amélioró un peu après doux prises journalières de mèdicament, in n'avait pu résister à l'aspect d'un plat de gibier, quassi la quantité d'acide urique n'a-t-elle guère varié entre les deux analyses A et B.

Ces analyses, qui d'ailleurs sont le seul point vraiment original de mon travail, sont intéressantes, car elles montrent bien que, suivant la théorie, le titre de l'acide urique a réellement diminué. Ce résultat est certainement dù à l'acide quinique, car tout au contraire, dans l'emploi des uratolytiques, administrés seuls, il arrive d'abord une période d'angmentation de l'acide urique excrété, ce qui est fort logique, puisque le médicament a pour effet de dissoudre et, par conséquent, d'entraîner de fortes quantités du toxique retenu dans le sang. Ici au contraire, sauf le n° 2 et encore pour une raison extérieure, comme je viens de le dire, tous les malades présentent dès le début une diminution très nette de l'acide urique excrété.

SOCIÉTÉ DE THÉRAPEUTIQUE

SÉANCE DU 27 MARS 1901

Présidence de M. Albert Robin

Communications.

Cacodylates de soude, de magnésie, de guaïacol, de fer et de quinine

> Par M. le D' BURLUREAUX, Professeur agrégé libre du Val-de-Grâce.

La Société de thérapeutique est une des rares grandes sociétés savantes qui n'ait pas encore mis à l'étude cet intéressant suiet.

En ma qualité d'ouvrier de la première heure, je crois bien laire de provoquer une discussion générale sur cette médication, qui a déjà subi l'èpreuve du temps, et de fournir à nos collègues, médecins et chimistes, l'occasion d'exposer leurs recherches et leurs observations.

Pour légitimer le titre d'ouvrier de la première heure, je rappellerai que, dès le mois d'octobre 1898, j'avais eu la bonne fortune d'être associé, par M. le professour Gautier, à une série de recherches sur la médication excodylique, et que, le juin 1899, M. Gautier résumait dans sa communication à l'Académie de médecine, les quatorze observations que je lui avais remises à ce moment. Avant cette date, il avait lui-même employê et étudié le cacodylate de soude et avait signalé l'acide cacodylique à M. Danlos, qui fit sur ce médicament une première communication en juin 1890, à la Société de dermatologie. Il l'avait aussi indiqué à M. Roustan, de Cannes, qui lui adresse once observations, et, enfin, à M. le professeur Renaut, de Lyon, qui, à l'Académie de médecine (30 mai 1890), à propos d'une étude sur la médication arsénicale, signala comme un heureux complément de la médication arsénicale.

cale ordinaire », l'acide cacodylique, employé par lui chez un malade auquel M. Gautier l'avait intéressé.

Ces détails précis démontrent que M. le professeur Gautier a été l'initiateur de la médication ; c'est à lui que revient tout l'honneur de la découverte, qui a une importance énorme, bien plus grande qu'on ne serait porté à le croire par les résultats signalés jusqu'à ce jour. Immédiatement après la retentissante communication de M. le professeur Gautier, si riche de faits et si pleine de promesses, on se mit de tous côtés au travail, dans les petits comme dans les grands centres ; de nombreuses communications furent faites aux Sociétés, aux Congrès. Les chimistes rivalisèrent de zèle pour fournir aux praticiens des produits irréprochables et faciles à manier. Bref, jamais médication n'eut une aussi rapide fortune, et ne provoqua en un laps de temps aussi court, d'aussi nombreuses communications. La richesse de documents est telle que je m'abstiens, à dessein, de faire l'historique de la question, me bornant à dire ce que j'ai fait depuis trois ans, ce que j'ai observé, et à proposer une hypothèse destinée à relier entre eux les résultats, en apparence contradictoires, que je vais rapidement mentionner et qui ont été obtenus avec divers cacodylates.

CACODVLATE DE SOUDE

Jo dois dire, tout d'abord, que je n'ai jamais employé que la voie lypodermique, et de parti pris, suivant, en cela, les indications de M. le professeur Gautier qui a démontré que la médication par voie buccale ou rectale, n'avait rien de commun avec la médication qu'il préconisait. Cest compromettre le médicament que de le donner autrement que par voie sous-cutanée, et c'est avec déplaisir que nous voyons surgir, tous les jours, quelque spécialité nouvelle destinée à l'absorption par voie interne. Nul doute que ces préparations ne soient irréprochables au point de vue chimique; qu'on ne fasse avec du cacodylate de soude parfaitement cristallisé des pilules exactement desées, des dissolutions parfaites et bien titrées

pour lavements, etc. Tous ces progrès apparents arriveraient. à ruiner la médication cacodylique, parce que tous les cacodylates en contact avec la peau ou les muqueuses se décomposent en dounant naissance à de l'oxyde de cacodyle qui n'a aguenc des propriétés bienfaisantes des cacodylates, qui même est toxique, et est péniblement éliminé par les reins, la peau, l'Inlaine, etc.

Pour s'en rendre compte, qu'on veuille bien mettre sur la langue une goutte de solution même très étendue de cacodylate de soude ou de magnésie, chimiquement pur, ou de, cacodylate de fer ou de cacodylate de quinine et l'on sera vite édifié, par le gout détestable et persistant qui envahit la bouche. Or, par l'introduction par voie dermique, soit sous-cutanée, soit, mieux encore, intramusculaire, c'est tout à fait exceptionnellement que le médicament provoque cette odeur de l'haleine. Nous l'avons notée seulement chez une malade que nous avions déjà signalée dans la note remise, en 1899, à M. le professeur Gautier ; un centigramme d'acide cacodylique injecté sous la peau provoquait chez elle « un fort gout ailliaeé dans la bouche, persistant des heures entières ». Chez une autre, c'est la penu de la figure et le cuir chevelu qui preunent cette odeur particulière. Lorsqu'elle fait sa toilette, dit-elle, et qu'elle frotte la face et le cou, avec une serviette mouillée, elle percoit cette odeur, mais seulement quand la dose de cacodylate de soude dépasse cinq centigrammes; dans l'immense majorité des cas, l'introduction par voie hypodermique ne donne lieu à augun phénomène apparent; elle ne provoque pas de deuleur, même avec une solution titrée à 20 0/0, pas le moindre accident, même si le médicament pénètre dans les veines, ce qui a bien dù arriver quelquefois. J'emploie, indistinctement. les solutions des diverses pharmacies, qui toutes peuvent actuellement fournir un set chimiquement pur et cristallisé. Je commence toujours par une demi-seringue de. Prayaz de solution à 5 0/0 afin de tâter la tolérance, puis-

ie denne, des la deuxième injection, la seringue entière. sans dépasser cette dose, sauf on cas exceptionnels. C'est ainsi qu'à une malade, j'ai donné 2 grammes de la solution à 5 0/0, pendant deux mois de suite, et à un autre malade, treis grammes pendant quinze jours, sans lo moindre aecident. Mais les fortes doses no me paraissent que rarement indiquées ou. pour mieux dire je n'on connais pas oncore les indications. et je fais soit une injection quotidienne pendant quinze jours, avec huitjours de repos, soit treis injections par semaine pendant deux et trois mois. J'ai eu une fois l'occasion de prolonger le traitement pendant six mois, à raison de deux injections par semaine. sans provoquer la moindre menace d'arsénieisme, et le citerai teut à l'heure, un malade qui, depuis quinze mois et demi, prend, en injection, du caeodylate de soudo, de la facon suivante : Un jour, einq centigrammes, le londemain, repos ; le iour suivant, dix centigrammes, le leudemain, repos: le 4º jeur, 5 centigrammes, etc. C'est le fils du malade, docteur en médecine, qui a adopté eo mede d'administration chez son père, encore on traitement à l'heure présente. Ce fait prouve qu'en peut continuer longtemps l'omploi du médicament, sans danger. Mais, dans quels cas doit-en le faire? Je ne suis pas encere assez documenté peur le dire. Quelle est la dose optima? Quelle est la dose maniable? Quelle est la dose toxique? Car, enfin, il doit bien arriver un moment eù l'écenomie est saturée d'arsenic...?

Autant de questions auxquelles je suis abselument incapable de répondre. Tout ee que je sais, c'est qu'il y a très rarement intolérance, peur les faibles doses. Jo n'ai vu que deux fois des malades accuser des sensations anormales, bizarres, indescriptibles, avec une seringue et demie de la solution à 50/0. Et c'étaient de ces malades peur lesquels tout est poison... véritables « noil me tangere », que 10 centigrammes d'antipyrine ou de quinine mettent dans des états pitoyables, bien pires que les malaises contre lesquels était dirige l'agent hiérapentique. Ce que je sis encere, C'est que l'ai obtent

des résultats essentiellement variables, sur les 72 malades que j'ai traités soit seul, soit avec l'aide de plusieurs cellaborateurs, résultats excellents — parfois absolument remarquables nuls dans maintes autres eireonstances, mais jamais négatifs.

Je vais, à titre d'exemple, citer quelques observations résumées, que je prends à dessein sans erdre nosologique, en les classant d'après l'importance des services rendus par la médication

1º Un jeunc homme atteint de graves malaises sans nom, que j'attribuais à une fièvre palustre larvée, contractée en Cerse, s'était bien trouvé, une première fois, d'avoir reçu 10 grammes de cacedylate en soixante-dix-huit jours. Or, le traitement a tôté ontimé cinq mois avec interruptiens, et le résultat a été excellent : disparition de tout malaise; retour des forces et de l'énergie mentale; augmentation de poids et la guérison se maintient depuis un au.

2º Une jeune fille, Mie'v ..., traitée par injections queitdiennes, du 7 ectobre au 5 décembre 1809, à vu reparaître ses régles suspendues depuis quinze mois, et se félicite oncore, actuel-lement, de l'amélieration obtenue dans ses forces, ses aptitudes digestives. Or, il est à noter que je soignais cette malade depuis longtemps et que je n'ai rien modifié à sen règime a son hygiène gofnérale, pendant la durée du traijement cace-dylique. C'est denc à ce dernier qu'il faut, suivant toute apparence, rapperter l'amélioration très rapide obtenue, et la persistance de cette guérisen démontre que le bénéfice aequis est durable, et que le cacodylate de seude no donne pas seu-lement une force factiem mementanée.

3° Cher M. M..., que je seignais également depuis longtemps pour dyspnée texique, le régime n'avait eu que des offiets médiocres, et la santé revint peu après le début du traitement caeodylique; elle se maintient depuis huit mois qu'il a pris fin.

4° Mme G... attribue aux injections qu'elle reçoit, en moyenue, deux fois par semaine, depuis plus d'un an, un effet recensti-

tuant extraordinaire, et elle ne manque pas de venir nous demander une piqure elaque fois que ses occupations, très fatigantes, lui en laissent le loisir. Comme son régime n'a été en rien modifié par nous, e'est bien aux injections qu'il faut attribuer ce bien-étre immédiatement consécutif à l'injection, que la malade affirme de la façon la plus eatégorique.

5º Même effet dynamogénique elez M™ C... dont je n'ai en rien modifié le régime, ni le genre de vie et qui m'affirmait se sentir remontée par les injections quotidiennes faites par série de 15, pendant plus de six mois.

6° Mile G..., opérée pour une tumeur du sein, trois aus auparavant, et très préoceupée d'une récidive de la tumeur in situ, a été traitée par le eacodylate à dosse massives, avec le secret espoir d'enrayer le processus. J'ai obtenu après six mois de traitement une superbe repousse des cheveux, une augmentation de 8 kilogs, une grande amélioration de l'état général et la disparition des douleurs de la cieatrice opérée, mais non de la petite tumeur de récidive.

7º Un employé du Louvre porteur, depuis deux ans, de plaeards d'eezéma au dos des mains, a été guéri après 12 injections faites quotidiennement.

8º Citons, encore, lo père d'un de nos confrères, atteint d'une maladie de Parkinson; je ne saurais mieux faire que de transcrire la lettre que m'écrit son fils le 27 janvier 1900 : « Vous vous rappelez que je vous avais montré le malade en 1806, un an parès le début de son affection, avec des symptômes très confus; il n'avait, à ce moment, qu'un peu de tremblement limité au bras et à la main gauelle, survenu insidieusement et s'exagérant par les mouvements. Il y avait aussi de la parèsie, car le dynamomètre qui indiquait 32º a droite ne donnait que 16º à gauche. Ce n'est que deux ans plus tard (1897), qu'un diagnostic ferme a pu être établi par M. le professeur Raymond et par M. Babinski. La paralysie agintante se présentait alors avec tout le cortége classique.

Or, do 1897 à fin 1890 tous les traitements avaient échoué. Quand je vous vis le 6 décombre 1899, l'état du malade était lamentable; bon sommeil, bonnes digestions, mais los forces avaient décliné au point que le malade ne pouvait que se trainer de son lit à son fantesil; la parole était devenue tellement tremblée, qu'elle n'était plus distincte et on était oblicé de faire manager mon père comme un petit enfant.

C'est après vous avoir vu, qu'à votre instigation, i'ai commencé les injections cacodyliques d'après la formule que vous m'avez donnée. Or du 10 décembre 1899 jusqu'à ce jour 27 janvier 1900, j'ai injecté 5 grammes de cacodylate pur, et l'amélioration à été sensible 3 ou 4 jours après le début, puis manifeste pour tout le monde, dans la deuxième quinzaine de décembre. Elle a porté : 1º sur le relèvement des forces; le malade a pu quitter son fauteuil; puis faire quelques tours de chambre : puis monter un escalier ; puis enfin sortir : il a fait hier 1,500 mètres, en trois reprises; 2° sur uue diminution notable du tremblement de la parole; 3º sur une diminution de moitié du tremblement des bras, des jambes et de la tête. l'amplitude et la rapidité des oscillations ont diminué dans la même proportion. L'état mental qui s'était conservé intact. n'a naturellement pas été modifié, mais le moral est devenu bien meilleur, et l'espoir très vif renaît chez le malade. »

Une nouvelle lettre reque le 22 mars 1901, et provoquée par moi, pour que je puisse dire exactement l'état actuel du malade m'apprend que le traitement a été continué sans interruption depuis la lettre du 27 tévrier 1900, et d'après le procédé que épai relaté plus haut; j'en transcris les passages suivants : « Vous avez été pour mon père l'initateur des injections de cacodylate oi je vous en suis trop reconnaissant pour ne pas m'empresser de répondre à votre demande. Sa situation est la même qu'en jauvier 1900, les injections sont bien supportées, les reins sont bous, ni sucre, ni albumine. L'état général est excellent; à noter copendant un léger amaigrissement progressif, malgré l'alimentation très régu-

lière. Les symptomes de Parkinson sout toujours les mêmes. Marche toujours possible. J'ai, comme le malade et son emetorage, l'impression bien nette, que le cacodylate seul, a eurayé la marche très rapide de l'affection. Tout autre traitement s'étant moutré absolument nul. »

Or qui sait ce qui scrait arrivé si chez co malade, on avait employé dès lo début, c'est-à-dire trois ans avant la consultation de M. le professeur Raymond, le précieux médicament?

Le résultat obtenu chez ce malade m'ayant eucouragó, je priai M. le docteur de Saint-Martin d'aller faire des piqtores de caccidylate de soude à M. X., domeurant près de Versailles et atteint aussi de maladie de Parkinson. Deux piqures par semaine ont été faites de févrire 1900 à juillet 1900, avec un résultat favorable, mais moins excellent que chez le précédent malade.

9º Muo J..., bien portante jusqu'à 29 ans remarqua trois jours après un refroidissement intense (février 1898) de l'enflure des jambes et des paupières. Un confrère de Neuilly trouva dès le lendemain un gramme d'albumine dans les urines et depuis ce jour jusqu'au moment où je la vis (2 juin 1899), elle a fait l'analyse quotidienne et a trouvé de un à quatre grammes d'albumine. Or divers traitements, divers régimes essavés par moi, à partir de juin 1899, n'avaient eu aucun effet appréciable. La malade maigrissait peu, mais voyait ses forces disparaître, son teint devenir de plus en plus pâle, lorsque j'eus l'idée, en décembre 1899, de la soumettre aux injections de cacodylate. Le résultat fut très appréciable, la malade reprit des forces, de l'appétit, se maria en mai 1900 et depuis elle a cessé tout traitement; chose curieuse, la quantité d'albumine n'a pas diminué, mais la jeune mariée disait récemment que si elle ne se savait pas albuminurique, elle ne so doutcrait pas qu'elle est malade.

10° J'ai fait en six mois à M= P... avec l'assentiment préalable du regretté professeur Potain, trois séries d'injections cacodyliques, qui ont eu un excellent effet reconsiituaut. Cette personne qui était toujours fatiguée, à sommoil défoctueux, malade saus maladie, mais cependant d'un état de santé vraiment défectueux, s'est vue vite et bien remoutée. Nul doute qu'à la première défaillance de ses forces, qui serait consécutive soit à une grippe, soit à une maladie quelconque, soit au surmenage, elle ne nous demande une autre sêrie d'injections qui aurait probablement le même effet régénérateur.

J'ai été frappé de la rapidité du retour do l'appétit chez quatre grandes nerveuses atteintes d'anorexie dite hystérique, et l'affirme qu'il v a eu chez ces malades plus qu'une heureuse coîncidence et que la suggestion n'est pas en cause, car chez l'une, j'ai substitué sans le lui dire les injections de cacodylate aux petites injections de sérum artificiel que je lui faisais prendre depuis quelque temps, et sans que le régime ait été modifié, il v a eu un subit retour de l'appétit, à partir de la troisième injection do cacodylate do soude. Une des trois autres malades littéralement mourante à son retour du midi, a pu renaître à la vie, après huit ou dix injections. Ello a suivi le traitement huit mois pendant lesquels elle a eugraissé de 30 kilos. M. le docteur Faucon qui a bien voulu m'aider à traiter plusieurs de ces malades, a été également étonné de la rapidité du retour de l'appétit dès la quatrième ou cinquième injection. Et avec l'appétit, les forces et l'emboupoint ne tardent pas à réapparaître.

15º Co même confrère me signalait les excellents résultats obtenus clezum jeune convalescent de fièrre typhoïde, que nous avons vu ensemble, dont l'appétit et les forces restaiont languissantes, et qui après deux injections de cacodylate, s'est tout à coup ressaisi, retrouvant un appétit de bon aloi et une vitueur ranidement progressive.

Malheureusement on ne peut jamais promettre à l'avance l'amélioration ou la guérison. En d'autres termes, les indications de la médication cacodylique ne sont pas encoro précises. Chez tel malado elle réussit, chez tel autre, elle échouo sans que nous sachions pourquoi.

La scule notion précise qui se dégage des observations que jai faites, octs que quand le succès doit couronner l'essai thérapeutique, il ost rapide et vite appréciable; l'amédioration surviont dès la quatrième ou cinquième injectien. Si après cinq ou six niglections, il n'y a pas amélioration notable, mieux vant peut-étre ne pas continuer. En outre, j'ai remarqué que quand une première série d'injections n'avait rien donné, les séries suivantes ne donnaient pas davantage. A prouve je citerai l'observation d'une malade qui à priori, paraissait justiciable de la médication accedylique. Iethyose, amaigrissement leutement progressif depuis deux ans; anorexio absolue, etc. je lui avais fait une première série de vingt injections sans le moindre effet utile. Or sur les conseils de M. Moizard, je refis du autres injections, mais co fit ave le mém insueces.

Quand au contraire la médication a donné une première fois un résultat favorable, on deit espéror qu'une douxième séric d'injections, voire même une troisième, accontueront l'amélioration obtenue ou feront regagner aux malades le terrain perdu, dans l'intervalle des traitzements; et les malades le savont bien, ear d'eux-mêmes ils reviennont demander le secours dont ils ont une première fois anorpécié la valeur.

C'est chez les tuberculeux, avec ou sans fièvre, que j'ai obtenu relativement, le moins de succès de l'emploi du caco-dylate do soude. Il mo coûte de faire cet aveu : 1º parco que pris, sans commontaires, il pourrait désobliger M. le processeur Gautor, qui a toujours une foi robuste dans l'emploi du cacodylate, spécialement chez les tuberculeux avec ou sans fèvre; 2º parce que cette affirmation va à Pencontre de l'opinion couvante; 3º et surtout parce qu'elle pourrait décourager si elle était mai interprété, los praticiens qui, depuis deux ans, se félicitent d'avoir enfin un moyen thérapeutique puissant à opposer à la tuberculose. Mais la vérité me force à répéter que c'est chez les tuberculeux que le cacodylate de soude m'à

rendu relativement le moins de services. Mais parce que je dis que le caccolylate m'a rendu moins de services d'uno façon générale clos les tubercaleux, que clos d'autres malades, il ne faut pas me faire dire qu'il est inutile chez les tuberculeux. Peut-être d'ailleurs n'ai-ie nas employé les doses néces-

saires, pendant tout lo temps voulu, avec les interruptions convenables de traitement...? Je n'ai pas la prétention de sayoir encore bien manier le médicament chez les tuberculeux. En outre, je dois avouor quo je n'ai traité par le eacodylate que les tuberculeux qui à priori me semblaient ne devoir pas être justiciables de la créosote, c'est-à-dire, los malades profondément atteints, touchés par ces formes graves, qu'une certaine habitude elinique parvient à dépister. « Lo elinicien, disais-je dans un livre écrit en 1894 sur la tuberculose, arrive à une précision rolative de propostic, par une sorte do travail inconseient qui se fait dans son esprit, et qui lui fait apprécier avec une approximation suffisante ce que nous appellerons la « valeur biologique de son malade ». Or c'ost à ces malades à pronostic sombre que j'ai spécialement donné le cacodylate, réservant pour los autres la croosote à laquelle jo suis resté fidèle, ne me crovant pas le droit d'abandonner une médication que je commaissais et que je savais devoir être utile. pour une autre avec laquelle j'avais à faire connaissance.Cette considération doit atténuer beaucoup l'impression défavorable se dégageant des résultats que le vais exposer.

Il est probable que si je n'avais pas fait do sélection parmi mes tuberculeux traités, j'aurais eu à euregistrer à l'actif du cacodylate, dos résultats infiniment plus favorables. Coci dit, voici e que j'ai observé sur les vingt-neuf tuberculeux que l'ai traités na l'e occodylate dopuis ectobre 1885.

J'ni obtenu un succès très romarquable, malheureusement trop tôt compromis chez une dame notoirement tuberculeuse, avec nombreux bacilles, perte d'appétit, diarrhée, fièvre vespérale, état vraiment inquiétant. Elle avait en de l'intolérance

à quelques petites doses de créosote, ce qui me fit de suite renoncer à l'emploi de ce médicament; et cette intolérance ne faisait que confirmer le prononstic très sombre porté des le début. C'est dans ces conditions peu favorables que j'employai le cacodylate: or je puis dire qu'il eut des résultats excellents. Après quarante injections, faites en l'espace de trois mois, la malade se crovait guérie; de fait, elle ne crachait plus, n'avait plus de râles, avait retrouvé l'appétit, les forces et le sommeil. Elle était si bien portante que nous crûmes devoir M. le docteur Chaillou et moi, lui laisser faire faire une grave opération chirurgicale qu'elle réclamait. L'opération fut faite par M. le docteur Michaux qui après l'avoir auscultée avec nous. considéra la chloroformisation comme sans danger, vu le bon état des poumons. Mais deux jours après l'opération une meumonie se déclarait, au sixième jour, apparition de bacilles dans les crachats en nombre colossal (Dr Chaillon), et un mois après la malade succombait à nette phisie galopante.

Chez les vingt-huit autres tuberculeux traités par le cocadylate de soude, le résultat n'a jamais été nuisible, mais il :a été ou passager ou médiocre ou nul. L'insuccès le plus complet, est celui d'une jeune dame, que j'ai pu soigner dès le début de la tuberculose, alors qu'elle n'avait pas encore de fièvre et se trouvait dans des conditions idéales de confort et d'alimentation. M. le professeur Landouzy qui l'avait vue quinze jours avant moi, n'avait pu que soupconner la tuberculose, et lui avait conseille d'aller à Hyères par précaution. Or le cacodylate employé le jour même de la première visite (31 décembre 1899) et les vingt jours suivants n'a pas enravé la marche terrifiante de la maladie ; il est vrai que la malade était enceinte ce qui aggrave singulièrement le pronostic de la tuberculose pulmonaire. Le traitement cacodylique repris après l'accouchement n'eût comme la première fois aucun effet utile et la malade succomba en septembre 1990.

Un tuberculeux renal (diagnostie confirmé par M. le professeur Dieulafov) n'a tiré aucun bénéfice du traitement cacedylique, essayé, à vrai dire, pendant un trop court laps do temps (vingt jours).

Faut-il continuer cette lugubre énumération ?

Une joune fille de Bastia sur laquelle J'ai remis une note à M. Gautier eu juin 1899, et qui à cette date avait eu 53 abetes d'origine osseus (tuberculos) el avait été déjà traitôn-pendant quatre mois, par 15 grammes de cacodylato de soude en injetions ne tira aucun bénéfice du traitoment prolongé pendant deux autres mois et qui n'empêcha pas 40 autres abets de se produire et la mort de survenir en février 1990. Nos confrères Agostini of Zucarelli current devoir attribuer au cacodylate la survie si prolongée de cetto malhoureuse cuffant; mais il faut bien avouer quo c'est là un résultat médicore.

Même échec clez un jeune homme atteint de mal do Pout, ue j'ai soigné avec M. le docteur Courtois-Suffit. Mon collègue peut témoigner de la persévérance avec laquelle j'ai émployé les injections de cacodylate, sans parvenir à faire tomber la févre et à enrayer la maladie, qui s'est terminée par un abcès ouvert à [Berck, et par la mort quelques jours après.

M. le docteur Robert Sinon qui a soigné avec moi, bon nombre des 29 tuberculeux traités par le cacodylate, m'autorise à dire, qu'en dernière analyse, et après deux ans d'études menées parallelement sur le cacodylate ot la créosote chez les tuberculeux, il estime que sans nier les services que peut rendre le cacodylate, il ne faut pas abandonner la créosote et que dans sa pratique personnelle, il associe volutiers les deux médications en employant des traitements alternants.

Pour conclure, nous dirons que pour avoir une idée bien nette et personnelle sur l'officacité du cacodylate clus les tuberculeux, il nous faudrait des observations plus nombreuses et plus longuoment suivies, ot sur des malades qui n'auraient pas été préalablement sélectionnés.

Il y a donc lieu do laisser à d'autres confrères micux placés pour l'obsorvation et ne se croyant pas tenus à n'employer le cacodylate que dans certaines catégories de malades, lo soin de précisor la valeur du mèdicament chez les tubercuieux.

Chez trois personnes atleintes d'asthme, le truitement cacodylique s'est montré très efficace, nne fois, et deux fois, sans effet utile appréciable. Chez un de ces malados, jo l'ai renouvelé deux fois, à six mois d'intervalle et avec aussi pou de succés à la douxième tontaitve qu'à la première.

Mais ce qu'il faut bien remarquer, c'est que le médicament, même donné à fortes dosses longtems prolongées, quand il ne fait pas de bien, ne fait pas de mal; nous n'avons jamais eu a déplorer le unoindre accident et si nous en cessons l'usage, après 4 ou 5 injections chez les malades auxquels il ne rend pas de services immédiats, ce n'est pas par la crainte de leur être muisible, c'est par celle de leur étre muisile.

En résumé, lo cacodylate de soudo nous a donnó des résultats parfois très remarquables par leur rapidité et leur intensité, chez divers malades, dont la murition était défectueuse et dont l'appétit et les forces étaient en défaillance. Par contre, il a été sans effet, chez un nombre à pen près égal de malades semblables aux premiers et en particulier, chez les tuberculeux. Pour coordonner cos résultats contradictoires, nous avons eu recours à l'hypothès suivante:

« Si la vitalité n'est qu'inhibée, lo cacodylate met en valeur les forces latontes dont l'économie dispose encore. Si au contraire, il n'y a pour ainsi dire, plus de réserves de force nervouse, le cacodylate est incapable d'en créer et il est sans action.

Catte interprétation est peut-être bien hardie, mais si elle était exacte, elle nous expliquerait cette variabilité si extraordinaire dans l'action thérapeutique, qu'on ne rencontre à ce degré, avec aucun médicament, ot nous rendrait compto des effots véritablement remarquables qu'on observe chez certains malades, contrastant avec l'inefficacité absoluc qu'on note obez d'autres cliniquement identiques ou du moins comparables. Si notre hypothèse venait à se vérifier par une patiente étude ultérieure, elle aurait une portée considérable au point de vue clinique et au point de vue de la philosophie médicale.

Je m'explique : On croît connaître un malade, quand on a bien étudié tous les troubles qu'il accuse; quand on a patiemment exploré tous ses organes, avec ou sans instruments de précision : quand on a interrogé son hérédité. Mais en réalité on ne le connaît pas ; on ne sait pas, en réalité, ce qu'il vaut, de sorte, que des surprises sans nombre sont réservées au clinicien le plus consciencieux... Tel malade, dont tous les organes paraissaient en bon état, fait le désespoir de toute thérapeutique; tel autre, qui paraissait plus profondément touché, se ressaisit, sous les influences les plus variées, et parfois sous la seule impulsion de la nature. Pourquoi ces différences qui ont échappé à l'analyse symptomatique la plus minutieuse? A vrai dire, certains cliniciens, forts d'une longue expérience ou spécialement doués, arrivent à pénétrer quelques-uns de ces mystères du pronostic. Mais sur quoi s'appuie leur jugement? Sur une sorte de flair qui les trompe souvent et qui fait d'eux, plutôt des artistes, que des savants. D'autres, fouillant de très près l'hérédité, étudiant le malade depuis le jour de sa naissance, voire même de sa conception ; le suivant à travers toutes les phases de sa vie : notant non seulement les incidents nathologiques de sa jeunesse, de son adolescence, de son age viril, mais surtout les périodes de santé qui ont séparé ces divers incidents, ce que M. le docteur Sigaud appelle les phases de compensation; tenant grand compte des phénomènes objectifs révélés par l'examen de tous les organes et de l'abdomen en particulier, arrivent à connaître la valeur biologique d'un malade, avec une précision qui confine à celle des sciences exactes.

Et puisque nous venons de prononcer le nom du decteur Signaud, de Lyon, c'est à lui que nous faisons allneison, au risque de froisser sa modestie : Il nous a plusieurs fois étorné par la súreté de son pronostie basé non pas sur une sorte de diviation d'artiste, mais sur des données absolument scientifiques. Mais, tout le monde ne peut pas avoir la prétention d'arriver à cette virtuosité; d'ailleurs, peu de praticiens ont le loisir de consacrer aux malades le temps nécessaire à une étude si complète.

Aussi, quelle trouvaille serait la découverte d'un médicament révélateur de la valeur biologique! Depuis longtemps, cette idée me poursuit, et je crois avoir déjà démontré que la créosote jouit de cette propriété d'agent révélateur cluez les tuberruleux on particulier? Or, je crois devoir dire, que le cacodylate de soude, me semble jouir des mémes prérogatives, avec cette différence, qu'il est bien plus facile à manier que la créosote; car, où il agit, et alors, il agit vite et bien; ou il n'agit pas, mais il n'occasionne pas le moindre accident; tandis quo la créosote, quand elle n'est pas tuile, est toujours nuisible, et quelquefois très nuisible. Els bien! quand le cacodylate agit, c'est qu'il y avait des réserves de vitalité, qu'il met rapidement en évidence, et quand il n'agit pas, c'est que la valeur biologique du sujet est réduite au minimum compatible avec la vie.

Cost, par parenthése, ce qui expliquerait son inefficacité rélatire chez les tuberculeux. Le tuberculeux n'est pas seulement un bacillière, un intoxiqué par les sécrétions du bacille de Koch; avant d'être bacillière, il était déja atteint dans sa vitalité et c'est pourquoi il est devenu tuberculeux. En tous cas, à partir du moment où le bacille a pu l'envahir, aux causes d'infériorité initiales, se joignent celles qui dérivent de l'intoxication bacillaire, et la valeur biologique so trouvant ainsi progressivement amoindrie, le cacodylate, agent révélateur de cette valeur biologique a de moins eu moins d'efficacité.

Heureux donc le tuberculeux, chez qui le cacodylate produit de bons effets! C'est qu'il a l'étoffe voulue pour lutter contre son envahisseur; le cacodylate ne peut que l'y aider, comme le fait d'ailleurs la créosate.

Mais, dira-t-on, si le cacodylate jouit de cette surprenante

propriété, il faut donc l'employer chez tous les malades dont la nutrition périclite? Autrement dit, chez tous les malades chroniques. De deux choses l'une : ou il réussit, et alors il remplace toute autre médication; ou il ne réussit pas, et alors il indique qu'il n'y a rien à faire, puisque toutes les réserves de la viatilité sont équisées.

Voilà trois propositions que nous allons discuter. Nous nous rallions volontiers à la première, et n'est-ce pas ec que font, sinou inconseiemment, du moins, sans idée directrice, la plupart des praticiens qui emploient le eacodylate chez les malades les plus divers, dans les maladies les plus dissemblables : tuberculose, diabète, maladie de Basedow, cancers, chlorose, impaludisme, auémie, leucémie, chorée, maladies de la moelle, psoriasis, aenė, liehen-plan, cedėme, sarcomatose de la peau, lymphosareôme, épitheliomas, etc. etc.? N'estil pas curieux de voir le même agent s'attaquer à tant d'états pathologiques, à tant d'ennemis différents? Et nous ne sommes qu'au début! Nul doute que dans quelques années, la littérature médicale ne soit enrichie d'une foule d'autres conquêtes dans les maladies les plus dissemblables. Et remarquons bien qu'il n'y pas à mettre en doute la bonne foi des observateurs; tous les succès signalés sont réels, plus ou moins durables, peut-ètre, mais incontestables.

La liste des insuccès sera moins longue. Pourquoi? parce que les insuccès passent inaperque: le médicament ne produisant pas d'action toxique, n'éveille pas l'attention quand'son action est nulle; un insuccès silencieux, sans fracas, ne suscite pas les louables serupules qui forcent un médecin digne de ce nom à publier ses éclaces.

Ainsi, pour en revenir à notre première proposition, nous en admettons la légitimité: on fera bien d'essayer le eacodylate cliez tous les malades dont la nutrition périclite, qu'ils soient tuberculeux, cancéreux, diabétiques, névropathes, néphrétiques, dyspeptiques, myélitiques, rhumatisants, malades sans maladie cataloguée. Il pourrus se faire, qu'on leur soit utile et on ne risque pas de leur être nuisible, surtout si l'on ne s'obstine pas dans l'emploi du médicament qui agit vite, quand il doit agir.

Mais nous n'admettons, ni la deuxième, ni la troisième proposition. De ce que le cacodylate est utile, il ne s'en suit pas qu'il remplace toute autre médication. Rappelons-nous que ce n'est qu'un agent révélateur, qui peut rectifier la nutrition momentanément déviée, mais qui ne lutte pas, contre les causes de la maladie; do ce qu'il est inutile, ne concluons pas qu'il n'y a rien de plus à faire. Notons seulcment que lo malade a une médiocre valeur biologique... et tenons-nous rour avertis... Ne faisons pas à son suiet de promesses que l'avenir démentirait: instituons une médication prudente, de laquelle seront exclus les exercices physiques exagérés, l'hydrothérapie froide, les eaux minérales actives, Vichy en particulier, les longs voyages, etc. Mais, multiplions au contraire les soins et exerçons une surveillance médicale assidue. C'est précisément parce que la maison n'a pas de fondations solides qu'il faut chercher à l'étaver.

CACODYLATE DE MAGNÉSIE

Estimant que le magnésium devait avoir un role considerable dans l'économie humaine, M. le doctur Chaillou nous proposa, en décembre 1900, de substituer chez quelques-uns de nos malades communs, le cacodylate de magnésie, au accodylate de soude et sans tarder, nous tentaines quelques essais que je vais résumer, et que je n'aurais pas encore publiés si la circonstance ne s'était offerte à l'occasion de ma communication sur lo cacodylate de soude, et aussi pour prendre date, au nom de mon confrère et ami, et au mien. Car, je ne crois pas, que jusqu'ici, le cacodylate de magnésie ait été étudié?

C'est cependant un sel facile à obtenir chimiquement pur

et neutre à la phtalèine ou au tournesol. Il ost très riche en acide cacodylique: I gramme de sel, représentant 92 centigrammes d'acide cacodylique, soit 67:48 d'arsenie; alors que I gramme de cacodylate de soude ne contient que 70 centigrammes d'acide cacodylique, soit 67:38 d'arsenie.

Mais ce n'est pas cette riche teneur en arscuic qui doit le faire préfèrer aux autres cacodylates, car, avec celui de soude on particulier, on peut fournir à l'économie des quantités invraisemblables d'arsenic non toxique, et qu'il y en ait un peu plus, dans le sel magnésien que dans le sel sodique, lo fait u'à aucune importance.

Le sel magnésien est très soluble dans l'eau; on peut arriver à faire une solution à 45 0/0; c'est-à-dire telle que 1 gramme de solution, contient 45 centigrammes de sel. Mais c'est un liquide sirupeux.

La solution à 25 0/0, est légérement visqueuse, mais bion tolérée par lo tissu sous-cutané : en moyonne sur dix porsonnes, huit n'éprouvent aucune doulour : une accuse des douleurs sourdes survenant peu après l'injection et durant une heure ou deux. Une autre trouve les injections très désagréables, quand elles sont faites à la dose do 1 centimètro cubo, mais avec 1 demi-centimètre cube, la douleur est insignifiante, d'ailleurs avec des solutions plus étendues, la douleur a toujours été nulle, nous avous débuté par des solutions à 5 0/0, puis à 10, à 20 et nous avons adopté celle de 25 0/0. Nous commençons tous les traitements par une injection de 1 demi-centimètre cube, d'une solution à 10 0/0, afin de tâter la tolérance : si elle existe, c'ost-à-dire, si le malado n'éprouve aucun phénomène appréciable, nous poussons à 1 centimètre cube de la môme solution, et nous arrivons très vite à l'omploi de la solution à 25 0/0. Sur trente-huit malades que nous avons déià traités, il nous est arrivé deux fois seulement de ne pas pouvoir dépasser la dose initiale do 1 demi scringue de solution à 10 0/0. L'une de ces malades accusa une perturbation générale insolite, avec vertiges passagers. L'autro, dos sensations si extraordinaires, que nous avons renoncé à les noter. Toutes doux rentrent dans la catégorie de ces malades auxquelles il ne faut rien donner, sous peine de leur faire du nal, et de se discréditer dans leur esprit. Chex tous les autres malades, la dose de 1 seringua de 1 centimetre cube de solution à 25 0/0 est vaillamment acceptée, et chez plusieurs, nous avons donné 2 seringuas de la dite solution pendant trois et quatre jours de suite, saus provoquer le moindre phénomème toxique.

Nous ne connaissons donc pas encore la dose maxima.

qu'on peut injecter sans péril; elle est peut-être boaucoup plus considérable que celle que nous avons atteint. Si l'on avait dit à un toxicologiste d'autrefois qu'on pouvait, sans le moindre accident, donner par la peau, pendant plusieurs jours de suite, et chez un individu non mithridatisé la dose de 32 centigrammes d'arsenic, le savant aurait poussé de hauts cris. C'est cependant ce qu'on fait de la facon la plus simple du monde, en injectant doux seringues d'une solution à 25 0/0 de cacodylate de magnésie. En effet, chaque seringue de 1 centimètre cube pèse 1gr,30, car le liquide est très dense et renferme 0st,33 de cacodylate, c'est-à-dire 16 centigramme d'arsenic ; deux seringues valent donc 32 centigrammes. C'est à dessein que nous précisons le calcul, parce que d'habitude, on confond gramme et centimètre cube; cela n'a aucuno importance quand il s'agit de solutions au centième ou au cinquantième, mais quand on procède avec dos solutions à 25 0/0, l'écart entre le gramme ot le centimètre cube est loin d'être négligeable. Ainsi l'arsenic qui, sous la forme d'hydrogène arseuié, a une toxicité épouvantable, puisque des traces impondérables de ce gaz ont proyoqué en juin 1900. une catastrophe dont je soigne encore une des victimes, n'est pas toxique à la dose de 32 centigrammes, quand il est sous la forme de cacodylate.

Y a-t-il intérêt à pousser à des doses plus élevées, que celles atteintes par nous, jusqu'à ce jour? C'est probable rendre des services, il en rend d'autant plus, qu'il est donné à une dose qui se rapproche davantage de la dose maxima tolérée; c'est-à-dire, de la dose qui confino à la dose toxique. J'ai développé ailleurs cette idée... Quoi qu'il en soit, la dose do cacodylate de magnésie que neus n'avons pas encore dépassée. M. Chaillen et moi, est de 66 centigrammes par jour, et lo malade qui en a pris le plus, a recu en quatre-vingt-dix jours la dese de 130 centimétres cubes de solution à 25 0/0, soit 43 grammes de cacodylate de magnésie : soit plus de 20 grammes de métalloïde arsenic. Or c'est, de teus les malades traités, celui qui nous a donné le plus brillant résultat. Le fait est incontestable : mais il s'agit de l'interpréter. Est-ce, cette énorme quantité de médicament qui lui a rendu d'énormes services, eu n'est-co pas, parco qu'il supportait bien le médicament, que nous avons été incités à lui en denner beaucoup? Peut-être une dose dix fois moindre aurait amené le mêmo résultat?... Peut-être aurait-il toléré sans inconvénient une dose beaucoup plus ferte encore ? En teus cas, une dose beaucoup plus forte, n'aurait pas pu lu ètre beauceup plus utile, car le résultat a été excellent, et d'une remarquable promptitude. Co malade se croyait tuberculeux; des la première visite qu'il me fit, le 24 décembre 1900, i'eus le plaisir do pouvoir le rassurer, sans restrictions : mais comme il était très éprouvé par des craintes imaginaires, par la perte de semmeil et d'appétit, je le mis séance tenante au traitoment, et il alla tous les jeurs prendre une injection, tantôt chez moi, tantôt chez M. le Dr Chaillou qui dirigea son régime alimentaire. Les forces revinrent des la huitième ou dixième injection et l'amélioration fut rapidement pregressive; le poids augmenta de 5 kileg. 500 en trois mois, mais des la fin du deuxième meis de traitement l'état était irréprochable.

Des sceptiques pourrent dire que la guérisen n'est pas due au cacedylate, mais à l'agréable impression morale du début et au régime alimentaire qui à été conseillé, voire même que la guérison est survenue malgré le cacodylate; c'ost possible, à la rigueur; mais comme nous avons concurremment dix-huit autres observations de résultats favorables, moins éclatants sans doute, mais très appréciables et très apprécidés des malades et de leur entourage, qui sont assex bon juges en pareille matière, comme chez quielques-uns de ces malades, nous n'avous en rien modifié le régime alimentaire autérieur, nous croyons de bonne foi que le cacodylate de magnésie leur a été utile. Tous accussient un retour ou une augmentation rapide d'appétit et surtout un sentiment très marqué de force et de bien-être général après deux ou très injoctiens.

La plupart disaient qu'ils dormaient mieux; chose curieuse, chez la plupart, le poids n'a pas augmenté, malgré l'exagération énorme do l'appétit.

Les dix-huit malades auxquels nous faisons allusions étaiem neurasthéniques, dyspeptiques, arthritiques, convalescents de grippe, l'une était anoréxique et faisait lo désespoir de ses parents qui me l'amenérent de Compiègne; elle n'avait plus ses règles depuis deux ans et s'amaigrissait progressivement; depuis six mois, elle avait perdu 9 kilogrammes, et ne pesait plus que 41 kilogrammes, le la mis, à la fois, à un régime convenable, au repos et au cacodylate de magnésie (0,33 par jour) et sous cetto triple influence, j'obtins en dix jours une amelioration vraiment remarquable, qui s'accentua au point, qu'après un mois de traitement elle était transformée (sans cependant peser davantage).

Or, qu'elle est la part du caccivlate dans ce résultat? Quelle est celle du repos; quelle est celle du régime; quelle est celle du changement de milieu? Il est impossible de répondre d'une façon précise; mais nous avons tous soigné par lo repos, le régime et le changement de milieu des malades de ce genne, et nous n'avons pas souvent, que je sache, observé transformation si rapide. Pour préciser la part qui revient au médicament, il edit fallu, ne rien changer au régime et faire traiter la malade, dans son milieu habituel.

C'est ce qui so fit chez Miss E..., qui ne changea rien à son genre de vie et qui vint prendre chez moi trois fois par semaino une injection (du 24 décembre au 24 mars). Elle non plus, n'augmente pas de poids (49 kilogrammos en décembre, et 49 kil., 200 lo 24 mars); mais elle s'est sontie bien plus forte, dès les premières injections.

Lo colonel N..., surmené par le travail de l'hiver, se disposait à son grand regret, à partir pour le midi, sur les prescriptions formelles de plusieurs médecins, quand ils vint me voir, le 22 février dernier. Il a reçu jusqu'à ce jour 25 injections et s'en trouve si bien, sans avoir rien changé à son alimentation, à son genre de vie, à son travatil, qu'il ne pense plus à la villégiature imposée. Il a augmenté de 2 kil., 500; je lui ai conseillé de suspendre le traitement (25 mars 1901).

Tous les résultats no sont pas aussi favorables: six fois, nous n'avons obtonu que des demi-succés; trois fois de véritables insuccés.

Ainsi M¹⁰ L..., 18 ans, a été traitée du 26 décembre au 3 février et du 26 février au 12 uners, à raison de trois injoctions par semaine, de solutions à 10,15,20 et enfin 25 0,1 n'y a ou qu'une lègère augmentation de l'appétit et des forces. Cette jeune fille a toujours été plus ou moins malade, à 1 an diarrhée verte, puis rougeole, coupeluche, scoliose à 5 ans, soignée par M. de Saint-Gormain: malaises gastriques à tout propos. Il y a six ans, M. lo Professeur Hutinel lui avait imposé un régime qu'elle était encore obligée de suivre. Depuis trois ans, elle posait le même poids de 15 kilogrammes, etc. Elle a une lourde héridité. Bref, elle a une faible valour biologique.

M¹⁰ M..., 16 ans, élevée au biberon, a eu la diarrhée dans la promière enfance, une rougeole grave, des angines fréquentes, la coqueluche, une entérite grave à 8 ans; elle a toujours été faible, incapable d'un travail plusique ou cérébral tant soit peu prolongé. Bien qu'elle ait tous les organes en bon état, c'est une malade. Nous l'avons soumise le 6 décembre aux injections quotidiennes de caccodylate do soude, et le 24 décembre, sans lui rien dire, nous lui avons substitule les injections de sel magnésiem. Même insuccès; elle n'est ni mieux, ni plus mal qu'avant les dix-huit injections do sel sodique et les trente-six injections de sel magnésien. Cest aussi une chétivo à médiorer vitalité.

M™ F..., tout en n'ayant aucune maladie organique, épuisée par neuf grossosses, des chagrins et des maladies antérieures de toutes sortes est une véritable ruine. Nous sommes presque sires à l'avance que le traitement magnésien ne lui sera pas d'une grande utilité, en vertu des idées doctrinales que nous avons dévelopées plus hant. Nous l'essayons cépendant pour no pas encourir à nos propres yeux, le roproche de n'agir que d'apprés des idées préconcues.

En résumé, le cacodylato de magnésie parait agir dans le même sens que le cacodylate de soudo; il aide les malades à se ressaisir; il met en évidence, leurs réserves latentes de force nerveuse. Il n'occasionne janais d'accidents, même aux fortes dosse que nous avone employées. Quand à préciser la part, qu'il convient de faire au magnésium et à l'arsenie, dans les effets utiles obtenus, nous déclarons que nous n'avons aucune donnée qui permette d'aborder le problème.

Si la question des cacodylates intéresse nos confrères, neus leur parlerons dans uno autre séance, des injections intramusculaires et sous-cutanées de cacodylates de fer, de guafacol et de quinine.

Action apéritive du persulfate de soude.

Par M. Edgard Hibrz.

Depuis la séance du 23 janvier dernier, j'ai pu étudier plus à loisir l'action du persulfate de soude. Dans les trois cas que je citais aucune amélioration sensible ne s'était manifestée après l'emploi du persulfate à la dose de 05°.50.

J'avais signalé chez mes malades une sensation de creux pénible dans la région épigastrique, une sorte de sensation de faim douloureuse qui persistait pendant toute la journée à la suite de l'ingestion du médicament.

Je pense aujourd'hui, comme notre Président, que cet échec est imputable à des doses trop élevées de persulfate. J'ai abaissé la dose à 0°.20 par jour que je donne en solution.

Le médicament est administré par la surveillante le matin au moment où les malades sont à jeun.

Voici les résultats obtenus que je diviserai en favorables et défavorables, dans ma salle d'hommes et ma salle de femmes :

SALLE D'HOMMES

Résultats favorables :

1º Ménici, 30 ans, chimiste: bacillose au 2º degré. Trés peu d'appétit à son entrée. Prend 0⁵⁷,25 de persulfate à jeun, depuis 6 jours.

L'appétit est meilleur; du 1º degré, le malade passe au 3º degré d'alimentation et le mange avec plaisir.

2º Millet, 30 ans, domestique: pleurésie droite avec épanchement. L'appétit est nul à son entrée. Il prend 0r-20 de persulfate, et dès les premiers jours, l'appétit augmente sensiblement. Au bout de 12 jours, il est au 4º degré d'aliments; l'état général est bout.

3º Malterre, 25 ans, valet de chambre: hacillose au début; anorexie assez marquée. Il prend 0ºº-20 de persulfate le matin, à joun. Dès le 3º jour, l'appétit est meilleur; le 5º jour il est au 3º degré alimentaire au lieu du premier. L'état général s'améliore.

FEMMES

Résultats favorables :

- 1º Pigeau, Octavie, 38 ans, relieuse: bacillose au 1º degré; anorexie compléte à l'entrée; après trois jours de médication apéritive, l'appétit est revenu. Mange 4 portions.
- 2º Chauvin, Marguerite, 38 ans : l'appétit est presque nul; tuberculose au début. Au bout de 8 jours de persulfate l'appétit augmente et se maintient.
- 3º Spard, Marie, 47 ans: rlumatisme articulaire; anorexie.
 2 jours de persulfate, l'appétit est sensiblement meilleur.
- 4° Brault, Berthe, 41 ans, blanchisseuse : bacillose au 2° degré. 0sr,25 de persulfate par jour. A l'anorexie absolue du début succède un réel appétit au bout de 5 iours.
- 5º Favot, Lucie, 17 ans : anémie, sans appétit ; résultat rapide.
- 6° Guibert, Elisa, 29 ans : rhumatisme, anorexie cède le 3° jour. Résultat noté par la surveillante comme excellent.
 - 7º Meyer, Marie, 33 ans : hystérique. Résultat très bon. 8º Richard, Léonie, 15 ans : chorée légère, anorexie. Résul-
- tat très bon.

 9º Kien, Valentine, 39 ans : dès le 3º jour grand appétit.
- 10° Lebreton, Joséphine, 46 ans : dès le 3° jour se trouve très bien du persulfate. Entrée pour une phlébite grippale.
- 11º Bigot, Ernestine, 29 ans : métrite, anorexie. Très bon résultat le 4º jour.
- 12º Letellier, Louise : tuberculose au début. Résultat rapide.

HOMMES

Résultats défavorables :

1º Richard, 39 ans, journalier: congestion pulmonaire; signes de tuberculose au début; anorexie très prononcée à

l'entrée. Après 5 jours d'usage de persulfate, l'appétit n'est pas revenu.

2º Borin, 48 ans, concierge: bacillose au 3º degré; anorexie absolue. Prend du persulfate pendant 4 jours. Aucune amélioration.

3º Maurice, 50 ans : bacillose au 3º degré ; anorexie absoluo. Au 3º jour de persulfate, aucun résultat.

FEMMES

1º Devonconce, Marguerite, 22 ans : grippe, anorexie très marquée. Ne peut continuer l'usage du persulfate. Troubles gastriques le 2º jour.

2º Trianon, Georgette, 20 ans : anémie, inappètence ; résultat nul. On diminue la dose de persulfate ; pas d'effet. Le médicament provoque de la diarrhée.

En résumé, nous avons opéré sur 21 malades, 6 hommes et 15 femmes.

Dans notre salle d'hommes, les observations ont été moins nombreusés. Lo mouvement des malades est plus actif, mais le zèlo des élèves chargés de relevor les résultas a été audessous de celui qui, dans la sallo des femmes, nous a valu 15 observations bien suivies.

Chez nos malades femmes, nous constatons 13 résultats excellents sur 15.

Chez les hommes, 3 sur 6. Mais, pour ces derniers, les conditions d'oxpérimentation étaient particulièrement mauvaises.

Deux cas so rapportent à des individus anorexiques porteurs de grosses cavernes,

On ne manquera pas d'objecter que les résultats ne sont si menarquables dans notre salle des femmes, que par suite de la suggostionnabilité inhérente à leur sexe. Cependant, sur les 15 malades, une seulo était hystériquo. Je ferai remarquer, au surplus, que je fis plusieurs fois cesser le médicament chez quelques malades sans appeler leur attention sur cette suppression, leur laissant leurs médicaments habituols. Rapidement, l'appétit fut moindre.

Nous pouvons donc conclure que le persulfate de soude paraît un très bon médicament apéritif.

Qu'il faut le donner à dose de 0er,20 en moyenne.

Qu'on peut l'administrer, en une seule fois, le matin, à jeun, suivant, je crois, la manière Lyonnaisc. L'effet apéritif se maintiont toute la journée,

Quand le médicament est mal toléré, il provoque une sensation doulourouse, et parfois de la diarrhée.

M. Matrieu, - Je demanderai à M. Hirtz s'il a fait pratiquer l'analyse de son médicament afin de constator s'il no contenuit pas d'acide sulfurique libre ? Pour mon compte, l'ai expérimenté de mon côté les persulfates, mais j'ai utilisé la persodine, c'est-à-dire le mélange de persulfates préconisé par MM. Lumière, de Lyon. Ces autours ont en offet avancé que les persulfates étaient des sels éminemment instables et qu'ils so dédoublaient avec la plus grando facilité en mettant l'acide sulfurique en liberté : j'ai donc tenu à employer un produit donné comme stable. Mais pour être certain de ce que je faisais, j'ai fait essaver le médicament, or, cette solution que l'on me présentait comme stable s'est trouvée renfermer des quantités relativement considérables d'acide sulfurique. J'en suis donc amené à supposer que les persulfates. même en solution préparée spécialement, se décomposent, et alors ie crois que c'est tout bonnement l'acide sulfurique qui agit dans les solutions de persulfate. C'est une chose que nous connaissions depuis longtemps et il serait bien plus simple de prescrire tout bonnement l'acido sulfurique, suivant la vieille contume.

M. Hirtz. — l'avoue que je me suis dispense de faire l'analyse, je mo suis contenté do faire exécuter l'ordonnance avec tout le soin possible et je suis convaincu que le produit était pur. Quand à ce qui a pu se passer après la préparation je me déclare incompétent.

M. Caixox. — Les persulfates sont, en effet, des sels très instables et ils ne se conservent qu'en solution acide, comme par exemple, l'eau oxygénée. Dans ces couditions, le seul moyen de conserver des solutions de ces médicaments consiste à les additionner au préalable d'une très poitie quantité d'acide sulfurique. Mais il est bien évident qu'au point de vue de l'action sur l'estomac, cet acide doit jouer uu rôle d'oxcitant et l'on est en droit de se demander ce qui dans la circonstance, revient vraiment aux persulfates.

MM. Frémont et Dubois font des communications qui, faute de place, seront insérées ultérieurement dans lo Bulletin de Thérapeutique

Comité secret.

La Société se réunit en comité secret pour entendre la lecture du rapport de M. Hirtz, au nom d'une commission composée de MM. Créquy, Du Castel et Josias, sur les candi datures.

Onze candidats se présentent pour remplir les places de titulaires vacantes dans la section de médecine. La commission a décidé que, suivant la coutume admise dans les sociétés savantes fermées, elle ne ferait figurer sur la liste que six candidats closiés exclusivement d'après leur valeur porsonnelle et l'importance de leurs travaux antérieurs. Le nombre des places vacantes étant de trois, la commission met trois candidats en première ligne, oe sont :

MM. BALZER.

BAUDOUIN (Goorges).

ISCH WALL.

Viennent ensuite en deuxième ligne :

MM. HALLION. RICHE.

SAINTON.

Rapport favorable est ensuite fourni sur la candidature do MM. BROCCHI et ODILON MARTIN, au titro de correspondant national, et NOGUERA, de Madrid, au titre de correspondant étranger.

Les élections auront lieu le 17 avril ; le scrutin sera fermé à cinq heures.

Étaient présents à la séance :

Titulaires. — MM. Adriau, Bardet, Blondel, Bolognesi, Brun, Burlureaux, Cautru, Courtade, Crèquy, Crinon, Dalchié, de Crésantigues, Deléage, de Molènes, Déessquelles, Dosnos, Dignat, Du Castel, M. Dupont, Frémont, Hirtz, Joanin, Josias, Le Gondro, Lépinois, Lereddo, Mathieu, Moreigne, Muselior, Patein, Pouchet, Rémon. Albert Robin. Svestyer, Vozt.

Correspondants. - MM. Dubois, Duhourcau, Linossior et Rodet.

La séance est levée à six heures et quart.

Le Secrétaire des séances,

Bolognesi.

BIBLIOGRAPHIE

Vade-meeum de poche du jeune praticien et des remplaçants, par Roger Hyvert; 1 volume in-18 de 222 pages; Maloine, éditeur.

Petit livre appelé à rendre des services aux débutants qui n'ont pas encore dans leur mémoire les formules propres aux différents cas à traiter.

Manuel de thérapeutique, par M. Berlioz, avec une introduction de M. le professeur Bouchard; 1 volume in 18, 4* édition revue et augmentée; Masson et C*, éditeurs.

L'évilion que nous donne sujourd'usi M. Berlioz était impatiemment attendue. Comme îl le reconsait lis-nieme, la thérapeutique merche à grands pas et chaque jour voit éclore un nouveau médicament. Mai-heureusement, nous subissons dos mours telles que les inventeurs ont souvent plus de hâte à lancer une affaire, à voir le beaux bênéries se réaliser qu'à présente un produit parlatiment définit, à propriéés filérapeutiques nettement présisées, à indications et propriées filérapeutiques nettement présisées, à midications et que M. Berlioz «sa va vanient les consecutions de médicaments nouveaux imparfaitement étudiés. Mais, sous peine déture incupales, il à dis 5 y résoudre.

A signaler un chapitre fout entier consacré à la sérothérapie et à Forganothérapie. Ces remédes biologiques ont été Pobjet d'un examen aussi complet que possible, tout en conservant la concision qui fait du livre de M. Berlioz un manuel apprécié depuis longtomps des étuliants et des pruticiens.

L'hypnotisme et ses applications à la médecine pratique, par O.-G. Wetterstrand, traduit par P. Valentin et J. Lindford; 1 volume in-18; O. Doin, éditeur.

L'auteur a voulu appeler l'attention des médocins sur une métitode dont Liébault il Trinitateur et que Bernheim et aes étèves ont depuis brillanment développée. Il a tenu à prouver que la sphére d'action de la tibérapeutique suggestive es des plus amples et qu'elle atteint son maximum de puissance dans l'état le prontique profond. Cest à tous maximum de puissance dans l'état le prontique profond. Cest à tous puis de l'action de la completion de la completion de l'action de la completion de l'action de la morphisme de la completion de l'action de la morphisme de la mor

taines formes d'épilépsie. Et il conclut son travail, très intéressant à consulter, en émetlant cette appréciation, basée sur sa propre expérience et sur celle d'autres médecins, que l'hypnothérapie a une grande valeur dans beaucoup de cas et qu'il est souvent le seul moyen d'obteuir le résultat désiré, la sant des

Précis de thérapeutique oculaire, par A. Bounceois; petit volume cartonné in-18 de 131 pages; O. Doin, éditeur.

Si le médecin praticien n'a pas de temps à consacrer aux opérations importantes nou plus qu'aux examens que réalament certaines anomalies de réfraction, par contreil est tenu de comantire les malidies des yeux à manifessitions externes et d'instituer un traitement capable de les gaérir ou du moins d'ampécher les complications pour lui un précient guide, il y trouvrer les médientions les plus efficacement employées dans les cures des différents eas qui se rencontrant ou contrant de la contrant de la contrant de la contrant contract contract

Aide-mémoire des maladies du cœur, par Paul Lerent; 1 volume in-18 de 285 pages; J.-B. Baillière, éditeur.

Ce petit livre continue la sèrie de ceux que l'auteur destine aux mélecins praticiens, auxsi a-ci-li développé la partie clinique autant qu'il était possible, restreignant au striet nécessaire les discussions purement théoriques, ne dévriant que très sommairement les raretés pour s'attaeller surtout à l'étude des cardiopathies que l'on rencontre journellement.

Manuels de thérapeutique clinique, Partie médicale, par G. L.R-MOINE; 1 volume in-8° de 788 pages; Vigot frères, éditours.

Sur les instances de ses clères, M. Lemoine s'était décidé en 1832 à faire paraftre ses leçous de dimique thérapeutique. Il offrait un livre de vulgarisation dont avait été sysématiquement écardé tout ce qui est sécience pure et n'a pes trait d'une façon immédiate à la pratique de la médecine. Le stucès obtenu fut let que non seulement les deux premières délitions rapishement epinsées ont necessité l'appartition d'une troisème notablement augmentée et mise au courant des non-relles découvrerés faires en thérapeutique, mais qu'il dut denander à quelque-suns de ses obligues de vouloir bien rédiger dans le même expert deux volumes qui font suite à la sparie médicale » et qui et des mondres de la comment de la propriet deux volumes qui font service volumes que font service de la comment de la

Pour ce qui est du livre de M. Lemoine lui-même, l'auteur va au-

dovant du reproche qu'on pourrait lui adresser d'avoir laissé dans l'ombre des médiements et des médietions, en dissant qu'il est difficile au médecin inexpérimenté ou peu expérimenté de choisir entre toutes les médiedes de traitement qu'on lui propose pour un même cas, celle qu'il pense devoir être la meilleure. Ce travail de sidection, M. Lemoine a cherché à le faire en ne consciliant que l'emploi de médietions particulièrement bonnes, en précisant les cas où chacune d'elles trouve son indication.

La pratique du massage, conférences faites aux écoles d'infirmiers et infirmières des hôpitaux de Paris par M. Frumenis; 1 volume in-18 de 148 pages; Vigot frères, éditeurs.

On rên est plus à démoutrer l'utilité du massage comme moyen témpeutique. Il a ses indications qui se précisent de jour en jour. Hier, exclusivement réservé à l'entorse, il est employé aujourd'hui au traitement de certaines frectures et les résultats qu'il donne font désirer la vulgarisation des enseignements tels que ceux donnés par M. de Frumerie et que celui ei a consignée dans son petil l'est

La cure pratique de la tuberculose, par P. Puiade; 1 volume in-18 de 369 pages; Carré et Naud, éditeurs.

Chaque année la tubereulose fait en France 150,000 victimes. Devant une si effroyable constatation, on se sent pénétré d'inquiétude et de pitié et le besoin grandit d'être éclairés sur les causes de ce mal redoutable et sur les moyens, s'il en existe, de le prévenir ou de le guérir. M. Pujade présente sur la cure pratique de la tubereulose une œuvre écrite d'un style si vivant et si alerte, avec tant de verve et d'entrain que le lecteur s'y trouy comme emporté de page en page et qu'il s'étonne d'y rencontrer, ainsi que se plait à le constater M. Boirae, recteur de l'académie de Grenoble, dans la lettre préface donnée à ee livre, quelques-unes des qualités qui ont fait le succès d'un Alexandre Dunias ou d'un Edmond Rostand. Ce n'est pas qu'un tel éloge soit une critique du livre, car « si l'un ou l'autre de vos confrères, écrit M. Boirac, vons faisait par hasard un crime de n'être ni ennuyeux ni même obscur, sovez assuré que le public ne partagera pas son avis : quelle agréable surprise qu'un livre de médecine tout rayonnant de clarte et tout pétillant d'esprit! »

L'ulcool et l'ulcoolisme, par MM. H. Tribouler et F. Mathieu; 1 volume cartonné in 8º de 250 pages; G. Carrè et C. Nand, éditeurs.

On commence à sérieusement s'émouvoir des progrès faits en France par l'alcoolisme et peu à peu un mouvement d'opinion se dessine en faveur des moyens propres à arrêter ses funestes eflets. MM. Triboulet et Mathieu peuvent donc être assurés qu'un hou accueil sera fait à leur livre où l'histoire de l'alcool, la fabrication des boissons alecoliques dans ses rapports avec la toxicologie et la hybrisologie générale on tété soignessement exposés. Ils es sont attachés à éviter, dans la mesure du possible, les raisons de sentiment, les opianos tendaméciuses appuyées sur les statisfiques suptets à caution et les controverses de tout ordre, celle d'ordre extra-médical an particulier, pour ne s'attecher qu'ox faits. Ils out parfaitement propriet de la consommation de l'alecol et ont étudié avec soin les rang dans la consommation de l'alecol et ont étudié avec soin les moyens repressiés, préventifs et curatifs à appliquer à fallocolisme.

REVUE DES TRAVAUX FRANÇAIS ET ÉTRANGERS

Gynécologie et obstétrique.

De la grossesse triple. — La grossesse triple, qu'il ne faut pas appeler trigemellaire, est extrémement rare puisque les auteurs donnent comme chiffre une grossesse triple sur 8.000 accouchements environ.

Après avoir parcouru pendant près de 10 ans la plupart des maternités de Paris M. Boissard (journal des Praticens 20 decembre 1900) n'a rencentré que deux cas de grossesse triple : le premièr dans le service du Dr Pinard (Laribeisière, 1888), le second, à la clinique du Dr Tamier; le diagnostic degrossesse triple fut fait par le Dr Pinard, dans le première cas, mais la femme meurut subitement au début du tavail; l'extraction des trois enfants vivants fut pratiquée par la sage-femme de garde, Mie H. Carrier; le fait eut méme les honneurs de la publicité de la presse extra scientifique.

En quarante ans, à la Clinique obstétricale de Strasbeurg, on n'ebserva que deux cas de gressesse triple.

Par une singularité extraordinaire, et par un de ces hasards comme la clinique seule nous en réserve, l'auteur vient d'observer dans sen service à la Maternité de Tenon quatre cas de grossesse triple en moins de 18 mois dent deux dans la mêma sempia. Il a va qu'en général l'accouciement es facilo, mais, malgré la petitesse da fetus, il ivest pas rare qu'on soit obligé d'intervenir, soit dans l'intérêt de la mère (syncope, suffocation), soit dans l'intérêt des enfantsqui se présentent simultanément au détroit supérieur; enfin les cas de procidence du cordon on des membres ne sont pas rares, et si l'on pratiquo l'extraction; il est nécessaire de ne preadre qu'un pied, pour ne pas securer des tractions, après avoir saisi les pieds appartenant à deux fetus differents.

Malgre la fréquence des hémorrhagies (utérus surdistendu). Pextraction du ou des placentas est en général facile la masse placentaire est parfois énorme, 1,220 gr.; parfos la délivrance se fait successivement; sortie du premier placenta, puis sortie du second quelque temps après; l'important est de ne pas so hâter, do se rendre compte de ce qu'on fait, et du pourquoi on lo fait; l'examen minuiteux de l'arrière faix est d'une importance capitale, tant au point de vue de la configuration des oufs. m'an point de vue des suites de concles.

En raison de l'accouchement prématuré qui est de règle pour ainsi dire, le sort des enfants est assez compromis, mais avec du soin, uno surreillanco de tous les instants, on peut arrivre à des résultats surprenants; si on no tient pas compto des enfants pesant 850 gr., sur 8 enfants ués vivants dont le plus petit pesait 1220 gr., sept sont partis vivants et bien portants du service; un seul (1,750 gr.) est mort de broncho-pueunonie; dans sa clientèle particulière M. Boissard a pu élever un enfant qui pesant 1,240 grammes à sa naissance, était tombé à 910 gr.

Maladies des enfants.

Cure de Quinquaud (emplâtre au calomel à demeure) daus la syphilis de l'erafaut. — L'application d'un emplâtre à base mercuriolle, principalement au calomel, à l'exclusion de tout autre traitement, en particulier de tout traitement interne peut, dit M. Gillet (Journal des Praticiens n° 39, 1900), suffire à elle seule à la cure de la syphilis, ainsi que l'a démontré Quinquaud (1890). L'absorption du mercure a lieu, à la fois par la peau et par les poumons, par suite de la volatilisation d'une partie du produit.

L'emplatre de Quinquaud so compose de :

Emplatro diachylon des hôpitaux	3000 parties
Calomel à la vapeur	1000
Huile de ricin	300

Etendre sur des bandes de toiles ; chaque décimètre carré de l'emplatre obtenu doit contenir environ 1 gr. 20 de calomel.

Ches l'adulte on applique des morceaux d'emplaire de 0 m. 10; de 0 m. 12 chez l'hommo; de 0 m. 10 ches la femme; chez l'enfant il faut des surfaces, nou proportionnellement, mais absolument plus étendites que chez l'adulte, soit 0 m. 10 sur 0 m. 15; 0 m. 15 sur 0 m. 20 ou 0 m. 30, des les premiers mois.

Tous les huit jours, sur la peau bien propre, on applique l'emplâtre à l'enfant en demi-ceinture, une fois en arrière, l'autre en avant et ainsi de suite tant que doit durer le traitement.

Lorsqu'on enlève l'emplatre, au bout de la semaine, on trouvo l'épidermo légéroment macéré, mais sans trace d'inflammation ni au-dessous, ni autour du point d'application.

Le traitement de l'influenza chez les enfants, par A. Jacon (Medical News, 15 décembre 1900).— On a recommandé à titre prophylactique l'huilo de foie de morue (Ollivier), le sulfure de calcium (Greene), le sulfate de quinine. Quand la maladie est constitué o il n'y a point de médication vraiment spécifique. Le chlorhydrate d'ammoniaque, le carbonate de potasse, le sulfo-carbonato de potasse, l'acido phénique, l'ichtyol ont évi recommandés sans que leur emploi soit suivi de succès. Il faut avoir recours à un traitement rationnel, hygiènique, symptomatique et tonique. On commencera par administrer au patient une dose purgative de calomel pour débarrasser l'intestin de ses microbes et de ses toxines, car il est le plus touché chez les jeunes enfants. Le malade est mis a ult it et à

une alimentation légère et liquide: lait, légumes, farines, eau, limonade et bouillon. Les œufs peuvent être permis, ainsi qu'une légère quantité d'alcool.

Si la température est élevée, l'eau froide n'est point indiquée. La toux est augmentée par l'immersion ou l'enveloppement dans l'eau froide; le bain chaud, au contraire, est indiqué centre les deuleurs musculaires et l'insomnie.

Parmi les médicaments, la quinine occupe le premier rang, son action bienfaisante a été signalée par Dujardin-Beaumetz, Teissier, Carrière, Pibraux, Mossé, Filatew, Toutefois, Lichherts, Traujen et Borrie la considérent comme contre-indiquée. S'il existe des vomissements, il faut prescrire la diéte et l'alimentation retale.

Quand la température est élevée et que les bains sont impuissants il faut avoir recours à la phénacétine que l'auteur préfère à l'acétanilide trop toxique, à l'antipyrine pouvant avoir des effets désastreux sur le tube digestif, le système norreux et circulatoire, la peau et les nuqueuses. La phénacétine sera prescrite chez les enfants à la dose de 15 milligrammes à 3 contigrammes. La salipyrine est mieux tolérée que l'antipyrine. Le salophène est vanté par Drewes (de Hambourg).

Chez les enfants, le oœur doit être surveille; les accidents de faiblesse cardiaque sont justiciables de la caféine (0°°. 00 salicylate ou benzeate de soude caféine); du sulfate de spartéine (5 contigrammes pour un enfant de deux ans); s'il y a de l'excitation cérébrale, il estime que le camphre à la doct de décigrammes deit être préféré. Un des meilleurs stimulants que l'on puisse prescrire dans les cas urgents est le muse (10 à 20 minimes chaque demi-heure de tenture à 10 0/0).

L'Administrateur-Gérant : O. DOIN.



L'hygiène des che`Migs_de_ffr.— Le professeur Manasseine.— La médecihe ut théâtre.— Annoblissement de Behring.— Le groupe médical à la chambre.— Conférences sur les stations balnéaires et sanitaires.— Le pronostic éloigné des ménincites cérèbre-suinales.

Enfin, ou s'est décidé à preserire par déeret que les personnes atteintes visiblement ou notoirement de maladies dont la contagion seruit à redouter pour les voyageurs pourront être exclues des compartiments affectés au public. Les compartiments dans lesquels ces malades auront pris place, seront des l'arrivée, soumis à la désinfection. Le même déeret rappelle que dans les salles d'attente uinsi que dans les voitmes, il est défendu de cracher ailleurs que dans les reachoirs disposés à cet effet. Enfin il est spécifié qu'à des garcs désignées, les compagnies entretiendront les médicaments et movens de socurs nécessairs en cas d'accident.

. * ..

Manasseine, clinicien émérite, vient de succomber à la thrombose des vaisseaux cérébraux. Il a inspiré de nombreux travaux à ses élèves qui avaient une véritable vénération pour lui.

Pendant sen professorat, il avait refusé de faire de la clientèle en ville donnant tout sen temps à ses malades de l'hôpital qu'il venait voir régulièrement deux fois par jour. Estimant que l'on doit toujours laisser la place aux jounes et quo les professeurs ne doivent pas s'étorniser dans leurs chaires, il avait donné après vingt-cinq ans de profes562 BULLETIN

sorat sa démission, quoique étant en pleine activité scientifique.

Il ya 21 ans il fonda le Wratek un des meilleurs etdes plus anciens journaux de médecine russe. Malheureusement il va disparaitre avec son rédacteur en chef, car d'après la volonité de celui-ci la publication du Wratek ne sera continuée que jusqu'à la fin de l'année.

_ * .

Dans uno comédie qu'il fait jouor au théâtre Antoine, M. Brioux aborde une question médicale d'un haut intérêt social, la question de l'allaitement par la mère. Il fait paraitre deux médécins: l'un mondain sacrifiant ses principes aux désirs do ses clientes; l'autre campagnard, mais observateur. Lui, combat l'habitude coupable des mères de famille de confier leurs enfants à des remplagantes, à des nourrices.

Cette habitude est d'autant plus blâmable que la mère est bies charges et les ennuis de l'allaitement. M. Brieux montre les dangers de l'allaitement mercenaire pour tous et pour tout, pour la mère, pour l'enfant, pour la nourrice et c'est avec raison qu'il réclame la loi de protection de l'enfance qui veut qu'une nourrice no puisso se placer comme mercenaire que lorsquo son enfant aura 7 mois au moiss. Eu combattant la coutume dangereuse de l'allaitement mercenaire, M. Brieux lutte et il faut lui en savoir gré, contre une cause de la dépopulation, la mortalité infantile.

* * :

C'est toujours avec uno bien vive satisfaction que l'on voit la scioaco honorée. On no saurait donc trop applaudir à la distinction que l'empereur d'Alleimagne, à l'occasion du bi-centenaire de la monarchie prussienne, vient de concéder à un certain nombre d'hommes éminents parmi lesquels se trouve M. Behring, directeur de l'institut d'hygiène de Marboure, M. Behring a été a nanobli et investi en outre du droit

héréditaire de siéger au Sénat, faveur qui n'est accordée qu'aux familles d'ancienne noblesse.

. * .

Le groupe médical des chambres vient do se reconstituer au Palais-Bourbon. Cegroupe est formé par les députés et sénateurs médecins. Il s'est réuni récemment sous la présidence de M. Cornil. Après discussion, le groupe a décidé de faire aboutre la proposition Combes, votée par le Santa, et qui a pour objet de faire disparaître l'incompatibilité qui existe actuellement entre les fonctions de mèdecin de l'assistance publique et le mandat de consoiller général.

. * .

Le syndicat général des médecins des stations balnéaires et sanitaires de la France a adopté avec empressement l'idée que M. le baron d'Estournelles, député de la Sarthe lui a suggérée de créer un certain mouvement dans notre pays par des conférences qui seraient faites par des professeurs de grande réputation et dans les principales villes et centres importants. Ces conférenciers évitant toutes les questions politiques, personnelles ou locales, s'occuperaient exclusivement des intérèts nationaux, purement économiques. La France étant un des pays les plus riches en eaux minérales, on ferait comprondre aux liabitants l'intérêt qu'ils ont dans la prospérité de ces stations, qu'ils doivent tout mettre en œuvre pour y attirer les nationaux et les étrançers.

L'opinion , publique aiusi mise eu éveil, chercherait les moyens propres pour exploiterconvenablement ces ressources nationales et forcerait ses élus au conseil municipal d'abord, puis au conseil général, enfin à la Chambre et au Sénat à s'occuper de ses propres intérêts au lieu de faire de la politique pure qui ne sert qu'à diviser et appauvrir le pays.

Et comme première manœuvre de ce mouvement à créer, M. Albert Robin annonce qu'il a fait remettre et appuyer par M. le baron d'Estournelles au Ministre des travaux publics 564 BULLETIN

une lettre où il demande que pour certaines villes d'eaux des Pyrénées, de la Savoio, et des Vosges les compagnies de chemins de fer avancent la date du début des services d'été : que pour quelques villes d'eaux des Pyrénées et de l'Auvergne la durée des trajets soit abrégée grâce à la suppression ou au raccourcissement de certains arrêts; que sur tous les trains se rendant aux villes d'eaux, le confortable des mouons soit augmenté. Il serait enfin très désirable que les communications directes entre les direrses stations balnéaires soient facilitées pour l'accomplissement de la « eure complémentaire » qui est aujourd'hui très répandue dans tous les pays de langue allemando sous la désignation de Nach-Cur et qui consiste après la cure normale de l'organo, primitivement affecté. dans une cure consécutive des organes secondairement intéressés ou de l'état général (anémio, lymphatisme, arthritisme ete...)

. * .

La méningite cérébro spinale est-elle susceptible de guérir sans laisser après ello des troubles nerveux. MM. Chauffard, Marcel Labbé et Castaigue et Netter sont à ce sujet affirmatifs.

Ce dernier rapportait en 1900 l'histoire de sopt malades guéris. Trois ont été perdus de vue et lour observation ne saurait plus être utilisée. Trois autres ont été revus; des renseignements précis ont pu être recentillis sur un quatriene. La méningite, dans ces quatres cas avait débuté une fois en décembre 1809, une fois en mars 1900, deux fois en avril de la même année. Il s'est donc écoulé un temps suffisant entre quinze et dix mois, depuis le début de la méningite. Eh bien il résulte de l'observation minutiouse de ces sujets que la guérison compléte o s'est máintenue.

Entre ces cas de guérison complète et ceux de mort, il existe des observations dans lesquelles la méningite a été suivie de désordres persistants plus ou moins graves. De ces faits ou peut cependant dire que les complications qui aggravent le pronostie éloigné ont toujours apparu au cours même de la période aigué, et que, loin de s'accentuer, elles ont le plus souvent témoigné d'une tendance marquée à l'amélioration.

Ces preuves d'ordre exclusivement clinique sont déjà singulièrement convaincantes; les preuves apportées par
MM. Labbé et Castaigne, tirées de l'examen du liquide céphalorachidien, sont peut-être plus démonstratives encore. Il semble que la dispartiton graduelle des polyaucléaires annonce
l'évolution de la méningite cérébre-spinule vers la guérison
et que leur réapparition doire faire craindre une reclutue. On
peut en tout cas affirmer la guérison de la méningite lorsque
la formule leucocytaire du liquide céphalo-vachidien est redevonne normale.

THÉRAPEUTIQUE MÉDICALE

Délire salicylique

Par M. Raymond Bernard,

Médecin-major de 1^{re} classe, répétiteur à l'Ecole de service

de sante militaire.

Si l'observation suivante n'ajoute rien à la seméiologie de l'intoxication par le salicylate de soude, elle peut du moins servir à en éclairer la pathogénie. Les médecins qui ont eu l'occasion d'étudier ces accidents ont envisagé les responsabilités respectives du médicament et de la prédisposition nerveuse sans les préciser. Les faits jusqu'ici publiés ne se prétaient guère à cette analyse : dans celui-ci les éléments mis en cause ont gardé leur individualité dans l'action commune assez pour qu'on puisse faire le étépart.

Un brigadier du 14° escadron du train, B..., prend froid, le 23 novembre 1899 en montant la garde : frissons, lassitude, malaise général. Il se couche; le soir, il a de la fièvre (39°,5), de l'oppression, il est très abattu et ne peut manger ; soulagé par des ventouses sècles, il passe tranquillement la nuit. Le lendeman il entre à l'infirmerie où il passe quelques jours sérieusement indisposé par de la dyspnée, des maux de tête, des vomissements, une fièvre légère, de l'inapoétence. Il ne se rappelle pas avoir en mal à la gorce.

La persistance de cet état amène le malade à l'hôpital.
Dès son arrivée (3 décembre) il se trouve mieux, la fièvre,
l'oppression et les maux de tête se dissipent. Le malade
nous semble affaibli, anémié, fatigué, et c'est ce qui me
décide à le garder, car nous ne trouvons ancune localisation
morbide. Le pharynx est un peu rouge, la langue sale, l'appétit reste médiocre : mais le ventre est souple, indolore,
sans taches rosées. Selles régulières. Séro-diagnostic négatif. Ni toux, ni expectoration. L'examen méthodique de
l'appareil respiratoir en y montre rien d'anormal.

Le cœur bat régulièrement (P. 72). On ne constate aucun souffle. — Pas de glycosurie, pas d'albuminurie. Aucun symptôme nerveux.

À son entrée, B... a montré dans les poils de sa barbe, à gauche de son menton, une petite croûte molle qui pouvait être de l'herpès, qui ressemblait plutôt à de l'impetigo et qui a guéri en quatre ou cinq jours.

Le 12 décembre, B... toujours déprimé mais point malade est pris subitement, dans l'après-midi; d'un point de obté à droite. Pas de frisson, mais de l'oppression et un foyer de rales sous-crépitants extrèmements fins et serrés un peu en dehors de l'angle de l'omoplate droite. L'ascension brusque de la température me fait craindre une pneumonie. Pas d'expectoration.

Le 13 décembre, le point de côté, les râles sous-crépitants et l'oppression ont disparu pendant la nuit; mais de vives douleurs ont apparu dans le membre supérieur gauche : l'épaule, le poignet et les doigts sont immobilisés, tuméfiés. A la main cette tuméfaction diffuse, blanc rosé, avec quelques marbrures d'un rose plus vif, l'endolorissement, l'aspect des doigts en fuseau sont typiques : il s'agit d'une attaque de rhumatisme articulaire aigu-franc; traitement : application de salicylate de méthyle, 12 grammes. Il n'y a pas d'albuminurie.

Le 14 décembre, pas d'amélioration; au contraire le rhumatisme toujours mieux caractérisé a crivahi les articulations des deux genoux et des deux cou-de-pied et les gaines tendineuses voisines. Rien d'anormal aux poumons, le cœubat à 116 sans bruits adventices. Pas d'albuminurie. Je crains que le salicylate de méthyle ait été mal appliqué. mais l'imperméable se trouve bien ajusté, le pansement r'a pas été dérangé. Nouvelle application de 12 grammes.

A la contre-visite je trouve B... plus fatigué, plus agité et plus souffrant. « Les douleurs ne sont pas calmées du tout, dit-il, elles ne font qu'augmenter. » L'application du salicylate de méthyle paraît avoir été bien faite, néanmoins, n'ayant pas une longue expérience du médicament, je doute qu'il ait été absorbé; sans enlever le pansement, je prescris une potion de 10 grammes de salicylate de soude qui devra être prise par fractions jusqu'à 10 heures du matin. La sour du service surveille d'habitude cette médication; mais elle est subitement appelée ailleurs et remplacée avant d'avoir fait ses recommandations. A cinq licures du soir, B... avale d'un traît les 10 grammes de salicylate.


Le 15 décembre, B... est très sourd, il faut crier dans ses orcilles pour se faire comprendre; il n'entend pas la montre appliquée à ses orcilles. Il nous raconte qu'il a transpiré abondamment pendant la nuit, on a du le changer de linge au réveil, les douleurs ont disparu, mais il ne se trouve pas très bien; il n'explique pas son malaise; il ne souffre plus du tout, cependant il ne se croit pas guéri. La quantié d'urine est notablement acorne, très lécer disme d'albuminurie. Salicylate de soude, 8 grammes. Ergotine, 4 grammes.

A la contre-visite cet état ne paraît pas modifié. Il n'y a plus traces de douleurs, ni même de surdité, mais B... n'est pas satisfait. Je lui parle sans élever la voix, et aussi à voix basse pendant quelques minutes, il paraît distrait. Il répond correctement à mes questions; mais il garde ses veux fixés devant lui, il finit par me dire qu'il voit des fantômes. Depuis environ deux heures il regarde passer en l'air des animaux fantastiques, des dragons tout dorés et des hommes avec des casques et des lances : c'est un cortège sans fin qui défile devant lui de droite à gauche, il n'est pas dérangé, il est intéressé parce spectacle, il me dit de luimême que c'est « la maladie qui fait ça », il n'a pas la moindre conception délirante. - Il a pris a peu près la moitié de sa potion, je supprime le reste et recommande à l'infirmier de garde d'observer B,.. pendant la nuit, moins par inquiétude que par euriosité.

je trouve le médecin-chef occupé avec mon collègue de semaine et le médecin de garde, à ranimer B... agonisant. Le malade semble un peu mieux sous l'effet des injections de sérum, mais il était très bas tout à l'heure; le pouls se relève, mais il a été presque imperceptible : la respiration se relève aussi mais elle menacait de s'interrompre. Les extrémités et les lèvres ont encore une teinte cyanotique. Le malade est sans counaissance depuis plus d'une heure. Après une nuit très agitée par des rêves pénibles, coupès

Le 16 décembre, à huit heures, en entrant dans la salle

de eris, un vrai délire, s'est manifesté vers quatre heures du matin. B..., assis sur son lit, les yeux grands ouverts, hagards, voyait des hommes qui voulaient le saisir. Ce qu'il disait était très incohèrent et indistinct, il criait souvent « Au secours! Au secours! on veut m'emmener... » Cette agitation n'a fait que croître jusqu'à cinq heures, puis le malade s'est renversé dans son lit, se débattant, repoussant ses couvertures des pieds et des mains, tombant enfin dans des convulsions et dans une sorte de tremblement clonique. Une accalmie a suivi l'administration d'une injection de morphine (1 centigr.) et d'une injection de sèrum artificiel (400 gr.) par le médecin de garde. A six henres les accidents reprennent : flux de paroles incohérentes, agitations, puis convulsions et tremblement, enfin prostration



avec menaces de collapsus, la respiration d'abord pénible se ralentit, le pouls s'est élevé à 120 et plus, et il s'affaiblit. A sept heures, le malade est conateux; il ne répond à aucun appel, les yeux fermés ou entr'ouveris restent vagues, les pupilles sontcontractées et immobiles, on voit les extrémités se cyanoser.

On pense à du rhumatisme cérébral, à une intoxication qui paraît inexplicable (le malade n'a pas vomi, on fait sans résultat le lavage de l'estomae), puis à de l'urémie (on sonde la vessie, on la trouve vide et l'infirmier-major de service rend compte que l'urine de la veille était légèrement albinnieuse). Cette hypothèse étant la plus vraisemblable, elle inspire le traitement : inhelations d'oyygène, saignée de 400 grammes suivie d'une injection de sérum (1,200 gr.), glace sur la tête. On se tenait prêt à faire de la respiration artificielle; la situation pourtant s'est améliorée, laissant emoore les assistants très inquiets à cause de l'incertitude du diagnostie. Il n'est pas sûr que la méningite doive être exclue, et d'autre part, on auscultant le eœur, M. Marcus a constaté un gros souffle de la pointe et il se demande si l'origine des désordres eérêbraux n'est pas là. Les rensei-guements que je donne ne dissipent qu'imparfaitement les doutes.

A neuf heures, la cyanose a disparu, le pouls est descendu à 80, il est ample, la respiration est régulière. En arrangeant le lit du malade on s'aperçoit qu'il est mouillé, l'urine à traversé le matelas et coulé sur le parquet. B... commence à répondre, mais il divague et il a des hallucinations; il ne sait pas ce qu'on lui dit et il réclame son père avec qui il vient de causer, assure-t-il, et qu'il vient de voir passer dans la chambre à coté. Plus tard il me dit encore que son père est venu, qu'il l'a vu, mais son père n'a pas voulu lui par-ler; il se demande pourquoi. La parole est lente, le regard noyé et les gestes incertains comme dans l'ivresse. Vers dix heures, B... demande à uriner, la réaction par le per-chlorure de fer est intense, il y a comme la veille un disque très lèger d'albumine (ergotine, 4 grammes).

A deux heures, B... est dans le même état de délire calme ne causant du reste que si on l'interroge. Pas de surdité. Le pouls est ferme à 80 et il n'y a aueun trouble respiratoire. A huit heures dusoir l'amélioration s'accentue.

Le 18 décembre, le père du malade est venu le voir, il lui a parlé. Mais au moment de la visite B... affirme qu'il ne l'a pas vu, pourtant le père ne s'est éloigné que depuis quelques minutes. B. . est dans le même état intellectuel qu'hier, on le dirait hypnotisé. Indifférent si on le laisse à lui-même, dès qu'on l'interpelle, il répond avec vivacité. Sa parole est brusque et un peu tremblante d'abord. Il n'a acueun entoin de ce qui s'est passé la veille. La réaction de l'acide salicylique est intense. Le œur est normal; maison constate nettement la présence de deux souffles, l'un systolique dans le troisième espace, l'autre diastolique à la pointe.

A la contre-visite, B..., interrogé de nouveau sur son père, me dit qu'il l'a vu, qu'ils out causé et qu'il se sont disputés pour une petite affaire d'intérêt au sujet de laquelle on lui a fait des reproches immérités. B... se dit seulement peiné, il n'est pas du tout agité, mais il n'y a pas un mot de vrai dans ce qu'il raconte. Il ne voit pas de fantômes.

Le 19, après une longue nuit de sommeil, B... paraît revenir à lui, mais il est encore distrait, ahuri, mal réveillé. Il semble avoir tout oublié des journées précédentes, il ne se rappelle pas la visite de son père. Il se plaint de souffrir un peu de la tête et de la région précordiale. Mêmes souffles, même réaction salieylée. Pas d'hallucinations.

Le 20, la réaction salicylée est moins intense, mais très nette. B.., plus conscient, se met au courant de tous les incidents dont il n'a gardé aucun souvenir, il paraît encore très distrait. — Un interrogatoire consciencieux du père nons a fourni les renseignements ci-après:

Antécèdents héréditaires. — Les grands-parents dans les deux lignes sont morts très vient, ils n'étaient pas una lades. La mère de B..., agée de 47 ans, a eu la fièrre typhoïde, elle a été opérée deux fois à la Charité de Lyon (abcès du sein et plus tard polype de la matrice), elle est assez vive mais très raisonnable et n'a januais eu de maladie nerveuse. Elle n'a eu que trois enfants, deux garçous

et une fille mariće à présent bien portante. Deux tantes maternelles sont mortes tuberculeuses. On ne peut donner plus de détails sur la famille maternelle, Sur sa propre famille le père est moins renseigne, il ne peut parler que de ce qui le concerne personnellement ou de ce qui concerne ses enfants. Il est très vif. très irritable, il n'a en qu'une maladie à trente ans, des rhumatismes (douleurs dans les membres avec fièvre; les douleurs étaient surtout localisées à la jambe gauche en arrière et s'étendaient à la fesse (sciatique ?)) Il mone une vie regulière, il n'a iamais fait aucun excès, il est intelligent. Dans son enfance, à l'occasion de légères indispositions et plus tard au cours de ses rhumatismes il a déliré. Son fils cadet, frère de B.... est sujet à des « canchemars, on l'a trouvé quelquefois la nuit debout dans sa chambre, il bougeait les moubles. il parlait, et il avait les yeux ouverts, mais on voyait bien qu'il était endormi », on le calmait facilement, mais deux fois (une fois parce qu'il avait mal à la gorge et l'autre fois sans motif), il a eu de vrais accès de délire; il courait dans la maison, criant: « Papa! papa! au secours! on vent m'emmener! retiens-moi! »

Antécèdents personnels. — Rougeole dans la première enfance. A onze ans influenza (?), cette maladie a duré quinze jours, mais pendant deux mois à la suite, tous les jours, B... était pris de vertiges avec sueurs froides, il voyait tourner les objets autour de lui et il était obligé de s'appuyer pour ne pas tomber. Plus tard ces vertiges sont devenus plus rares; il les avait uneou deux fois par mois; il en a eu seulement deux ou trois dans ses deux premières années de service. A seize ans, il a eu comme son père des rhumatismes (fièvre avec douleurs dans les jambes, le moindre contact était inspportable), pendant la nuit il avait des fraycurs, il criait: « Au secours! au secours! on veut

me faire mal », et il voyait des hommes. Ce délire a duré trois ou quatre jours. Les parents soignaient seuls leur enfant, ils n'ont pas appelé le médecin, ils n'ont pas administré de médicament. Pas d'antécédents vénériens. B... est très sobre, sans mauvaise habitude.

Le 21, B... se trouvant très amélioré, on fait un examen méthodique de son système nerveux. B.,, est bien constituć (taille 1m.71, poids 69 kilogr.); on ne lui trouve aucun stigmate de dégénérescence, aucun trouble de la motilité volontaire ou reflexe (le reflexe pharyngé nul), aucun trouble de la sensibilité, le champ visuel n'est pas rétréci. L'intelligence est assez ouverte et cultivée; mais B... a encore de la peine aujourd'hui à fixer son attention, il n'a gardé aucun souvenir des journées précédentes: il sait seulement et très vaguement que son père est venu le voir. Il ne souffre plus du tout. Les souffles cardiaques persistent, le premier systolique, avec ses caractères, le deuxième remplacé par une sorte de dédoublement : tous ces bruits s'évanouissent quand le malade s'assied. Urines, deux litres. Albumine, néant. Acide salicylique en faible quantité. Réaction de Testevint positive.

Le 22, B... est tout à fait remis. Il a repris son appétit. Son intelligence est tout à fait normale, mais il n'a aucune idée de ce qui s'est passé entre le 14 et le 17. L'acide salievijone a disparu.

Depuis, l'amélioration ne s'est pas interrompue. Pourtant, le 6 janvier 1900, l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce droit a été le siège d'une petite poussée douloureuse avec œdème rosé et empâtement qui a cédé à une seule application du salicylate de méthyle.

Le 18 janvier, B... quitte l'hôpital avec un congé de convalescence de deux mois. A cette date les souffles extracardiaques persistaient.

Ce que l'on sait de l'intoxication salicylée permet d'at-

tribuer à l'action directe du médicament les symptômes ci-après; on les trouve mentionnés dans presque tous les cas:

- io La cessation des douleurs (métastase);
- 2º La surdité:
- 3º Les hallucinations visuelles ;
- 4º La dyspnée, le collapsus, l'incontinence urinaire, moins habituels, font néummoins partie des symptômes réguliers. Leur contingence dépend du degré de l'intoxication.

Quant au délire il est constant et il est, lui aussi, nécessamment liè à l'intoxication qui le provoque. Est-il le fait de la seule intoxication? Chez un malade sujet à des accès spontanés de ce même délire, il est plus logique d'admettre que l'intoxication, par les hallucinations, appelle le déure et que chacun répond selon ses prédispositions, selon son idiosyncrasie personnelle ou familiale. Dans le cas particulier il est difficile de domer à cette prédisposition une formule précise, hystérie, épilepsie ou psychose, muis la tare névropathique est incontestable et c'est ce qu'il importait le plus d'établir.

Incidemment on peut encore noter dans cette observation:

1º A l'actif des composés salicylés leur action analgésique et autithermique si remarquable, mais celle-ci éphémère, puisque la courhe thermique après une apyrexie de trente-six heures a di remonter pour compléter une sorte d'évolution cyclique. Ce n'est pas ainsi que la quinine agit contre le parasite du paludisme et ce serait peut-être une raison pour croire que la spécificité du salicylate, comme on l'à dit, porte moins sur l'agent pathogène lui-même que sur ses toxines, si, d'autre part, le retour offensif du rhumatisme après une dizaine de jours, puis sa disparition subite et délnitive sous l'action du spécifique, ne rappelaient ce qui s'observe couramment chez les paludéens insuffisamment tratiés. Ceci confirme l'opinion classique sur la nécessité de prescrire une dose maximum de salicylate et de la soutenir par le renfort quotidien des doses décroissante;

2º A l'actif de l'ergotine, son efficacité comme antagoniste physiologique de la surdité salicylique (1). Comme antidote elle est nulle.

THÉRAPEUTIQUE EXPÉRIMENTALE

Action de l'eau, du sel, du bouillon, du bicarbonate de soude sur l'estomac (2).

> Par M. V. Frémont, Médecin de l'Hópital thermal de Vichy.

En avril 1898, au Congrès de médecine de Montpellier, j'ai fait connaître les résultats obtenus sur l'estomac isolé (3) par le vin, la gontiane, le condurange, le colombo, le quassia amara, le tréfle d'eau, le houblon, le chardon bénit, la pilocar-

Paul Marais, Delire salicylique dans le rhumatisme articulaire aigu. Thèse de Paris 1900. — Schilling, Gaz. méd. de Paris, 1883, p. 235.

⁽²⁾ Soc. de Ther: du 27 mars 1901.

⁽³⁾ Estomac isolé de l'ossophage, mais ayant tous ses vaisseaux et tous ses nerfs pacumogastriques et sympathiques.

pine, enfin le simareuba. Permettez-moi de vous rappeler que ce dernier, à la dose de 157,44, a déterminé une gastrite hémorrhagique intense chez 12 animaux sur 14.

Aujeurd'hui, je vais veus exposer les effets preduits sur la sécrétion de l'estomac par l'eau, le sel, le bouillou et le bicarbonate de soude.

Pour toutes ces recherches, j'ai procèdé de la manière suivante. La nourriture et la boissen des animaux leur sont retirés à 8 heures du soir. Le lendemain matin, entre 4 h. 30 et 5 heures, ils sont invités à sauter sur une table. Dans cotte position, l'animal étant sur ses quatre puttes, l'estomac est vidé. Une heure après, il est encere évacué. A ce monont, la substance en expérience est intreduite. Une heure après l'estomac est vidé. L'analyse de la sécrétion pendant l'heure qui a précédé l'intreductien de la substance, et celle qui la suit, permet de voir l'action sur l'estomac.

Il y a eu une légère variente peur le bicarbonate : il a oté laissé vingt minutes dans l'estomac, puis retiré. La sécrétion est encore retirée quarante minutes après pour être analysée. Ces deux quantités réunies donnent l'action pendant une heure.

Les substances employées aux doses qui seront indiquées, étaient dissoutes dans 100 centimètres cubes d'eau à 38 degrés, qui servaient à faciliter leur intreduction dans l'estomac.

Vous serez sans doute surpris du nombre d'expériences que je veus paperte ; mais je vous assure qu'elles ne sent pas trop nombreuses. L'estomac d'un même animal subit des variations de secrétions assez grandes pour rendre nulles toutes les expériences qui seraient faites avec un en doux animaux. Je veus apperte les tableaux qui contiennent en chiffres les résultats.

Toutos les quantités trouvées sont exprimées en milligrammes d'acide chlorhydrique, même les chlerures et le chlere total.

La lettre H, représente l'acide chlorhydrique faiblement cembiné. La lettre C, représente l'acide chlorhydrique fortement combiné;

La lettre F, les chlorures fixes, et la lettre T, le chlore total.

Vous verrez combion j'ai raison d'insister sur ce point: il faut prendre un grand nombre d'animaux pour éviter les erreurs dues aux variations de sécrétion qui tiennent à des causes que nous ne pouvons empêcher, ni doviner le plus souvent.

Action de l'eau distillée sur l'estomac.

L'action de l'eau distillée sur la sécrétion de l'estomac mérite d'êtro étudiée avec soin, parce que les divers médicaments sont dissous dans l'eau et qu'il est impossible de fur la part de leur action si on n'a pas pris soin d'établir celle de l'acti

J'ai introduit 100 centimètres cubos d'eau à 38 degrés dans l'estomac de 20 animaux à estomac isolé; la même quantité à 50 degrés et à 2 degrés à 10 animaux.

Los tableaux ci-joints contienuent tous les détails de mes expériences.

L'eau excite la sécrétion de l'estomac : cette excitation porte sur tous les étéments : acide chlorhydrique et chlorures. Toutofois, l'augmentation porte nu peu plus sur les chlorures et sur l'acide chlorhydrique faiblement combinés, ou H.

et sur l'acide chlorhydrique fablement combinés, ou H. Les différences d'excitation produites suivant la température sont pou marquées; sans doute, parce que les 100 centimètres cubes d'eau se mettent rapidement à la température du corps de l'animal.

L'excitation est moins forte lorsque l'eau est à 50 dogrés.

De plus, la sécrétion a une certaine tendance à devenir plus muqueuse, plus épaisse avec l'eau froide qu'avec eau chaude.

EAU A 38

- 1	8	−် ဝ်၈၈ လ လ
Ξ.	2	20588
de	.=	10-40
ume	=	e = 4 = 8
igna	9	5.588
ı mil	12	00000
iee ei	4	2 - 5 2 2
prim	2	おるに数器
ın, e2	12	00 40 to 50 to
e.Leo	=	85248
ion d	2	21.6883
duct	. 6	e 25 th th th
"intr	*	# 0 io 10 on so 10
eqq.	-	r x @
pre s	9	2 . 12 8 8
qui e	10	= 4 5 6 2
eare	4	6. 6. 1. 21 E
nt Uh	m	2 8 2 ° 2
enda	2	a 31 13 2 2 2
ion p	-	8 = 3 章 章
Sécrétion pendant l'heure qui a précédé l'introduction de l'eau, exprimée en milligrammes de HCL		E C E E E E E E E E E E E E E E E E E E

		Se	Secretion		sendant Theure	t Uhe	ure (Jui a	qui a suici		l'introduc	ction	de	lean.
-	2	m	*	20	9	1	-	о.	2	=	- 52	2	3	152
ខម្មខ្ម	13 1- 31 13 13	6 1 6 2 5	8 = 2 E	21 22 25 25	ឧ≒ខ⊏ឡ	- E 31 B B	1: 0 8 8 8	0 2 2 E E E	8 to 1- \$ 13	ខាខាឌមីក្	36848	製品は製品	22 24 25 5	% % - ₹ N
	-													

1		
	Ponu : P = 424	F=1.783
	decide Fintroduction de l $\mathbf{H}+\mathbf{G}=348$	H + C = 1.107
	nt l'heure qui a pr C=78	G=247,5
	Ces 20 animaux ont sécrèté pendant l'heure qui a précédée l'introduction de l'eau : $\Pi=270 \qquad C=78 \qquad \Pi+C=388 \qquad F=421$	Et pendant l'heure qui a suivi : If == 839,5

T== 72

T=1.7 36

F = 968

G=117

Sécrétion pendant l'heure qui a précédé l'introduction de l'eau exprimée en milligrammes de HCI. EAU A 50°

8 2
_
٠
ıs
4
8
2
-

	Seore	etion pena	lant Phou	re qui a	suiri l'in	Sécrétion pendant Pheure qui a suiri l'introduction de l'eau.	r de Cear	4.		
	-	2	8	4	so		,	8		2
Н	8	2	31	*	=	12	191	6	13	=
C=	5	53	t-	25	2	6	13	Ŀ	Ŀ	2
C =	25	86	8	64	š	15	5	98	21	21
P	103	92	13	3	83	28	116	3	9	95
T-2		£	Į.	Ξ	137	2	303	21	71	æ
							4.000			And the colours of Malach
Sécrétion avant	nt :									
	H=640	3	92	H+ C= 680	099	F = 615	H	T=1.375		

Sécrétion pendant l'heure qui a précédé l'introduction de l'eau exprimée en milligrammes de HCL.

-	7	69	4	s	9	-	60		2	TOTAL
,	3	-	F	-	,	99	13		1 2	98
-	2		91		. 2	1,6	œ	2	6,5	15
 26	103	43	17,12	٠,	56	18	142	35	8	416
 à	47	435	25	12	22	01	93	58	30	401
 23	150	95	13	9	26	43	8	72	28	817

Starttion sous l'influence de l'eau à 2.

	-	8	80	4	LO.	9	-	80		2	TOTAL
	1		8	a	-	:	8			-	97.
	3	911	60	8		2 :		1	5 1	ā	910
G III	12	8	80	9	0	12	9	5		2	468
п-1-С=	52	137	Ξ	25	Ξ	81	137	500	12	8	359
F =	186	140	153	F	æ	28	99	383	R	103	1.170
T=	623	262	516	53	8	107	133	388	2	139	1.851

Action du chlorure de sodium sur la sécrétion de l'estomac.

Le chlorure de sodium dissout dans l'eau a fait augmenter la sécrétion de l'estomac; mais il ne l'a pas augmentée plus que de l'eau simple soit pour l'acide chlorhydrique faiblement combine H, soit pour l'acide chlorhydrique fortement combine C.

Souvent la sécrétion de chlorures a été diminuée, parfois méme il y a eu absorption si forte du chlorure injecté, que le liquide retiré une heure après son introduction renfermait moins de sel qu'an moment de son introduction. Dans un cas il a disparu ainsi 110 milligrammes.

L'ean salée excite peu l'estomac et on ne peut espérer réveiller sa sécrétion en prescrivant aux malades de manger très salé.

La sécrétion de l'estounae renferme une quantité de chlorures presque constante : elle varie de quelques milligrammes seulement. Si l'estomac est sain, bien innervé, parce que l'état général est bon, etc., il transforme une grande quantité de chlorures en acide chlorAviriaue.

Si au contraire l'estomac est affaibli par la maladie, par une cause quelconque, il sécrète bien encore beaucoup de chlorures, mais, il n'en transforme qu'une faible partie en acide chlorhydrique et ce liquide digère peu ou pas.

J'ai vérifié cette loi des containes de fois sur un très grand nombre de chiens à estomac isolé: pour une même quantité de gastérine ou sue gastrique animal, la quantité de chiorures est sensiblement la même, quet que soit l'animal qui en est l'auteur.

L'acide chlorhydrique varie d'un animal à l'autre; il varie chez le même animal suivant beaucoup de circonstances. Elles me paraissent agir toutes par l'entremise de l'innervation.

ACTION DU CHLORURE DE SODIUM SUR LA SÉCRÉTION DE L'ESTOMAC

1 Solution de 6 grammes par litre :

		L'HEURE précèdé	PENDANT qui a	L'HEURE suivi	то	FAL
	1	2	1	. 2	Avant	Pendant
n= c= n+c= r=	5 12 66 78	11 5 16 50 66	25 35 60 158 T=738	15 23 37 8 608	18 10 28 116 111	39 58 97 466 1.366

2º Solution de 12 grammes par litre

	PE		IEURE QUI	A PRÉCÉ prété	DÉ	TOTAL
	3	4	5	6	7	
11 = G = 11 + G = F = T =	163 6 169 56 225	30 3 .33 30 63	5 2 7 17 24	15 4 19 17 36	39 5 41 46 60	252 20 272 136 408

	PI		HEURE QU duction de			TOTAL
	3	4	5	6	1	
н=	257	82	5	23	95	462
€=	0	0	3	. 8	28	39
H- - C=	257	82	8	33	123	301
F=	7.3	58	30	110	30	21
T=	184	140	30	110	30	214
T'=	1.381	1.310	1.170	1.090	1.230	6.214

T' comprend tout le chlore trouve ; T, le chlore trouvé moins la quantité injectée avec l'eau.

Rouillon

Le bouillon expérimenté était du bouillon de bevul ordinaire, dont une partie avait servi aux usages de la table. Ce bouillon dégraissé, légèrement citrin, reniermait 1º-,20 d'àcides organiques par litre et 5º-,84 de chlorures par litre. Il reniermait donc sensiblement la même quantité de chlorures que la solution faible qui a été expérimentée dans le tableau précédent. Combien coendant les résultats sont différents !

L'acide el·lorhydrique faiblement combiné ou H, disparaît chez sept animaux sur dix: l'acide chlorhydrique fortement combiné ou Caugmente chez tous dans des proportions colossales. Ainsi, H tombe de 456 à 252, tandis que C monte de 38 à 1151.

Ce résultat confirme d'une manière frappante que l'acide chlorhydrique mis en présence d'albuminoïdes liquides se combine avec eux.

Il no reste d'acide libro que lorsque sa sécrétion a été tellement grande qu'elle a dépassé la quantité d'albuminoïdes présente dans lo houillon. Mais je crois qu'il est inutile d'insister; vous avez tous présents à l'esprit ma démonstration de ce fait, lorsque je vous si parlé de la classification des dysopsies.

Le point vraiment important dans l'action du bouillon est son excitation sur la production d'acide chlorhydrique, excitation qui dépasse notablement celle produite par l'eau à 38°. Le bouillon subit une transformation chimique si intense, en une seule heure, qu'il sort incolore cites 5 chicies sur 10. Plus le C a été abondant, plus la décoloration a été grande : celle-ci est paralléle à l'activité de la digestion.

En résumé; le bouillon a use action excitante marquée sur l'estomac; cette excitation s'accompagne de la formation d'une grande quantité d'éléments chloro-organiques. Ceux-ci nourrissent le sujet pendant que la diminution de l'acide chlorhydrique libre soulage [Pestomac.

ACTION DU BOUILLON SUR LA SÉCRÉTION DE L'ESTOMAC

S	Sécretion pendant l'heure qui a précédée l'introduction du bouillon.	pendar	t Then	re qui	z précé	lee l'int	roductie	n da b	ouillon.			
	-	"	69	4	10	9	-			9	TOTAL	
II=	22	9	÷	8	æ	9	=	2	22	75	969	
C=	,	-	-	9	21		-	20	1-	0.	88	
H+C=	63	1-	١-	101	9	2	42	2	8	Z	165	
F=	æ	æ	şş	ş	š	¥	6	71	20	37	12.0	
T=-	8	60	36	Đ.	31	ž	38	35	808	2	Ē	

Sécrétion pendant l'heure qui suit l'introduction du bouillon.

	-	2	es	4	40		-	00	6	9	TOTAL
H=	ä	0	0	0	0	•	0	0	122	76	625
C=	3	35	3	31	55	33	2	8	192	3.	1,154
n+c=	35	25	9	25	io	2	21	8	315	903	1.403
F	28	238	25	984	787	533	38	233	250	193	3.461
T=	685	(34)	452	220	5333	119	929	9	1073	ž	6.891
								-		-	

T = le chlore total y compris celui contenu dans le houillen.

	0 GR, 50	. 30	1 GRAMMB	MME	8	2 GR. 30	S GRAMMES	MMES
F	Avant	Après	Ávant	Après	Avant	Après	Avant	Aprica
	9	181	88	01 01	8	į,	103	909
	28	113	۰	197	21	133	72	19
	908	147	8	361	168	25	114	95
	570		ą	93	18	178	100	6.1
	Şē.	118	ž	968	671	77	ē	8.6
TOTAL	910.1	1.094	282	1.121	531	1.125	741	1.303

Action du biearbonate de soude.

Le bicarbonate de soude employé était chimiquement pur. Il a été dissous dans l'eau, chaque dose introduite dans l'estomac isolé avec 100 centimètres cubes d'eau à 38°. Les doscs ont été 0°,750, 1 gramme, 2°,50 et 5 grammes.

Citaque dose a été laissée 20 minutes, puis retirée. 40 minutes après, l'estomae a étó de nouveau vide L'analyse des liquides retirés après vingt minutes, puis après 40 autres minutes, a permis d'établir quelle quantité de chlore total l'astomae avait sécrété.

Il n'est pas possible de doser exactement l'acidité. Il n'est même pas toujours facile de doscr le chlore total. Sous l'influence du bicarbonate de soude la sécrétion de l'estomac perd sa fluidité, elle devient muqueuse, visqueuse. Elle se mêle difficilement avec le réactif; même en l'étendant d'eau on ne parvient pas toujours à faire un mélange homogène. Cette modification muqueuse de la sécrétion de l'estomac est d'autant plus marquée que la dose de bicarbonate est plus forte, moins diluée et que l'estomac est moins actif. Au reste, c'est une loi générale : moins un estomac est actif, moins il secrète, moins il se défend contre l'action des médicaments. Une même dose de médicaments le modifie d'autant plus qu'il est plus faible. C'est ainsi que lors de la gastrite hémorrhagique provoquée par le simarouba, ce sont les estomacs qui sécrétaient le moins, qui sécrétaient le liquide le moins actif, qui ont été les plus altérés.

50 centigrammes de bicarbonate de soude dissous dans 100 centimètres enbes d'eau calment l'estomae; le chlore total avant son introduction ctait 1,016, après son action il monte à 1006; mais nous avons vu que l'eau distillée seule excite beaucoup plus la séretion du chlore total.

A partir de 1 gramme le bicarbonate de soude excite davantage l'estomac; sans que je puisse dire de combien l'excitation dépasse celle de l'eau, si elle la dépasse. Quoi qu'il en soit, il semble bien qu'il y a intérêt à procéder par doses petites et fractionnées, lorsque nous voulons calmer l'estomac ou le protéger contre l'activité digestive du suc gastrique.

Le bicarbonate de soude est utile parce qu'il neutralise les acides de l'estomac, annibile le pouvoir digestif du suc gastrique, forme une sécrétion muqueuse qui protège les parois de l'estomac, dégage de l'acide carbonique qui calme la sensibilité.

Il ne faut pas dépasser la dose utile sous peine de déterminer de l'indigestion intestinale.

THÉRAPEUTIQUE AU LIT DU MALADE

Traitement de la paralysie générale,

Par M. Albert Rosin.

Le diagnostic de la paralysie générale au début est souvent hérissé de difficultés; et, l'autre jour encore, Jinsistais devant vous sur certains épisodes, certains accidents qui viennent traverser la vie d'un homme jusque-là bien portant, qui disparaissent sans laisser de turces, et pourtant sont les premier indices d'une paralysie générale qui se révèle trois ou quatre ans plus tard.

Il n'en est pas de même chez ce malade que vous voyez couché au n° 20 de la salle Serres. Pour lui, un certain embarras de la parole, l'incohérence de quelques réponses, un léger tremblement des lèvres, la crise de larmes qu'il vient d'avoir, tout cela, joint à la paresse des réflexes pupillaires, nous ont fait affirmer le diagnostic.

Allons-nous en rester la? Nous contenterons-nous de la satisfaction scientifique d'avoir dépisté la maladie, et considérerons-nous ce malade comme perdu à plus ou moins brêve échéance?

C'est bien souvent ce que l'on sc borne à faire; on prescrit pourtant pour la forme un peu d'iodure de potassium, afin d'aider à résoudre les sclevases commençantes; or, je crois qu'il y a mieux et plus à faire pour les paralytiques généraux, et c'est ce dont je voudrais vous sarler aujourd'hui.

Vous savez que la paralysie générale est due très souvent, comme l'a montré Fournier, à une syphilis antérieure. Le traitement spécifique s'imposait, on l'a employé; il a donné quelques beaux résultats, mais dans les formes syphilitiques soules. Notre malade, qui n'a pas perdu la mémoire, nie toute syphilis antérieure; on ne retrouve rien dans son passé: aucune cicatrice, aucune pléiade gauglionnaire ne permet de justifier l'hyphôbés de syphilis.

Allons-nous quand même donner l'iodure 9 Je l'ai fait comme les autres au début; depuis, j'ai cessé, et j'espère vous démontrer que c'est là un mèdicament non seulement inefficace, mais même dangereux dans certains cas.

Il y a quelques années, j'étais appelé à Genère avec M. Magnan pour voir un paralytique général au début que soignait le D' Ladame. On prescrivit l'iodure; au bout de deux mois, iy eut des crises épileptiformes qui furent attribuées à la maladic. Le D' Ladame eut pourtant un soupçon; il supprima l'iodure et les crises du même coup.

A quelque temps de là, un médecin conseilla de nouveau l'iodure de potassium ; les crises reparurent et ne cédérent qu'à la cessation du médicament. Binin, un troisième essai fut suivi des mêmes accidents dans les mêmes circonstances.

Unanaprès, jevoyais, avenue du Bois, un Américain atteint, lui aussi, de paralysie générale; bien que déjà un peu plus méfiant, comme on avait tout essayé, je redonnal l'iodure; trois semaines après, crise apoplectiforme. Le médicament fut cessé, mais repris pendant les vacances, sur les conseils d'un autre médecin; il ramena les mêmes accidents. Il ne s'agitévidemment que de deux cas, d'après lesquels il ne faudrait pas généraliser; mais quand on compare l'inefficacité du médicament avec son darger possible, je crois qu'on peut déclarer qu'il faut être très économe d'iodure dans la paralysis générale.

L'iodure était à peu près la seule indication thérapeutique qu'on pouvait tirer de la notion pathogénique. Cette indication détruite, que reste-t-il?

A mon avis, trois médications.

1º La médication arsenicale, comme modératrice du système nerveax et de la nutrition en général; elle parait en effet indiquée dans une maladie où l'élément nerveux est en état de méjopragie évidente; on peut ordonner deux caillerées à soupe par join de la solution suivante:

```
- Arséniate de soude ...... 0,05 centigr.
Eau distillée ......... 300 grammes.
F. S. A. Solution.
```

2º Les laxatifs, surtout ceux qui congestionnont la partie inférieure de l'intestin, et font ainsi une dérivation utile. Ce sont les drastiques qui répondent lo mieux à ce desideratum.

Voici une formule que j'omploie fréquemment :

Aloės		2 grammes
Résine de jalap	ââ	1 gramme.
Turbith végétal		
Extrait de belladone Extrait de jusquiame	ââ	0,15 centigr
Savon amygdalin		9 s.

pour 50 pilules. 1 à 2 pilules le soir avant le diner.

3º La révulsion eutanée combinée avec la dérivation; ainsi, les pointes de feu sur la nuque, le vésicatoire à distance, au bras par exemple, à condition d'y ajouter un pois qui entretienne une certaine suppuration, enfin le séton trop abandonné aujourd'hui.

l'ai dû à ce genre de révulsion un fort bean succès. Il s'agit d'une dame de 43 ans, atteinte d'une paralysie genérale à forme dépressive. Elle ne sortait plus, ne bougeait plus, mangeait à peine, ne parlait pas; pendant les consultations notament, il était impossible de tirer d'elle aucune réponse. On lui mit un vésicatoire au bras et on le fit suppurer. Deux mois après, elle était déjà beaucoup mieux, mangeait, parlait, sortait en voiture pour prendre l'air. Je ne sais d'ailleurs ce qu'elle est devenue depuis, mais elle a eu au moins une rémission.

Voici done comment nous allons agir chez notre malade; pendant vingt jours par mois, il prendra de l'arséniate de soude; il se reposera les dix autres jours; tous les jours nous lui donnorons une ou deux pilules laxatives; enfin, on lui mettra un séton à la nuaue.

Si nous ne réussisons pas, en tout cas, nous aurons fait une thérapeutique rationnelle, exempte de danger, et qui compte quelques succès relatifs à son actif.

LITTÉRATURE MÉDICALE

Contribution à l'étude de l'acidité urinaire chez l'homme sain et chez les malades,

Les remarquables travaux de M. Joulie sur l'acdité urinaire ne pouvaient manquer d'attirer l'attention des médecins. On a déjà vu que la Société de thérapeutique a consacré un nombre assez considérable de ses séances, depuis l'année dernière, à la discussion de cotte intéressante question. Voici un gros travail, qui fait le sujet de la thèse inaugurale de M. Nicolatid, thèse très importante, car elle ne comporte pas moins de 323 pages! Ces recherches ont été inspirées par M. le D^{*} Dalché, médecin de l'Hôtel-Dieu. Voici les conclusions générales de l'auteur.

On sait que M. Joulie, prenant le rapport de l'acidité au litre établi avec l'excès de densité de l'urine sur l'eau à 0 degré, considère la normale comme représontée par 4 à 5 0/0. Les expériences de M. Nicolaïdi, faites sur les urines de 19 personnes supposées saines, l'amènent à une moyenne journalière de 3.10/0, les urines du matin donnant 3.9 et celles de la journée donnant 2,70/0. Ces chiffres sont intéressants: on peut se demander si l'auteur est en droit de considérer ses malades comme sains, car, pour mon compte personnel, je crois sa moyenne beaucoup trop faible. Il a eu sans doute affaire à des sujets de la ville, habitués à une alimentation azotée exagérée. Les sujets choisis pour type normal par Joulie étaient des Bourguignons campagnards menant la vie des champs, c'est-à-dire la plus rapprochée de la nature. Il est trés intéressant de constater que les urines de la journée. prises en cours de digestion, donnent un chiffre très faible ; cela vient confirmer l'opinion de Joulie, défendue par moimême, que la digostion normalo, non accompagnée de formentations vicieuses d'acides organique, amène un abaissement notable du titre acidimétrique.

Voici d'autres faits très intéressants :

- 1º L'acidité urinairo est très diminuée sous l'influence du régime carné;
- 2º L'acidité urinaire subit seulement une lègère diminution sous l'influence du régime végétal;
- 3º L'acidité urinaire est fortement diminuée sous l'influence du régime lacté;
- 4º L'acidité urinaire augmente notablement sous l'influence du vin rouge, du vin ot de la bière autrement dit avec l'alcool,
- La première de ces conclusions confirme absolument ce que j'ai dit sur la nocivité du régime carné, par suite de l'alcalinisation humorale qu'il détermine ; je suis donc très satisfait

de trouver eette constatation dans une longue série d'expériences.

La dernière conclusion démontre que l'alcool provoque des fermentations acétiques capables d'influencer la réaction humorale.

Examinant les urines des malades entrant dans le service avant tout traitement, M. Nicolaidi a constaté que dans presque tous les eas les urines étaient hypoacides, le rapport ossillant entre 1,5 et 3,5. Deux fois seulement, il a observé dos chiffros supérieurs à 5. Le premier cas était celui d'un tuberculeux et le second celui d'un dyspeptique hyporsuleu. Il est probable que ce dernier présentait des acédes de fermentation. Cependant, je reconnais que les hypersthéniques, comme les tuberculeux au début, sont des malades à untrition oxaltée et que, par conséquent, on peut constaterchez eux de l'hyperacidité, mais en dehors des crises paroxystiques chez les dyspoptiques.

Chez un grand nombro de malades et notamment chez les chroniques, l'auteur a trouvé de l'alcalinité ou de la noutralité : cette observation est d'accord avec celles de Joulie, de Cautru et de moi-même.

Toutes ees remarques sont extrémement intéressantes, carelles apportent des faits dans l'étude d'une quostion qui prendra încessamment une importance capitale dans la clinique; on doit done remercier M. Dalché d'avoir provoqué ce travail et le féliciter d'avoir rencontré pour le faire un esprit bien doué au point de vue de l'observation.

G. B.

L'Administraleur-Gérant: O. DOIN.



Lutte contre l'alcoolismé. — La fui sur les patentes. — Le diagnostic au télèbione. " D' La goutte de lait. — Hygiène de la vision. — L'Institut Pasteur de Lille et le corps médical. — Défense de cracher. — Le danger des lampes fumivores. — Origine des eaux sulfureuses. — Un parasite observé chez des syphilitiques. — Les coxyures et l'appendicite. — Prophylaxie de la tuberlose. — La sciatique traitée par la sérothérapie intra-arachnofienne.

Les médocins du Calvados, membres de la Société de médocinc, suivant la voie dans laquolle se sont engagés les médocins du Finistère et de l'Hérault, viennent d'adresser à leurs comparitotes les plus chaleureuses, les plus prossantes, les plus patriotiques exhortations, les suppliant, s'ils veulent que la France reste la France et que leurs fils puissent encoreétre français, de se gardref de l'alcool et des aperitifs comme des plus dangereux de tous nos ennemis. A signaler qu'à Caen, en 1900, il y a eu 893 maissances et 1,574 décès !

* *

Dans sa scance du 26 mars, le Scant a adopté, malgré l'opposition du Gouvernement, l'article 4 de la loi sur les patentes ainsi conçu: « Par exception à l'article 14 de la loi du 15 juil, let 1880, le médecin qui se transporte annuellement dans une ville d'eaux ou une station bainéaire ou thermale pour y exercer sa profession, et qui ne se livre pas ailleurs à l'exercice de la médecine, n'est imposable au droit proportionnel sur l'habitation que pour la maison qu'il occupe pendant la 594 BULLETIN

saison balnéaire eu thermale, même si cette maison ne eenstitue pas son demicile habituel et principal. »

Par contre, dans sa séance du 28 mars, le Sénat a rejeté l'amendement de M. Labbé et de plusieurs de ses collègues, amendement tendant à ne faire perter, pour les médecins, le dreit proportienuel que sur les lovers professionnels.

On racente, dans le quartier de l'Eleile, d'après un journal politique, un fait curieux de consultation médicale qu'on garantit authentique. Par une des dernières nuits froides, une maman, domiciliée dans ce quartier, effrayée par des accès de taux de son petit enfant et redoutant le oreup anrait téléphené aussitét à sen médecin. Ce dernier par téléphene également démanda quelques détails, qui hi parrurent rassurait. Il ent alors l'idée de prier la mère de mettre l'enfant à l'appareil et de le faire tousser. Et après une quinte de toux, réperentée par le téléphone, le médecin de dire : « N'ayez aucune orainte, c'est un rhume bénin; il n'y a aucun symptôme de croup. Recouchons-nous les uns et les autres. » — La consultation par téléphone est encere une innevation que nous réservait netre joure virgitéme siècle.

Grâce à l'œuvre de la goutto de lati de Rouen, pendant le semestre du fonetionnement de ce patronage, 31 enfants sculement sont morts sur 305 secouvus. Cela donne une mortalité globale de 11 0/0 alors que cette mortalité est de 33 0/0 en ville. C'est an docteur Didour, cretateur de la tioutte de lait de Fécamp », que l'on doit la créstiou à Rouen d'une œuvre semblable, placée sous la direction de M. Bruuon, directeur de l'Ecole de médecine. Il serait à désirer que des souscripteurs charitables permissent à d'autres villes d'imiter l'exemple de Versailles, de Fécamp et de Rouen.

Un eurieux prejet de lei a été introduit dans la législature de l'Etat de New-Yerk. Ce bill tend à obliger les éditeurs et les directeurs de journaux à imprimer leurs publications en caractères plus gros que ceux actuellement usités.

Cette mesure aurait été inspirée par l'observation de spécialistes qui ont remarqué que la vue des New-Yorkais s'affaiblissait d'une manière inquiétante et qui attribuent le fait à la lecture de publications imprimées avec des caractères fins,

Un conflit s'est élevé entre l'Institut Pasteur de Lille et le corps médical de cette ville. Celui-ei voit d'un très mauvais cuil le directeur de cet établissement se mettre à la téte de dispensaires anti-tuberculeux. Il estime que l'ingérence de l'Institut Pasteur dans la clinique constituers une menace pour l'indépendance des médecins. Le public sera amené à croire que l'Institut est en possession d'un reméde qu'en ne connait pas ailleurs. Les médecins de Lille no veulent pas laisser s'accréditor une telle croyance puisque, si l'Institut Pasteur possèdait ce reméde, son premier devoir, étant donnée la raison même de la fondation de l'établissement, serait de le faire connaître aux médecins.

On a beau multiplier les affiches dans les omnibus, les tramways, les gares de chemin de fer, dès que l'invitation de no pas eracher par terre n'est pas suivie de sanction, on s'en moque, commo un poisson d'une ponnme. Cela ne se passe pas ainsi en Amérique. Un individu crachait dans le tramway de la neuvieme avenue à Now-York. Un de ses voisins lui fit remarquor l'alleho de Bureau d'hygiéne interdisant de cracher dans les voitures. L'homme continua à cracher et l'intervention du conducteur du tramway n'eut d'autre résultat que d'exagérer l'expectoration. Le voisin indigné déposa une plainte au Bureau d'hygiéne qui fit arrêter le délinquant et le fit condamner à 100 dellars d'amende.

On abuse des lampes fumivores, ozonatrices, ditos hygicniques. Il peut en résulter de réels dangers. A la suite d'une mert rapide par gangrène pulmonaire survenue chez un malade dans la chambre duquel était placée une do ces lampes, M. Bard de Lyon) expasea dix-luit cobayes aux vapeurs d'une lampe; les uns moururent rapidement, les autres plus ou moins tardivement. A l'autopsie des animaux merts, on trouva des lésions de broncho-pneumenie et de bronchite capillaire. La mort s'expliquerait par un métange d'action toxique et asplyxique par irritation terochique.

Il faut donc, dans la pratique usuelle, se méfier sérieusement de l'emploi de ces appareils qui sont loin d'être inoffensifs.

M. A. Gautier a pus s'assurer que, quand on épuise de la poudre de granit par de l'eau froide, la liqueur sinsi obtenue ne renferme pas trace de sulfures alcalins ou alcalino-torreux. Au contraire, si on clauffo à 250° ou 300° dans un tube scollé, co méme granit pulvérisé avec son peisé d'acu, on obtient une véritable cau sulfarense artificielle, comparable par sa composition, aux caux prévieueures mais plus concentrée.

Dans la sérosité sanguinolente retirée par ponction di guaglion satellite des chancres sphilitiques, M. Stassano n constaté la présonce de corps mobiles paraissant être des infusoires flagellés du groupe des menadines. Ces parasites, ronds, ovoides ou pyriformes sont munis de deux faquella tout droits à l'un des pôles et d'un flagellum plus long et fluxueux à l'autre pôle.

('es protozoairos sont, en majorité, libres parmi les cellules et les leucocytes d'un tisseu lymphatique; certains cependant sont fixés sur les hématies qui traversent le ganglion. Leurs conditions biologiques expliquent parfaitement la diminution du nombro des hématies et du taux de l'hémoglobine que l'on observe à chaque ponssée nouvelle de la syphilis.

L'helminthiase détient encore le record dans l'étiologie de l'appendicite. Mais peur M. Moty ce ne sont ni les ascarides, BULLETIN 597

ni les trichocépales qui doivent être incriminés, mais bien les oxyures. Aussi conclut-il à la nécessité de n'employer le traitement chirurgical qu'après échec de la médication parasitaire

. *

La prophylaxie de la tubereulose a été pour M. Laneereaux l'oceasion d'un oxeellent travail dans lequel il préconise d'un coté, la lutte contre l'alcolisme par la prohibition absoluc des apéritifs, la réglementation des débits de boissons et d'un autre côté, un ensemble de mesures législatives et administratives destinées à assurer un eube d'air suffisant aussi bien dans les habitations privées que dans les ateliers, pensionnats et cascress.

* *

Une injection intra-arschnofdienne de cinq milligrammes do occatine en solution stérilisée à 1 0/0 fit disparaitre au bout de six minutes des douleurs de névralgie seiatique durant depuis luit jours. MM. P. Marie et Guillain qui avaient en recours à ce moyen thérapeutique, obsorvéront, quelques heures après, un retour do la névralgie mais pen pronoucée, et depuis elle ne s'est pas reproduite.

Ce que MM. P. Marie et Guillain ont obtenu avec la eccaine, M. Sieard l'avait eu avec une injection dans l'espace sonsarradmotidien lombaire de quatre centimètres cubes de simple sèrum physiologique. L'offet sédatif fut à peu près immédiat et dopuis plus do trois semaines les douleurs tres vives de la sciatique out fait place à un l'égre regourdissement.

THÉRAPFUTIOUE MÉDICALE

La glycosurie et le diabète d'origine dyspeptique. Symptômes, diagnostie et traitement,

par M. Albert Rohin, de l'Aradémie de médecine.

1. — Il est un retentissement hépatique des dyspepsies et spécialement de l'hypersthénie gastrique, qui n'a point encore été décrit, ou qui, quand il a été observé, n'a pas été rapporté à sa réelle origine : c'est la glycosurie. Dans les rares cas où l'on a constaté la présence du sucre dans l'urine des dyspeptiques, on lui a attribué une origine a limentaire pure et simple, et la glycosurie d'origine gastrique n'a pas été individualisée comme espèce particulière. D'antres fois, on l'a confondue avec le diabète, et plus du tiers des malades qui sont venu sen consulter se cryaient diabétiques ou avaient été considérés et traités comme tels. Ce retentissement est donc important à connaître, d'autant qu'à côté du diagnostic, il comporte une thérapeutique spéciale.

Mais venons au fait. Sur 1.600 cas d'hypersthenie gastrique où les urines on té de examinées, j'ai constatie 83 fois la glycosurie, soit une proportion de 5,18 p. 100. Ces 83 cas eux-mêmes se divisent en deux catégories. Dans la première, la glycosurie présente des caractères qui permettent d'éliminer immédiatement l'élée de diabléte : ées la glycosurie dyspeptique. Dans la seconde, il s'agit d'un diabéte véritable qui ne diffère du diabète ordinaire que par son origine et unequeques-une des symptômes qui l'accompagnent, de sorte

que le diagnostic différentiel n'est pas sans difficulté; c'est le diabète dyspeptique. La première catégorie, d'ailleurs, est de heaucoup la plus fréquente, puisqu'elle s'observe dans près de neut dixièmes des cas que i'ai réunis.

II. — Étudions d'abord les faits de la première catégorie, soit la glycourie dyspeptique. Dans celle-ci, ce qui domine la symptomatologie, c'est le fait même de la glycosurie, de son degré, de ses variations et des conditions dans lesquelles elle survient; aussi, les caractères de cette glycosurie doivent-ils retain; en premier lieu, toute notre attention.

1º Cette glyossurie est essentiellement irrégulière. Voici, en effet, les dosages pratiqués, jour par jour, pendant plus de six ans, chez un de mes malades, considéré à tort comme diabétique, traité sans succès comme tel, et chez lequel un examen plus attentif permit de reconnaître une glyossurie d'origine gastrique aujourd'hui définitivement guéric.

													SUCRE
1892	28 janvier	٠											10,25
	29 janvier	au	[er	fé	v	rie	P						0
	2 février												8,10
	3 —												8.33
	4 au 7 fé	vrie	ľ.										0
	8 février												0,90
	9 —												0
	10												1,66
	11 —												0
	12 —												6,25
	13 —												1,85
	14 an 26 f	évri	er.										0
	27 février	٠											1,35
	1er au 10 i	mair	۶.										0
	11 mars.												0,65
	12 au 21 i	11.91%	2										0

THÉRAPRUTIQUE MÉDICALE

000	THERAPEUTIQUE MEDICALE	
	22 mars	4,85
	23 mars au 10 mai	0
	11 mai	0,85
	12 au 16 mai	0
	17 mai	0,50
	18 mai au 15 juillet	0
	16 juillet	4,80
	17 juillet au 26 octobre	0
	27 octobre	2,60
	28 octobre au 27 novembre	0
	28 novembre	2,25
	28 novembre au 25 décembre	0
	26 décembre	7,20
		-
	Le sucre n'a été constaté que trois fois :	
1893	5 janvier	1,50
	10 —	1,90
	12 octobre	5,25
	Le sucre a été constaté dix fois :	
1894	6 janvier	8,40
	7 février	0.90
	3 mai	2,50
	11 août	3,90
	17 septembre	3,72
	6 octobre	1,84
	30 novembre	4,20
	2 décembre	1,25
	13 –	5,50
	15 —	9.48

1895. — Les analyses ne sont plus journalières. On fait environ une analyse par semaine. Le sucre est constaté quatre

fois cu jauvier (1,50), en avril (2,10), en juin (2,50), en juillet (1,20).

De juillet 1895 à 1898, le sucre n'a pas reparu.

2º La quantité du sucre reste toujours dans des proportions très faibles. Parfois aussi, elle est indosable. L'urine réduit alors la liqueur de Fehling après défécation; la réduction n'est pas inmédiate et consiste en un trouble verdâtre pulvérulent; le liquide déféqué ne donne rien au polarimétre, mais on peut s'assurer que la réduction est hien due à la glyosse, en concentrant ce liquide par évaporation dans le vide : à un certain degré de concentration, la déviation apparaît.

Les quantités de sucre qui figurent dans l'observation précédente donnent bien l'idée de ce que l'on trouve habituellement. Je rencontre cependant dans mes malyses, mais à titre tout à fait exceptionnel, les chiffres de 13#,30, de 25#,40, de 38#,50, par litre d'urine, mais jamais ces quantités élevées n'ont persisté pendant plus d'une ou deux journées.

3º Sauf exception, le sucre n'est pas uniformément réparti dans l'urine des vingt-quatre heures. Il manque habituellement dans l'urine du matin et ne se rencontre que dans celle de la digestion. Ce caractère est de la plus haute importance. Pour le rechercher, on recommande au malade de conserver dans un flacon toute l'urine émise depuis le diner jusqu'à minuit, inclusivement, puis de recueillir, dans un autre flacon, l'urine émise au réveil, avant le premier déjeuner; le premier flacon renfernuera l'urine de la digestion : le second, celle du jeûne.

Or, pour fixer les idées, voici l'examen de deux urines recueillies dans ces conditions, chez une femme de trentedeux ans atteinte d'hypersthénie gastrique périodique.

TOME CXXXXI, 16° LIVE.

Urine du matin. — Très trouble. Le trouble, dù à de l'urate de soude en suspension, disparaît par la chaleur. — Aucun des réactifs usuels ne dénote la présence de traces d'albumine. — Pas de réduction de la liqueur de Fehling. Après défécation et concentration dans le vide, pas de déviation polarimétrique. — Au microscope : nombreu cristaux octaédriques d'oxalate de chaux, beaucoup d'urate de soude amorphe, quelques globules blancs fortement pirmentés.

Urine du soir. — Transparente au-dessus d'un l'èger dépôt cristalloïde. — Traces absolument indosables d'albumine. — Réduction jaune immédiate de la liqueur de l'ébling qui prend peu à peu une teinte vert noirâtre. Le dosage du sucre au polarimètre donne 13st, 30 par l'ître. Au microscope, nombreux cristaux octaédriques d'oxalate de chaux, nombreux et gros cristaux d'acide urique plus ou moins teintés de jaune.

13#7,30 de sucre dans l'urine de la digestion, pas de sucre dans l'urine du jeûnc : voilà qui est tout à fait significatif.

Ce caractère de l'absence du sucre dans l'urine du matin, ou pour mieux dire dans l'urine du jedne, doit être déterminé avec de rigourcuses précautions. Il ne suffit pas de recueillir l'urine du matin et d'y rechercher le sucre; il faut aussi s'assurer que le malade n'a rien pris depuis son diner de la veille et qu'il a vidé sa vessie cinq à six heures après; en un mot, que l'urine en observation est hien l'urine sécrétée pendant le jeune, hors de toute influence alimentaire.

4º Dans le cas précédent, l'urine du soir renfermait à la fois du sucre et de l'albumine. Cette coîncidence de l'albuminurie et de la glycosurie temporairce est très fréquente; elle figure dans trente-neuf de nos quatre-vingt-trois observations, soit 46,6 fois sur cent. Cette albuminurie manque comme la glycosurie dans l'urine du matin, mais elle est plus régulière dans son apparition vespérale et elle est toujours beaucoup plus tenace que la glycosurie, dont le caractère est d'être essentiellement passagère. 5° En dehors des variations du sucre et des caractères si

particuliers que présente cette glycosurie, je dois donner quelques indications sur l'état des échanges élémentaires. La quantité de l'urine est presque toujours un peu aug-

mentée; elle varie de 1.200 à 2.000 centimètres cubes en vingt-quatre heures. Elle oscille de 1.500 à 2.200 dans plus de la moitié des cas, ce qui correspond à une légère polyurie.

La densité légèrement acerue, dépasse habituellement 1.022 et monte jusqu'à 1.032, avec une moyenne de 1.025 Les échanges totaux sont acerus et particulièrement les

changes azolés, comme lo démontrent les chiffres élevés des matérimac solides (de 1/9 o 38,516, 16 se matérinuc organiques (de 36 à 66,80), de l'urée (de 34,72 à 52,42), de l'azole total (de 13/7 là 23,55). l'ar kilogramme de poids, la plupart de ces élements subissent de grandes augmentations : c'est ainsi que J'ai vu les matériaux solides atteindre 1x,512 et l'urée 0x,560 au lieu de 1 cramme et de 0x,500.

L'utilisation des matières albuminoïdes est satisfaisante, puisque la moyenne du coefficient d'oxydation azotée dans quatre-vingts cas donne 83,5 p. 0/0, la normale étant de 83 è 85 p. 0/0.

à 85 p. 0/0.

L'utilisation des matières ternaires est assez bonne, avec la moyenne de 5^{sr},90 pour les matières organiques non

azolées de l'urine.

La déminéralisation organique est légèrement accrue (coefficient de déminéralisation 31,6 p. 0/0 au lieu de 30 p. 0/0). La désassimilation nerveuse est aussi un peu plus forte un'à l'état normal (Parô : azote total :: 0/0 au lieu

de 18 p. 0/0).

L'acide urique présente un certain excès (0,65 au lieu de 0,50); mais son coefficient de solubilisation (rapport de l'acide urique aux phosphates alealins) reste aux environs de la normale.

Le rapport de l'acide phosphorique lié aux terres à l'acide phosphorique total reste physiologique (21,2 p. 0/0).

Accroissement des échanges généraux, des échanges azotés, des échanges necreux, tels sont done les termes principaux de la nutrition ehez les dyspeptiques glycosuriques. Nous aurous, tout à l'heure, à utiliser ces documents.

Les malades dont nous nous occupons ne présentent aueun des symptômes du diabète, et la découverte de la glycosurie est toujours une question de hasard, à moins qu'on n'ait le soin d'examiner systématiquement les urines de tous les dyspeptiques. Je ne compte pas, en effet, parmi les symptômes diabétiques la minime polyurie, la légère augmentation de la densité, ni même la présence d'une faible quantité de sucre.

Toutefois on ne peut s'empêcher de remarquer l'analogie qui existe entre les troubles de la nutrition dans le diabète et ecux que nous venons de constater chez nos malades.

En effet, contrairement à l'opinion admise encore par quelques médeciens, le diabète, loin d'être une maladie par ralentissement de la nutrition et par défaut de consommation du sucre, doit être considéré, au contraire, comme le résultat d'une accélération de la nutrition exagérée du sucre. Sans revenir sur les preuves qui en ont été données dans d'autres publications, je rappellerai seulement que, chez le diabétique franc, tous les actes chimiques de la nutrition organique sont accrus, qu'il s'agisse d'hydratations, de déboublements, de synthèses ou d'avychations, et que tout médicament qui ralentit la nutrition générale et celle du système nerveux diminue la plvocsurie.

Or, dans la glycosurie dyspeptique, tous les échanges sont accrus comme dans le diabète vrai, et cette analogie dans les troubles de la nutrition constitue, un élément très important dont nous aurons à tenir compte tont à l'heure, quand nous étudierons la pathogénie et la place nosologique de cette glycosurie.

III. — La glycosurie dyspeptique n'a donc pas de symptomatologie à proprement parler. Mais elle est associée à un certain nombre de symptômes qui peuvent aider à la reconnaître.

Ces symptômes sont :

4º Des troubles dispeptiques dont l'ensemble ressorit le plus souvent à la description que je vous ai donnée de l'hypersthémie gastrique, qu'elle soit aigui, paroxystique, périodique ou permanente. En général, il m'a semblé que la glycosurie était plus fréquente dans les formes aiguis que dans les chroniques; en tout cas, je ne l'ai rencontrée que tout à fait exeptionnellement et très passagèrement dans les formes acchectiques. Parmi ces symptomes de dyspepsie hypersthénique, il en est trois qui sont à peu près constants, à savoir : l'appétit plus ou moins exagéré, la distonsion temporaire de l'estomae avec clapotage, l'augmentation du volume du foie qui, sur mes %2 cas, existait 75 fois, dans 90 p. 0/0 des cas.

2º Des phénomènes accessoires en raison de leur irrégularité, mais qui eependant se présentent elez ces malades avec plus de fréquence que chez le dyspentique non glycosurique. Citons: la neurasthénie (25 p. 0/0 des cas), los vertiges (13 p. 0/0), les émissions d'urines laiteuses phosphatiques (12 p. 0/0), les dermatoses (15 p. 0/0), les troubles cardiaques (20 p. 0/0), les sueurs profuses (12 p. 0/0), les troubles orbaitentuels, les troubles condiaries.

3º L'état général ne présente rien de particulier. Un tiers des malades avait une tendance à l'obésité, un autre tiers se plaignait d'amaigrissement. L'anémie n'a été constatée que dans 8 p. 0/0 dos cas. Les divers symptômes dits accessoires n'ont donc aucune valeur diagnostique; mais leur existence, au cours d'une dyspepsie hypersthénique, peut constituer un signe révéluteur qui incite à rechercher la glycosurie.

Ce qui caractérise bien celle-ei et permet de faire exactement son diagnostic, c'est l'ensemble des caractères suivants :

Glycosurie temporaire, irrégulière, relativement minine, n'existant, quand elle se manifeste, que dans l'urine de la digestion, manquant dans l'urine du jeûne, s'accompagnant fréquenment d'albuminurie transitoire, et toujours d'une exagération des échanges nutritifs généranx, actés et nerveux. Cette glycosurie s'observe chez un dyspeptique dont l'appétit est conservé ou exagéré, l'estomac distandu et clapotant, le foie gros et plus ou moins sensible à la percussion, le chimisme stomacal en état d'hyperehlorhydrie. Elle reconnait, comme symptômes accessoires et dépendants de la dyspepsie causale, la neurasthénie, les vertiges, les émissions laiteuses phosphatiques, les dermatoses, les troubles cardiaques, les seurs profuses, etc., etc.

Cet ensemble est assez caractéristique pour fixer le diagnostie, rapporter la glycosurie à sa véritable cause et, par conséquent, lui imposer avec certitude le traitement qui lui convient.

IV. — Avant d'aborder la pathogénie et le traitement de ces cas curieux, je veux dire quelques mois des faits classés dans la seconde catégorie, c'est-à-dire du diabète dyspeptique. Leur existence n'est pas facile à établir et il subsisterait toujours un doute sur leur réalité si le hasard ne m'avait pas permis de suivre pendant plusieurs années un cas qui a été pour moi une véritable révélation.

En effet, il ne suffit pas pour poser le diagnostic de constater la coexistence du diabète avec l'hypersthénie gastrique; cette coexistence n'implique nullement le carac-

tère secondaire du diabète, puisque l'hypersthénie gastrique est au contraire une fréquente complication de celui-ci. et c'est une complication qui n'est pas toujours sans gravité, puisque je l'ai très souvent constatée associée aux fermentations chez des malades qui ont succombé au coma diabétique, dont elle paraît avoir été comme un symptôme avant-coureur. Dans ces derniers cas, le diagnostic est facile et l'antériorité du diabète n'est pas discutable. Mais ce sont aussi les cas les plus rares et, dans les plus habituels, on ne peut guère se fonder que sur une chronologie bien souvent sujette à caution. C'est pourquoi le diagnostic du diabète gastrique est à peu près impossible, puisqu'il ne semble différer en rien du diabète ordinaire, si ce n'est par une origine que rien ne saurait faire distinguer d'une complication. l'ai pu cependant saisir sur le vif un cas qui ne laisse

aucun doute sur la réalité du diabète gastrique. Il y a environ huit ans, en 1892, je fus consulté pour un enfant de neuf ans qui présentait tous les symptômes de la dyspepsie hypersthénique pernamente. Le truitement conseillé fut suivi pendant quelques mois avec une sensible amélioration; mais on relâcha bientôt la sévérité du régime et, en janvier 1805, l'enfant m'était amené de nouveau, faible, très amaigri, avec une énorme distension de l'estomac, un foie débordant les côtes de deux travers de doigt et douloureux à la pression, de la diarrhée, tout cela avec un appétit excellent et une langue parfaitement rose. Un examen du chimisme stomacal démontra de l'hyperchlorhydrie libre et organique avec des acides de fermentation, donnant au liquide une acidité totale de 3º 25 en HCl. L'urine du soir renfermait 2º 22 de succe l'urine du matin n'en contenait as de trave-

Je recommandai d'insister sur le traitement gastrique; le sucre disparut aussitôt, et des analyses régulièrement pratiquées pendant plusieurs mois n'en décelèrent pas le retour. Comme l'enfant ne se plaignait plus, qu'il avait engraissé, on surveilla moins son régime, et même, en novembre 1895, on le mit au lycée.

En février 1896, l'attention fut attirée sur la santé du petit malade par un amaigrissement rapide, une soif intense et de fréquents besoins d'uriner ; une analyse révéla une densité de 1042 avec 60 grammes du sucre par litre. Ce n'est qu'en juillet qu'on me ramena l'enfant : l'urine des 24 heures avait une densité de 1050 et contenait 43 grammes de suere ; l'urine du matin en renfermait encore 22 grammes : le diabète était constitué. Le traitement alternant (1), institué aussitôt, fit disparaître le sucre en 18 jours, à la fin de la deuxième sèrie médicamenteuse. Comme l'on constatait toujours les signes de l'hypersthénie gastrique, j'en ordonnai alors le traitement et le régime, en commençant par le régime lucié absolu. Jusqu'à la fin de septembre, on put croire qu'on était maître de la situation : la densité se maintenait entre 1015 et 1019 et le suere ne reparaissait pas. J'avais perdu de vue le malade au milieu d'août, mais j'étais tenu régulièrement au courant par les parents. A la fin de novembre, on m'apprit qu'après une crise de diarrhée, le diabète avait repris de plus belle avec 54 grammes par litre et une rapide déchéance de l'état général. A partir de ce moment, la maladie défia toute intervention thérapeutique : en décembre, une analyse donna 430 grammes de suere en 24 heures, et le petit malade succombait en janvier 1897.

Cette observation démontre nettement la transformation de la glycosurie dyspeptique en diabète vrat. Je n'en saurais fournir de plus démonstrative et les autres eas que j'ai vus n'entraîneraient nas la conviction, parce que l'on ne peut

⁽¹⁾ Albert Robin. — Traitement du diabète. Traité de thérapeutique appliquée, fasc. 1.

fournir à leur endroit la preuve absolue que la dyspopsic était antérieure au diabète. Cependant, comment elasserdes faits comme celui d'un banquier de quarante-six ans, dyspeptique hypersthénique depuis quinze ans, ayant fait analyser chaque année son urine sans qu'on y trouvât jamais de sucre, et qui, le 5 mars 1896, à la suite de troubles dyspeptiques plus accentués, fait pratiquer une analyse qui révèle 21er, 50 de sucre? On porte le diagnostie de diabète, on le met au régime; le sucre ne s'abaisse qu'à 19er, 10. On institue le traitement de la dyspepsis hypersthénique permanente, et le 25 mars, le sucre tombe à 3er, 90, puis à 3er, 38 le 7 avril, à 1er, 36 le 17 mai, pour disparaltre définitivement le 27 mai, en même temps que s'amélioraient notablement les symptômes gastriques.

donner matière à d'intéressantes remarques. Dans l'un d'eux, le médecin traitant, abusé par le clapotage gastrique et les didés fausses propagées au sujet de ce symptôme, avait porté le diagnostic de dilatation de l'estomae au cours du diabète; il institua aussitôt le fâcheux régime soc et l'antisepsie stomacale, qui current pour premier effet de faire monter de 40 p. 0/0 la quantité du sucre par vingt-quatre heures, puis disparut tandis que la glycosurie diminua sous l'influence du régime lacôt.

Ce diabète dyspeptique peut se compliquer d'accidents divers qui en changent complètement l'expression habituelle, et malgré cela, il est susceptible de complète giuèrison quand il est bien diagnostiqué et traité. J'ai soigné avec Kûss, en 1896, un savant âgé de cinquante et un ans, asthmatique, gros mangeur, ayant depuis longtemps dans l'urine des traces de sucre qui cédèrent aussitôt à la suppression des féculents, et qui, sous l'influence d'une alimentation trop copieuse et d'ennuis prolongées, fut pris de troubles digestifs caractirésés par la distension stomacale, des renvois aigres, un-risés par la distension stomacale, des renvois aigres, un-

certaine lenteur de la digestion et une constipation intense. L'examen du contenu stomacal après repas d'éprcuve démontrait une hyperchlorhrydric libre et organique (H + C = 2gr,45) et de l'acide lactique en abondance. En peu de temps, la déchéance de l'état général fut telle que plusieurs médecins crurent à un cancer. Et la glycosurie atteignit 38 grammes par litre, si bien que d'autres mirent les accidents sur le compte du diabète, en même temps que se produisaient des troubles trophiques (durillon forcé prenant l'apparence du mal perforant) et une violente irritation des voies urinaires avec hématurie. Je mis aussitôt le malade au régime lacté absolu et au traitement de la dyspepsie hypersthénique. L'effet ne se fit pas attendre : la glycosurie disparut et l'état général se reconstitua. Aujourd'hui, quatre ans se sont passés sans que le sucre ait reparu ; l'état général est excellent et la santé parfaite de tous points. En eût-il été de même, s'il s'était agi d'un diabète ordinaire, uniquement soumis au traitement gastrique avec régime lacté d'abord, mixte ensuite?

Je suis donc convaincu que la glycosurie intermittento des hyporsthéniquos peut, dans cortains cas et à la longue, devenir permanente et se transformer en un diabète vrai qui porte, dans la persistance des troubles gastriques et dans l'influence encore favorable sinon décisive du traitement antidyspeptique, la marque de son origine. A une période avancée de son évolution, ce diabète devient semblable à un diabète quelconque et n'est plus que très fablement modifié par le traitement gastrique. Il importerait donc d'en faire le diagnostic de bonne heure; mais ce diagnostic ne possède pas d'éléments décisifs. Dans la pratique, on se fondera sur l'antériorité des troubles dyspeptiques, sur la faible quantité du sucre, au moins au début, sur la présence de traces d'albumine dans l'urine de la digestion et sur son absence

dans l'urine du jeune, enfin sur l'action favorable du traitement gastrique.

V. — A ne considérer que les théories régnantes et quelques travaux récents sur la glycosurie alimentaire, la glycosurie par injection sous-cutanée de sucre et l'insuffisance glycolytique (1), recherches qui ont abouti à des conclusions erronées parce qu'elles partent toutes du faux point de départ que les glycosuries expérimentales de cet. ordre sont l'expression d'une insuffisance glycolytique du foie ou des tissus, à ne considérer, disje, que ces théories, on serait tenté de faire de la glycosurie dyspeptique un acte d'insuffisance relative du foie. Elle prendrait place ainsi dans la vague catégorie des glycosuries alimentaires par insuffisance glycolytique, du diabète fruste ou du petit diabète.

Mais cette idée d'une glycosurie alimentaire liée à une insuffisance glycolytique même relative du foie ou des tissus est absolument incompatible avec les troubles dans les échanges qui accompagnent la glycosurie dyspeptique.

En effet, une insuffisance hépatique, quelle qu'elle soit, ne saurait comporter un accroissement de tous les échanges, une quantité d'urée atteignant 67,600 par kilogramme de poids, un coefficient d'oxydation azotéc normal ou augmenté, une évolution normale des autres ternaires que le sucre, etc. Bien au contraire, cotte exagération des échanges et des rapports d'échanges correspond à la suractivité hépatique, à cette suractivité fonctionnelle dont l'hypertrophie de l'organe et la polycholic sont aussi les manifestations.

⁽I) Voyez pour la biographie de ces travaux: — R. Morisseau. Do l'insuffisance glycolitique, Thèse de Paris, 1889, et Linossier. De la valeur ellinique de l'épreuve de la glycosurie alimentaire, Archives pénérales de médécine mai 1899.

Et cette suractivité fonctionnelle me semble facile à interpréter. Elle dépend de deux causes : l'une est l'excitation réflexe exagérée et renouvelée après chaque repas que produit sur le duodénum, sur l'ampoule de Vater et réflexe exament sur le foic, le passage d'un chyme hyperacide et stimulant, comme on sait, de la fonction biliaire; l'autre est l'excitation directe que les sucres engendrés ou transformés par les actès digestifs excreent fonctionnellement sur la cellule hépatique dont ils constituent l'excitant habituel. Et l'on peut se domander si, en thérapeutique, la suppression des aunylacés et des sucres n'agit pas autant sur certains diabètes en privant le foie de ect excitant habituel qu'en supprimant la matière première du glycogène.

La glycosurie dyspoptique constitue donc, dans l'ordre des glycosuries, une espèce à part, différant totalement des glycosuries, alimentaires, du diabète fruste dont l'existence, d'ailleurs, n'est rien moins que démontrée. Elle est le résultat d'actes d'excitation, tandis que les autres sont des actes d'insuffisance. A ce titre, elle est, pour ainsi dire, la préface du diabète. Dans la glycosurie dyspeptique, en effet, la fonction hépatique et spécialement la fonction glycogénique ne sont excitées qu'à cortains moments; il ne s'agit d'abord que d'un retentissement local, mais qui peut, à la longue, mettre en branle le système nerveux et créer le diabète vrai, c'est-à-dire l'excitation continue.

Cette pathogénie, sommairement esquissée, explique la similitude des troubles dans les éclanges des glycosuriques dyspeptiques et des diabétiques, ainsi que la transformation possible de cette glycosurie en diabète, quand le foie continue pour son propre compte et par suite d'une prédisposition liéréditaire ou acquise l'excitation d'abord intermittente. Elle laisse soupçonner que nombre de diabètes dont on cherche vainement la cause reconnaissent la dyspessie comme origine. Elle rend compte de l'une des causes

de la gravité des dyspepsies chez les diabétiques ordinaires et de l'urgence avec laquelle on doit les traiter. Enfin elle est justifiée par la thérapeutique, — ce juge sans appel, puisque glycosurie et diabète dyspeptiques relèvent à la fois du traitement antidyspeptique et des modérateurs de l'activité hépatique.

VI. — Le traitement découle tout entier, en effet, de cette pathogénie et les succès qu'il donne sont la meilleure preuve de l'exactitude de la théorie. Que celle-ci, d'ailleurs, soit vraie ou fausse, qu'importe, si le traitement qui en découle réussit!

Il n'est pas un seul des cas de glycosurie dyspeptique qui n'ait écdé plus ou moins rapidement à ce traitement, lequel n'offre rien de difficile ni de particulier, puisque c'est simplement, celui de la dyspepsie hyperstiténique. Dans les cas simples, on ordonnera la troisième étape du régime avec le traitement médicamenteux sédatif (1). Dans les cas plus sévères, on commencera par le régime lacté absolu avec jes précautions voulues, sans s'inquiéter de la glycosurie qui disparattra du fait même de la diminution de l'incitation acide sur le duodénam et sur le foie.

Si, par exception, la glycosurie persistait, il faudrati employer les médicaments modérateurs de l'activité fonctionnelle du foie, qui sont: l'antipyr-ine associée au bicarbinate de soude, l'arsèniate de soude et l'arsènité de potase, le carbonate de lithine la codéine, l'opium, la bellidane, la valériane, etc. J'ai fixé, dans maintes publications, les règles de leur administration sous le nom de Truitement alternant du diabète, et je ne puis mieux faire que de

Albert Robin. — Les maladies de l'estomac, p. 256 et suivantes. Paris, 1901.

renvoyer à l'une d'elles (1). Toutefois il n'est jamais nécessaire de faire parcourir au malade les trois séries de ce traitement alternant, et une ou deux dosses d'antipyrine de 0°,50 à 0°,75, associées à 0°,50 de bicarbonate de soude ou bien l'emploi judicieux de l'arséviate de soude, on bien vite raison de cette excitation hépatique plus persistante.

Il est bien entendu que, la glycosurie guérie, il faudra, pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, selon le degré de cette glycosurie, supprimer toutes les causes de stimulation du foie, ce qui comporte un régime strict d'où les féculents et les altiments surcés seront exclus.

Dans le diabète dyspeptique, ou encore quand la quantité du soure prend une certaine importance, il faut procéder différenment et commencer par réduire directement l'activité du foie à l'aide de l'antipyrine. Vous conseillerez donc le traitement suivant, qui devra être suivi pendant trois iours seulement:

- 1º Suivre exactement l'hygiène et le régime des diabétiques, en supprimant cependant de celui-ci les crudités et les acides. 2º Une heure et domie avant déjeuner et diner, prendre
- un des paquets ci-dessous qu'on fera fondre dans un peu d'enu de Seltz:
 - 24 Antipyrine
 0",50 à 1 gr.

 Bicarbonate de soude
 0 50 à 0",75.

Mèlez exactement en un paquet. Faites six paquets semblables.

3º Ne boire pendant les repas que de l'eau de Vichy, source Lardy.

Albert Robin. — Traitement du diabète. Traite de thérapeutique appliquée, fasc. 1, 1885.

4º Après les repas, prendre une des poudres suivantes, délayée dans un peu d'eau :

4 Magnésie ca Bicarbonate	alcinée)			
Bicarbonate	de sor	ıde.		í	4		j	an	. 4	gı.
Craie prépa	rée	٠.							- 6	

Mêlez exactement et divisez en douze paquets.

5º Si des crises gastriques ou des accès de pyrosis, ou encore des sensations de brûlure, d'aigreur, de constriction ou de tiraillement au creux épigastrique survenaient dans l'intervalle des repas, prendre aussitôt une des poudres composées à la manésie et au sous-nitrate de hismath.

24	Magnésie calcinée	15 gr.
	Sous-nitrate de bismuth	. 7
	Craie préparée	7
	Codéine	0=1,05
	Riearhonate de sonde	10

Mèlez exactement et divisez en dix paquets.

Pendant les trois jours de ce traitement, on examinera quotidiennement l'urine afin de cesser les médicaments des que le sucre aura disparu. Et l'on commencera alors le traitement de la dyspepsie hypersthénique dans toutes ses étapes, en débutant par le vigime lucté absolu. J'en reviens, pour le diabète dyspeptique, au régime exclusif de Donkin que l'ai combattu jadis, en le réservant aux seuls diabètiques albuminnriques. Le tort de Donkin avait été de généraliser à tous les cas de diabète les faits qu'il avait observés. Ce tort, nous l'avons tous plus ou moins dans nos affirmatios, et je ne pense pas déchoir en reconnaissant le mien et en affirmant que le régime lacté absolu convient merveilleussement aux cas que nous étudions.

Je suppose que le sucre reparaisse au cours de ce trai-

tement. Si la quantité en est abondante et dépasse, par exemple, 10 à 15 grammes par litre, on reviendra à l'ordonnance de tout à l'heure avec l'autipyrine, et, quand le sucre aura disparu, on reprendra le régime lacté, dont on mitigera bientôt la rigueur pour arriver à la troisième étape du régime, bien entendu sans féculents ni aliments sucrès.

Si la quantité en est minime, on donnera, le matin à jeun et le soir avant la dernière prise de lait, 0°,15 de carbonate de lithine, que l'on fera dissoudre dans une cuillerée d'eau à laquelle on mélangera une cuillerée à soupe de la solution suivante :

Ou encore, si l'on craint l'action parfois irritante de l'arséviate de soude sur l'estomac, on pratiquera matin et soir, selon l'indication de J. Renaut, avec la seringue à embout de Condamin, une injection rectale de 5 centimètres cubes du mélange suivant :

24 Liqueur de Fowler...... 8 gr. Eau distillée...... 92

Enfin, dans les cas plus anciens où le diabète est définitivement établi, il faur alterner le traitement complet du diabète tel que je l'ai institué en trois séries avec le traitement de la dyspepsie hypersthénique, en insistant sur l'un ou sur l'autre suivant les prédominances de la maladie gastrique ou du diabète.

Traitement des ties convulsifs par la rééducation des centres moteurs.

Par le Dr S. Dunois (de Saujon).

I

Le 15 juillet 1896 M. le professeur Raymond m'adressait une joune fillo de 20 ans atteinte depuis l'enfance de ties convulsifs. La maladie prisc d'abord pour de la chorée avant résisté à tous les traitements faits depuis dix ans. Pendant l'interrogatione de la maladoi p m'aperçois que, si brusquement je sollicite son attention en lui posant une question, elle cosse de tituer pour recommencer l'orsuno je angle à sa mère.

La suppression du tic convulsif, chez cette malade, sous l'influence de la fixation do l'attontion, mo donna l'idée premièro d'une rééducation possible des neurones associés dans la production des ties convulsifs. Je pensai qu'en habituant par des oxercices méthodiques, la malade à rester immobile commo une statue dans une position favorable au repos et pendant un laps de temps déterminé; qu'en faisant cela avec autorité, par suggestion verbale (sans hypnose), on arriverait à imposer suffisamment l'image du calme possible pour que co calme puisse se réaliser dans l'inconscient et impressionner ainsi les centres producteurs des divers ties.

Cotto idée théorique appliquée par moi pour la première fois sur M^{lle} B... m'a guidé depuis dans le traitement du tic convulsif. Voici quolques observations dans lesquelles le résultat a été favorable.

Obtiendra-t-on toujours de bons résultats par l'emploi de cette méthode dont je vais donner la description en publiant les obsorvations? Il est probable que non. On échouera toutes les fois que par la faute de l'opérateur ou par la faute du sujet, l'image du ropos nécessaire no sera pas suffisamment acceptée pour impressionner les centres perturbateurs. On échouera si le sujet est inintelligent; échec certain chez les idiots.

En effet il faut de la part du sujet beaucoup de volonté et de bonne volonté, il faut de la part de l'opérateur beaucoup d'autorité, de patience et de confiance dans la méthode. Le traitement sera long; mais on sera récompensé par uno amélioration certaine; et souvent, je le crois, par une guérison définitivo.

Obstavarnox I. — Mis B... de Châlons-sur-Marue, 20 ans. Père et mère vivants. Le père est atteint d'asthme depuis la campagne de 1870, la mère a une bonne santé; elle est impressionnable nerveuse, sans stigmates hystériques. Elle attribue la maladie de sa fille au fait qu'elle a eu pendant la gestation de cette enfant une série ininterrompue de très violents chagrins. « Les neuf mois de grossesse se sont passés dans les larmes, nous dit-elle.»

Première enfance sans maladie grave. A 5 ans bronchopneumonie qui guérit en dix jours sans laisser de trace. A 10 ans rougeole bénigne, à 12 ans scarlatine. Réglée à 15 ans. C'est avant d'avoir la rougeole vers l'age de 9 aus que se sont manifestés les premiers ties convulsifs. Brusquement l'enfant se précipitait à terre comme pour ramasser un objet, mais avec cette particularité qu'il fallait que le dessus de la main touchat le sel, sans quoi elle recommençait. Ello faisait cela vingt, trente fois par jour. Entre temps olle tournait la tête toujours à droite, regardant en haut des rideaux dans le coin d'une fenêtre, faisant entendre un bruit de gloussement comme un appel sourd qui attirait l'attention des personnes présentes. De 9 à 11 ans ces deux ties ont été les principaux; ils s'accompagnaient de manies : compter insqu'à trois, regarder trois fois un objet ou une personne. Peu à peu les mouvements convulsifs se généralisent, gagnent le dos, les jambes; les médecins consultés portent le diagnostic de chorée.

De 18 à 20 ans tous les ties précèdents persistent et s'aggravent: il s'y ajoute un tie plus pénible. La malade heurte son coude droit contre sa poitrine. l'avant-bras étant plié sur le bras; elle le heurte quinze, vingt fois par minute, elle le fait jusqu'à ce que le coude ait violemment touché la baleine du corset; ce coup plus violent est accompagné du petit cri guttural signalé plus haut. Il semble que la malade n'ait la satisfaction de son tie que lorsqu'elle a provoqué ce choc du coudo accompagné du cri. Alors elle cesso quelques minutes pour recommencer dans les mêmes conditions. Le choc du coude contre la paroi du thorax est'tel, qu'à la longue s'est formée une érosion sous un point bien limité et c'est lorsque la sensation de contact avec le point érodé s'est fait sentir que le petit cri est poussé et que la malade cesse momentanémont de tiquer. Mais si le coude est au repos la tête remue se déviant plusieurs fois par minute de gauche à droite et en haut.

C'est dans cet édat que M^{IN} B... m'est arrivée après avoir été traitée intillement à Châlons pour de la chorce, puis à Paris pendant plusieurs mois. Les derniers traitements faits à Puris ont consisté en : électricité statique pondant trois mois, hydrothérapie dans une maison spéciale dirigée par un médecin, bromures, antipyrine, chloral, valérianate d'ammoniacue, etc.

La malade n'a jamais on de crises de nerfs, olle n'a pas d'anesthésie pharyngée, pas d'hémi-anesthésie, aucune sensibilité ovarique, pas de rétrécissement du champ visuel. En un mot, après un examen minutieux et très complet, je ne peux constater aucun stigmate hystérique.

En nevanche, je note diverses phobies; appréhension ridicule à l'idée qu'elle pourra rencontrer des bêtes à cornes, des vers de terre, des chats; ne peut toucher une clof rouillée, etc. Des le premier jour la malade est isolée; les parents me la laissent avec une religiouse et je commence aussitôt le traitement. Jo fais étendre la malade sur un divan, je lui dis d'y prendre une position commode et je lui affirme avec autorité qu'elle va pouveir y rester trois minutes sans remuer un seul muscle du corps. Afin de mieux fixer son atteution jo lui dis de fermer les yeux, lui faisant observer quo jo ne lui fais pas fermer les yeux pour l'inciter au sommeil, mais bien pour qu'elle puisse mieux rester tranquille comme je le desire. En ma présence l'ordre est exècuté, la malade reste immobile, figée comme une statue pendant trois minutes. Le lendemain je recommence et je le fais pendant cinq minutes, defendant à la roligieuse qui accompagne la malade de lui faire la moindre observation dans le courant de la journéeau sujet des ties qu'ello remanquera.

Aprés deux mois amélioration considérable, les mouvements du coude out cessé, ceux de la tête ont diminué, la malade est moins peureuse. Sa mère vient la chercher.

Un mois après (octobro 1896) elle m'écrit : « Les mouvements du bras n'ont pas reparu, mais la tête tourne toujours et le potit gloussement de la gorge existe encore. Un tie nouveau s'est déclaré dans les deux épaules, c'est un mouvement d'arrière en avant comme si les manches du corsage étaient trop étroites et génaient. »

J'écris à la malade d'avoir à s'observer pour ce mouvement, d'y peuser surtout pendant les séances de repos que je recommande de continuer à domicile pendant un quart d'heure, trois fois par semaino ot cela pendant tout l'hiver.

Au mois de novembre 1896; la nuit lorsque la malade s'éveille, mouvement continuel des jambes dans le lit; le jour la tête s'obstine à tourner.

En mars 1897, jo reçois des nouvellos moins satisfaisantos encoro: « les mouvements du coude sont bien passés mais il y a autre choso; dans le gosier une espèce de gloussement presque continuel, perceptible non seulement dans la pièce où elle se trouve mais dans les pièces voisines. Je n'ose plus la sortir et nous tous de son entourage, nous sommes exaspérés par ce rouron perpétuel. »

On m'amène la malade à Paris, je la gardo huit jours et je fais disparaître par des exercices de repos semblables à ceux faits à Saujon, ce nouveau tic.

Au mois de juillet 1897, la malade m'est ramenée à Saujon, olle y séjourue pendant trois mois, accompagnée de sa mère et de sa sœur; je crois un nouvel isolement superfila. Cette fois elle en part guérie, n'ayant plus ni tics, ni gloussements. Elle s'est habituée à voir des animaux à cornes, des vers et des clats.

J'ai revu cette malade à Paris en 1889; elle n'avait plus aucun tic. Es 1900, elle s'est mariée; elle a eu un enfant an commencement de l'hiver 1901. L'enfant né avant terme, élevé dans une couveuse, n'a vécu que trois semaines. Elle a supporté cette épreuve vaillamment sans retour d'un seul tic. Je crois qu'on peut considérer cette malade comme complétement guérie. En réalité la guérison remonte à trois ans et demi puisque lo dernier traitement et les dernières séances de renos ant été faits en octobre 1897.

J'ai publié cette observation un peu longuement parce qu'elle peut sovrir d'observation type pour la bonne direction du tratitament. On y verva que les malades ne doivent pas être abandonnés à eux-mêmes trop tôt, qu'il faut les suivre pendant plusieurs mois et même pendant plusieurs années si on veut que le succès soit complet. On remavquera que les ties se substiment les uns aux autres ce qui découragerait malades et médecins si les uns et les autres n'étaient pas prévenus de cette éventualité probable.

Obs. II. — M. II.... est un homme de 39 ans qui m'est adressé par le docteur Arnozan, de Bordeaux. Depuis l'âge de trois aus M. II... à des tics qui d'année en année se sont accentués d'une façen telle, que le malade n'ese plus paraître en public; il est un objet de risée peur les gamins de la ville, et seuvent même peur les grandes persennes.

Harvedité lourde : le père était diabétique, il est mort à 58 ans d'un authrax, il avait des ties dans un bras. Mère met à 47 ans d'une fièvre typheide, n'avait ui ties, ni mahadie nerveuse. Grand'mère paternelle avait des ties dans les mains et les jambes. Oncle paternel vit encere et a quelques ties dans un bras et dans une jambe. Une sœur du malade est morte d'anorxée hystérique.

Veici la cepie de la note que m'a remise le malade lui-même au suiet de la marche de sa maladie:

- « Je me seuviens aveir eu dés men enfance des ties dans le visage et netamment dans les yeux (áge 4 eu 5 ans).
- A 14 ans après une fièvre muqueuse, ma fatigue nerveuse a augmenté et, de physique, devient également morale. Je fus ebligé d'interrempre mes études pendant deux ans.
- « Λ 23 ans je fis men service militaire; à ce mement les ties faciaux ne me quittaient pas; ils se développèrent et prevequèrent des spasmes quand je les avais dans la gerge.
- Les dernières années j'ai été très fatigué; mes ties étaient devenus très fréquents et plus forts dans les yeux, la gorge et souvent par tout le corps, et je n'osais plus à cortains mements me présenter en publie à cause d'un hoquet convulsif très persistant qui interrempait chacune de mes phrases.
- « J'ai teujeurs épreuvé une certaine difficulté à écrire, mais elle a beaucoup augmenté depuis quelques années.
- « Ma fatigue a toujeurs été plus grande lersque je me suis treuvé dans le mende, obligé de suivre une eenversation ou dans mes occupations commerciales.
- « La lecture me surexeitait également; en un met tout ee que je voulais peursuivre prevequait des erises de ties plus violents.
- « A part quelques spasmes très rares je n'ai jamais eu de tics pendant men semmeil. »

Lorsque le malade se présenta dans mon cabinet, le 6 août 1898, l'agitation était telle qu'à un examen superficiel on eût pu croire à une chorée suraigué; mouvements continuels des bras, des jambes, de la tête, grimaces, spasnes de la gorge interrompant le malade plusieurs fois au milieu d'une phrase et simulant à s'y méprendre un bégaiement. Très grande difficulté à évrire en raison des ties des mains. Jo donnerai plus loin des spécimens d'écriture avant et après le traitement.

Depuis plusieurs mois M. H... n'osait pius sortir de chex lui, les tics augmentant considérablement à l'ides soule qu'il va se trouver en présence d'une tieree personne. Ce qui explique l'état de grande surescitation dans lequel je le vois à la première visite qu'il me fait.

État moral: serupules religieux, phobies diverses surtout au sujet des maladies contagieuses, craites do mottre le leu; est angoissé s'il ne s'est pasassuré plusieurs fois de suite qu'il a bien fermé une porte, qu'il a mis une lettre dans la botte au bureau de la poste (reviendra sur ses pas plusieurs fois afin de bion s'en assurer), etc. l'insiste sur ees divors troubles psychosthéniques qui accompagnent presque toujours les ties convulsifs et que j'appellerais volontiers avec Charcot: lites psychâțures, à mettre en parallelo avec les ties physiques.

Dès eette première eonsultation je dis avoc autorité au malade que je vais lui apprendre à supprimer momentanément tous ses ties. Je le fais étendre sur un divan, je lui appuie la main sur le front et je lui dis : * Restez-là immobile comme me statue, cons le poucez, j'en suis sir, par un grande gfort de colonté! *. Le malade m'obéit et pendant deux minutes il resto inunobile. Il est supéfait de l'avoir pu faire, il ne croyait pas la chose possible.

Jo lui explique que c'est par des séances de repos analogues à colle-of que je compte le guérir. Très intelligentil comprend de suite la méthode que je précouiso. Je lui fais chaque jour une séance de repos avec suggestion verbale sans livpnose; et après 25 jours de traitement, l'amélioration est déjà considérable. Le malade dans l'intervalle des séances se tient reide évelue comme un automate avec des mouvements saccades, te la tête rigide find 'éviter tout mouvement involontaire. Cette première plase du traitement a été très pénible et a necessité de la part du malade une tension d'esprit, un effort de volonté considérable, que malheureusement on ne retrouvera pas toujours chez tous les sujets, surtout chez des cenfants qui n'en comprennent pas aussi bien la nécessité. Cet effort de volonté constant soutenu et amplifié par les séances d'inmendité abunde de la considérable que après normale, par sus mon cabinet chaque jour pendant un quart d'heure ou vingt minutes, a produit dés la première année une amélioration telle qu'après deux mois de traitement le maladé à pu reprendre et menor pendant l'ivier 1898 une vie à pou près normale, pouvant faire des visites et surveiller ses affaires commerciales.

Au moins do mai 1880, il revient à Saujon. Les grands ties ont disparu, mais chaque fois que le malade rentre dans mon cabinet il a un spasme accompagné de deux ou trois hoquets bruyants. Après quelques jours ce symptôme, lui aussi, disparatit; les phobies s'améliorent en même temps que les ties. Pendant le séjour à Saujon comme traitement adjuvant je fais faire de l'hydrothérapie et de la franklinissation; mais à n'en pas deuter c'est à la récèducation par le repos imposé en ma présence qu'il faut attribuer le calme obteuu. Le malade s'en rend compte et jo lui fais premettre de faire chez lui pendant teut l'hiver, trois fois par semaine des séances analogues à celles qu'il fait à Saujon. Il en comprend la nécessité et il m'écrit : • Qu'il regrette bien do ne pas pouvoir faire aussi sœuven qu'il le désirerait ces séances d'immobilité si nécessaires pour donner aux nerfs la souplesse coulte . *

Le 7 juin 1900, le mainde revient tellement amélioré que sauf quelques contractions très rares dans les muscles du visage, on peut le considèrer comme guéri. Après un mois de traitement il part n'ayant plus un seul tic. Jusqu'à ce jour la guérison s'est maintenue. Chex M. H... les ties des membres supérieurs produisaient une incoordination telle qu'il ne pouvait plus écrire lisiblement. On jugera des progrès de l'ambioration d'année en année en comparant les trois types d'écriture de ce malade, types pris aux dates sous-indiqués.

Écriture de M. H...

1º Avant le traitement (mars 1898).

the chaque and y of a rach of the of

2º Un an après le premier séjour à Saujon (mai 1899).

Now row confirmen note beligación manguent deux cents france. En efet horizon que F 48 55 usis, portour o valor au yeste rudiy lin acus rentos la tro france

3º Deux ans après le début du traitement (février 1900).



Jo crois inutile de donner avec autant de détails les observations des autres malades traités par la mémo méthode. L'exposé en scruit fastidieux. Toutes ces observations se ressemblent. Aucun de mes malades n'avait de coprolaite, ni d'écholaile, aucun n'avait de stigmates hystériques, mais tous avaient des troubles psychiques caractérisés surtout par des phobies, des manies ou des idées fixes. Chez tous l'état psychique s'est amélioré à mesure que les ties ont diminué. Aucun d'eux jo crois, n'était hypnotisable mais je n'en suis pas certain, n'ayant chorché chez aucun à provquer le sommai hypnotique. Les suggestions verbalos ont été faites à l'état de veille et cela a suffi pour imposer aux cellules motrices la coordination de leur action, laquelle avait cosed d'être volontaire, et aussi pour modifier les phénomènes psychosthéniques.

Ons. III. — Madame D..., d'Orléans, m'est adressée par le professeur Raymond. Tics convulsifs des muscles de la face et du bras droit, idées fixes, scrupulos religieux, marmotte presque constamment trois ou quatre phrases toujours les mêmes. Disparition complète des tics dès la première saison, de juin à fin août 1898; amélioration des idées obsédantes. Reprise du traitement en juin 1899. Durée un mois et demi; les tics ont disparu, mais plusieurs idées obsédantes persistont. En noût 1900, nouveau traitement d'un mois; il n'y a plus de ties, mais il existe encore des obsessions et des scrupules religioux.

Oss. IV. — M. J..., de Bordeaux, 17 ans. A depuis l'âge de six ans des ties convulsifs dans le côté gaucho de la face. La paupière supérieure de l'oril gauche elignotte constamment. Pendant un mois et demi, séances d'immobilité d'un quart d'heure, trois fois par semaine, séances qui seront continuées par le malade pendant tout l'hiver. Le malade part ne faisant plus aucun tie, mais l'ignore si ces ties ont reparu, n'ayant plus entendu parlor de M. J... depuis son traitement fait en 1899.

(A suivre.)

LITTÉRATURE MÉDICALE

Traité des maladies de l'estomae et de l'intestin

par Albert Mathieu

Un volume grand in-8° de 988 pages (Octave Doix, éditeur).

Il n'est guère dans les habitades médicales que l'auteur d'un traité des maladies de l'estomac vienne parler publiquement d'un traité sur le même sujet, et l'on met en pareil cas une grande discrétion dans les appréciations que l'on formule.

Mais l'étroitesse d'osprit et lo personnalisme qui dirigent trop souvent les choses de la médecine sont totalement inconnus au Bulletin de Thérapeutique qui est une tribune ouverte à tous et où l'on peut expeser et répandre toutes les opinions, même et surtout celles qui sent le plus en contradiction avec les travaux individuels de sen directeur scientifique. C'est pour cela que lorsque le livre de M. A. Mathieu est arrivé au Bulletin, je me le suis réservé pour l'annoncer et en rendre compte moi-méme.

Et la táche m'a été rendue d'autant plus facile que je n'ai que du bien à en dire. Je viens, en effet, d'en terminer la lecture qui est très attachante et très instructive.

M. A. Mathieu est un classique, mais c'est un classique doublé d'un observateur qui passe au crible de son observation personnelle les faits admis par ses devanciers, et qui éclaire d'une note crizinale les questions imprécises.

A une épeque où les doctrines règnent en maîtresses et tendent à ployer sous leur joug les lois de l'évelution morbido et de la thérapeutique, M. A. Mathieu s'en tient à la stricte observation des faits. Il se défend de toute théorie cemme de toute classification. Il se garde de diviser les dyspensies en formes et en variétés; il étudie simplement ce qu'il appelle les grands complexus symptematiques gastre-intestinaux, pensant, avec juste raison, que l'histoire des maladies de l'estomac et celle des maladies de l'intestin sont cliniquement inséparables et que toute division tendant à la dissocier est artificielle. Il sépare aussi l'étude des maladies fonctionnelles de celle des maladies caractérisées par des lésions. Il met sur un plan plus lointain l'anatemie pathelogique, qui est la science de la mort, tandis que la vie de la lésion, sa pathogénie, son expression clinique et le mécanisme physiclogique de sa symptomatologie retiennent principalement son attention.

M. A. Mathieu est très moleste quand il dit « qu'à notupeque d'abondante publicatien et de cellaboration internationale, la part d'originalité des auteurs tend de plus en plus à se restreindre, et que le mérite dans un traité de-pathelogie consiste avant tout à distinguer ce qu'il est essentiel de savoir et à l'exposer clairement ». Il est très medeste, dis-je, parce qu'il apporte dans la selutien des mobreuses questions peudantes en pathologie gastro-intestinalo des aperqus personnels qui résultent de sa grande pratique et de ses recherches scientifiques, et qu'il est parrenu à élucider bien des points douteux. Sa part originale reste donc très grande, et je ne serai démenti par aucun lecteur en disant que son livre est une des œuvres les plus complètes et les plus importantes qui aient été écrites sur la pathologie gastro-intestinale.

S'il n'était permis de faire quelques observations, je ne les porterais guére que sur des points de détail. Pourquoi M. A. Mathieu centinue-t-il à employer pour le dosage des facteurs de l'acidité totale du sue gastrique le precedié de Winter, quand il sait que ce procédé no donne pas le chiffre de l'HCL libre, et quand il sait aussi que la somme de l'HCL libre de de l'HCL organique, trouvée par ce precéde, est supérieure à l'acidité totale, — ce qui impliquerait que le contenu est supérieur au contenant?

M. A. Mathieu répondra sans doute que ce precédé est le plus omployé et qu'il peut, en l'employant, comparer ses résultats avec ceux d'autres observateurs.

Pourquoi, d'autre part, a-t-il réuni toute la thérapeutique fonctiennelle en un chapitre unique au lieu de répartir les traitements d'après chaque état merbide?

M. A. Mathieu répondra à juste titre que le médecin peut facilement adapter les règles qu'il indique à chaque état morbide en particulier et que cette description d'ensemble évite bien des redites.

Il a certainement raison, on principe —, mais le praticien, qui est labitude à voir le traitement suive immédiatement la description de l'entité morbide eu du complexus symptomatique, sora pout-étre embarrasse par cette exposition d'ensuble. Pautre part, colle-ci satisfora davantage les espris synthétiques qui aiment à voir les choses de haut et qui préférent les réçles générales aux expositions de détails.

M. A. Mathieu u'admet pas l'hypersthènie et l'hyposthénié gastriquies qui vonetituent les pointe essentiels de ma classification des dyspepsies. De cola, je ue saurais le blâmer, puisque sa conception est aussi simpliste que la mienne et qu'elle comporte aussi une thérapeudique adéquate.

Mais jo me permottrai de lui faire observer, à propos de la paternité du ternne de hypersthénie yastrique qu'il attribue à Soupault, que ce torme a été couramment employé dans mon service depuis l'année 1891, comme en fait foi la thèse de Déguéret (1894). La chose en elle-mêne n'a acueuo importance; si je la relève, c'est pour donner à M. A. Mathieu l'occasion de remanier ce minuscule point d'histoire dans la future édition de sou livre.

Je voudrais signaler oucore parmi los chapitres que j'ai lux avec le plus d'intérêt coux de l'ulcère simple de l'estonne, du cancer et de l'appondicite. A propos du cancer, M. A. Mathieu est absolument dans le vrai quand il dit que la gastro-entiores tomic ne doit étre conscillée et pratiquée que dans les cas d'extrême urgence, alors qu'on a la main pour ainsi dire forrée.

Mais je ne m'accorde plus avec lui quand il écrit, à propos du traitoment de l'appendicite, qu'il faut s'abstenir avant tout de donner des purgatifs. Jaï sur ce point une assez longue expérience, puisque je n'ai jamais cessé de consciller la médication laxativo à mes malades à crises appendiculaires, et j'en suis encore à recherchèr son inconvénient, tandis quo dans un très grand nombre do cas, sos avantages m'ontapparu tollement manifestes que nombre d'intervontions chirurgicales ont pu être ôvitèes gràco à son emploi. Jo crains qu'ici, et par exception, M. A. Maltieu n'ait sacrifié à la doctrine réginanté. Par contire, où je le loue saus réserve, c'est quand il supprime carrément la dilatation d'estonac comme entité morbide. Après avoir cuglobé toute la pathologie stomacule, après avoir été créatrice de diathèses, presque diathèse ellemême, que rested-il aliquer'dhui de la dilatation d'éstoime. Rien, ou pressque rien! La voilà disparue du cadre nosologique ot réduite à l'état d'expression symptematique. Toute cette conception purement théorique, édifiée en dehors de la clinique et de l'observation des faits n'a pas duré 15 aus. M. A. Mattieu n'en parle qu'à titre occasionnel dans le chapitre premier de son livre: « Technique séméiologique et séméiologic analytique. »

Signalons encore d'excellents chapitres sur les entérites, la dislocation intestinale et les tumeurs malignes de l'estomac. Quelqu'un m'a reproché dernièrement de toujours louer les livres dont je rends compte dans le l'ulletin de Thérapeutique. Je sitis loin de m'en défendre, et je n'accepte pas cela comme ui roproche. Ronan n'a-t-il pas dit: « On ne doit jamais écrire que de ce qu'on aime. L'oubli et le silence sont la punition qu'on inflige à ce qu'on a trouvé laid ou commun dans la promenado à travers la vie ». Or, j'ai cu grande satisfaction et grand profit à lire le livred et M. A. Mathieu. C'est pour cela que je le recommande vivement à ceux de nos lecteurs qui s'intéressent à la pathologie gastro-intestinale. C'est un livre de honne foi, c'est un livre vécu, deux qualités qui se foit de plus on plus rares dans la littérature médicale classique.

HOPITAL DE LA PITIÉ

La Thérapeutique au lit du malade.

LA MÉDICATION APÉRITIVE (1)
DAY ALBERT ROBIN

Vous venez de voir au nº 8 de la salle Valleix tous los heureux offets du porsulfato do soudo comme apéritif. Il s'agit d'un tuborculeux au début, se plaignant d'une inappetence com-

⁽l) Consultation recueillie par X. Gouraud, interne de service.

pléte. La première indication thérapeutique était de relever l'appétit. Il prend 0,20 centigr. de persulfate de soude par jour depuis dix jours, et, à l'heure a persulfate de soude par jour Dès lors le médicament n'est plus utile; il a fait son effet; il faut nous hâter de le supprimer pour ne pas laisser l'accoutumance s'établir, ce qui enleverait au remêde la majeure partie de son efficacité.

Les apéritifs sont nombreux et d'origine fort diverse; en en en précenise encore de nouveaux à chaque instant. Bien des médecins pourtant n'ont en eux qu'une confiance fort limitée, justifiée d'ailleurs, par le peu de succès thérapeutiques qu'is leur dévient. C'est qu'il faut, avant tout, savoir les donner; en thérapeutique, la façou de donner vaut autant, sinon plus, que ce que l'en donne.

Les principaux apéritifs sont au nombre de cinq :

1º Le persulfate de soude en solution étendue à la dose de 0,20 cent. en deux fois, une demi heure avant les repas.

2º Les sals de vanadium, et surtout le métacanadate de soude; comme le précédent, il a êté préconisé dans la tuberculose à titre de médicament spécifique, autibacillaire. Or, il n'a rien de spécifique; son rôle se borne à celui d'apéritif, remontant l'estomae si souvent délabré, lui permetant de tenir son rang si important dans la lutte contre les bacilles. Vous en donnerez 1 à 2 milligrammes par jour; formulez ainsi:

Une cuillerée à soupe 3/4 d'heure avant le déjeuner de midi et le dîner.

Là encore ne dépassez jamais huit jours; cessez même lo médicament au bout de cinq à six jours s'il a déjà produit son effet. Métiez-vous des doses trop fortes, trop longtemps prolongées qui irritent, fatiguent l'estomac et ramènent l'état d'inappétence qu'elles étaient justement destinées à combattre.

Si au bout de huit jours l'effet est nul, changez le médicament; essayez un autre apéritif qui pourra souvent réussir là où le premier a échoué;

3º L'orexine, introduite dans la thérapeutique par Penzoldt en 1895, employée surtout sous forme de tannate d'orexine.

lo Une sério de plantes indigênes ou exotiquos, telles que le trêfle d'eau ou ményanthe, la gentiane, le colombo, le quassia amara.

5º La série des strychniques; sulfate de strychniae, en solution, à la dose de 1 ou 2 milligr. par jour; teinture de noix comique, 4 ou 5 gouttes avant les repas; teinture de féets de St-Iynaee, moins riche en strychuine, plus riche en brucine, contenant en plus de l'igasurine; teinture de fausse augusture, très peu employée, et souvent très efficace.

A côté de ces apéritifs directs, vous avez encore à votre disposition d'autres moyeus do réveiller l'appétit, en stimulant la sécrétion gastrique.

Cos stimulants possèdent des modes d'activité différents : leur action peut être :

Dynamique, tel l'ipéea donné à petites doses : 0,02 à 0,03 cent. dans un peu d'eau avant le repas;

Osmotique, comme les sels neutres, sulfate, azotate de potasse, à la dosc de 0,05 à 0,06 cent. en un cachet;

Physiologique, et c'est le cas du bicarbonata de soude. C'est, en effet, un excitant de la sécrétion acide, surtout lorsqu'il est douné en petites quantités. Il ne faut pas dépasser 0,30 ou 0,40 cent. en un cachet, une demi-heure avant le ropas. C'est à lui, d'ailleurs, que l'eau de Vichy doit ses propriétés stimulantes.

Pour avoir une action plus énergique, plus complète, j'as-

socie volontiers ees différents stimulants dans la formule suivante :

Sulfate de potasse	0,05 cent.
Poudre d'ipéea	0,01 -
Biearbonate de soude	0,25 —

en un eachet à prendre 1/2 heure avant le repas.

Je vous recommande aussi l'*Elixir de Gendrin* qui est une solution de carbonate de potasse dans un mélange d'extraits aqueux aromatiques et qui agit à titre d'alcalin.

Laissez-moi vous citer, pour elore la série des apéritifs, un vin de composition assez complexe, que vous me verrez employer dans des cas très rebelles. Je lui dois un certain nombre de succès, mais il ne faut l'employer que clez les careinomateux, les bacillaires avaneés; l'hyperothoribyrie et l'hypersthénic constituent une contre-indication formelle.

Voici sa composition :

Prendro 5 grammes d'écoree de condurango blane, 5 gr. de trèfle d'eau, 5 grammes de thériaque; joter dessus le mélange suivant:

Vin	de	quassia	125 gr.
		eolombo	125 -

Porter à l'ébullition, laisser infuser 21 heures et filtrer.

Au liquide filtré, ajoutor 20 gouttes de teinture de noix vomique, vous obtenez ainsi un vin très mauvais, terriblement amer, mais qui agit en raison même de cette amertume.

amer, mais qui agu en raison meme de cette ameriume.

Vons donnerez une cuillerée à soupe 30 minutes avant le déieuner ou le diner.

Il vous réussira surtout bien dans les gastrites ehroniques,

Et notez qu'avant de soumettre un malade à l'intervention chirurgicale, qui est évidemment le seul traitement rationnel du carcinome gastrique, il y a grand intérêt à réveiller son appétit. Vous lui redonnez des forces, vous remontez son organisme, lui permettant de faire les frais du traumatisme qu'il va subir. Bon nombre de morts opératoires sont dues à l'état précaire du malade avant l'intervention.

Vous voyez la multiplicité des moyens à votre disposition pour stimuler l'appétit. Si le médeein a souvent à lutter contre l'anorexie, l'imapétence, il se trouve très armé contre elles, mais à une condition : c'est de bien se servir des armes qu'il a entre les mains.

REVUE DES TRAVAUX FRANÇAIS ET ÉTRANGERS

Médecine générale.

La coraîne et son autidote rationnel. — Un produit très précieux et qui réconcilierait nombre de praticiens avec in cocaine dout les accidents les avaices éloignés vient d'être découvert. Le « volasem » pour l'appeler par son nom ne serait autre que de l'extruit de violettes dont l'action physiologique tenant tout à la fois de la digitale, de la belladone, de l'erget de seigle, de la fêve de Calabar contre-balancerait les effets paralysants de la cocaine sur le cour, les vaisseaux sanguins et la respiration, prévenant toute espèce d'àceidents.

M. Lenox Curtis (de New-York) cite dans le Pacific Dental Grazelle deux cas cliniques où le volasem a été de la plus grande utilité. Il en administre ciuq gouttes toutes les heures jusqu'à concurrence de douze fois eette quantité.

Extraction des corps étrangers du conduit auditit. — Un corps étranger de l'oreille, livré à lui-même, dit M. Lermoycz (Archives de thérapeutique) n'est nullement dangereux; ce qui est plus dangereux pour lui c'est le médecin qui, à la pensée

de ce corps, ouvre sa trousse et se met en devoir de l'ex-

traire.

Pourtant, si le corps étranger est vivant, il devient dange-

Pourtant, si le corps etranger est vivant, il devient dangereux. Il faut alors le tuer en remplissant à pleins bords l'oreille d'huile d'olive.

Quand on constate l'existence d'un corps étranger non enclavé, on injecte dans l'oreille de l'eau tiède avec la seringue à hydrocèle, ce qui suffit à le ramener.

· Si le corps est enclacé sans complications, seringuer bien fort et injecter cinq à six seringues d'eau tiède. Si on ne réussit pas le premier jour, recommencer le lendemain.

S'il y a des complications, seringuer d'abord cinq ou six lois, puis procéder à l'extraction à l'aide d'instruments extracteurs, en n'employant jamais la pince.

On commencera par essayer l'extraction au crochet mousse, puis aux divers crochets et leviers, puis au crochet piquant, à l'extracteur à double crochet, etc.

Quand toutes les tentatives d'extraction ont échoué, il faut aller à la recherche du corps étranger par la roie rétro-auriculaire.

Sur le delire dans le cours des maindies infectieures. — Le délire, au cours des maladies infectieures, dit. L'Sivengi (Revista critica di clintoa medica, septembre-octobre 1900), est un phénomène frèquent, atteignant surtout les individus de hérédité dévropathique, ou affligés de névropathie antécedente ou concomitante, ou bien oncore les prédisposés par l'alcool ou par la fatique excessive physique et mentale.

Le diagnostic différentiel entrelo délire infectieux ou toxique transitoire et la vraie psychose est difficile, tout en tenant compte de la survenue rare de l'aliénation mentale dans le cours des maladies infectieuses.

Dans ces cas, la genèse du délire est complexe : hyporthermie, intoxication, inanition, sans compter les autres motifs qui nous échappent. Enfin, le délire infectieux peut représenter toute espèce de déserdre du raisonnement, et ainsi il trouve la raison de son apparence, bien plutôt dans les dispositiens et tendances intelloctuelles du patient, que dans la nature du precessus infectieux.

Gynécologie et obstétrique.

Une mère albuminurique peut-elle allaiter? — Question que M. Commandeur s'est posée dans la *Province médicale*, décembre 1900.

Déjà MM. Budin et Chavannes avaient sur ce sujet pesé les conclusions suivantes :

1º Contrairement à l'ancienne opinion, les femmes qui ent de l'albuminurie ou ont eu de l'éclampsie peuvent nourrir leurs enfants. Souvent, l'albuminurie disparait rapidement.

2º Quand elle persiste, ce qui est exceptionnel, l'allaitement peut êtro centinué et la guérison de la mère ne paraît pas empêchée.

3º Il est évident qu'on doit surveiller les mères et les enfants et qu'en cas de complications ou de centre-indications, l'allaitement peut être suspendu.

M. Commandeur, fert do ces conclusiens, a laissé allaiter teutes ses albuminuriques, et il est arrivé aux conclusions suivantes: l' Que l'allaitement maternel installé dès le promier jour des suites de couches n'est pas un obstacle à la dispartien rapide de l'albumine; 2º Que l'albuminurie peut persister un certain temps après les couches sans qu'il on résulto de dommages ni peur la mère ni peur l'enfant; 3º Que l'albuminurie chez les femmes qui allaitent peut persister de lengs mois, puis disparatire.

Ces conclusions se rapportent à des cas d'albuminurie de la gressesse et non à des cas de mal de Bright antérieurs à celle-ci. En ce qui concerne cette dernière circonstance, M. Commandeur rapporte l'observation d'une malade chez qui une albuminurie ancienne a déterminé, dans deux grossesses successives, un accouchement prématuré. Depuis, le premier cufant est mort après la naissance. Malgré son albuminurie, persistant entre les grossesses, la mère a pu allaiter son second enfant, dont l'état de santé est florissant et cela malgré la présence de 0=,75 d'albumine dans les urines de la mère.

L'albuminurio maternello n'est donc pas un empéchement absolu à l'allaitement, mais il faut une surveillance étroite et ne le continuer que si la mère et l'enfant n'en souffront pas.

L'albuminurie simple, sans insuffisance rénale marquée n'empêche donc pas l'allaitement à condition qu'il v ait une surveillance régulière du médecin.

En cc qui concerno les nourrices mercenaires, on pourra à la rigueur les conserver si les enfants s'en portent bien, mais, comme il est assez simple d'en changer, il scrait inutile de les conserver s'il y avait quelque ennui.

De l'influence favorable de la grossesse sur l'entéroptose, par M, H, Maillart. -- L'entéroptose recennaissant, comme facteur de la plus haute importance l'affaiblissement du tonus musculaire de la sangle abdominale, il peut sembler invraisemblable que la grossesse, qui a pour effet de distendre - ct par suite de relacher - la parei de l'abdomen, puisse exercer une influence favorable sur cette affection. Il en est pourtant ainsi, d'après M. Maillart, et voici l'explication (Rev. méd. de la Suisse rom., avril 1900) qu'en donne cet autcur :

Les viscères abdominaux sont soumis, cemme l'ont mentré les recherches de Schwerdt, à une double pressien : d'uno part, la tension abdominale proprement dite, due à la tonicité de la parei : d'autre part, la pression de charge, résultant du peids des erganes eux-mêmes et augmentant à mesure que l'on considère des viscères placés plus bas dans l'abdomen. Les effets de ces deux forces sont invorses, la première maintenant les organes dans leur situation normale, tandis que la secondo tend à les déplacer dans le sens de la pesanteur, à les ptoser = par conséquent. Or, pendant la grossosse l'utórus en se développant, refoule de bas en haut les organes abdoninaux, annulant ainsi plus ou moins complétement l'influence de la pression de charge.

Ce n'est pas là, d'ailleurs, une vue de l'esprii, car cet honreux offet de la grossesse sur l'entérvplose se traduit par une augmentation de poids, par suite de l'amélioration des fonctions digestives consécutive ello-ménea ur retour des visceires dans leur situation normale. Cet embonpoint, qui ne se manifeste qu'après la période de troubles réflexes (anorexie, vomissements, etc., etc.) du début de la grossesse, atteint de 2 kilos et demi à 5 kilos quand aucun incident, telle que l'albuminurie, ne vient l'entraver.

Il s'agit là, on le voit, d'une amélioration sensible, d'autant que le relèvement de la nutrition a pour conséquence immédiate la disparition, ou du moins l'atténuation, des troubles neurastitoniques concomitants. Il est, du reste, facile de rendre définitif le résultat acquis, en soumetant la malade à quelques mesures d'lugiène, dont les plus essentielles sont l'usage d'une sangle de Glénard et l'abandon du corset, remplacé par une « taille à bretelles » supportant le poids des vétements de dessous. Et, de fait, chez toutes les femmes traitées par M. Mailart qui ont accepté ess prescriptions, l'augmentation de poids constatée pendant la grossesse a persisté après les relovailles, et cela bieu sue la lactation leur oût été nermise.

FORMULAIRE

Traitement des pharyngites chroniques

(SAVOIRE, Pr. méd.).

La difficulté qu'ont rencontrée tous ceux qui se sont occupés du traitement des pharyngites chroniques provient de ce que les badigeonnages, les pulvérisations avec des solutions, des poudres médicamenteuses, les cautérisations chimiques ou physiques ne sauraient atteindre tous les replis de la muqueuse malade. Le traitement consistant dans l'emploi d'antiseptiques facilement volatils, paraît remédier à cet inconvénient.

Après avoir remédié aux lésions unsales d'ordre mécanique (qui sont la cause la plus fréquente des pharynètes) par des traitements médicaux ou chirurgicaux appropriés, rétablissant dans la plus large mesure possible la perméabilité nasale, on institue le traitement suivant :

1º Lavages du naso-pharynx, au moyen d'une des deux sondes (nasale antérieure ou nasale postérieure suivant la tolérance des malades, pour enlever, matin et soir, les mucosités qui s'accumulent dans la cavité naso-pharyngieune, avec un 1/2 litre de solution de phénosalyi à 1 p. 100.

2º Le lavage est suivi d'une inhalation nasale de quatre à cinq minutes de durée, avec une cuillerée à café de la solution suivante :

)¥7,05
Menthol 16	grammes
	0 —
Chloroforme 1	0
Eau de Cologne 10	0 —

3º Tous les soirs, on fait toucher le naso-pharyux avec l'unc des deux solutions suivantes :

 a) Solution aqueuse saturée de résorcine (15 p. 10).

 b) Menthol.
 1 gramme.

 Teinture d'iode.
 5 —

 Glycérine.
 10 —

Ce traitement, nullement douloureux, améne généralement, au bout de quelques semaines, la guérison des affections les plus tenaces.

L'Administrateur-Gérant: O. DOIN.

Imp. PAUL DUPONT, 4, tue du Boulei, - Paris, 1er Arrt. - 67.1.1901 (Cl.)



Alcoolisme hospitalier. — Création d'une caisse de recherches scientifiques. — Mort de Pettenkoffer. — Création d'un musée Ollier. — Médecins et mutualistes. — Accidents radiothérapiques. — Délégué au comité consultatif de l'agriculture, du commerce et de l'industrie, des colonies. — Lavage asspitque du linge.

La Commission, chargée par le Conseil municipal de Paris d'examiner les services économiques de l'assistance publique, vient de découvrir que la consommation des beissons alcooliques dans les phópitaux de la capitale augmente chaque année dans des proportions alarmantes. En 1896, on avait bu pour 80,375 francs de rhum et pour 131,283 francs d'alcool. En 1900, la dépense de rhum e'sost élevée à 128,742 francs et celle de l'alcool à 217,000 francs, ce qui a fait dire que si réellement l'alcool est un poison pour les gens bien portants on ne s'explique pas pourquoi on en laitabsorber pour 300,000 francs par un aux malades. A moins que la maladie immunise contre l'alcoolisme;

. .

Dans sa séance du 25 mars dernier, la Chambre des députés a adopté une proposition de loi de M. Audifired ayant pour objet la création d'une caisse de recherches scientifiques investie de la personnalité civile et divisée en deux sections daus le but de favoriser les travaux de science pure relatifs: 1º à la découverte de nouvelles méthodes de traitement des maladies de l'homme, des animaux domestiques et des plantes cultivées; 2º à la découverte, en dehors des sciences médicales, des lois qui régissent les phénomènes de la nature.

Les ressources de la caisse des recherches scientifiques comprendrent: 1º les subventions de l'Etat, des départements, des communes, des colonies et autres établissements publics; 2º les dons et legs; 3º les versements à titre de souscription individuelles ou collectives; 1º Les allocations prélevées sur la partie du fonds du pari mutuel affecté aux œuvres locales de bienfaisance; 5º l'intérêt des fonds libres placés en rentes sur l'Etat ou versés en compte courant au Trésor.

La caisse des recherches scientifiques relèvera du ministère de l'Instruction publique.

٠.

L'illustre maitre et doyen de l'hygiène moderno en Enrope, Max von Pettenkoffer vient de mourir à l'âge de 82 ans. On connaît son role glorieux dans la rénovation de l'enseignement et de la pratique de la science hygiénique. Son nom est un de ceux qui auront le plus honoré la seconde moitié du siècle écoulé.

*

En même temps qu'on s'occupe d'élever par souscription un monument la gloire d'Ollier, on songo à collectionner les pièces anatomiques préciouses qui ont servi à établir expérimentalement le rôle du périoste, dos pièces pathologiques montrant les merveilleux résultats des résections sous-périostées, d'autres encore se rapportant aux sujets les plus divers dela chirurgic. Tout cela doit être conservé pour l'honneur de la science l'younaise et l'instruction des générations futures. Il semble bion, comme le dit M. Vincent, qui fut un des élèves les plus aimés du professeur Ollier et qui reste un des plus dévoués à sa mémoire, que la place naturelle de cette collection est l'Hotd-Dieu de I.vos.

. *

Les médecins de Nantes et d'Arras auraient récemment adressé leur ultimatum aux Sociétés mutuelles de ces villes, ecei pour démontrer qu'ils ne veulent plus et ne, peuvent plus se laisser exploiter par ces groupements pseude-phinentrophiques. Il faut que les médecins se fassent un peut d'henneur de ne plus connaître les mutualistes autrement que comme des clients erdinaires.

Il résulte du rapport du ministre de l'Intérieur au Président de la République que les honoraires des médecins entrent pour un chiffre variant de 10 à 13 0/0 dans les dépenses des sociétés de secours mutuels.

L'henoraire médical est denc une dépense bien modique pour les mutualistes, si l'on veut bien réfléchir aux services que rendent les médecins à ces sociétés. Il appartient aux mutualistes soucieux de la bonne et juste administratien de leurs groupes de senger à ces chiffres révélés par l'enquête officielle et de se demander s'il n'est point parfois regrettable de refuser à leurs ecilaborateurs médicaux et pourtant si utiles une rénumération plus équitable de leurs soins.

* 1

Le médecin est respensable des accidents que peuvent canser les rayons X employés par lui dans un but thérapeutique. Ainsi viont de décider la première chambre du tribunal civil en faisant dreit à une demande de 5,000 fraces en demunges et intérêts formée par une dame M... contre un médecin qui l'avait grièvement brâlée au visage par une application radiothérapique.

* * 1

On a beau décrier notre profession, il n'empèche, que c'est de plus emplus chez elle qu'on vient chercher des hommes éclairés pour toutes les branches de l'activité scientifique de 614 BULLETIN

notre pays. Témoin, le choix que les electeurs de la Guyano viennent de faire de M. Heim, profosseur agrégé de la Faculté de médecine, comme délégué au Comité consultait de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie, près le ministère des Colonies.

. .

Simplifier et obtenir de meillours résultats, voila qui résume le procèdé de lavage da linge préconisé par M. De-lorme. Avec lui il n'est plus besoin de vestes locaux: six à luit mêtres carrés pour un hôpital de cinq cents lits suffisent, ce sera uno cave, par exemple, pourvu qu'elle soit munie de conduites d'eau d'apport, de conduites de dévorsement et de conduites de vapeur.

Dans l'espace restreint qui suffit aux installations et aux opérations figurent cinq appareils spéciaux: ut euvier à lessive; un appareil pour le lessivage et la désinfection avec le réservoir d'eau savonneuse; une essoreuse; un séchoir à air chaud; un moteur de petites dimensions.

Dans le cuvier à lessive, le linge est soumis à chaud à l'action d'une solution titrée de bicarbonate de soude. Dans le second appareil s'effectuent le lavage et la désinfection. Cotte machine qui ressemble à une étuve à désinfection du modele Gieusette et Herscher, se compose de deux cylindres, en tôle galvanisée ou en cuivre, laissant entre eux un certain intervalle, auxquels un mécanisme spécial communique automatiquement un mouvement de rotation alternatif très lent. Le cylindre intérieur est perforé de trous ne présentant aucune aspérité susceptible de détériorer le linge. Une porte donne accès dans les cylindres; des tuyaux munis de robinets permettent d'y diriger à volonité de l'eau froide, de la vapour sous pression, de l'eau savonneuse et de les voider de leur contenu.

Par l'emploi de l'appareil ci-dessus, on peut sans inconvénient mélanger le linge des malades contagieux ou non, car du même coup le linge se trouve lessivé et désinfecté par la vapeur à 120 degrés, c'està-dire qu'il est scientifiquement parlant asspitque. Dans ces conditions, on comprend très bien que l'Académie de médecine ait accepté: 1º d'engager Fautorité civile à prescrire dans les lavoirs publics l'usage de ces lessiveuses désinfecteuses; 2º d'en proposer l'emploi, dans le plus bré délai possible, pour les établissements hospitaliers des ministères de la guerre, de la marine et des colonies,

SOCIÉTÉ DE THÉRAPEUTIQUE

SÉANCE DU 17 AVRIL 1901

PRÉSIDENCE DE M. LE PROFESSEUR BOURGET, DE LAUSANNE

Communication du Président.

M. Albert Romx, président. — Messieurs, Jai l'honneur d'annoncer que l'un de nos correspondants » honoris causà « les plus distingués, M. le docteur Bourget, professeur de clinique médicale à l'Université de Lausanne, assiste à la séance et doit nous donner la primeur d'un important travail. Je remercie au nom de la Société, M. Bourget de l'honneur qu'il veut bien nous faire et je le prie de vouloir prendre ma place au bureau et de présider la séance. (Applaudissements.)

M. Bourget prend place au bureau et prononce les paroles suivantes :

M. Hourger. — Je vous suis, mes chers collègues, infiniment recomnaissant du grand honneur que vous voulez bien faire, non pas à moi seulement, modeste travailleur, mais au corps professoral suisse, que J'ai en co moment le très appréciable avantage de représenter parmi vous

En venant ici pour la promière fois, messiours, je voulais payer mon tribut de reconnaissance à la Société de Thérapeutique de Paris, qui, d'elle-même, a bien voulu m'accorder le titre de correspondant * honoris causá *. Cette distinction intatendue, m'a profondêment touché, croyez-le, on me prouvant que mes modestes recherches avaient pu dépasser nos frontières. Mais ces frontières, messieurs, on ouvrant libéralement vos portes aux savants étrangers, vous avez morte que vous ne les reconnaissiez pas en matière scientifique et vous avez donné là un noble exemple qui, soyez-en sûrs, portera d'houreux fruits.

Mais, messieurs, en voulant bien m'appeler à présider aujourd'hui cette séance à laquelle j'ai le honheur d'assister, vons mottez le comble au libéralisme auquel je faisais tout à l'heure allusion et j'en suis fier, non seulement pour moimeme, mais encore pour une pays que vous honorez en ma personne. En quittant Paris, messieurs, j'emporterai un souvenir précieux de la si honorable réception que la Société de l'hévapeutique, cetté association si connue par sos beaux travaux, qui marquent dans le mouvement médical du monde entier, a su faire au modeste savant qu'i lui apportait son tribut et so trouve appéle par vous à présider vos débats.

(Applaudissements unanimes.)

TÉTANOS 647

Présentations

1. - Tétanos et injections hypodermiques de quinine.

Par M. EMERY-DESIROUSSES.

Pendant la période de préparation de l'Expédition de Madagascar (hiver 1894-1895), il nous fût communiqué un travail d'un médecin de la marine, en résidence à Tamatave, relatant la fréquence du tétanos sur le littoral de l'île.

La communication était muette sur les canses du tétanos et se bornait à signaler le fait. Très désireux de prèvenir, si possible, une aussi redoutable complication, nous nous étions adressés aux hommes les plus compétents, faisant appel à la science moderne, pour tâcher de trouver un remêde dans le cas où nous observerions, sur la côte occidentale, la terrible névrose, qui avait fait un assez grand nombre de victimes sur la côte orientale.

Fallati-il fonder quebque espoir sur le sérum antitétanique? Hélas non! Tout le monde était d'accord, à ce moment-là, et nous ne pensons pas que cette opinion se soit modifiée depuis, que le sérum antitétanique, capable de prévenir le tétanos, était impuissant à guérir la maladie confirmée. Nous devions donc nous borner à prescrire l'antisepsie la plus rigoureuse des plaies, la atérilisation absolue des instruments et réserver l'emploi du sérum aux blessée atteints de plaies contuses des extrémités et surtout de plaies par écrasement.

On a reproché au corps expéditionnaire de ne pas s'être muni de sérum antiétanique. Ce reproche n'était pas fondé; nous avions du sérum à Majunga et nous pouvons affirmer de suite que, dans les cas de tétanos, qui se sont déclarés à bord du Schanrock (bateau hôpital) il en a êté fait usage, sans succès du reste.

Dans le courant du mois de mai 1895, plusieurs cas de

tétanos furent observés à l'hôpital militaire de Majunga (hôpital nº 1). Cet hôpital était dirigé par un médecin instruit, attentif et des plus consciencieux. Nous cherchames ensemble les causes du mal et le médecin-chef nous fit remarquor que presque tous les malades présentaient sur diverses parties du corps des plaies et des exceriations, qui, selon lui, devaiont servir de porte d'entrée aux germes tétanigènes. D'autre part. les injections hypodermiques de chlorhydrate de quinine étaiont très fréquemment pratiquées, mais avec tontes les précautions d'antisepsie et d'asepsie; or, il n'était pas possible de renoncer à ce mode d'administration de la quinine, qui s'imposait non seulement dans les cas, trop fréquents, d'acrès pernicieux, mais aussi dans certaines formes typho-malariennes et chez un grand nombre d'impaludés présentant des troubles gastriques et chez lesquels l'emploi de la quinine par le tube digestif était impossible, ces malades rendant intacts les pilules ou comprimés de quinine qu'ils avalaient.

Nous étions donc trés perplexes, d'autant plus que les cas de tétanos se multipliaient. A la fin du mois de mai, nous enregistrions un total de 11 cas, tant à l'hôpital n' 1 qu'à bord du Schamroch. Nous avions un vague soupen que les injections de quinine pouvaient être lucriminées et nous etimes l'idée de demander au médecin-chef de l'hôpital s'il avait obsorvé du tétanos chez cdes maldaés n'ayant pas reçu d'injections hypodermiques; il nous répondit mégativement. Nous apprimes en même temps que la plupart de ces injections étaiont pratiquées dans les membres et dans la région fessière.

Nous fimes alors une circulaire prescrivant de restroindre le plus possible les injections hypodermiquos, de surveiller encore plus rigoureusemont l'antisepsie et enfin de ue faire ces injections que dans la paroi abdominale et dans les flancs.

Cette circulaire, approuvée par le général en chef, était envoyée, le 2 juin, à tous les médecins chefs de service dans les hôpitaux et dans les corps de troupe. TÉTANOS 649

A partir de ce jour-là, il ne s'est plus déclaré, à notre connaissance, un seul cas de tétanos.

Voilà un fait brutal dont nous garantissons absolument l'authenticité et qui est do nature à troubler les partisans do l'origine microbienne unique du tétanos.

Pour notre compte, nous n'hésitons pas à déclarer que notre conviction profonde, absolue, est que tous les cas de tétanos, observés en mai 1895, à Majunga, ont été dus à des injections de quinine dans les membres.

Nous laissons à de plus savants le soin d'expliquer ces phénoménes. Pour nous, nous nous demandons si le tétauos n'a pas été provoqué simplement par une névrite ascendante due à l'irritation, par la solution quinique, d'un ou de plusieurs nerfs (si froducusts dans les membres).

Il ne faut pas oublier du resto que les injections dans les membres sont horribloment douloureuses. Nous en avons personnellement fait l'expérience.

Après avoir reçu une quarantaine d'injections de quinine dans la paroi abdominale, nous nous fines faire un jour une injection sur le bord extorne de l'avant-bras gauche. La douleur fut vive et la nodosité, qui suivit, resta douloureuse pendant des mois. Par contre, les injections dans les parois de l'abdomen n'ont d'autre inconvénient que de laisser, pendant longtemps, des nodosités indolores qui donnent à l'abdomen l'aspect d'un sac de noix,

En dolors de la douleur, les injections de quinine dans les membres provoquaient souvent des abcés et même des phlegmons diffus.

Il advint, dans le cours de l'Expédition de 1895, que des médecins, arrivant de France, et n'ayant pas eu connaissance de la circulaire du 2 juin, continuèrent à faire des injections dans les membres; il survint du fait de ces pratiques un certain nombre de graves accidents phlegmoneux et même gangreneux, qui nous furent signalés.

Ces faits, que nous avons communiqués verbalement à quel

ques sommités médicales, il y a déjà plusieurs années, nous avons cru devoir les livrer à la publicité, car ils nous paraissent avoir une grande importance pratique pour les médecins appelés à servir dans les colonies et pour ceux qui exercent dans les avas à Malaria.

D'un autre côté, cette note n'arrait-elle pour résultat que de faire abandonner l'habitude des injections dans les membres qu'elle rendrait un sigualé service aux malheureux patients, auxquels on impose des souffrances inutiles, daugureuses et qu'il est si facile d'évier.

Communications.

Le traitement médical de la pérityphlite

Par le Dr Rounger

Professeur de clinique médicale à la faculté de médecine de Lausanne.

Nous n'avons pas la préteution de faire l'historique complet de la pérityphilie et de son traitement, nous nous bornerons à examiner les grandes lignes des méthodes curatives employées depuis l'avènement du traitement chirurgical de cette affection.

Il serait, en effet, bien difficile de citer en détail les opinions des nombreux anteurs qui ont ècrit sur ce sujet. En 1896, Grobé avait déjà compté 1,250 publications sur la pérityphitie (Grobé, B. Pathologie und Therapie der Tiphititiden. Eine historitehe studie, GroisWadd, 1896).

Rappelons en passant que le nom de pérityphlite a été proposé pour la première fois par Puchelt en 1829 (Puchelt, System der Medizin, Heidelberg, 1829).

Jusqu'en 1885, cette affection était du ressort de la médecine interne, bien que depuis 1846, Rokitansky et Volz eussent démoutre la perforation de l'appendice par des corps étraugors (Volz, Ad. Die durch Kolhsteine bedingte Perforation des Wurmforbactes, etc., Karisvulo, 1840. On la traitait par les saugsnes, les cataplasmes, les purgatifs et les bons onguents, et elle ne fit pas beaucoup parler d'elle pendant cette période, mais elle devint bionôt un ce alamité publique, des lo moment ed les chirurgiens démontrérent, pièces en mains, que la pérityphito appendiculaire devait rentrer dans lo domaine de la chirurgie.

domaine do la chirurgio.

Dès l'année 1885, oute tumeur ou résistance dans la région lifec-cecale droite, avec fièvre et état général infectioux, était considérée comme une pérityphlite et justiciable d'une intervention chirurgicale. Il fallait agir sans tarder, tonte heure perdue obtait une chance de moins de réussite, et des cette époque le traitement médical de la pérityphlite était condamé.

Pendant II ou 12 aus cotte règle domeura immunable; il y out bieu quelques médecins partisans de l'ancien régime (Sahli, Revillod, etc.) qui protesterent, affirmant que le traitement médical conservait toute sa valeur à côté du traitement chirurgical. Lour voix se perdit dans le désert, et l'intervention chirurgicale sévit avec ardeur avant, pendant et après les accès de péritybhite appendientaire. Peudant cette période la science chirurgicale fit faire un pas énorme aux procédés opératoires et les perfectionna à tel point que les chances d'insuccès étaient minimos, ou réduices à leur extrémo limite. Les comptes rendus des sociétés chirurgicales et des congrès médicaux no sont remplis que de ces détails

techniques et de statistiques les plus encourageantes.

On espérait faire passer cette opération de grande chirurgie
dans la pratique courante, de façon que tout médecin de
campagne phi, avec un couteau et uno pince, intervenir des
le début de la pérityphitie; et quand on vit des chirurgiens
présenter des statistiques de létalité de 0,5 0/0,on proposa même
de consciller aux marents l'extiración priventive de l'annen-

dice, de manière à mettre leurs rejetons à l'abri de la pérityphite. Si on ne fit pas de lei pour rendre cette opération préventive obligateire, c'est qu'on était occupé ailleurs, et que la vaccination ou les désinfections obligateires occupaient déjà suffisamment les législateurs.

La technique opérateire était arrivée au maximum de développement désiré, mais il n'en était pas de même de la question de pathogénie de cette affection.

Ou avait cependant éclairei certaines questions et, en particultier, cello des cateuls appendiculaires, qu'on cessa de considèrer comme de malencontreux noyaux de cerises, ou d'autres fruits engagés, par lassard, dans ce cul-do-sac, mais bien comme des concrétions formées peu à peu, ainsi que la plupart de celles qu'on treuvo dans les différents organes du corps humain, soit, dans le cas particulter, par des matières fécales, ou par des sets calcaires fixés antour d'un noyau do n'importe qu'elle nature.

L'anatemie normale et pathologique de l'appendice profita aussi de cette étude. On décrivit avec plus de seins les rapports de cet organe avec le cœœum et les organes avoisinants, sa longueur variable, ainsi que sa forme, sa vascularination et a ficon dont il était enveloppe par le péritoine. Puis en voulut faire une classification des appendicites, sans yréussir beancoup. On décrivit l'inflammation de la muqueuse, do la musculeus, de la séreuse, pour en faire des endo appendicite, pariétale appendicite, périappendicite, puis des appendicites totales, perforantes, suppurées, gangreneuses, etc. Mais d'un autre côté, on neus dissait que l'appendicite la plus simple pouvait donner des symptômes los plus graves, au même titre une l'appendicite ganzreneuse.

Cette divisien n'était denc pas faite peur guider le médecin dans le cheix de l'interventien, mais seulement peur l'engager à ne procéder que chirurgicalement.

Quant au mécanisme de la lésien, en accusa tout naturellement le calcul appendiculaire qui, àun mement denné, devait

produire une irritation des parois, du gonflement inflammatoire. de l'œdème et consécutivement un sphacèle par compression. De l'appendice, la phlegmasie gagnait le cœcum, provoquant des troubles graves dans sa paroi et concourant avecles tissus avoisinants à former la tumeur palpable à travers les parois de l'abdomen. C'était l'explication la plus ordinaire, bien qu'on cut pu avec autant de raison faire partir la philegmasie de la paroi cœcale, pour se continuer sur celle de l'appendice, où elle prenait un caractère de gravité tout particulier, à cause de la faible lumière de cet appareil, produisant plus facilement un étranglement; et si, par hasard, un corps étranger était engagé dans le canal, les chances de nécrose pariétale en étaient considérablement augmentées. Nous passons sous silence un certain nombre de théories additionnelles, cette discussion ne rentrant pas dans le cadre de ce travail. Mais il faut cependant citer la part que prirent les bactériologistes dans l'étude de cette question de pathogénie. Leur concours était bien nécessaire, car ils avaientà chercher les coupables dans la faune et la flore si variées et si fournies de notre tube digestif. Quel était donc le microbe coupable de l'appendicite?

Le choix était immense, et un grand nombre de microgganismes furent signalés comme les agents de l'infection appendiculaire. En première ligne on nous dénonça ces vieux récidivistes, qui s'appellent les streptocoques, les staphylocoques, les pneumocoques, les collòacilles, etc., sans compter les microorganismes de l'influenza, du rhumatisme, de la scarlatine, de la rougeole, etc.

Tout cela n'était pas très concluant, car nous savons bien que tout ce petit monde circule librement et en foule dans tous nos organes ouverts à l'extérieur, où ils sont porr ainsi dire chez eux, s'y comportant le plus souvent en ami de l'homme, payant du reste son hospitalité en aidant aux travaux de la digestion gastro-intestinale.

Pour les prouver coupables, on imagina qu'ils pouvaient

changer de caractère sons l'influence de causes encore mal définies, et on admit que leur virulence, nulle jusqu'à un certain moment, pouvait s'evalter, et qu'alors ils se livraitent à toutes sortes de médaits, forçant le chirurgion à intervenir à main armée. L'ordre rétablie et la paix faite, les microvapanismes perdaient leur virulence et reprenaient tranquillement leurs travaux ordinaires.

Sur ce thème nous eumes des variations infinies, comportant les théories les plus étranges; elles reposent dans toutes les publications spéciales des l'année 1890 à nos jours, mais elles n'ont pas encore pu nous expliquer le pourquoi de la pérityphlite. La faute n'en est pas à la bonne volonté et à la porsévérance des bactériologistes qui, à cette époque, n'étaient pour la plupart pas qualifiés pour s'occuper avec fruit de cotte ótudo des infiniment petits, vivant et se reproduisant comme la plupart des plantes unicellulaires que nous connaissons et qui rentront donc dans lo domaine étudié par le botaniste, au mêmo titre que la flore des plantes supérieures, que nous observous à l'œil nu. Si la bactériologie a eu des commencements difficiles, c'est qu'elle a méconnu les lois de la physiologie végétale ot qu'elle n'a pas su profiter des observations de celle-ci sur la morphologie cellulaire ot les symbioses, sur les variations de toxicité dépendant de la composition du sol, et de bion d'autres lois applicables aux grandes commo aux petites cultures.

Le chirurgien a donc fait faire un pas énorme à la technique de l'opération de la pérityphlite, mais il n'a rien pu démontrer de définitif quant à sa pathogénie.

A-t-il été plus heureux dans la question do thérapeutique générale?

Il no nous parait pas. La nature do ses fonctions ne lo prédispose pas spécialement à étro un bon thérapeutisir interne Il exerce un art plus objecuit, reposant sur des données pointivos, et on comprend qu'il soit habitué à des propositions plus exactes et plus intransiçuennes que celles habituelles au médecin toujours en présence du mystère, Le traitement adopté par le chirurgien était des plus simples : application de glace dans la région iliaque droite et opium à l'intérieur.

Le froid devait diminuer la phleguassie. Cola peut être vrai pour un abcès superdiciel, itais cela ne l'est plus pour un abcès profond. L'expérience de Lauder Brunton est probauté à cet égard. Il prend un lapin, dans l'abdomen duquel il introduit un thermomètre, et il voit la température monter rapidoment forsqu'on applique des vessies de glace sur la peau du veittre.

Dans le traitement de la pérityphlite, la glace arrive donc au résultat opposé à celui qu'on désire.

Quant à l'opium et ses dérivés, c'est toujours le médicament préféré du pathologiste externe. En l'espèce, il avait toutes les vertus et en particulier celle de maintenir l'intestin au repos et de favoriser les adhèrences, ultime ressource fournie par la nature, cherchant à empécher l'envahissement du péritoine par les microorganismes. Ce narcotique diminuait aussi les phénomènes douloureux. Ou ne pouvait pas, à notre avis, instituer une plus mauvaise thérapeutique, mais elle servait à merveille la cause du chirurgien, en rendant nécessaire, à bref délai, l'intervention armée.

Si la plupart des pérityphilites sont provoquées ou préparées par la stase stereorale dans le cœcum, on voit coubien il est illogique d'augmenter encore la constipation par l'opium, dans la trompeuse espérance de favoriser les adhérences avec les séreuses voisines. Or nous savons par ce qui se passe sur la pièvre, combien ces adhérences se forment facilement, malgre le mouvement rythmique de la respiration.

Il est donc douteux que l'opium ait quelque action sur la formation des adhérences ou sur leur solidité; par contre il voile le mal en procurant au malade un bien-ètre trompeur; mais ce qui est plus grave, c'est qu'il augmente la coprostase et favorise la dévomposition dans le gros Intestin et principaloment dans le cœcum. Par centre, le chirurgien a supprimé tous les moyens thèra peutiques employés jusque-là par la médecine interne. Il prolibé de la manière la plus absolue tous les purgatifs, même l'innocente huile de ricin, et cela sous la menace d'une perforation immédiate par déchirure d'adhérences problèmatiques.

Il se moque des sangsues, ee merveilleux moyen décongestionnant; quant au cataplasme on n'en parle mêune pas, il cet regardé comme de la vieille munition, plus muisible qu'utile, au même titre que les pommades mercurielles, l'iode, l'ichtioil, etc.

Les lavements sont encore plus sévèrement défendus, s'il est possible, que les purgatifs. L'ancien traitement médical est caractérisé d'expectative sans armes, tandis que la glace et l'opium c'est l'expectative l'arme au pied.

Pendant dix aus ce mode de faire ne change guére, tout Peffort se portant sur la technique opératoire. Quelques chirurgiens compatissants permirent de changer la vessie de glace contre un bon cataplasme de farine de lin, plus agréable au malade (parce qu'il lin étair plus utile) ou par des compresses chaudes. C'est encore le traitement qui sévit à l'houre actuelle.

Depuis rois ou quatre aus, on a vu se produire une certaine diminution d'enthousiasme pour l'interveution précoce: des chirurgiens proposèrent l'opération en deux temps, c'est-à-dire le débridement du foyer purulent d'abord, puis après quelque temps, les symptômes aigus étant calmés, la résection de l'appendice. Cette prudente temporisation gagne de jour en jour plus de partisans, et il fant le dire à l'honneur de la chirurgie moderne, ce furent les opérateurs ayant le plus pratiqué la résection hâtive de l'appendice, qui conseillèrent le plus la prudence.

Cependant les statistiques continuaient à être bonnes, et on n'y trouvait rien qui pût expliquer ce recul du principe de l'intervention immédiate. Il est probable qu'un certain nombre de cas difficilement classables, pour toutes sortes de raisons spéciouses, avaient cependant fini par mettre en garde le chirurgien contre l'opération bâtive.

On consoilla alors d'atteudre que la température et le pouls se fussent mis d'accord, ce qui prenati bien quelques jours; puis on temporisa encore huit, dix ou seize jours pour arriver enfin an principe de l'opération à froid, apres guérison complète de la poussée aigué, ce qui démande le plus souvent cinq on six semaines, grâce à l'illogique traitement de l'expectative l'arme au piet : glace et ouium.

Actuellement, les six semaines peuvent se prolonger sans crainte en huit ou dix.

La chirurgie nons recommande en outre de ne pas généraliser, mais de considérer chaque cas, en particulier et de temporiser le plus pessible, si on ne peut agir dès les premières heures. Nous ne voulons pas du reste discuter ces règles, ne voulant admettre notre compétence que pour des questions de théraneutique générale, et nous proposons au médecin de reprendre sa place de médecin traitant de la pérityphlite, pendant la période que le chirurgien considère cemme celle de l'expectative l'arme au pied, en premettant à ce dernier de lui rendre le malade bien préparé pour subir une opération à froid, et dans un temps certainement plus court que celui exigé par le traitement qu'il préconise, et nous revenons avec nos purgatifs, nos sangsues, nos cataplasmes, nes lavements et la statistique pour nous protéger ou nous absendre en cas de malheur. Pour démontrer la logique de notre thérapeutique, nons devons reprendre l'histoire médicale du malade,

On nous dit que, le plus souvent, le début de la pérityphilie est brusque, qu'il éclate comme un erage dans un ciel seroin. Rien n'est plus contraire à ce que nous observons journellement. Nous pouvons plutôt affirmer que tous les individus atteints de pérituphitie souffrent de troubles yastro-intestinaux et quo cela commenco presque toujours par des troubles gastriques (souvent de l'hyperchlorhydrie) pour continuer par des manifestations intestinales (alternatives de constipation et de diarrhée) et ces symptômes peuvent durer des moiss et des années avant qu'ou arrivé a remarquer des troubles du côtô du cocum et de l'appendice; mais il sufit souvent d'un froid de pied, pendant une de ces digestions laboriouses pour provoquer les troubles les plus graves. Tont le monde est d'accord pour admettre que la constipation est la principalo cause prédisposante de la pérityphilte, mais nous, médecin, nous savous aussi que la constipation n'est qu'une conséquence d'un a lifertaire dans les fies de la constipation n'est qu'une conséquence d'un a lifertaire dans les fies de la constipation n'est qu'une conséquence d'un a lifertaire dans les fies de la constipation n'est qu'une conséquence

Notre part serait done déjà très belle, sl on voulait nous remettre le traitement prophylactique de la pérityphlite, qui comprend tout d'abord le régime alimentaire, et les soins à donner à l'intestin pour parer à la constination. Si les grandes villes d'Amérique fournissent un si grand nombre de cas de pérityphlite, ce n'est pas, crovons-nous, uniquement parce qu'on s'y nourrit principalement do viande, mais blen parco que le régime alimentaire général est déplorable. - Outre une nourriture très épicée et prise rapidement, bien souvent debout dans les bars, on boit force boissons glacées. - Le candidat à la pérityphlite doit suivre un régime mixte, où la viande entrera pour une proportion minime, tandis qu'on augmente les légumes, les fruits très euits et les farineux. On voit souvout les malades prendre des soins infinis, pour ne pas avuler les pepins de fruits, dans la crainte de les voir s'introduire dans l'appendies ; nous croyons que c'est là une crainte chimérique et les semences des fruits, à part les noyaux ligneux, out plutôt une heureuse influonce sur la muqueuse Intestinale, paree que leur épisperme, par macération dans le liquide intostinal, donne toujours une sorte de muche très utile pour lubrétler les parois et aider au glissement de la masse alimentaire ou fécale.

Les semences de coings, de pommes et de poires possèdent

cette propriété au plus hant degré. On corrigera avec soin l'hyperacidité gastrique, si nuisible à la longue, au fonctionnement intestinal; on y arrive soit par des bouillies préparées au lait, soit en donnant des alcalins au moment où la digestion gastrique est à son point culminant. Pendant la digestion intestinale, on entretiendra la chaleur aux pieds et aux jambes soit par le mouvement, soit par des chaussures appropriées. On ne laissera pas un seul jour l'intestin sans fonction évacuatrice, on l'aidera par les purgatifs salins, comme le sel de Carlsbad, pris le matin à jenn, à la dose d'une cuillerée à café dans de l'eau chande ou dans une infusion aromatique (petites camomilles); mais il est encore plus utile de donner une large portion de fruits cuits, au petit déjeuner du matin, et si cela n'est pas suffisant, d'y adjoindre, à la fin du repas, une ou deux capsules d'huile de riein (à 2 grammes). Ces deux dernières précautions peuvent se répéter à chaque repas aussi longtemps que la constipation persiste. Quand elle a cédé, on règle alors la fonction en diminuant d'abord la dose d'huile, puis relle des fruits. Il faut faire en sorte que la selle se produise le matin, entre le petit déjeuner et le repas de midi. On peut aussi d'emblée s'aider par les lavages intestinaux administrés le matin comme nous le décrivons plus loin.

La crainte de voir l'intestin s'habituer aux purgatifs et aux lavements n'est pas justifiée. Nous avons toujours vu qu'après des semaines ou des mois de ce traitement, les fonctions intestinales reprenaient leur cours règaller et qu'il suffisait alors de veiller simplement suir le régime pour les maintenir normales. En résumé, le traitement prophylactique de la pèrity-phlite est celui des d'spepsies gastro-intestinales, avec certaines modifications dietées par les circonstances. Le constipé devra v'abstenir de boissons glacées, et à ses repas user de boissons chaudes, soit uns infusion aromatique (the, camomille, tilleul), soit de l'eau chaude aiguisée de vin ou de sur de citron. Nous recommanderons aussi les mouvements de gymnastique, qui mettent en luc se musées de l'abdoinen, et en premier lién mettent en luc se musées de l'abdoinen, et en premier lién

la rame (muscles droits) et la pagaie (muscles en ceinture). Si le malade n'est pas dans la situation de faire du canotage, on lui fait exécuter le simulacre de ces exercices.

Du reste, le médecin a à sa disposition une foule d'exercices, qui lui sevont dietés par les circonstances, et qui toujours tendront à développer les muscles abdominaux. Comme massage nous nous servons d'uno méthode très recommandable, parce qu'ello est simple ot qu'elle s'applique par lo malado luiméme. Elle consiste à faire placer le malade dans la position ouchée sur le dos, et de faire exéruter des flexions altornatives, de la cuisse gauche et droite, en comprimant vigoureusement la partie supérieure de la cuisso sur l'abdomen, les deux mains d'ant croisées sous la routle. On répétera cet exercice quatre fois par jour (nombre des flexions à déterminer dans chaque cas, en moyenne 10 ou 20) à jeun le matin, à ouze houres, à quatre licures et le soir en se couchant. Le matin et le soir, le malado fera cet exercice étant nu, et dans la journée sans quitter ses vétements.

Occupons-nous maintenant du traitement de la pérityphlite une fois déclarce, soit qu'elle se manifeste par des crises appendiculaires, soit que les troubles crecaux dominent la situation. Dans le début on peut le plus souvent trouver les symptômes classiques (douleur à la pression, résistance, engorgement des parois, boudin appendiculaire, etc.) mais bien souvent aussi on ne trouve rien, ou très peu de chose : une paroi cœcale épaissie, dont il est bien difficile de juger la consistance, si l'on voit le malade pour la première fois. L'examen des matières nous donne quelquefois do meilleurs renseignements. On voit se produire dans l'intervalle des périodes de constipation des diarrhées fréquentes, bien que peu abondantes, se produisant après chaque repas. Les matières ne sont pas liées, et présentent toujours une très forte proportion d'aliments non digérés, soit viandes, soit légumos, Ces symptômes précèdent souvent l'attaque de plusieurs semaines et même de plusieurs mois, ils sont pour nous caractéristiques, et ils peuvent durer très longtemps sans qu'on arrive fatalement à la erise aigué.

Le traitement que nous allons decrire s'applique aussi bien à la crise la plus légère qu'à la plus grave; nous le pratiquous maintenant depuis bientôt dix ans, soit dans notre elientéle particulière, soit à l'hôpital et nous pouvons affirmer qu'îl ne nous a jamais douné les acédents que les chirurgieus aiment à signaler, quand on leur parle de traitement médical de la pérityphilite, et nous n'avons voulu le recommander qu'après l'avoir perfectionné au cours des expériences et lui avoir vu faire ses preuves. Il est basé sur la désinfection de l'estomac et du petit intestin, et sur le lavage du gros intestin. Nous ne prétendons pas à la priorité du principe, depuis longtemps appliqué dans le traitement des affections intestinales, nous avons simplement groupé certains éléments de méthodes déjà connues, pour en faire un traitement logique et simple des flections escales.

Sitót une crise aiguê commencée, si légère soit-elle, nous mettons le malade à la diéte liquide, de préférence des potages à l'eau, avecde la fariue d'avoine, du riz, des cuets, et si le patient n'a pas faim, il reçoit du thé léger avec très peu de lait. Journellement tous lui administrous 15 à 20 grammes d'huile de ricin, contenant en dissolution du salacétol (Huile de ricin 20 grammes, salacétol 1 gramme) ou bien 5 ou 10 capsulos (à 2 grammes et 1 à 2 grammes de salacétol en même temps. Si les troubles gastriques prédominent mous faisons un lavage d'estomae à l'ean bienréonatée (1 0/6). Quant au lavage du gros intestin, oso-t-ou le pratiquer et pouvous-nous essèère en retire un bénéfice certain?

Les chirurgiens se sont toujours fortoment opposés aux lavages intestinaux et même aux Javements; toujours dans la creatine de gêner la formation des adhérences ou de provoquer une perforation imminente. Ces craintes sont exagérées. Il n'appartient pas à nos moyens de fecilitor ou d'empécher des adhérences intestinales, qui seront ee que la nature you-

dra bien les faire. Quant à la perforation elle ne sera ni aidée. ni empêchée par les liquides introduits dans l'intestin; elle dépend surtout d'un travail antérieur de nécrese de la paroi et, si elle s'est faite d'emblée, sans la barrière des adhérences, le cas est des plus graves, mais il ne sera pas aggravé par le traitement : et si les adhèrences ont pu calfeutrer l'orifice. nous n'aurons rien à craindre en poussant nos liquides antiseptiques jusque dans le cœcum. On a vu. nous dit-on, des liquides passer du gros intestin dans le péritoine, c'est possible, mais dans ces cas le mal était déià bien grand, ot il n'en sera pas augmenté par l'arrivée d'un désinfectant. Quel bénéfice peut-on espérer des lavages intestinaux? A notre avis il est immense. Puisque la pérityphlite consiste en une phlegmasie cecale, entretenue par des matières fécales anormales, ou y résidant trop longtemps, et que nous pouvous atteindre directemont le lieu du désastre, il n'v a pas à hésiter à faire circuler dans le gros intestin des liquides antiseptiques ou décongestiennants, qui auront dans tous les cas le précieux effet de layer cette cavité et d'extraire rapidement et sûrement des éléments d'infection. Cela aura le même effet heureux que le premier lavage d'une plaie contaminée par des corps étrangers. Voilà pour le début de l'affection, mais si elle s'aggrave, ces lotions deviendrent de plus en plus utiles, et même dans la période de grande intexication, neus pouvons toujours espérer enlever directement une partie de la substance intoxicante. Dans ces circonstances un lavage de l'intestiu a le même heureux effet qu'un lavage d'estomac dans les cas d'intoxication ou d'autointexication. Prenons comme exemple l'intoxication urémique eù nous voyons les lavages stomacaux avoir un si bon effet. que du reste nous constatons aussi après le lavage du gres intestin. Nous en ebtenens le même bénéfice dans toutes les intoxications, et cela s'explique par le fait, maintenant bien connu, que les substances toxiques pénétrant dans l'erganisme, par n'importe quelle voic, sont toujours, en partie, éliminées à la surface des muqueuses, et principalement de la muqueuse

gastrique et intestinale; d'où nous pouvons facilement les enlever par des lavages. C'est ainsi que nous arrètons momontanément les vomisseumonts urémiques: le hoquet et les mansées des septicémiques; c'est ainsi qu'on peut expliquer les heureux effets signalés dernièrement, dans deux eas graves d'intoxication générale, suite de pérityphlite (Lucas-Championnière); c'est ainsi qu'on empéchera ou qu'on arrètera ees hémorrhagies stomacales qu'on observe dans les infections graves, surtout celles provenant de perforations intestinales et qui ont été récemment décrites sous la dénomination lugubre de vomito negro de l'appendicite.

Nous pouvons donc admettre que, si le lavage stomacal est utile dans toutes les intoxications, le lavage intestinal ne l'est pas moins et doit être employé dans les mêmes circonstan-

Par lavage intestinal, nous n'entendens pas la pratique qui consiste à introduire en une fois plusieurs litres d'ean, sous pression; nous considérons cette méthode comme dangerouse on tout an moins comme trop brutale. Il suffit, pour pratiquer ce lavage, d'un litre d'eau introduit avec précaution, et de façon que ce liquide pénètre en partie dans le coccum. Nous employons pour cela une sonde stomacale molle (enduite de vascline). quo nous introduisons peu à peu, tout en faisant arriver le liquide de lavage au moyen d'un instrument quelconque de propulsion (seringue, enema, irrigateur, etc). Nous avons souvent entendu dire qu'une sonde molle, introduite dans le rectum ne pénétro pas plus loin qu'une simple canule d'irrigateur; qu'elle va s'enroulant dans l'ampoule rectale, sans franchir le second sphincter. Nous croyons que e'est là une erreur; on peut, avec un instrument convenable, arriver facilement à le faire s'engager dans le sphineter supérieur; dans ces cas, il n'est pas nécessaire de pousser la sonde plus avant, car le liquide pénètrera très facilement dans le emcum. Mais, même si la soude s'enroule dans l'ampoule rectale, l'effet ntile sera produit, parce quo cette sonde ainsi repliée sur elle-même, provoque la contraction de l'anus, mais facilite ou excite même l'ouverture du second sphineter, permettant ainsi le libre passage du liquide introduit; c'est ce que nous avons souvent observé en introduisant le doigt dans le rectum pendant la manouvre.

Le liquide introduit aura une température de 38°, et contiendra un antiseptique soluble et non toxique; nous employons dans ce but exclusivement l'ichthiol, qui a l'avantage de joindre à des propriètés antiseptiques, des vertus décongestionmentes très remarquables; nous l'employous en solution, aqueuses à 4 pour mille. En même temps que cette solution, nous faisons pénétrer une certaine quantité d'huile d'olive, au moyen d'un petit instrument de verre que nous avons décrit ailleurs (Therapeutische Monatshefte, nou 1900. Berlin).

Il consiste en un petit ballon de verro à deux tubulures. d'une contenance variant de 100 à 250 grammes, et qu'on place entre l'extrémité libre de la sonde et le tube adducteur de l'irrigateur ou de l'enéma, après l'avoir rempli d'huile, par aspiration ou avec un petit entonnoir. (Penfold, instruments de chimie, Genève).

En passant, l'eau enlève une certaine quantité d'huile, qu'elle entraîne dans l'intestin.

L'huile employée est l'huile d'olive fine contenant des principes aromatiques volatils, tels que le memble ou le thymol ou encore le salicylate de méthyle à 1 0,00, ou encore de l'huile essentielle de sauge 05 gouttes par 100 grammes. Nous comptons beaucoup sur l'effet mécanique et émollient de l'huile introduite de cotte façou; ce moyen nous donne également de très bons résultats dans le traitement de la constipation

Dans les crises appendiculaires, olle calme très rapidement les douleurs, etnous comparons cet heureux effet à celui qu'on observe dans les coliques hépatiques après l'ingestion d'huile d'olive. Dans les cas où la colique appendiculaire est due à la contraction de l'appendice, essayant de se débarrasser d'un calcul, nous pensons que l'huile introduite dans le carcum lui sera d'un grand secours.

Voici maintenant le dispositif de l'opération. Le malade est couché sur le côté droit, la tête non appuyée par des coussins : le piéd du lit est relevé de 20 à 30 centimètres, de manière que la tête soit partie la plus déclive du corps, une fois la sonde introduite de 5 à 10 centimètres, on fait passer doucement le liquide, qui se charge d'huile à son passage dans l'oléoklysme, puis on fait penètrer doucement la sonde aussi longtemps que le liquide s'écoule facilement, s'il se produit un arrêt, on rotire un peu la sonde, jusqu'à ce que l'éconlement se rétablisse. On enlève avec précaution la canule après avoir introduit un litre de liquide. Lo malade reste sur le côté droit autant qu'il le peut, et si possible 20 à 30 minutes.

On peut pendant ce temps faire des frictions de bas en haut sur le colon descendant, pour aidera up assage du liquide dans le colon transverse et dans le cocum. Puis le malade rond co lavement, soit sur la chaise percèe, soit dans an vase plat. On cherche pour les deux premières fois à lui faire rendre la totalité du liquide, puis une partie sealement pour les fois suivantes, maintenant ains une petite quantité d'huile et d'ichthiol dans le coccum, comme une sorte de pansement. On répeté l'opération matin et soir.

Dans l'intorvalle des lavages, ou placo sur la région de la fosse iliaque droite des cataplasmes de farine de lin, ou bien cinq ou six sangsues, si la tuméfaction est très forte et résistante.

Dès le deuxième ou troisième jour du traitement, nous remplaçons l'huile de ricin par les purgatifs salins d'après la formule suivante:

Bicarbonate de soude chimiq, pur.

Phosphato de soude anhydre.

Sulfate de soude anhydre de chaque 5 grammes.

Eau 1 litro.

En prendre 150 grammes trois ou quatre fois par jour, à répartir dans la journée.

Il serait trop loug de publier en détail les observations prises soit dans notre clientèle privée, soit dans notre service d'hôpital, où nous traitons les cas les plus légers comme les plus graves par cette méthode. Il ressort de ces histoires de malades, que les lavages intestinanx ont un effet rapide et remarquable sur le symptôme douleur. Les coliques cessent ou diminuent dès le premier lavage, et le plus souvent sont définitivement éloignées en faisant deux lavages par jour; la douleur à la pression cède aussi parallèlement et progressivement, en même temps que le malade se laisso mieux palper, et que la tumeur diminue de consistance et de volume. Ces symptômes douloureux disparaissent aussi rapidement qu'après l'emploi de l'opium, mais tandis que ce dernier est un palliatif, voilant le mal, notre procédé est vraiment curatif, puisqu'il élimine la canse de la douleur représentée par des substances irritantes on toxiques.

Ce premier effet est suivi d'un grand sentiment de bien-ètre; les symptomes d'intoxication générale: nausées, vomissements, angoisses, sueurs froides, cessent peu à peu, et dans la plu-

L'effet est aussi remarquable sur la température, que sur la douleur.

part des cas, dès les premières 24 heures.

Combien de fois avons-nous vu la fièvre tomber de 39° ou 40° à 30° ou 37°, des le premier lavage, pour reprendre un peu et tomber définitivement à la normale après le troisième ou le quatrième lavage.

Nous avons observé cette issue favorable dans des cas où la tuméfaction était considérable, compromant toute la fosse litaque droite, s'étoudant même jusqu'à l'ombilie, avec ou sans symptomes d'appendicite aiguë. Dans les cas où la collection prurlente était probable, la température baissait quand méme, pour se maintenir pendant quelques jours à colle d'une simple suppuration (37- ou 38). Puis peu à peu co symptôme même diminuait et la température redovenait normale. Ce qui tend à prouver qu'un abcès péri-appendiculaire peut, ou bien se résorber, ou bien se vider dans l'intestin par le canal de l'appendice, une fois celui-ci décomprimé.

par le canal de l'appendice, une fois celui-ci décompriné. La constatation de pus dans les selles est venue quelquefois confirmer cette opinion, en dehors des cas où se sont produites de larces évacuations purulentes par l'intestin.

Dans certains cas graves, nous avons tenu à procéder nousnéme, aux premiers lavages intestinaux. Notre entourage médical paraissant effrayé des suites possibles d'une intervention aussi en désaccord avec les idées adoptées suit les causes et le traitement de la pérityphile; et cependant, même dans ces cas délicats, nous n'avons januais en d'accidents à regretter. Nous avons anssi certaines observations dars lesquelles les principaux symptômes ayant disparu, la flèrre se mintenait avec d'autres symptômes abdominaux dépendant d'autres désordres. (Phiegmasie des annexes chez la femme, tuberculose intestinale et péritionéale, etc., etc.)

La durée du traitoment par les lavages intestinaux a été de deux à dix jours; le plus souvent, ils ne sont plus nécessaires après le cinquième ou le sixième jour, et nous les remplaçons par des purgatifs légers, luille de ricin on l'eau alcaline plosplo-sulfatée, dont nous avons donné plus laut la formula.

Le malade, une fois guéri de l'accès aigu, nous ne nous opposons nullement à l'opération à froid, qui est décidée dans chaque cas en particulier et suivant les circonstances: lorsqu'il ya des récidives, ou que le malade ne peut suivre chez lui une hygiène appropriée à son état.

Nous avons des malades que nous suivous depuis plusieurs années, et qui, aprés un accès aigu, peuvent être considérés comme définitivement guéris, puisqu'il n'y a jamais eu de rechutes, et qu'ils n'éprouvent aucun malaise du côté du système gastro-intestinal. Chez quéques-uns nous avons vu se produire dos récidives, d'autant plus bénignes qu'on appliquait plus tôt la méthode des larges intestinaux. Un lavage fait à temps, suffissit bien souvent pour dissiper un malaise

annonçant une récidive probable. Certains de nos malades nous disent qu'ils ont encore de temps en temps recours au lavage, comme moyen prophylactique, par exemple, après avoir fait quelques excès de table, on de fatirue.

Une autre sèrie de nos malades guéris ont été ensuite opérés, mais même dans ces cas, tous n'ont pas été définitivement débarrassés des symptômes douloureux de la pérityphilite et ils étaient obligés, comme les autres, non opérés, d'avoir recours au lavage intestinal, pour combattre les coliques, la constipation, et même dans un cas les vomissements.

Dans ces conditions, nous pouvons considèrer nos résultats comme des plus astisfaisants et comme médecin ils nous elus atsagagent à revendiquer hautement la direction du traitement de la pérityphlite, non pas que nous pensions pouvoir nous passer du concours du chirurgiers, auquel appartiendra bien souvent le dernier mot, mais en le faisant intervenir à son heure et avec des indications plus précises.

Nos revendicatious sont encore plus légitimes, si ou veut considérer la pérityphilite et l'appendicite comme la manifestatiou locale d'une infection générale, ainsi que certains observateurs le pensent (Sahli, Jalaguior, Merklen, Tripier, etc). Elles ne le sont pas moins, si nous considérons le mode de traitement actuel, conseillé par la plupart des chirurgiens, qui, d'opérateurs zélés et pressés, deviennent temporisatours, suqu'à attendre la disparition complète des symptòmes aigus est subaigus. En conséquence, nous demanderons de pouvoir nous occuper de ces malades pendant les six ou luit semaines qui les séparent d'une opération à froid ; mais pour faire autre close que de leur administrer do l'opium ou de les couvrir de glace.

Lorsque nous aurons remis en meilleur état un individu atteint d'appendicite, nous n'aurons pas la prétention de le considèrer comme définitivement guéri, et il pourra toujours recourir au chirurgien pour se faire réséquer l'appendice, au memo titre qu'on enlève des amygdales hypertrophiées et trop sujettes aux anginos.

Les chirurgiens ont donc devant eux de belles séries d'appendices à réséquer, même si le traitement médical leur onlevait une benne partie de la bosogne d'antan.

M. Albert Roun. — Je remercie M. Bourget, au nom de la Société, de l'intéressante communication dont il nous a offert la primeur. Ce travail, de tous points remarquable, est d'autant plus intéressant que l'auteur, en le publiant, fait vraiment un acte de courage.

On a en effet aujourd'hui un certain mérite à parler du traitement médical de l'appendicite eu de la pérityphlite, et nous sommes obligés d'avouer que le médecin, au moment où nous sommes, a teutes les peines du mondo à ne pas faire intervonir le chirurgien dans le traitement de ces maladies. Pour mon compte personnel, je suis fort heureux de voir un homme de la valeur de M. Bourget se ranger parmi ceux qui prétendent que la thérapeutique purement médicale pout fournir de bons résultats : j'ai vu tant d'accidents qui auraient pu, j'en suis certain, être évités, se produire à la suite d'interventions sanglantes, que je suis de plus en plus convaincu que notre devoir absolu est de réagir contre cette manie opératoire qui enlève à la médecine un trop grand nombre de sujots qui relèvent logiquement de ses soins. Je voudrais donc que l'initiative de notre collègue de Lausanne fût l'occasion d'une discussion approfondie du traitoment de l'appendicite. Nous semmes ici dans un milieu ossenticllement médical et i'ai la conviction que cette discussion pourrait rendre les plus grands services en éclairant les nombreux praticions qui lisent nes comptes rendus.

Élections

Lo serutin pour la nomination de trois membres titulaires de la section de médecine, de deux correspondants nationaux et d'un correspondant étranger, ouvert à quatre heures et lermé à cinq heures et demie fournit les résultats sui vants:

Votants 48, majorité absolue 25.

Out obtenu:

MM. Balzer	4	4 suffra;
G. Baudouin	3	5
A. Riche	25	5
Hallion	10	i —
lsch Wal	14	1
Sainton		8 -
Chambian		4

En conséquence MM. Balzer, G. Baudouin et André Riche, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages sont proclamés membres titulaires de la Société.

MM. Brocchi et Odilon Martin, correspondants nationaux et M. Noguera, de Madrid, correspondant étranger.

Le scerétaire général croit utile de rappeler aux membres de la Société de thérapeutique autorise le vote par correspon dance pour toutes les questions relatives aux intérêts de l'Association. En conséquence les personnes qui ne peuvent venir voter les jours d'élection peuvent adresser au président leur vote : celui-cii doit être mis sous euveloppe signée avec la mention: élection du.... (avec la date). Le président ouvre la lettre et met bulletin dans l'urne avant le dépouillement du scrutin. Il ne suffit donc pas, comme plusieurs personnes font fait aionor/l'hui. de prier le Secrétariat de voter vour tel candidat, c'est là un procèdé irrégulier qui ne peut être accepté.

Etaient présents à la séance :

Correspondant étranger : M. le professeur Bourget, de Lausanne.

Titulaires: MM. Adrian, Barbier, Bardet, Bichal, Benjamin, Berlioz, Blondel, Bolognesi, Boymond, Burlureaux, Cadiot, Catilion, Cautru, Chassevant, Courtade, Créquy, Dalché, de Crésantignes, Deléage, Désesquelle, Desnos, Dignat, Duchosne, Fiquet, Frémont, Grimbert, Hallopeau, Hirtz, Jeanselme, Joanin, Lafay, Lépinois, Leredde, Main, Manquat, Maurange, Moreigne, Musclier, Patein, Picou, Porack, Portes, Pouchet, A. Robin, Renault, Saint-Yves Mosnard, Sevestre, Triboulet, Viron, Vogt, G. Weber.

Correspondants: MM. Dubois et Rodet.

La séance est levée à six heures,

Le Secrétaire de service,

Vogr.

REVUE DES TRAVAUX FRANÇAIS ET ÉTRANGERS

Pharmacologie.

Le chlorhydrate d'apocodeine en Injections hypodermiquescontre la constipation. — Le chlorhydrate d'apocodèine peut étré considéré comme un médicament sédatif et hypoptique : son action sur le tube digestif est particulière, il augmente le péristaltisme et la sécrétion glandulaire : c'est pour cela que MM. Ravara et Bearus (Echo médical du Nord, 2 décembre 1900), ont songé à l'employer contre l'atonie musculaire intestinale et l'hyposècrétion. Leurs observations ont porté sur trente-quatre malades se plaignant de constipation ; les constipés lubituels ou dyspeptiques out été soulagés sauf un seul ; entin, les constipés passagers ont la plupart vu l'emploi du médicament suivi d'effet. Les auteurs n'out ou recours qu'à l'injection hypodermique ; ils ont usé de la solution suivante :

Chlorydrate d'apocodèine . . . 0 gr. 50 Eau stérilisée 50 »

à la dose de 2 centigrammes en moyenne.

Le seul inconvénient noté a été une douleur assez vive au point de vue de l'injection : si l'on a soin de faire les injections intra musculaires, ce lèger ennui peut être évité.

Chirurgie générale.

Traitement des ulcérations mallgues par le cynoglosse.— Jaconas et Poulopoutos ou publié dans Med. ree, octobre 1900, cinq cas de guérison d'épithélioma ulcéré de la face (dont trois cas très anciens) par des applications de poudre de cynoglosse. La duréed utraitement avarié entre 4 et 8 mois.

Ils lavent l'ulcère avec une solution d'acide borique et saupoudrent ensuite abondamment deux fois par jour de cynoglosse, recouvrant le tout de coton stèrilisé et d'un bandage.

Il faut employer la poudre de racines, de feuilles, de fleurs de cynoglosse et non pas la poudre officinale qui est presque toujours faite de racine ou d'écorce de racine du cynoglosse.

Ces applications de poudre de cynoglosse ont été aussi employées avec succès dans les ulcères simples de la peau, dans les ulcérations chroniques du col de l'utérus et même en ingestion à dose de 0 gr. 90 à 1 gr. 80, dans les ulcères de l'estomac.

L'Administrateur-Gérant: O. DOIN.

Imp. PAUL DUPONT, 4, rue du Boulei. - Paris, 1er Arri. - 68.5.1991 (Cl.)



Un pharmacien, qui porte mor nom, fait en ce moment une publicité considérate. Sur aute spécialité pharmaceutique. Je suis persuade par jersonne ne pensera que je sois l'auteur de ce produit, mais pourtant, pour éviter tout malentendu, je erois utile de publier que je n'ai rien de commun avec le pharmacien non plus qu'avec la drogue en question.

G. Bardet.

BULLETIN

La mort de Napias. — Service de santé militaire. —
Les conseils de revision. — La médecine légale
psychiatrique. — Les services sanitaires maritimes. —
Sur la résection diaphysaire primitive dans les fractures par coup de feu. — Le purpura chronique dans
l'angio-selèrose.

Napins vient de mourir à la suite d'une maladie chronique qui tenait depuis plusieurs mois éloigné de ses fonctions. Aneien médecin de la marine nationale, il s'occupa surtout d'hygiène. En 1877, avec Budin, Dubois, Gubler, Laborde et Pinard, il fonda la Société de médecine publique et d'hygiène professionnelle.

Nommé au concours inspecteur départemental du travail des enfants dans l'industrie, il devint président du conseil des inspecteurs généraux des services administratifs au ministère de l'Intérieur, membre du comité consultatif d'hygiène publique de France, du conseil supérieur de l'Assistance publique, et eufin, le 12 mars 1898, directeur de l'Assistance publique.

L'Académic de médecine avait recennu sa valeur scientifique en l'appelant dans sa section d'hygiène; le gouvernement l'avait récompensé de ses services en le faisant officier de la Légion d'Honneur et de l'Instruction publicue.

. * .

Une circulaire du ministre de la Guerre preserit que les étudiants en médecine, en pharmacie et les élèves ecclésiastiques, rentrant dans la catégorie des dispensés, qui doivent être convoqués en 1901 pour une période d'exercice de quatre semaines, devont être répartis et instruits dans chaque corps d'armée, conformément aux dispositions suivantes :

1º Btudiants en médecine. — Ils seront convequés au chef-lieu du corps d'armée pour être mis en subsistance dans les divers régiments. Placès le matin sous la direction du médecin chef de service qui les initiera au fonctionnement du service de santé dans les infirmenties régimentaires, ils seront réunis l'après-midi en un seul groupe dont l'instruction sera assurée par un médecin militaire.

2º Etudiants en pharmacie. — Ils seront répartis dans les hôpitaux militaires du corps d'armée; s'il n'y en a pas, dans un certain nombre d'hôpitaux répartis entre les sections intéressées.

* * *

La commissien d'hygiène parlementaire aurait entendu, semblet-il, les plus hauts représentants du service de santé de l'armée lui demandant de bien vouloir réformer la loi sur les conseils de revision, afin d'empécher dans l'avenir l'acceptation hátive des jeunes gens trop faibles ou atteints de phtisie on de maladies contagieuses nen encore déclarées. Arrivés au régiment, ces malheureux seraient accusés de centaminer leurs veisins et d'encombrer les hôpitaux militaires. Ce tableau semble d'autant plus poussé au noir que l'ajournement d'une part et la réforme temporaire de l'autre permettent, tout en ne négligeant pas les intérêts vitaux de l'armée. de faire une sélection absolument efficace.

* *

L'infirmerie spéciale du dépôt de la Préfecture de police constitue une clinique psychiatrique médico-légale de premier ordre où des hommes comme Lasègue, Legrand du Saulle, out puisé les éléments de leurs remarquables travaux et que seuls, quelques étudiants travaillant des sujets spéciaux, quelques praticiens, quelques médecins étrangors envoyés en mission par leurs gouvernements étaient autorisés à fréquenter. Dorémavant, grâce à MM. Brouardel et Paul Garnier, ello sera ouverté à tous les médecins, aux internes des hôpitaux, aux étudiants parrenus au terme de leur solarité qui voudront parfaire leur instruction spéciale et étudior les questions de médecine légale dans leurs raports avec la psychiatrie. Ces visites ont lieu le morcredit le vendredi de 1 heure 1/2 à 3 heures, quai de l'Horloge. 3.

Après trois mois d'assiduité à cotte clinique, un certificat de Stage mético-légal psychiatrique sora délirvé par la Faculté do médecino. Evidenment les médecins qui seront munis de ce certificat seront dorénavant choisis de préférence pour les attributions d'experts près les tribunaux, inspecteurs d'asiles... et autros fonctions pour lesquelles ils auront fait preuvo d'une compétence spéciale.

M. Danjou, président de la Société de médocine sanitaire maritime, a entrepris une campagne pour relever la situation du médecin sanitaire maritime, au point de vue sciontifique et pécuniaire, lui assurer uno parfaite indépendance professionnelle. Il voudrait, eutre autres choses, l'obligation pour les compagnies d'assurer à bord l'organisation matérielle 676 BULLETIN

indispensable pour le service sanitairo; la création d'un corps d'infirmiers, indépendants des compagnies, et rattachés aux directions de la santé des ports; l'entrée des médecins au conseil d'hygiène; la création d'une direction unique des sorvices sanitaires maritimes au ministère, assurant le sorvice sous toutes ses formes; l'examen de la patente de santé confié à un médecin sanitaire maritime, à l'exclusion de tout autro gaent; la faculté de concourir, après quinze ans de navigation, pour les places vacantes de sous-directeur de la santé des ports, directeur de lazaret...; la concessiou d'une solde progressive de 3 à 10,000 francs, avec retraite de 3 à 4,000 francs; enfiu l'allocation d'un certain nombre à déterminer de croïx de la Légion d'Honneur.

٠.

En mars dernier, dans une communication à la Société de chirurgie, M. Picqué demandait si la résection diaphysaire primitive, quo Baudens et Ollier avaient cherché à remettre en honneur, devait être conservée en chirurgie de guerre.

M. Delormo lui répond très catégoriquement que la résection diaphysaire primitive est une opération qui ne relève plus que de l'histoire de la chirurgie d'armée et qu'elle doit disparaître du cadre de nos méthodes opératoires actuelles. Dans une fracturo par coup do feu, toutes les esquilles adhérentes doivent être conservées, car elles contribuent puissamment à la formation du cal. Quant aux esquilles libres, une simplo pince servira à les extraire : il suffit pour les atteindre de se rappeler quo toujours ces esquilles se trouvent dans le trajet musculo-cutané creusé par le projectile, entre son orifice de sortie de l'os et son orifice de sortie des parties molles. Ainsi, grâce à de simples pansements antiseptiques, et en usant de patience, on arrivera à voir guérir des fractures par coup de feu qui, traitées comme autrefois par la résection primitive, auraient donné lieu à des suppurations interminables suivies finalement de pseudarthrose

Il existe une variété spéciale de purpura chronique siégeant aux membres inférieurs que M. Gaucher attribue à la solèrose vasculaire. Ce purpura est constitué par une teinte diffuse, brunâtre plutôt que rouge, étalée sous forme d'une plaque assez large, occupant parfois toute la circonférence du membre et eutourée d'éléments punctiformes ou lenticulaires de la même couleur. Cette coloration persistante est due très manifestement à une suffusion sanguine. Le sang épanellé donne lieu, par ses transformations, à une sorte de pigmentation entanée permanente.

Jusqu'à présent, on n'avait observé ce purpura chronique qu'aux membres inférieurs, où sa présence s'explique bien par la stase sanguine résultant de la pesanteur, qui rend plus facile la rupture des petits vaisseaux dégénérés et friables. Mais M. Gaucher apporte à la Société médicale dos hôpitaux une observation montrant que ce purpura, au lieu de rester localisé aux mombres inférieurs, pout se généraliser à presque toute la surface du corps. C'est en cela que le fait signalé est particulièrement intéressant.

THÉRAPEUTIQUE CHIRURGICALE

0

Méthodes et procédés d'analgésie chirurgicale,

par le D' Ed. LAVAL

Avant d'entreprendre une opération, le chirurgien se demande s'il doit anesthésier son sujet et, dans l'affirmative, quel procédé employer, problème souvent embarrassant en raison du nombre et de la variété des moyens préconisés pour endormir la sensibilité des malades. Il nous semble, cependant, qu'il est possible de dégager quelques règles générales susceptibles, dans la plupart des circonstances, de servir de guides pour le choix de la méthode à employer. Mais, pour établir ces principes, il convient d'abord de passer en revue les procédés en usace.

т

Les méthodes mises en œuvre pour obtenir l'analgésie chirurgicale peuvent se réduire à deux, suivant qu'elles procurent l'anesthésie générale ou l'anesthésie locale.

A Anesthésie générale.

Dans l'anesthésie générale telle qu'on la pratique avec le chloroforme, l'éther, le protoxyde d'azote, le bromure d'éthyle, tous les modes de sensibilité sont éteints (sensibilité à la douleur, au contact, thermique...); le patient en un mot est endormi et ne se rend compte de rien.

Cette anesthésie générale est trop connue et d'un emploi trop constant pour que nous y insistions plus longuement.

Rappelons seulement que l'anesthésie par le protoxyde d'azote (1), celle par le bromure d'éthyle sont presque uniquement employées dans les opérations spéciales sur la bouche (en particulier les dents), les voies nasales, pharyngiennes... Ce sont là, ainsi que le dit M. Malherbe (2), régions extrêmement sensibles et où

R. Blanchard. — De l'anesthésie par le protoxyde d'azote (Thèse de Paris, 1880).

⁽²⁾ L'anesthésie au bromure d'éthyle dans la position de Rose (Bulletin médical, 1900, p. 451).

l'anesthésie locale serait insuffisante. Il ne saurait être question de recourir, dans ces cas, au chloroforme ou à l'éther, agents hors de proportion avec ces petites opérations. Le protoxyde d'azote, et particulièrement le bromure d'éthyle, lequel est d'un maniement plus simple, sont faciles à employer, jouissent d'une action presque instantanée et donnent un réveil également rapide sans retentissement général fâcheux sur l'économie.

Voici comment procède M. Malherbe pour l'emploi de ce dernier anesthésique.

Une compresse pliée en quatre épaisseurs suffit ; il est absolument iuutile d'employer des masques ou autres appareils qui ne sont qu'encombrants et nuisibles.

Sur cette compresse on verse d'abord une petite quantité de bromure, grande comme une pièce de cina francs. et l'on applique cette compresse sur le nez et la bouche

du malade, en l'iuvitant à faire des inspirations profondes. Cette pratique a l'avantage d'habituer un peu à

l'odeur de l'anesthésique et d'empêcher la suffocation. Après 12 à 15 secondes, ou verse largement sur toute la compresse, en passant la main gauche dessous, de 10 à 15 grammes de bromure, et on applique sur cette compresse disposée un peu en cornet la face palmaire de la main droite, la recouvrant le plus possible, afin d'empêcher l'évaporation, tandis que de la main gauche on maintient la mâchoire inférieure du patient.

Il arrive parfois que la respiration, soit que les malades la retiennent, soit qu'ils suffoquent un peu, s'arrête quelques secondes ; il suffit alors de soulever légèrement la compresse pour voir le rythme respiratoire reprendre normalement. A ce moment également, chez beaucoup de malades, mais non chez tous, il se produit de l'agitation; il suffit de les faire maintenir. Cette agitation, d'ailleurs, ne dure que quelques secondes. Le malade fait de grandes inspirations et, en 40 à 60 secondes environ, l'anesthésic est complète, sans qu'il soit nécessaire de recourir jamais à d'autres quantités de liquide.

B. — Analgésie localisée.

La seconde méthode générale est celle qui consiste à faire disparaître dans la région à opérer la sensibilité à la douleur. C'est une méthode d'analgésie pure et simple, puisque les autres sensibilités (notamment la sensibilité au contact) sont d'habitude conservées.

Dès l'abord, une grande division s'impose : ou bien l'opérateur obtient cette analgésie par des moyens appliqués à la périphérie, par voic externe; ou bien il atteint son but en portant des agents médicamenteux au sein des tissus, par voic interne par conséquent.

 a. Voie externe. — Nous étudierons la compression, la réfrigération, enfin les applications externes de médicaments.

Compression. Le procédé le plus simple est celui qui consiste à enserrer la racine de la partie sur laquelle on veut intervenir (il s'agit naturellement des extrémités). Depuis longtemps, nous opérons ainsi les ongles incarnés : on met à la base du gros orteil un lien constricteur assez fort et on arrive, en le serrant, non seulement à émousser, mais même à éteindre la sensibilité à la douleur. Généralement, pour obtenir plus d'efficacité, on ajoute à ce procédé un procédé de la voie interne, l'injection de oceaîne.

La compression a été appliquée à la chirurgie des gros membres, en se servant de la bande d'Esmarch. Les résultats au début paraissaient peu encourageants, si l'on s'en rapporte aux recherches de Chauvel (1). Riccemment, Jaboulay (de Lyon) (2) aurait pu obteni, de cette façon, une anesthésie suffisante pour pouvoir pratiquer une intervention profonde sur le poignet et une amputation de jambe.

L'opération sur le poignet a consisté en un curettage de l'articulation et de fistules remontant sur la face dorsale de l'avant-bras avec incision des ponts et parties molles interposés. Le tube d'Esmarch avait été enroulé à la partie moyenne du bras. En 10 minutes, la seusibilité avait disparu. Le malade ne s'est pas rendu compte de l'opération qu'il subissait, les parties molles incisées, le squelette ruginé et râclé étaient parfaitement insensibles.

M. Jaboulay a obtenu, par le même procédé, une anesthésie ayant permis l'amputation de la jambe. Un homme de 34 ans opéré à deux reprises d'un sarcome de l'extrémité inférieure du péroné et d'une récidive dans les parties voisines présentait une repullulation de sa tumeur au niveau du cou de pied, avec des hémorragues considérables. Anémié et affaibli, il priait de l'amputer. Le tube de caoutchouc fut placé à la cuisse pour arrêter une hémorragie nouvelle, et M. Jaboulay attendit une dizaine de minutes pour couper la jambe, en utilisant cet appareil anesthésiant autant qu'hémostatique. Le région opératoire fut préparée et lorsque le

⁽¹⁾ Bull. de la Soc. de chirurg., 1871, p. 361.

⁽²⁾ L'anesthésie des membres par leur compression circulaire (Lyon médical, 25 novembre 1900).

pincement de la peau du genou cessa d'être perçu, on commença l'amputation au tiers supérieur. Les différents temps de l'amputation de la jambe au lieu d'élection furent exécutés sans hâte et M. Jaboulay tint conversation avec l'opéré, lui recommendant de bien respirer, parce qu'on allait bientôt commencer. En faisant la ligature des vaisseaux tibiaux antérieurs et postérieurs, il prit le nerf satellite entre le pouce et l'index pour le mieux isoler et demanda alors à l'opéré s'il sentait une pression; celui-ci répondit qu'il ne sentait rien, mais qu'il ne fallait pas encore commencer l'opération parce qu'il n'était pas endormi. Bref, la fin de la suture fut seule perque par le malade, mais en tant que sensation de contact.

La guérison de la plaie d'amputation n'a pas été influencée par cette compression de la cuisse. Le seul reproche que mérite le tube d'Esmarch, c'est la douleur locale qu'entraîne son application.

M. Jaboulay estime que l'action anesthésiante si complète du tube circulaire tient à ce que non seulement il comprime les nerfs, mais en même temps il arrête aussi la circulation artérielle et prive de leur aliment tous les tissus, en particulier les appareils nerveux du territoire considéré.

Réfrigération. — On sait comment s'appliquent les réfrigérants. Un mélange de deux parties de glace réduite en petits fragments et une partie de sel marin est placé dans une feuille de tarlatane et appliqué sur la région malade. Les tissus ne tardent pas à devenir blance, durs et insensibles.

Fréquemment, on associe à l'effet de la réfrigération

l'action analgésique propre d'un médicament. C'est ainsi que l'éther, est utilisé en pulvérisations. L'appareil de Richardson est classique. Généralement les patients soumis au jet d'éther pulvérisé ressentent une douleur locale plus ou moins vive. C'est un des inconvénients de ce mode d'anesthésie; un autre inconvénient non moins grave est l'inflammabilité de l'éther (d'où contre-indication des préctions bien le theurse autre).

grave est l'inflammabilité de l'éther (d'où contre-indication des opérations avec le thermo-cautère). Le chlorure de méthyle est employé en stypage, afin d'éviter la mortification qui souvent suit le siphounage. Des tampons, ou stypes (formés de 2/3 d'ouate sèche au centre et de 1/3 de bourre de soic à la périphério) sont soumis à un jet de chlorure de méthyle et appliqués sur les téguments : après 3 à 5 secondes, la peau devient dure, parcheminée, elle se creuse en cupule : on peut entreprendre l'opération.

Le chlorure d'éthyle (conservé dans des ampoules de verre ou des récipients métalliques) bout à 10° et se volatilise à la chaleur de la main. Projeté sur la peau à une distance de 30 à 35 centimètres, il fait rougir les téguments, puis il les blanchit : c'est le moment d'opérer. L'analgésie est, plus encore qu'avec le chlorure de méthyle, précédée de douleurs parfois très vives. Elle dure de 1 à 2 minutes.

La réfrigération procure une certaine analgésie locale. Malheureusement celle-ci est de trop courte durée, car on ne peut prolonger trop longtemps l'action du froid qui pourrait mortifier les tissus. En outre, les réfrigérants n'agissent qu'à la surface et, dès que la peau a été divisée, les tissus sous-jacents qui n'ont pas subj l'action du froid sont très sensibles. Enfin, ce mode d'analgésie est une arme à deux tranchants : si l'on dépasse la mesure, on détermine aisément de la gangrène. Aussi convient-il de manier le froid avec prudence, surtout lorsqu'il s'agit de tissus enflammés, avec tendance au sphacèle.

On peut recourir aux applications médicamenteuses externes sans réfrigération. Rapplons à titre historique l'emploi du gaz acide carbonique, du sulfure de carbone depuis longtempe délaissés. Nous en dirons autant de la narcotisation (1) qui consistait à mettre de l'onguent belladoné au contact des tissus malades, de l'acide phénique (à 85 0/0) préconisé par Ball et Smith (2). Au pourd'hui la chirurgie spéciale se sert fréquemment des applications de cocaine sur les muqueuses (instillations, badigeonnages). Ces procédés procurant une analgésie incertaine et tout ce qu'il y a de plus superficielle ne nous arrêteront pas. L'emploi de médicaments injectés dans les tissus, ainsi que nous allons le voir, a détrôné la plupart de ces pratiques.

b. Voie interne. — De tous les médicaments essayés (morphine, boldine, gelsémine, atropine...) c'est la cocaïne qui a donné les meilleurs résultats. L'in-cetion d'une solution de chlorhydrate de cocaïne dans les tissus, telle est la pratique fondamentale de la méthode, mais cette pratique se modifie dans son application suivant les auteurs : tout d'abord, l'injection peut être dermique ou bien sous-arachnotifiene (moelle évnière).

1. Injection dermique ou interstitielle, procédé de Reclus. — C'est Reclus qui, le premier, a institué cette

Bouisson.— Traité historique et pratique de la méthode anesthésique appliquée à la chirurgie, Paris, 1850.
 Med. Times and Gaz, vol. 11, p. 128, 1872.

méthode et qui l'a mise absolument au point. « Les modifications qui y ont été apportées à l'étranger ne sont, en somme, que de bien petits perfectionnements de la méthode de ce chirurgien. » (1) Nous en rappellerons, en quelques mots, les points essentiels.

La solution de cocaîne doit être fraîchement préparée et au I/100°; on ne deit pas dépasser 15 à 20 seringues de Pravaz. L'opération se fera, le malade étant placé dans la position horizontale pour éviter la syncope toujours possible.

Voici, maintenant, les règles de la technique opératoire formulée par Reclus (2).

- « Je fixe de l'œil la place exacte de ma future incision et son étendue; à l'une de ses extrémités, j'enfonce d'un coup net la pointe de l'aiguille de Pravaz; si j'ai pénétré du premier coup dans le tissu cellulaire, je la retire un peu pour rester en plein derme et là, je pousse légèrement le piston; une petite boursouflure blanche se fait sur la peau et, à partir de ce moment, toute douleur du fait de l'injection doit cesser; si le malade souffre, c'est la faute de l'opérateur.
- « Il faut que celui-ci insinue lentement l'aiguille dans l'épaisseur de la peau et, comme il pousse lo piston à mesure que l'aiguille avance, la cocafine anesthésie au préalable les tissus, de telle sorte que ceux-ci sont déjà insensibles, lorsque l'instrument les parcourt. Il faut rester dans la trame serrée du derme... »

Grâce à cette injection traçante, la piqure du début

G. Pouchet. — L'analgésie localisée. Technique des procédés utilisant la cocaïne (Bull. méd. n° 19, 1899).

⁽²⁾ La cocaine en chirurgie, 1 brochure, Paris, 1896.

seule est ressentie. Les plans profonds sont injectés successivement de la même façon, au fur et à mesure de leur découverte. Inutile de rappeler qu'avant d'opérer, on doit attendre 5 à 6 minutes, afin que l'analgésie soit complète. Enfin M. Reclus insiste beaucoup sur ce fait que le malade doit être et demeurer après l'opération dans la position horizontale pendant quelque temps. De plus, il est bon de lui faire prendre pendant et après la cocalinisation un breuvage chaud et réconfortant (grog, café...).

Nous avons dit que des modifications avaient été apportées à cette méthode à l'étranger. Les principales sont celle de Corning et Oberst (méthode régionale) et celle de Schleich (méthode d'infiltration).

La méthode régionale consiste, après avoir fait une ligature circulaire à la racine du membre, à injecter une solution de cocaîne au contact direct du tronc nerveux qui commande la sensibilité de la région à opérer : au bout d'environ 8 à 10 minutes, l'excitabilité du nerf est complètement abolic. Il est facile de comprendre la différence qui sépare cette méthode de la précédente : Reclus fait épouser à son injection exactement le tracé de l'ineision prójetée; Corning et Oberst font porter leur injection au pourtour immédiat de la gaine du tronc qui innerve la région à opérer.

Ainsi, après une section accidentelle du long extenseur du pouce, Manz pratique la suture dans la région métaearpienne par la cocalnisation, après ligature circulaire du poignet, du nerf médian, du nerf eubital avec sa branche dorsale, de la branche superficielle du radial.

^{(1) 17}e réunion de la Société allemande de chirurgie.

Cushing (1) a, récenument, étendu l'emploi de cette méthode à la chirurgie viscérale. Il a pratiqué des opérations de hernie inguinale sans douleur, en injectant au préalable de la cocaîne dans la gaine des troncs nerveux (nerfs ilio-inguinal, génito-crural...) qui sensibilisent la région inguinale.

De son côté, la méthode par infiltration de Schleich est basée sur l'insensibilisation produite par l'infiltration du liquide injecté plutôt que sur les propriétés spéciales du liquide lui-même. C'est ainsi que l'eau distillée infiltrée dans les tissus produit l'anesthésic. Les résultats sont meilleurs et l'anesthésie consécutive plus complète, lorsqu'on associe à l'eau des quantités très faibles de chlorure de sodium et de cocaîne.

La solution moyenne (2) préconisée par Schleich a la la composition suivante :

Chlorhydrate de cocaine . . . 0,10 centigr.
Chlorhydrate de morphine . . 0,02 —
Chlorure de sodium 0,20 —
Eaû distillée stérilisée . . . 100 grannes.

Avec 50 seringues de cette solution, on atteint la dose maxima de cocaïne (soit 5 centigrammes) qu'on puisse injecter sans danger au cours d'une opération.

La technique est la suivante : il convient d'abord de procéder à l'insensibilisation superficielle de la région (vaporisation d'éther, de chlorure d'éthyle, badigeonnage à la solution pléniquée forte...). Alors seulement.

⁽¹⁾ Observations upon the neural anatomy, etc... (Bull. of the Hopkins Hospital, mars 1900.)

⁽²⁾ Il y a trois solutions : la forte, la moyenne et la faible, différent surtout entre elles par la quantité de cocaine.

on enfonce l'aiguille lentement et assez pour recouvrir tout à fait l'orifice de la canule. On presse le piston légèrement et on voit se former sur la peau une papule de la grosseur d'une pièce de 50 centimes. On retire la seringue et on enfonce de nouveau l'aiguille presque à la périphérie de la papule; on en forme ainsi une seconde à bords qui empiètent légèrement sur ceux de la précédente : et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait formé un chapelet de papules tout le long du trajet que va suivre le bistouri. Ensuite, comme dans la méthode de Reclus, on procède à l'anesthésie des plans profonds.

2. Injection sous-arachnoïdienne. - L'injection dans la gaine des nerfs devait entraîner les chirurgiens à tenter les injections dans les espaces sous-arachnoïdiens de la moelle épinière. C'est grâce à M. Tuffier que cette méthode due à Bier, a été vulgarisée en France et ce chirurgien vient de publier une statistique (1) de 252 opérations avec 6 décès, qui seraient indépendants du mode d'anesthésie (2).

La solution de cocaïne est à 2 0/0. Le sujet étant assis, les deux bras portés en avant, après les précautions antiseptiques d'usage on repère les crètes iliaques et, les réunissant par une ligne transversale, on se trouve à ce niveau sur la 4º vertèbre lombaire. C'est entre cette vertèbre et la 5° (dont on détermine l'écartement en

L'analgésie chirurgicale, Masson et C*, 1901.

faisant « faire le gros dos » au malade) que l'on pousse l'aiguille, à un centimètre à droite de la ligne des appenyses épineuses : la pénétration est de 4 à 6 centimètres chez l'adulte, un demi à 3 centimètres chez l'enfant de 10 à 12 ans. Il faut — pour être sûr de la pénétration — voir s'écouler de l'aiguille un peu de liquide céphalorachidien. Alors seulement on injecte lentement, en une minute, 15 à 20 milligrammes de solution cocañnée. On retire brusquement l'aiguille, on obture l'orifice d'entrée avec du collodion stérilisé, on laisse le malade assis 2 à 3 minutes, puis on le met dans la position chirurgicale. Au bout de 4 à 10 minutes on peut opérer, la sensibilité à la douleur n'existe plus, la sensibilité au contat seule persiste.

L'analgésie est complète, absolue dans les membres inférieurs, le bassin, les lombes, la région ombilicale, elle remonte le plus souvent jusqu'au thorax, parfois jusqu'aux aisselles. Elle est si complète que, dans une amputation de cuisse, « nous pouvions, dit Tuffier, demander au malade de relever son moignon par la simple contraction de ses nuscles, afin de faciliter le pincement des vaisseaux ».

Cette analgésie dure en moyenne une heure à une heure et demie. — De contre-indications, Tuffier n'en signale que chez les enfants et les hystériques — les premiers parce qu'ils pourraient être effrayés, les autres parce qu'ils accusent des douleurs à la simple sensation de contact et bourraient ainsi gêner pendant l'opération.

TI

Il nous reste maintenant à répondre à la question suivante : quelle méthode, quel procédé analgésique employer dans une opération donnée? Il est certain qu'il n'est pas possible de fixer à cet égard des règles exactes : la pratique est « ondoyante et diverse », les opératours ont également des habitudes et des préférences, des facilités et des difficultés d'exécution qui rendraient vaine toute indication systématique. Pourtant, d'une façon générale, on peut, nous semble-t-il, faire la part de chaoune de ces méthodes dans la pratique chiurugicate. Pour cela, il convient de ne pas oublier que l'analgésie en chirurgie doit, avant tout, satisfaire à plusieurs conditions essentielles qui sont :

Pour le malade : minimum de danger avec maximum d'analgésie — pour l'opérateur : maximum de facilité dans l'opération.

Dans cet esprit nous allons passer en revue, dans leurs grandes lignes, les principales opérations de la chirurgie et nous indiquerons pour chacune d'elles, la méthode qui nous paraît lui être indiquée. Mais d'emblée, nous pouvons déjà dire que les modes d'analgésie locale par voie externe (si nous en exceptons la compression) nous semblent impropres au but que nous poursuivons, en raison de la fugacité et de la superficialité de l'analgésie qu'ils déterminent. En revanche, tous les autres procédés que nous avons décrits sont susceptibles d'être nuités.

En ce qui concerne les interventions sur la face, les dents, le pharynx, l'anesthésie au bromure d'éthyle est la méthode de choix.

Pour les extrémités, on emploiera la ligature circulaire à la racine de cette extrémité (par exemple avec un drain de conutchouc dont les extrémités seront tenues serrées dans les mors d'une pince à forcipressure, ou encore avec la bande d'Esmarch) seule ou associée aux injections de cocaïne suivant la méthode de Reclus (Kummer).

La méthode de Schleich offre, en effet, beaucoup d'inconvénients qui restreignent son application : l'orientation des éléments anatomiques est troublée par l'infiltration; dans les régions infiltrées, les différences de consistance deviennent si peu tranchées que la palpation ne fournit plus d'indication. C'est ainsi que, dans les cas de processus inflammatoire, ce procédé complique l'œuvre chirurgicale, car on est forcé d'entourer le foyer morbide d'une zone d'infiltration en plein tissu'sain (1).

Quant à la méthode de Corning et Oberst, son emploi, bien que plus commode, exige que l'opérateur se rappelle l'anatomie exacte de l'innervation de la région à anesthésier. Ce n'est évidemment pas une raison pour condamner la méthode, mais cela suffit pour la compliquer.

Lorsqu'on ne peut faire de la compression circulaire, comme lorsqu'il s'agit de kystes, de lipomes, etc..., développés à la surface des téguments, la méthode de Reclus sera employée seule.

Pour la grande chirurgie des membres (résection, amputation...) qui exige une analgésie profonde et de longue durée, autrefois on employait (et on emploie encore souvent) les anesthésiques généraux. Nous avons vu qu'on peut s'en passer. Conformément aux principes énoncés plus haut, nous devons donc nous en passer

Vilain. — De l'Anesthésie locale (La Clinique, organe des hôpitaux de Bruxelles, 11 mars 1899).

(à moins de circonstances exceptionnelles), puisque le danger est moindre pour le malade.

La ligature circulaire avec le tube ou la bande d'Esmarch à la racine du membre, suivant les indications de M. Jaboulay, pourra être mise en ceuvre. A défaut de ce procédé, quand il s'agira des membres inférieurs tout au moins, les injections sous-arachnoidiennes seront tout indiquées. Elles offriront l'avantage que le blessé pourra coopérer à l'opération en aidant le chirurgien des mouvements volontaires de son membre, lesquels, on le sait, sont conservés.

Pour les opérations typiques et peu compliquées du tronc, l'analgésie localisée de Reclus suffit : circoncision, castration, cystotowie, dilatation anale, hémorroïdes, hernie (cure radicale, kélotomie), anus artificiel, empyème.

Mais, lorsqu'il s'agit de la chirurgie abdominale, chirurgie portant sur un champ opératoire très vaste et dont les limites ne peuvent être établies à l'avance, la méthode de Reclus, pas plus que celle de Bier, n'est suffisante pour résoudre le problème. Car il faut bien se rendre compte que la suppression de la douleur est certes la chose la plus importante en l'espèce, pour le malade comme pour le chirurgien; mais ce n'est pas tout, un des grands avantages de l'auesthésie générale — et qui est son corollaire en quelque sorte — c'est l'état de résoultion dans lequel se trouve plongé le patient, état qui permet à l'opérateur d'être tout entier à sa besogne, de ne pas se heurter à des mouvements intempestifs. Dans ces cas, il faut recourir à l'anesthésie complète.

Enfin, il nous paraît supcrflu de rappeler que les lésions crânio-encéphaliques, de par leur complexité et la difficulté des interventions pratiquées dans ces régions, réclament également l'emploi des anesthésiques généraux.

THÉRAPEUTIQUE MÉDICALE

La chaleur radiante lumineuse en thérapeutique. Les appareils Dowsing,

par le Dr P. Guyenor (d'Aix-les-Bains).

Dopuis environ trois ans, une nouvelle méthode thérapeutique, reposant sur l'emploi de la chaleur radiante lumineuse produite électriquement par les appareils Dowsing, a pris naissance en Angéterre. A la suite d'études physiologiques entroprises par le D' Heldey au London Hospital et par le D' Sibley au North West London Hospital; à la suite également des nombreuses observations cliniques recueillies dans ces deux hôpitaux et par le D' Douglass Kerr de Bath, ce nouveau mode de traitement s'est répandu dans les grandes villes et il existe actuellement dans la Grande-Bretagne plus de quarante établissements spéciaux pour les applications médicales de la chaleur radiante lumineux

Ayant en l'occasion de une rendre compte de la valeur de ce traitement dans les affections goutteuses et rhumatismales et après quelques expériences préliminaires dans mon laboratoire, je me rendis en Angleterre pour y étudier l'action physiologique, les indecations et les détaits techniques d'application d'une méthode actuellement très peu connue en France. Co sont les résultats de cette étude, rèsumés brièvement, que je soumets au corps médical, absolument convaincu que ceux

qui veudront bien centrôler mes assertiens partageront bientôt mon opinion.

Au point de vue physique la chaleur radiante lumineuse est constituée par l'asseciation de radiations calorifiques, lumineuses et chimiques possédant chacune des prepriétés physiques, chimiques et physiologiques particulières. Elle est produite artificiellement dans les appareils Dowsing à l'aide du courant électrique traversant un filament de composition spéciale contenu dans des ampoules de verre où on a fait le vide. Ces ampoules ou radiateurs électriques sont munis de réflecteurs construits de telle sorte que les rayons de chaleur radiante lumineuse peuvent être dirigés sur une partie quel-conque du corps et que la température peut varier instantamément depuis quelques degrés au-dessus de la température ambiante jusqu'à la température la plus élevée que le corps humain puisse supporter avec ces nouveaux appareils, c'est-à-dire environ doux cent soixonte decrès centigrades.

Les radiateurs sont montés sur des supports qui permettent de les ajuster dans teutes les directions; on empleie, à cet effet, des montants à bras mobiles sur lesquels sont fixés les réflecteurs. Les réflecteurs employés sont d'une censtruction spéciale, avant peur but de projeter et de diffuser les radiations sur la partie du corps qu'il s'agit de traiter. Les supports sur lesquels les foyers sont montés, permettent des déplace ments à grande amplitude en vue d'applications locales et peuvent aussi se cembiner facilement peur ebtenir un bain général. Dans ce cas, ils sont disposés de chaque côté d'un lit sur lequel le malade repose. Un régulateur de chaleur sert à medérer la température pendant le bain de chalcur radiante lumineuse, de telle sorte que les effets de celui-ci peuvent Atre instantanément variés. On peut, d'autre part, isoler les unes des autres les diverses radiations et éliminer certaines d'entre elles suivant l'action à obtenir.

Le corps humain peut supporter avec la chaleur radiante lumineuse des températures très élevées auxquelles il est de toute impossibilité de le soumettre avec les autres modes d'application de la chaleur. Le bain complet Dowsing peut atteindre sans danger 80 degrés centigrades (on le prescrit généralement entre 150 et 200 degrés). Les bains locaux sont très bien supportés jusqu'à 800 degrés. Dans toutes les applications, la tête du malade reste à l'air libre.

L'innocuité pour l'organisme, de semblables températures immédiatement dangereuses, même localement, avec nos procédés habituels d'application, résulte:

- 1º Du renouvellement constant de l'air en contact avec la peau par une ventilation automatique continue;
 - 2º De l'état hygrométrique très peu élevé de l'air ;
- 3º Du maintien de l'atmosphère où respire le malade à la température normale extérieure;
- 4° De l'absence totale de produits de combustion pouvant contaminer le milicu respiratoire.

Ces conditions assurent l'intégrité complète de la transpiration cutanée et de l'évaporation pulmonaire, ce qui ne peut être obtenu dans les divers systèmes d'étuves ou de bains d'air chauds soit locaux, soit généraux.

- L'action physiologique des bains Dowsing consiste dans les phénomènes suivants :
- (a) Rougeur très marquée de la peau; (b) transpiration cutanée très abandante et élimination plus considérable d'acide carbonique par les poumons; (c) accélération du pouls et élévation de la température de l'organisme, mais moins marquées proportionnellement que dans les bains d'étuves; (d) augmentation du volume des matériaux solides de l'urine, surtout de l'urée et de l'acide urique; (c) sursactivité des fouctions de la nutrition générale et d'élimination des rayons aclorifiques bouccoup plus intense qu'avec la chaleur obscure; (g) excitation particulière de la peau par les rayons chimiques, qui jouissent d'autre part de propriétés bactéricides prononcess; (d) action plus spécialement dévoue au rayon lumineux

sur les globules du sang dont le nombre augmente, ainsi que leur nouvoir d'oxygénation.

Dans les applications thérapeutiques de la chaleur on met à contribution les phénomènes physiologiques résultant de la lutte de l'organisme pour maintenir sa température propre dans un milieu à température plus élevée. L'action curative sera, le plus souvent, en raison directe de l'intensité de cette lutte. La chaleur radiante lumineuse permet de la porter à son maximum sans danger pour l'organisme, et la présence des rayons lumineux et des rayons chimiques constitue des facteurs nouveaux doués de propriétés dont l'utilité est incontestable dans bien des cas.

Indications thérapeutiques. - Toutes les affections justiciables des bains d'air chaud, soit locaux, soit généraux, sont traitées avec de grands avantages par la chaleur radiante lumineuse à l'aide des appareils Dowsing. On n'a plus à redouter en effet les accidents d'une mauvaise évaporation cutanée et pulmonaire, d'où la possibilité de soumettre l'organisme à un traitement intensif à des températures variant de 150 à 205° centigrades pour les bains complets et jusqu'à 260° pour les applications locales. Les résultats obtenus en Angleterre, où la méthode a pris une très grande extension et plus encore mon expérience personnelle, me permettent d'affirmer sans aucune hésitation que la chaleur radiante lumineuse est la médication locale par excellence, pour ainsi dire spécifique, du symptôme douleur dans les affections rhumatismales ou goutteuses et dans les traumatismes sans plaies des membres, contusions, entorses, luxations, etc.

L'action physiologique appuyée sur des observations cliniques nombreuses, a permis de déterminer certaines affections où ce traitement rencontre des indications très précises et donne des résultats particulièrement favorables.

Goutte. — Un seul bain Dowsing suffit souvent pour diminuer dans des proportions considérables la douleur d'un accès de goutte aigué. L'effet sédatif commence à se produire à la température de 160° centigrades et se continue pendant plusieurs heures après le bain, dont la durée varie de 30 à 45 minutes. Quand la douleur réapparait, elle est toujours très atténuée. Le Dr Douglas Ker (de Bath) qui a une grande expérience de ce genre d'affections, preserit un bain complet le matin et un bain local l'anrès-midi. La durée des attaques les plus sévères est alors réduite à quelques jours. D'après cet auteur, les meilleurs résultats s'obtiennent en combinant le traitement par la chaleur radiante lumineuse avec le traitement thermal de Bath on en l'en faisant suivre, mais le traitement thermal est contre-indiqué à la période aigue. Deux cas que nous avons traités suivant cette méthode, en combinaison avec le traitement thermal d'Aix-les-Bains, ont confirmé cette opinion. Dès le début du traitement Dowsing, les urines deviennent plus abondantes, plus riches en urée, en acide urique et en urates

Dans la goutte subaiçué ou elvronique, tout en apaisant sûrement les symptômes douloureux, on èvite souvent les déformations qui sont la conséquence de ces longues attaques à poussée parexystique intéressant simultanément un certain nombre d'articulations. Dans les cas voisins de la eachexie goutteuse où l'activité fonctionnelle de la peau est réduite au minimum, où les urines avec excès d'urée et d'acide urique sont émises en petite quantité, il semble qu'une abondante sudation devrait en diminuer encore le volume; c'est le contraire qui se produit et l'amélioration des fonctions d'élimination ne tarde pas à avoir un retentissement sur l'état général du malade.

Rhumatisme. — Dans un cas de polyarthrite rhumatismale fébrile où le salicylate et l'antipyrine ne semblaient pas donner de résultats très appréciables, j'ai adjoint un bain complet de chaleur radiante lumineuse à 150°, d'une durée de trente minutes chaque jour. J'ai constaté aussitôt l'attérmation des douleurs, la diminution du gonfiement, l'abaisse-

ment de la température et l'augmentation du volume des unines. C'est, à notre connaissance, la première fois qu'on emploie ce genre de traitement dans une affection fébrile; la durée de l'attaque a été de douze jours, les douleurs peu prononcées des l'application de la chaleur radiante et la convalescence n'a donné lieu à aucune complication. On ne peut tirer de conclusions d'une observation unique, mais à l'occasion je n'hésiterais pas à avoir recours au même traitement.

Dans les différentes formes de rhumatisme chronique articulaire ou musculaire, dans le rhumatisme blennorrhagique et l'arthrite sénile, l'action sédative des symptômes douloureux est de règle et l'impotence des membres atteints s'améliore graduellement. L'adjonction du traitement thermal d'Aix-les-Bains et de mouvements méthodiquement gradués est tout particulièrement indiquée dans cette classe d'affections

Contusions. — Entorees. — Stitles de fractures et de luxations. — Dans les contusions et les entores la chaleur
radiante lumineuse rend de grands services en faisant très
rapidement disparaître la douleur et le gonflement. A Manchester, il existe un service permanent de bains Dowsing à
l'infirmerie spéciale des joueurs de « foot ball » dont le
sport occasionne fréquemment des traumatismes de ce
genre. Dans les suites de frectures et de luxations, l'atténuation immédiate des symptômes douloureux et leur disparition
rapide permet d'instituer, peu de temps après l'accident,
des mouvements méthodiques pour rétablir la fonction et
arrêter les progrès de l'atrophie musculaire due à l'immobilisation

Phlébites. — Traitement de choix, même dans le cas où le gonflement œdémateux est arrivé à l'état chronique. Après un seul bain, on constate une diminution marquée dans le volume du membre atteint qui, par des applications subséquentes, reprend graduellement ses formes normales.

Rhumatisme déformant. (Rheumatoid arthritis des Anglais). D'après le D' Douglass Kerr, au début de l'affection,
même à la période des poussées aiguês, les articulations
s'amdiorent rapidement, l'état général devient meilleur et la
plupart des malades augmentent de poids pendant le cours
du traitement. A une période plus avancée, avec articulations
difformes, plus ou moins ankylosées, mais non douloureuses,
la chaleur radiante lumineuse est inefficace par elle-même.
Si, dans ces cas, soit brusquement, soit mieux graduellement,
on brise les adhérences, un bain Dowsing immédiatement
arpès, réduit considérablement les douleurs et le gonflement
consécutifs et les bains subséquents hâtent le recouvrement
de la fonction

Sciatiques. — Dans les sciatiques, les résultats sont contradictoires: tous les malades éprouvent du soulagement pendant la durée du bain; quelques-uns guérissent rapidement; chez d'autres, au contraire, survient une recrudescence des symptomes aigus. Ces différences dépendent très probablement d'un diagnostic insuffisamment établi; nous savons tous que, dans la sciatique névritique, par exemple, on n'obtient pas, quel que soit le traitement, des résultats comparables à ceux obtenus dans la sciatique névralique.

La chaleur radiante lumineuse n'est pas une panacée: pas plus qu'à aucune autre médieation il ne faut lui demander des choses impossibles, mais elle nous fournit une arme nouvelle, arme très puissante, sans aucun danger entre des mains judicieuses et qui laisse bien loin derrière elle tous les modes d'arplication de la chaleur connus iusoufrici.

Note sur les injections intramusculaires de calomel dans les arthrites bleunorrhagiques,

Par M. Thomas, de Genève.

Je viens en mon nom personnel et en celui du D'Bourdillon, ancien interne de la clinique médicale de Genève, présenter quelques cas traités par cette méthode due au D'Toupet et étudiée dans sa thèse par le D' de Gorsse.

La cure du rhumatisme blennorrhagique est une œuvre de longue haleine, et souvent le malade ne s'en tire pas saus des déformations plus ou moins pénibles. A voir le grand nombre de médicaments proposés, on peut être certain qu'aucun u'est spécifique; le calomel, sans avoir une pareille prétention, peut revendiquer cependant de beaux succès. Et suivant la doctrine actuelle qui démembre de plus en plus le rlumatisme pour y reconnaître de nombreuses variétés d'arthrites de nature infectieuse, cette action antisspélique peut être fort utile.

l'ai employè la méthode indiquée par de Gorsse, mais en me bornant à pratiquer l'injection à la dose de 0,03 à des intervalles de deux à quatre jours. Aucun inconvénient n'a pu être constaté; le malade qui fait l'objet de la troisième observation a eu une récléire de sa blennorrhagie et a été repris de ses arthrites. A cette occasion les injections de calomel ont amené de la stomatite qui a obligé d'intervonme le traitement. La douleur somme toute est assez peu considérable et n'a point ennuvé les malades.

Il est bien certaiu que malgré les fanatiques de l'injection, il pourra se produire encore des accidents, mais en faisant un examen soigneux de l'état du malade, il n'y a pas beaucoup de risques à courir.

T. P..., typographe, atteint en 1889 d'une première blennorrhagie qui guérit facilement, est de nouveau pris le 4 janvier 1901; le 17, l'articulation métatarso-phalangienne de l'index gauche est uméfiée, rouge et douloureuse, puis l'articulation tibio-tarsienno gauche, le genou droit et l'index et le
médius droits sont atteints successivement. Il arrive à l'hôpital dans est état, la blonnorrhagie est encore en ploine activité, le pus contient en abondance des gonocoques. Le
3 février, injection de calomel à 0,03 ; lefs, deuxième injection,
le genou droit est moins gros et moins douloureux; six injections sont pratiquées en lout jusqu'au 20 février, à cette date
les articulations sont libros, lo malado ne souffre plus.
Il est encore traité pendant quelque temps pour de l'atrophie
légero de la aimbo droite et sort zuéri le B mars.

Mile S..., femme do chambre, 21 ans, est entrée lo 30 octobre 1900; elle aurait eu une vive euisson en urinant il v a quelques semaines et souffre de douleurs artieulaires dopuis lo 27 octobre, en premier lieu au bras et à la jambe gauches, puis la chovillo et le poignet droits sont pris; cette dernière articulation est très augmentée de volume, très douloureuse. l'impotence est totale. L'écouloment urêthro-vaginal assez abondant, ne dócèle pas do gonocoques; il est vrai que les symptômes les plus aigus ont déjà passé. Jusqu'au 7 novembre, malgré différents traitements, aueun résultat ; on immobilise l'articulation le 16 et on commence du massage qui ameno uno sedation des phénomènes douloureux, mais lo gonflement et l'impotence sont encore considérables : les mouvements très limités font erier la malade ; le 4 décembre. les symptômes inflammatoires se reproduisant avec violonce. on commence les injections de calomel. Du 8 décembre au 18 janvier, elles sont pratiquées au nombre de dix en tout. Le 25 janvier, les mouvoments sont revenus, la malado peut exécutor tous les mouvements sans douleurs : le 4 février. elle est complétement guério ; il y a oncore un peu d'atrophie des museles de l'avant-bras.

H. F..., 31 ans, fabricant de ressorts, en est à sa quatrième blennorrhagie depuis 1800; chaque fois il eut des manifestations articulaires, qui guérirent dans un espace variant de trois semaines à trois mois; actuellement, 13 novembre 1900, il présente un gonflement marqué des doux articulations úbio-tarsionnes, surtout de la gauche; la peau est tendue, rouge, douloureuse; les poignets sont douloureux, mais non tuméfies; lors jointures des doigts qui ont été déjà fortement prises lors des attaques précédentes, sont assez défornées, et les mou-wements surtout de la dernière phalange sont limités. Blennorrhagie en voie de diminution; rétrécissoment uréthral, fièvre modérée.

Diverses médications étant restées sans résultat, on commenco le 9 décembre les injections de calomel; des le 21, la douleur est très atténuée, les mouvements plus faciles (quatrième iniection).

Le 15 janvier, le malade est guéri de ses lésions récentes; quant à celles plus anciennes atteignant la dernière phalango des doigts, elles n'ont que peu régressé. Il a été pratiqué en tout dix injections.

Comme je l'ai dit plus haut, ce malade nous est revenu, six semaines après, avec une récidiro de blonnorrhagie; évidemment son urethre, en fort mauvais état, nécessite un traitement chirurgical qui a été pratiqué. Les symptômes articulaires, moins prononcés cette fois, ont cédé à des injections de calomel, mais après la quatrième la gingivite nous a obligé à suspendre ce traitement.

Cotto méthodo de traitement nous parait donc présenter des avantages réels; les malades sont rapidement améliorés et encouragés ainsi à supporter les quelques inconvénients qui peuvent surgir. Sera-t-elle applicable, comme le pense de Gorsse, à d'autres formes d'arthrites? C'est là uno question que l'avenir pourra résoudre.

Traitement d'un eas de péritonite tuberculeuse généralisée par les injections de cacodylate de soude et les lavements d'eau saturée de sulfure de carbone. — Guérison,

Une guérison inespérée que nous avons obtenue, le docteur Traverse et moi, dans un cas de péritonite tuberculeuse trés grave, nous engage à vous communiquer les moyens thérapeutiques que nous avons employés et les considérations qui nous les ont dictés.

M. C..., ayant actuellement 47 ans, fut attoint d'appendicite légère à l'âge de 17 ans. Depuis de longues années il souffre d'une constipation opiniâtre avec selles laminées.

La maladie actuelle a débuté brusquement le 13 décembre, simulant une appendicite, puis survinrent des symptômes d'obstruction intestinale qui nécessitérent une intervention, suivie d'une amélioration de courte durée. Dix jours après l'état général s'altérait profondément; le 28 jauvier il est désespéré, le pouls est incomptable, le ventre est méteorisé, il est sonore dans toute son étendue. La palpation est impossible, tant par la tension des parois que par la douleur qu'elle provoque. Les selles sont tantét diarrhéiques, tantét réduites à des acybales très dures, très petites comme passées à la filière. On commence dès le lendemain le traitement suivant:

1º Le matin, injection de 0.05 centigrammes de cacodylate de soude:

2º Chaque jour, un lavement de :

3º On pratique la suralimentation.

Le 3 février, état général un peu meilleur ; la veille on observe une grande dilatation des veines de l'abdomen. Le foie paraît normal. Le malade accuse une sensation de fort ballonnement après chaque lavement sulfocarboné.

Le 5 février, 8 jours après le début du traitement, l'amélioration est très marquée; le malade veut même se lever. Le 13 février, abcès paraissant superficiel sans conséquence. Le ventre a ses dimensions normales, mais il est encore sensible. Le 22 février, la palpation profondo fait seniir dans l'hypochondre gauche deux anses d'intestin gréle entourées de leur péritoine fortement épaissi et contenant des noyaux indurès de la grosseur d'un pois. Les selles du malade sont abondantes, solides, bien calibrées.

Le diamètre de l'intestin est donc devenu normal, il était diminué depuis de longues années.

Actuollement, au 115° jour du début de la maladia, au 73° jour du teaitment cacodylique, M. C... est dans un état tellement satisfaisant qu'il peut être cousidéré comme guéri. Il est actuellement à la campagne et prend depuis quedques jours des granules de cacodylate do fer qu'il supporte très bien. Nous lui conseillons de prendre chaque somaine un lavement au sulfure de carbone, il nous dit qu'il n'a pas attendu nos conseils, qu'il en prend chaque fois qu'il voit ses selles diminuer de volume.

On ne peut attribuer cette guérison à l'opération, car on ne voit pas bien commont elle interviendrait au bout d'un mois après avoir épuisé son action en luit jours et que, en général, l'amélioration qu'elle produit est subite et continue et que s'il an es survient pas de complications le malade est sur pied au bout de trois semaines. Or un mois après l'intervention, l'état général et local était plus mauvais qu'auparavant. C'est donc bien le traitement médical qu'i a ggi.

Le excodylate de soude a contribué au relèvement de l'état général, au retour de l'appletit et des forces. Les lavements d'eau saturée de sulfure de carbone ont eu pour effet de faire l'antisopsie de l'intestin, peut-être aussi de faciliter la transformation fibreuse et assurément de dilater l'intestin, de le ramener et de le maintenir à son calibre normal, enfin de lui rendre sa tonicité.

L'augmentation de force élastique, de la vapeur de sulfure de carbone de 222 m/m 93 à 634",60 pour des variations de température faibles de 12°,07 à 38°,35 semble pouvoir nous en donner l'explication (1).

Dans l'intestin une certaine quantité de sulfure de carbone se volatilise. Il s'étabit une pression qu'on peut èvaluer à 600 m/m environ; à cette pression s'ajoute la tension de la vapeur d'eau, soit 50 m/m. Il en résulte une distation de l'intestin, un ballonnement de tout l'abdomen et des contractions réactionnelles de la part des muscles grand droit et grand oblique. L'abaissement du disphragme pendant l'inspiration agit dans le même sens. Les fibres lisses de l'intestin sont donc soumises à une sorte de massage interne, à des alternatives d'élongation et de raccourcissement, mouvements bien propres à lui rendre son calibre et sa tonicité.

Les lavements d'eau saturée de sulfure de carbone nous sembent indiqués dans les cas d'obstruction intestinale. Ils devront précèder les lavements d'eau de seltz qui sont dangereux, les lavements électriques qui sont quelquefois contronidiqués. Quoi qu'il en soit, les résultais que nous avronobtenus dans l'observation qui précède, marquent leur place dans le traitement de la péritonite tuberculeuse.

LITTÉRATURE MÉDICALE

Cours de minéralogie biologique

Par le De J. Gaune (Du Gers)

3 volumes in-12, A. Maloine, Paris, 1897, 1899, 1901.

Voici vingt-cinq ans que je suis M. le D' Gaube (du Gers).ll exerçait, à cette époque, la médecine rue Sainte-Isaure, à Batignolles; il avait, au delà des boulevards extérieurs, de

⁽¹⁾ Voir Schmitt, Bulletin des sciences pharmacologiques, ayril 1901.

l'avenue de Villiers et de la rue de Flandre, une réputation considérable, et il était le médecin consultant le plus appelé de toute cette zone parisienne.

Depuis lors, cotte situation n'a fait que graudir. Il est aujourd'hui à la têto de l'une des plus belles clientèles de Paris; sa consultation est l'une des plus suivries que jo connaisse: en somme, il occupe, dans la médecine parisienne, une place à la fois des plus importantes et des plus enviées.

A quoi M. le Dr Gaube du Gers doit-il cette situation exceptionnelle ?

Il n'est ni médecin des hôpitaux, ni membre de l'Académie de médecine, ni professeur à la Faculté.

Il y a quelques années, il avait onvoyé à l'Académie de médecine une lottre de candidature dans la section des académiciens libres et la Commission no trouva mêmo pas le moyen de le classer sur la liste de présentation.

Il n'a donc aucun titre universitaire, aucune estampille officielle; co qu'il a acquis, il le doit tout à lui-même, à son travail acharné, aux grandes idées originales qu'il a soutenues, à son incessant souci de la thérapeutique.

Aujourd'hui, en effet, les malades ne so contontent plus d'un diagnostic posé avec plus ou moins de virtuosité par un hommo que l'importance de ses titres et de ses décorations imposo officiellement comme un savant : ce qu'ils demandent, ces malades, c'est qu'on les guérisse ou qu'on les soulage ; peu leur importe que cette guérison soit acquise par la médication doctrinale à la mode — ou par tel autre moyen qui ne jouisse pas de la valeur officiello. Les malades ne voient que l'immédiat résultat et quand, nous-mêmes, nous sommes malades, nous pensous pas autrement.

L'un dos éléments de succès de M. Gaube (du Gers) a donc été sa thérapeutique. Or, celle-ci n'est pas quelconque; elle lui est absolument personnelle, et l'on peut dire qu'il a ouvert dans cette voie un sillon plein d'avenir, si l'on en juge par les résultats actuellement acquiel Il a été le premier à montrer l'importance de la minéralisation biologique du sol organique, cemme il l'appelle dana les phénomènes de la vie physiologique et morbide. Il ne s'est pas contenté d'étudier l'homme; il a fait porter ses recherches sur la plupart des animaux et sur les plantes, ce qui lui a permis d'élargir eucore sa synthèse.

Il a montré que la matière minérale était indispensable aux manifestations de la ric, que les ferments organiques et microbiens no pouvaient pas agir saus un substratum minéral particulier à clacun d'oux; que clauque tissu de l'organisme avait as dominante minérale; que la potasse est la dominante du musele, la magnésie du systéme nerveux, la soude der plasmas, etc., etc.; que l'aptitude minérale des protoplasmas est l'uno des conditions de la différenciation des organismes; que cetto aptitude minérale et le rapport de participation des définents minéraux à la vie sont caractéristiques des différentes colonies cellulaires, c'est-à-dire des différents tissus qui constituent les êtres animés.

Toutes ces découvertes qui jettent une si vive lumière sur tant de phénomènes obscurs de la vie et de la maladie sont exposées dans les doux premiers volumes du Cours de minéralogie biologique et il montre encore que dans la nutrition l'azote est tributaire du minéral, que la minéralisation particulière influencent hautement les divers actes de la nutrition défementaire.

Puisque la mincralisation prend une part si importante daus les actes de la vie, il était certain que toute rupture de l'équilibre minéral dévait ameuer des treubles morbides qu'il est difficile de classifier dans les cadres restreints et surannés de la nosologie actuelle.

C'est à l'étude de ces maladies de la déminéralisation que M. Gaube (du Gers) s'est attaché d'une façon spéciale, et cette étude remplit presque entièrement son troisième volume qui comprend aussi l'analyse minérale de la chair de l'homme et des animaux. La deminéralisation, qui n'est qu'un degré de l'inantition minérale, dénature la vie cellulaire; c'est une des maladies les plus fréquentes et les moins connues, parce qu'on ne la cherche pas; c'est aussi une des plus compromettantes pour toutes les fonctions de l'homme, et cela parce que le minéral est l'élément indispensable secondairement causal de la vie de chaque cellule, en particulier, de tout groupement de cellules, en rénéral.

Le minéral est l'un des grands metteurs en train de la vic cellulaire, et il prend une part énorme dans les actes intimes de celle-ci. Quand il défaille, non seulement l'équilibre est rompu, mais les actes aberrants, et par conséquent morbides, commenceur.

Lorsque l'analyse a révélé le point faible de la minéralisation d'un malade, il faut lui restituer ses éléments inorganiques par des combinaisens biodynamiques dont le poids moléculaire corresponde exactement à ce que devraient être les éléments de minéralisation défaillants, par rapport au poids antirvoemetrieue du malade.

Une étude minutieuse du bilan nutritif minéral (ingesta et exercta) permet de connaître le point où il faut frapper, puisque à chacun des tissus correspend une dominante minérale propre avec une sous-dominante:

Aux globules sanguius cerrespond le fer comme dominante, le potassium comme sous-deminante; au tissu osscux, le calcium comme dominante, le magnésium comme sousdominante; à la substance grise du système nerveux, le magnésium comme dominante, le calcium comme sous-dominante; à la substance blanche du système nerveux, le potassium comme dominante, le sodium comme sous-deminante au tissu musculaire, le potassium comme dominante et le magnésium comme sous-dominante.

Tous ces tissus sont baignés par des plasmas qui ont peur deminante le sodium et pour sous-deminante le potassium.

L'étude du bilan nutritif laissant reconnaître la quantité et

la nature de la déminéralisation, la médication aura pour but l'amendement du sol organique; elle variora nécessairemont suivant la nature de la déminéralisation. Ses agents essentiels sont : ou bien les médicaments minéraux simples, ou bien les aliments qui eontiennent dans leurs cendres en quantité dominante le minéral qui manque ou malade.

En 1894, j'ai montré, que la déminéralisation organique acompagnait la première période de la tuberculose pulmonaire et pouvait même la précéder. Depuis, M. Gaube (du Gers) est revenu sur cette question. Il a montré que cette déminéralisation portait surtout sur la claux et sur la magnésie, et qu'elle existait chez la plupart des descendants de tuberculeux. Ce simplo fait, quo je développerai prochainement, montre bien toute l'importance thérapeutique qu'il faut ajouter à cette question de la minéralisation organique, puisqu'elle sous-entend plus qu'une question de traitement, mais un amendement du sol apte à la tuberculose.

J'ai été souvent à même de constater les magnifiques résultats de la thérapeutique minérale de M. Gaube (du Gers). Ces résultats sont la preuve indéniable et pratique de l'exactitude de ses prévisions et de la sûreté de ses travaux.

Dans ces dernières années, on les a beaucoup pilles, sans les eiter, bien entondu, ee qui est uno autre preuve, non moins cortaine, de leur valeur.

Les trois volumes que je présente aujourd'hui aux lecteurs du Butletin de Thérapeutique ne sont ni conçus, ni écrits dans la forme didactique, mais ils sont pleins de fais nouveaux, d'idées originales et d'analyses suggestives, et puis ils donnent à penser, justifiant ainsi cette parole que « lorsqu'on a soi-même beaucoup d'idées, on en fait naître dans l'esprit de ceux aui vous lisent. •

Albert Roses

THÉRAPEUTIQUE AU LIT DU MALADE

N° 3. — Du régime de transition entre le régime lacté absolu et l'alimentation normale

UHEZ LES DYSPEPTIQUES HYPERSTHÉNIQUES AVEC HYPERCHLORHYDRIE

Par Albert ROBIN.

Vous vous ruppelez ee malade couché au n° 11 de la salle Serres et qui, au mement de son entrée, présentait tous les Serres d'une erise d'hypersthénie avec hyperchlorhydrie. Il n'y a que quatre jours qu'il est à uetre traitement habituel, c'est-d-dire au régime lacté absolu; déjà il ne souffre plus et demande à manger; il désire même sertir dans quelques jours.

Allons-nous d'emblée accèder au désir de ce malade, le mettre au deuxième degré, et lui signer bientêt son exeat, brus-quant ainsi le passage du régime lacté absolu à la vie ordinaire? Co scrait là une grave erreur, une faute de thérapeutique très prépudiciable à notre malade; et, si j'y insiste, c'est que nombre de médeeins la commettent, s'exposant ainsi à des rechutes qu'ils attribuent à l'impuissance de la thérapeutique, ee qui leur fait dire : « On ne guérit pas les estomaes; on ne fait que les amélierer peur un temps ».

C'est vrai si vous rendez à la vie ordinaire un malade qui ne souffre plus depuis deux eu trois jours; c'est faux si vous prenez les précautions que je vais vous indiquer et que j'ai réunies sous le nom de « régime de transition entre le régime lacté absolu et l'alimentation normale ».

La durée de ce traitement de transition est essentiellement

variable, suivant la symptematologie présentée par le malade, suivant l'aucienneté de son affection, suivant le temps qu'il a mis à s'améliorer ; il no duvera guére que cinq à six jours chez notre malade, taudis qu'il attoindra deux ou trois semaines pour le n° 8 de notre salle Serres. Celui-ci, en effet, vomit depuis 20 ans; il a considerablement maigri; au moment de son entrée, l'estomac était distendu, clapotait audessous de l'ombilic, ne gardait presque rien; en somme, il présentait tont le syndrome de Reichmann avec sténose du pylore; certains d'entre vous avaient même fait le diagnostie de sténose fibreuse et parlé de gastre-entérostomie.

Vous avez vu que ce pronestie était beaucoup trop sombre: le lait, les gouttes à la solanine, les paquets de saturation ont transformé l'état de cet homme qui ne souffre plus, qui a engraissé d'un kilogramme et demi en linit jours. Tant qu'il cugraissera, nous le hisserons au régime lacté absolu. Mais ensuite, ce n'est qu'avec une extrême prudenco, et par étapes successives, que nous lui ferous reprendre le régime commun. Quolles sont donc ces étapes de transitier.

Elles sont au nombre de trois.

Pendant la première étape, le malade prendra, le matin à jeun, et le soir, vers 4 ou 5 heures, un demi-litre de lait par petites gorgées; il s'abstiendra de tout médicamont à ces deux prisos de lait. A 11 heures du manin et à 7 h. 1/2 du soir, il fera deux repas un pen plus abondants; vous lui permettrez les soupes maigres, peurvq qu'elles soient sans beurre, les pâtes alimentaires, nouilles, macaroni, tapioca, arrow-roet, les œufs à la coque, tous les légumes, cuits à freau et sans beurre — on peut cependant leur ajonter à table un peu de beurre frais — les fruits euits, un peu de pain grille; il boira aux repas un demi-litre de lait.

Avant le repas de 11 heures et celui de 7 h. 1/2, vous lui ferez prendre quatre gouttes d'une mixture à la solanine, que veus fermulerez commo suit :

Solanine	0,10	entigrammes.
dissolution	0,09	
Picrotoxine	10,0	_
Chlorhydrate de morphine	0,05	_
- cocaine	0,03	_
Sulfate neutre d'atropine	0,01	_
Ergotine Yvon		gramme.
Eau de laurier-cerisc	12	_

Mêlez et filtrez.

pour 12 paquets.

Au milieu de ces deux repas, donnez un cachet de popsine (1 à 2 grammes par cachet).

A la fin, un des paquets de saturation suivants, délayé dans un peu d'eau :

Cette première étape du traitement durera en moyenne 8 à 10 jours; on pourra l'allonger ou l'écourter suivant l'état des

fonctions digestives.

A la deuxième étape, on remplacera le lait aux repas par de l'eau pure ou une eau minérale indifférente; on permettra le poisson cuit au court-bouillon, toutes les viendes, mais très cuites et sans sauce.

Pour le reste, il n'y a rien à changer; on continuera les médicaments et les prises de lait. La durée minima de cette deuxième étape du traitement est de 48 heures; on peut la prolonger jusqu'à 8 ou 10 jours.

Enfin, dans la troisième étape, supprimez complètement le lait qui devient alors nuisible.

Divisez ainsi les repas : le matin, un petit déjeuner sec, par exemple, du pain, du jambon froid et quelques fruits cuits. Au déjeuner et au diner, donnez la liberté de choisir parmi les aliments que je vous ai indiquês : comme boisson, de l'eau. Supprimez aussi tout médicament, mais sans cesser de surveiller le malade. S'il accuse quelques malaises, faites reprendre, pendant 4 jours, un des petits paquets de saturation formulés plus haut (µaquets n° 1). De plus, au moment des douleurs, brilmres, aigreurs, reuvois, ou à l'occasion d'uno sensation stomacale quelconque, finites prendre immédiatement un des grovs paquets de saturation suivants (paquets n° 2) :

Lactose	10 grammes.
Magnésie calcinée	15
Sous-nitrate de bismuth}	7 —
Codéine	0.05 centigrammes.
Bicarbonate de soudo	10 grammes.

Mêlez très exactement et divisez en 10 paquets.

Tonte cette réglomontation vous paraît peut-ôtre un peu compliquée; mais soyez convainen de son importance. Il nous est mallieureusement impossible do faire tous ces régimes à l'hôpital, et vous une pourrez pas me les voir appliquer rigoureusement, ni par conséquent en juger tous les bous effets. Mais soyez sûrs que, dans la pratique médicale, tous ces petits détails que vous ne trouvez pas dans les livres, vous rendront tos plus grands sorvices. C'est grâce à eux que l'on peut par-ler pour les dyspepsies, non seulement d'amélioration sérieuses, durables, mais de guérison totale.

REVUE DES TRAVAUX FRANÇAIS ET ÉTRANGERS

Médecine générale

Quand faut-il administrer la digitale. — Sujet souvent traité, mais sur loquel il est bon de souvent revenir. M. Martinet lui a récemment consacré une intéressante étude (*Pro*grès médical, n° 101, 1900). L'action physiologique de la digitale, dit-il, peut être ainsi schématisée: la digitale est un médicament toni-cardiaque, coso-constricteur, diutrélique. Elle exerce son action sur tout le système circulatoire, myocarde et vaisseaux, et sur l'apparoil d'innervation cardiaque. Suivant les cas et suivant les doses, elle a sur toute la circulation une action régulatrice, calmante, tonique, stimulante; elle peut être l'opium, le quinquina, l'alcod du cœur.

Son action cardio-vasculaire est complexe.

La digitale est un excitant direct de la fibre cardiaque.

Elle exerce sur les vaisseaux une action directe. La digitale exerce également une action vaso-constrictive, et élève, de ce fait, la tension artérielle.

Elle agit enfin sur le système d'innervation cardiaque. L'administration de la digitale ralentit de façon manifeste les battements cardiaques.

L'action globale résultant de ces actions expérimentalement de la période dissociées se manifeste par un allongement de la période dissociées se manifeste par un allongement de la période distolique et un ralentissement du rythme cardiaque (résultat de l'excitation pneumogastrique) d'où réplétion plus complète des cavités du cour; par un renforcement de la contraction cardiaque (résultat de l'action directe sur le myocarde et le grand sympathique). Les deux actions précédentes détorminent une accelération périphérique; jointes à la vaso-constriction artérielle, elles déterminent la régularisation de toute la cérculation.

L'action diurétique de la digitale est discutable chez l'homme sain; elle est évidente et puissante chez les cardiaques, surtout chez les hydropiques et les cedémateux.

Il est probable que la digitale est un diurétique indirect, que son action régulatrice de la circulation générale fait rentrer dans la circulation, pour les éliminer par les urines, les liquidos épanchés hors dos vaisseaux (hydropisies, oddemes).

La diurèse digitalique est relativement tardive; elle com-

mence en moyenne vingt-quatre à trente-six heures après l'administration de la digitale; elle se prolonge d'ordinaire pendant plusieurs jours, trois à sept; elle est donc tardice, moyenne, prolonyée.

De tout ce qui précéde, il résulte que l'emploi de la digitale sera justifié dans tous les cas où il y a fléchissement du myoearde, abaissement de la tension artérielle, tendance à la stase; qu'en un mot la digitale est le quasi-spécifique de l'hipposystoite ou de l'assystoite.

Elle sera surtout indiquée dans l'insuffisanee mitrule arrivée à la troisième période ou période liposystolique, caractérisée par l'insuffisance du pouls et des pulsations cardiaques, l'eodome malléolaire, la rareté des urines, la constance de la dyspenée. Elle aura, dans ec cas, la plus grande valeur, tant pronostique que thérapeutique, car elle renseigne exactement sur le degré de dégénérescence de la fibre cardiaque; quand le cœur réagit à la digitale, tout est à espérer; quand la digitale bien administrée est sans action, tout est à craindre.

Dans le rétrécissement mitral, elle est très longtemps contreindiquée.

Dans les cardiopathies artérielles et l'artério-sellorse, la digitale est presque toujours contre-indiquée du fait de l'hypertension artérielle quasi-constante et de l'apparition tardive des phénomènes hyposystoliques. Son administration intempestive risquerait d'aggraver la lesion, de stimuler ou de provoqueu l'angine de poitrine, d'amener la rupture d'un anévrisme aortique.

Après les affections cardiaques ce sont les affections pulmonaires qui fournissent les indications les plus fréquentes, en particulier les cas où il y a tendance à la stase veineuse, à la congestion des bases, indice que le œur droit est fatigué et insuffisant, incapable de suffire à la circulation pulmonér obstruée : c'est surtout dans l'emphysème avec bronchite chronique, et dans les congestions primitives ou secondaires qu'on aura à l'administrer. La digitale a de tout temps occupé une grande place dans le traitement de la pneumonie et cela parce qu'on sait que dans cette affection « si le mal est au poumon, le dauger est au œur ».

Dans les affections rénales, la digitale est surtout indiquée dans la période terminale du mal de Bright quand le cœur a faibli; qu'il ya stase, congestion viscèrales, hydropisies.

La digitale sora indiquée dans tous les cas où on devra stimuler la circulation, tonifier le cœur, faciliter l'élimination des poisons de l'organisme, c'est dire qu'on pourra être amené à l'administrer dans la plenrèsie, le rhumatisme, les fièvres éruptives, la tuberculose, la grippe...

Enfin, comme vaso-constricteur hémostatique, la digitale pourra trouver son emploi dans certaines hémorragies (hémoptysies, ménorrhagies).

Dans tous ces cas, on se guidera pour l'administration sur les régles qu'on peut résumer comme suit : 1º ne donner de digitale • ni trop, ni trop peu, ni trop souvent, ni trop longtemps »; 2º cesser toute autre indication pendantson administration; 3º teurie le malade au lit; 1º avant l'administration, chercher à diminuer le trop-plein vasculaire etles résistances périphériques par les moyens appropriés (purgatifs, saignées, pooctions, mouchetures, etc.).

Maladies infectieuses.

Le phénoi camphré comme antiseptique intestinal dans la favre typhoide. (Sém. méd., juil. 1900). — Un médeni américain, M. lo docteur D. English (de Millburn), s'est bien trouvé, chez les dothiénentériques, de l'usage interne du phénoi camphré, obtenu par le mélange d'une partie d'acide phônique avec trois parties de camphre. Nour confrère preserit es preduit — qui, on le sait, est de consistance

huileuse — à la dose de 10 à 12 gouttes toutes les deux heures.

Sous l'influence de ce traitement, on verrait, des les troisième jour, le météorisme intestinal disparaitre, les selles perdre leur odeur fétide et la fièvre baisser notablement. On doit continuer à administrer le phénol camphré tant que dure la période d'éstat, en surveillant atteutivement les urines. Si celles-ci prennent une teinte noiritre, il faut diminuer aussitôt les doses ou bien augmenter la durée des intervalles qui séparent deux prises successives; mais on ne suspendra la médication que lorsque le patient sera franchement entré dans la période de convalescence.

L'avortement artificiel provoqué par l'injection intrautérine de teiture d'iode. (Sem. méd., juli. 1900.) — D'après M. le docteur Ochischläger (de Dantzig), le meilleur moyen de provoquer l'avortement consisterait à înjecter dans la cavité utérine, à travers une canule métallique introduite jusqu'au fond de l'utérus, 3 ou 4 grammes de teinture d'iode pure; après l'injection, il faut avoir soin de tamponner le vagin avec de l'ouate aseptique pour éviter une cautérisation inutile de la muqueuse par la teinture d'iode dont une partie s'écoule toujours de l'orifice du col.

A la suite de cette opération, surtout quand elle est pratiquée dans les premières semaines de la grossesse présumée, on voit survenir, ordinairement des le troisième jour, un écoulement sanguin qui revêt tous les caractères du flux menstruel et qui entraine l'œuf dont la vitalité a été détruite par la teinture d'iode. Ce résultat ne saurait manquer que lorsque la canule n'a pas été poussée jusqu'au fond de l'utárus; on pareil cas, il suffit de recommence l'opération.

Le procédé qui vient d'être décrit serait dénué de touinconvenient, grâce aux propriétés éminemment antiseptiques du liquide injecté.

Maladies des voies respiratoires.

Le thiocol dans le traitement de la tuberculose et des bronchites chroniques. - M. Braun public diverses observations favorables au traitement de la tuberculose et des bronchites chroniques par le thiocol, et conclut de ses observations (Klin. ther. Woch., 1900, nº 38) que nous possedons dans le thiocol une préparation très importante de galacol capable d'agir d'une façon extrêmement remarquable, sur les affections tuberculeuses des poumons, et de guérir complètement les maladies de la muqueuse bronchique, accompagnées de sécrétion putride. Des quantités considérables de ce médicament sont absorbées ou incorporées par l'organisme sans conséquences fâcheuses; le thiocol n'irrite nulloment la muqueuse stomacale; on peut le prescrire sous la forme préférée par le malado, il ne possède ni goût, ni odeur repoussante, et la plupart des malades le prennent longtemps et même dos mois sans répulsion.

Traitement de la coqueluebe. — Il faut so défine de certains médicaments (Gazette de médecine de Paris, décembre 1900) tels que la belladone, le bromure de potassium et le saliciylate de soude, le chloroforme et le sulfate de quinine. La bolladone, préconiciée par Trousseau, n'a jamais produit d'effets salutaires sous quelque forme qu'elle ait été administrée. Lo bromure de potassium est un médicament dangereux, surtout dés qu'il y a un peu de bronchite, parce que, en anesthésiant les muqueases, s'il diminue d'un côté les quintes, et procure par suite un peu de repos, il laisse, par contre, aux bronches le temps de s'oblitèrer. Il fait le même reproche au salicylate de soude. Le chloroforme est d'un maniement délicat; et mieux vaut ne pas s'on servir que de le confier à une garde ou à la mère. Le sulfate de quinine dont la dose doit varier, suivant l'âge, de 0°25 à 0°00, outre son action sur la fièrre vaivant l'âge, de 0°25 à 0°00, outre son action sur la fièrre

dans les cas où elle existe, diminue aussi un peu le nombre des quintes.

Mais le médicament par excellenco, c'est l'hydrate do chloral. Sous quelle ferme, à quelle deso et à quel mement doit-on l'employer?

Il faut denner une préparation qui soit bien acceptée par l'enfant. C'est là une cendition essentielle. Joffroy conseille de le faire prendre dans de la gelée de groseille.

Aux petits enfants de 15 meis à 2 ans il donno de 0^{gr},75 à 0^{gr},80 dans un jour. A ceux de 3 ans il donne 1 grammo et aux plus âgés de 1^{gr},50 à 2 grammes.

Quant au moment de l'administration, cela a une très grande importance. Il faut donner le médicament le soir et le matin. De la sorte on ménage le sommeil et on precure le matin, lorsque les quintes seront passées, encere quelque tomps de repos.

Gynécologie et obstétrique

Perforation du crâne factal avec survic et guérison. —
M. lo P. I. Pernico (de Francior-tsur-Oder) relata dans le
nº 35 du Centralbiuti un cas do perforation crânienne pendant l'accouchement avec survie et guérisen. Il a observé un
efant du sexc féminin pertant à l'occiput une tumeur pai,
satile de la grossour d'un œuf de vanneau et présentant seulement à sa base un certain développement pileux.

En réalité c'est un cas de hernie pulsatile du cervoau ayant littéralement fait issue à travers un orificie crânien artificiel. Voici les renseignements fournis par les parents de l'enfant faisant l'objet de cette observatien : le médecin appelé lors de l'accouchement a constaté une hydrocéphalie chez le produit de la conceptien et un rétrécissement du bassin chez la méro. Il a nerforé le crâne de l'enfant et alors l'a extrait saus dif-

ficulté par le forceps. Le nouveau-né très fort, atteint d'hémiplégie du côté gauche, a survécu et a pu se guérir peu à peu.

plégic du côté gauche, a survécu et a pu se guérir peu à peu. Voici vraisemblablement deux erreurs commises par l'accoucheur allemand : d'abord la mère de l'enfant, qui a eu 3 accouchements antérieurs sans intervention opératoire.

aura eu une simple faiblesse des contractions utérincs.

En outre, lors de la perforation du crâne fostal, le liquide qui est sorti a pu provenir de la mère et il n'est pas établi que l'enfant ait eu de l'hydrocéphalie.

Le volume assez grand du fœtus explique parfaitement la lenteur de l'accouchement.

Enfin l'idée de pratiquer la perforation sans aide est malheureuse.

Quoi qu'il en soit, le cas décrit par notre confrère Ludwig Pernice est loin d'être banal s'il n'est pas unique.

Emploi de l'eau oxygénée en gynécologie. — M. Clitampké recommande vivement (Przeg. levarski, 1900, nº 40) l'usage du peroxyde d'hydrogène dans le traitement des affections utérines. Il y acu recours dans quelques cas d'endométrites, rebelles à tout autre traitement médical, et même au curetage, et a obtenu de très bons résultats. Le mode d'emploi consistait soit en application, matin et soir d'abord, une fois par jour ensuite, de tampons imbibés d'eau oxygénée, soit dans un cas par exemple de métrite par rétention partielle du placenta, en injections intra-utérines d'eau oxygénée (avec la seringue de Braun).

L'Administrateur-Gérant: O. DOIN.



Los locteurs du Bulletin de thérapeutique ont pu s'apercevoir depuis quolques mois que la direction du journal cherchait à transformer lègèrement la manière dont les articles étaient choisis et groupés : chaque temps, on effet, a des besoins diferents et il est bon d'accommoder toujours les choses aux nécessités de l'époque. Pour cela, nous avous cherché à faire rédiger par un certain nombre de rédacteurs particulièrement compétents des articles de Recue, destinés à condenser sous une forme précise et claire à la fois les progrés de la thérapeutique dans toutes les branches de la médécine.

En outre, nous nous sommes attachés a établir la rubrique Tracaux français et étrangers sur un modèle plus pratique, en groupant les divers empruts, que nous sommes amenés à faire, sous des titres bien choisis, en même temps que nous avons táché de faire un choix mieux éclairé des diverses citations.

Lo Bulletin de thérapeutique est un journal très spécial; nous no l'oublions pas, et nous avons toujours présent à l'esprit que sa seule raison d'être est de former pour le médecin praticien, et non pas pour le savant, un recueil aussi complet et surtout aussi clair que possible de tous les faits qui intéressent l'art de guérir. Mais pourtant, il nous semble impossible de ne pas tenir compte dans une certaine mesure des actualités d'ordre général qui peuvent intéresser le médecin, et sous le titre de Bulletin nous avons rassemble les faits thérapoutiques de la semaine et aussi les menus faits d'intérét professionnel général, en y ajoutant au besoin une note d'appréciation et de critique. Ce procédé de vulgarisation rapide des actualités nous a paru donner plus de vie au journal et nous

comptons dans l'avenir soigner particulièrement cette rubrique.

Depuis un certain nombre d'années la bibliographie semble être abandonnée des rédacteurs médicaux ou tout au moins il est certain qu'on attache moins d'importance à la critique littéraire. Nous pensons que cet abandon est injuste et impolitique, car le lecteur d'un journal doit espérer y puiser à l'occasion, des renseignements sérieux sur les livres qui paraissent : c'est pourquoi nous avons tenu à reprendre les anciens usages et à faire de bonnes notices bibliographiques. Malheureusement, nous nous sommes heurtés à une difficulté spéciale à l'époque : la production est si abondante que, coup sur coup, paraissent souvent chez divers éditeurs des ouvrages qui ne sont que la répétition les uns des autres ; or, quel qu'honorable qu'en puisse être la rédaction, il nous est impossible de faire consciencieusement l'analyse détaillée de chacun d'eux. Aussi avons-nous décidé de consacrer, sous la rubrique Littérature médicale, des articles spéciaux seulement aux ouvrages qui se recommanderont par leur importance réelle, tandis que, sous le titre ordinaire de Bibliographie, nous continuerons à publier des apercus rapides sur les livres nouveaux qui présentent moins d'originalité ou qui n'ont pas un intérêt thérapeutique. On trouvera régulièrement, sous la rubrique Thérapeutique

au lit du malade, de petites consultations pratiques résumant des leçons extemporanées faites à l'hôpital et donnant les moyens de traitement les plus nouveaux des diverses affections ou symptômes. Jusqu'ici nous avons surtout fourni dans cet ordre d'idées des médications professées à la Pitié par M. Albert Robin; mais désireux de décentraliser autant que possible, nous avons prié les plus éminents professeurs dos facultés provinciales de nous fournir de temps en temps des articles de ce genre; nous aurons donc varié davantage cette trobrique qui nous paraît appelée à rendre service au praticien. Dans le même ordre d'idées, nous avons décidé de ter-

miner presque tous les numéros par un formulaire de médications pour des maladies déterminées.

Enfin nous continuerons, comme par le passé, à publier régulièrement tous les travaux originaux qui présentent un caractère réel de progrès thérapeutique, aussi bien que les leçons de la Pitié et les comptes rendus in-extenso de la Société de thérapentique, de manière à fournir un ensemble de documents aussi sérieux que par le passé.

En terminant ce rapide exposé des petits changements et perfectionnements apportés dans la direction du journal, il nous reste une prière à adresser à nos lecteurs : nous trouvons que la rubrique Correspondance est aujourd'hui singulièrement délaissée par les médecins et nous le regrettons, car c'est on restant en communauté avec ses abonnés que le rédacteur d'un journal peut être le mieux capable de satisfaire a ses besoins. Le praticien est journellement aux prises avec des difficultés professionnelles imprévues : il fait souvent des observations de grande valeur, et par modestie, par crainte de paraître mal renseigné, il laisse perdre une quantité considérable de documents. Il ne faudrait pas oublier pourtant que la science est faite au moyen de faits innombrables et rien quo do faits ; tout le monde est donc appelé à contribuer au progrès scientifique, et tout lecteur, aux prises avec des difficultés ou en présence d'un fait qui l'étonne, devrait rédiger une note et l'envoyer au directeur de son journal, qui saura publier le travail s'il est vraiment intéressant ou qui reusoignera l'intéressé si le fait est seulement banal. C'est pourquoi le rédacteur en chef du Bulletin de thérapeutique sorait heureux de voir souvent sa bonne volonté misc à contribution par ses lecteurs.

Enflu, il est encore un point où la Correspondance peut rendre des services, c'est dans l'échange de vue qui s'opère entre le rédacteur et le lecteur. Bien souvent une indication fournio par le second peut permettre au premier des perfectionnemonts qui peuvront être deirrès de part et d'autre et que cependant on ne fait pas, souvent par ignorance. Nous serions done heureux quo les lecteurs du journal veuillent bien, à l'occasion, nous fournir leurs observations et manifester leurs désirs, car ils seront toujours bien accueillis.

REVUE DE PHARMACOLOGIE

Par A. Bolognesi.

Le Hontin

Voici encore un médicament nouveau qui parait mériter d'attirer l'attention des praticiens. C'est un tannate d'albumine qui a roçu le nom de Hontin de l'auteur qui l'a préparé, le chimiste Sztankay.

Nous connaissons déjà un certain nombre de préparations tanniques :

Le tannigène, combinaison du diacétyle avec le tannin. La tannalbine, combinaison du tannin avec l'albumine, sur

laquelle nous reviendrons tout à l'heure.

Le tannocol, combinaison du tannin avec la gélatine.

Le tannoforme, combinaison du tannin avec la formaldéhyde; cos deux dernières préparations tanniques ne valent pas la tannalbine.

La tannopine, combinaison de la formine avec le tannin a donné de bons résultats choz les enfants. Ce médicament coûte un peu cher.

Quelles sont les qualités que doit présenter un ben astringent intestinal?

Il doit tout d'abord être sans action sur la muqueuse do la bouche et de l'estomac; ne se dissoudre et ne se résorbor qu'avec lenteur afin d'exercer son action curatrice dans toutes les parties de l'intestin grêle et du gros intestin.

Le tannin pur trouble les fonctions de l'estomac. Les sels métalliques astringents, désagréables même à faibles doses dans l'estomac, forment dans l'intestin des combinaisons inso lubles qui obligent à en employer des doses considérables et irritantes.

Le Hontin est une tannathine kératinisée et réduite en poudre; grâce à sa composition chimique particulièrement stable, il arrive dans l'intestin sans presque avoir subi de décomposition dans l'estomac et peut parvenir jusque dans le gros intestin; il produit, grâce à sa solubilité dans le milieu alcalin intestinal, une diminution des sécrétions intestinales.

A l'intérieur, on peut, sans inconvénient, administrer jusqu'à 10 grammes de Hontin par jour sans produire de phénomènes désagréables pouvant provenir de troubles de l'estomac, tels que nausées, vomissements, tiraillements d'estomac, renvois, sensations de plénitudes ou de brûlures, etc., etc.

Même administré à faibles dosses, on peut, au bout de peu de temps, constater dans les matières fécales, la présence de cet agent, preuve que ce produit n'est décomposé dans l'intestin qu'avec lenteur, ce qui lui permet d'exercer son action jusque dans le gros intestin.

L'action du médicament est directe, par ce fait que le tannin qu'il renferme, à l'état naissant, grâce à ses combinaisons chimiques, avec les liquides albuminoïdes et muqueux, forme un précipité solide insoluble dans l'eau, précipité qui, dans le catarrhe intestinal, revêt comme d'une pellicule mince la face interne de la muqueuse ramollie et enflammée, produisant ainsi une sorte de gaine protectrice des terminies sons nerveuses irritées et diminuant les doulours habituelles de l'affection. L'action astringente directe jointe à la diminution de la douleur amène une vaso-constriction des vaisseaux superficiels et par suite un tarissement considérable de la

secrétion exagérée pathologiquement. Le Hontin constituerait donc une préparation directement astringente et antiphlogistique, agissant à la fois contre le gonflement, l'hypersécrétion et la douleur de la muqueuse intestinalo malade et amenant rapidement la diminution et la fin de la diarrhée.

Les indications du Hontin appartiennent aussi bien aux affections aiguës, subaiguës et chroniques du tube intestinal.

A la dose do 4 grammes pro die, il produit d'excellents résultats dans lo catharre aigu; au bout du deuxième jour, lo flux diarrhéique lo plus abondant diminuo considérablement, de même que les douleurs et le tenesme; le quatrième ou le cinquieme jour, la guérison survient.

Des cas de catarrhe chronique durant depuis plusieurs mois et chez lesquels le traitement habituel, par le busmuth, l'opium, le tannoformo, etc., n'avait donné qu'un résultat passager, ont été modifiés par la dose de 4 grammes de Hontin par jour.

Les premiers jours on observe une diminution des garderobes; les jours suivants leur aspect se transforme, elles perdent leur caractère diarrhéique, les mucosités disparaissont et vers le sixième ou septième jour elles ont le caractère moulé des garde-robes normales.

Dans le catarrhe intestinal des fièvres éruptives, le Hontin produit un bon résultat dès le deuxième ou le troisième jour.

Chez les tuberculeux diarrhéiques, le Hontin a donné aussi aux divors expérimentateurs de bons résultats, il arrête le flux diarrhéique, si fâcheux pour les malades qu'il affaiblit considérablement, et ne produit aucun trouble do l'estomac, ce qu'i est de la plus grande importance dans cette affection.

Dans les catarrhes faisant suite encoro à la constipation habituelle, le Hontin s'administre à la dose de 3 grammes par jour, produit aussi des résultats très appréciables. Chez l'enfant comme chez l'adulte, les succès sont fréquents, notamment dans la gastre-entérite et les longues diarrhées infantiles qui compromettent gravement la nutrition des nourrissons.

En résumé, le Hontin est un bon astringent, à action sère et rapide, d'une innocuité absolue, sans goût et sans odeur; on peut l'administrer même aux enfants de quelques semaines; c'est un nouveau remede qui paraît surtout appelé à rendre des services dans la médication infantile.

Nous avons pu expérimenter le Hontin dans six cas d'affections variées de l'intestin et nous n'avons pu que constater les bons effets du médicament :

Obs. I. Homme de trente ans atteint de diarrhée chronique due à une inflammation du gros intestin, datant d'un an. Guéri en huit jours. 4 grammes de Hontin par jour.

Obs. II. Tuberculeux à la deuxième période, avec diarrhée périodique rebelle. Amélioration dès les premiers jours et guérison le sixième jour. Doses : 3 grammes par jour.

Obs. III. Entérite muco-membraneuse chez une jeune femme de vingt-cinq ans, avec période de constipation et de diarrhée. Flux diarrhéique arrêté le troisième jour. Doses : 3 grammes par jour.

Obs. IV. Grippe à forme intestinale chez un homme de treute-cinq ans, avec diarrhée abondante ressemblant à une véritable attaque de cholèra nostras. Guérison en trois jours. Doses: 6 grammes par jour.

Obs. V. Enfant de trois ans atteint de diarahée lientérique, rachitique depuis un an. Guérison en huit jours. Dose : 2 granmes par jour.

Obs. VI. Diarrhée chez un nourrisson de trois mois, élevé au biberon et atteint de gastro-entérite. L'enfant, mis au lait maternisé, a été débarrassé de sa diarrhée en cinq jours. Dose : 1 gramme par jour. Le Hontin peut donc être administré avec grand avantage et sans aucun inconvéuient chez l'enfant de quelques semaines aussi bien que chez l'adulte. Il possède sur les autres préparations tanuiques l'avantage d'agir sans nuire aux fonctions stomacales et à doses moindres.

Tous nos malades, à l'exception des deux enfants, ont absorbé le médicament sous la formo de cachets d'un gramme.

Chez les nourrissons, on donnera le Hontin suivant l'àge, à la dose de 0°,30 à 0°,00 centigrammes, trois à quatre fois par jour. Chez les enfants plus âgés, à la dose de 0°,50 centigrammes à 1 gramme à la fois.

On peut l'administrer dans un sirop, du miel, du gruau, du riz ou tout autre alimentation solide. N'ayant ni goût ni odeur, il ne produit aucune répugnance de la part du malade.

Chez l'adulte, on peut donner des doses d'un gramme à la fois, répétées de trois à cinq fois par jour et disséminées dans la journée. On peut administrer des doses de 2 grammes à la fois et atteindre 10 grammes en vingt-quatre houres dans les ens tentaces et rehelles.

Le Hontin a été administré sous la forme de suppositoires au bourre de cacao dans des cas do rectite aiguë avec tenesme avec un excellent résultat.

Chez l'adulte, la prise en cachets semble être le meilleur mode d'ingestion.

Les résultats paraissent être plus favorables si en débute de suite par de fortes doses, pour aller en diminuant progressivement ensuite au fur et à mesure de l'amélieration.

SOCIÉTÉ DE THÉRAPEUTIQUE

SÉANCE DU 8 MAI 1901

PRÉSIDENCE DE M. ALBERT ROBIN.

Le proces-verbal de la dernière séance, lu et mis aux voix, est adopté.

Correspondance.

MM. Balzer, G. Baudouin, Riche et Brocchi adressent leurs remerciements à la Société pour leur élection au titre de membres titulaires ou de correspondant.

MM. Desnos et Leredde s'excusent de ne pouvoir assister à la séance d'aujourd'hui et demandent le report au 22 mai de la communication qu'ils devaient faire.

Présentations.

M. Soupault donne lecture, au nom de M. Hérard de Bessé, de Pougues, de la note suivante :

Note sur le traitement du cancer par l'acide osmique.

En 1895, j'ai eu l'idée, avec le D*Leclerc, d'employer pour le traitement du cancer une substance fixant les cellules épithéliales avec plus d'énergie que le bleu de méthylène et TOME CXXXI. 19° LIVE. 47 l'acide osmique sous la forme de liqueur chromo-acétoosmique de Flemming.

Les circonstances m'ayant empéché de poursuivre mes recherches, j'avais renoncé à publier les résultats d'une trop courte expérimentation. Co qui m'encourage à le faire aujourd'hui c'est l'espérance que d'autres reprendront ces expériences.

l'ai employé la liqueur de Flemming en compresses lumides et en injections interstitielles. Ces injections furent faites tantôt profondément, dans l'espoir de faire une zone de cellules fixées limitant la tumeur dans la profondeur, tantôt superficiellement pour crèter une porte de substance donnant accès à des compresses.

Chez tous mes malades, pendant toute la durée du traitement jo me suis assuré que ni la quantité ni la qualité des urines n'étaient sonsiblement modifiées; cependant je suis toujours arrivé à employer la liqueur de Fleminie pure on permanence, à l'aide de grandes compresses sur de larges surfaces en même temps que je pratiquais des injections interstitiolles (jusqu'à 8 centimétres cubes en une seule séance).

Voici ce qui m'a paru résulter de co traitement :

Les compresses produisent une couche noirâtre assez mince, s'eulevant assez facilement par le lavage:

Une injection superficielle de 1 centimètre cube provoque au bout de quelques jours une porte de substance pouvant loger une petite noisette:

La liqueur de Flemmiug a un certain pouvoir hémostatique. Son injection dans la tumeur est peu ou pas douloureuso; son application en compresses no provoque aucuno réaction.

De l'ensemble du traitement résulte une sédation manifeste de la douleur, peut-être due à l'action antinévralgique de l'acique osmique et une diminution marquée des sécrétions et de la fétidité.

L'usage de l'acide osmique sous forme de liqueur de Flemming semble sans inconvénient, même à fortes doses sans doute, parce que sa grande puissance fixatrice empèche son absorption, faisant à la fois sa valeur et son innocuité.

Conclusion. — Le traitement du cancer par la liqueur de Flemming mérite d'attirer l'attention et pourra sans doute remplacer avantageusement celui par le bleu de méthyène dans tous les cas de tumeur épithéliale inopérable ou que l'on ne veut pas opérer.

M. Albert Robin donne lecture, au nom de M. Deschamps (de Riom), de la note suivante :

Un appareit de soutien cardiaque, Ceinture hygiénique, par le D^{*} Deschamps, de Riom.

J'ai l'honneur de présenter à la Société de thérapeutique un appareil de soutien cardiaque, dit ceinture hypo-cardiaque,

J'étudie cet appareil depuis ciuq ans. Je l'aumis gardé quelque temps encore en observation, si deux médecius allemands, Abée (1) et Hellendal (2) n'avaient publié, l'an dernier des articles sur des appareils analogues. Ces travaux, inspirés par une préoccupation semblable à la mienne, m'ont engagé à douner le résultat de mos recherches sur cette méme auestion.

DESCRIPTION

Cette ceinture se compose :

1º D'une pelote de forme trapézoide qui s'applique sur la région cardiaque avec le mamelon comme centre. Je lui ai donné cette forme, afin que sa partie inférieure pût couvrir tout l'espace occupé par la pointe du cœur dans ses déplace-

De l'emploi d'un appareil de protection du cœur. Abéc, Deutsche med. Woch., 25 janvier 1900,

⁽²⁾ Hellendal, Deutsche m. W., 29 nov. 1900.

ments normaux ou pathologiques. On sait, en effet, que la pointe du cœur est très mobile. Elle se déplace suivant les mouvements respiratoires, les efforts, les attitudes (1), et aussi par hypertrophie, dilatation, ou cardioptose (Rummo).



La pelote est concave, afin de mieux s'adapter au pourtour du thorax: sa face postérieure est plus épaisse dans sa moitié externe, parce que la pression doit s'exercer plutôt en dehors qu'en dedans;

2º D'une ceinture eu tissu élastique, qui est fixée à la partie inférieure de la pelote et fait le tour du thorax; elle est très élastique afin de ne pas gêner le rythme respiratoire;

3° D'une bretelle qui s'attache en arrière à la ceinture, passe sur l'épaule gauche et vient se fixer sur le bord supérieur de la pelote pour l'empêcher de basculer en avant.

Potain, Merklen, Determann (Deutsche med. Woch, 12 avril 1900).

MODE D'ACTION

Tous les cardiaques qui souffrent de leur cœur, sont soulagés par une pression exercée loco dolenti soit avec la main soit au moyen d'un artifice quelconque. C'est cette pression douce et instinctive oue la pelote assure méthodiouement.

Elle diminue ainsi l'hyperesthésie de la paroi thoracique toujours augmentée comme on sait, chez les cardiopathes (la compression calme la douleur, c'est un fait d'observation).

Elle renforce cette même paroi généralement amincie par atrophie musculaire.

Et, dejà, elle facilite l'effort par ce simple moyen mécanique. Or l'effort qui est une cause de fatiguc, même pour l'homme sain, est, pour le cardiaque, un acte particulièrement dangereux. Tout artifice capable de le diminuer aura un resultat bienfaisant. C'est ainsi que ce coussin externe fournissant à la parci costale un point d'appui fixe allège d'autant le travail que doivent donner les muscles thoraciques; il le fractionne, le divise, et le rend plus commode et moins pénible. Le malade se sent plus fort; il a plus de confiance en soi.

Pout-être y a-t-il là un élément psychique; il ne le faut pas dédaigner. Les cardiopathes, qui savent ce que leur coûte un effort exagéré: palpitations, lypothymies, parfois syncope, ou encore crises de tachycardie ou d'arythmie, limitent volontiers leurs fôirts, ct, de crainte de dépasser le but, ne domnent pas toujours ce qu'ils pourraiont donner. La présence de cette ceinture leur rend la confiance et la e nossibilité à d'azir.

Enfin, et c'est là sou action principale : elle augmente la pression artérielle.

Les praticieus n'ont pas toujours à leur disposition un sphygmomanometre, mais avec un peu d'habitude il est facile d'apprécier au doigt les variations de la pression. L'augmen tation est d'abord passagère et disparait ouand on ôte la ceinture: puis, peu à peu, à la longue, par la lente stimulation produite sur le cœur (comme nous le verrons tout à l'iteure), elle peut devenir durable, - à supposer que les autres conditions d'hygiène cardiaque soient rigoureusement observées. On n'ignore pas qu'en thérapeutique cardiaque, hors de l'hyciène il n'y a nas de salut.

Abée (loc. cit.) a, de son côté, remarqué que, sous l'influence de la pelote qu'il préconise, « le pouls radial devient plus ploin, les limites du cœur sont repoussées en haut, les limites du poumou s'abaissent. »

Comment expliquer cette action?

On sait que les stimulations vives ou prolongées des extrumités sensitives produisent des actes réflexes favorables, sur la mobilité comme sur la nutrition générale. C'est ainsi qu'agissent les frictions, le massage, les douches, l'électricité statique, soit sur l'ensemble de la périphério nerveuse, soit sur un noint localisé du corns.

Abrams (1) a montré que si l'en excite la peau de la région précordiale, il se produit une contraction réflexe du myocarde; le phénomène est très manifeste chez les enfants.

Ne sait-on pas, en outre, que l'un des meilleurs moyens de ealmer les palpitations tumultueuses est l'application du froid sur la région eardiaque.

N'est-til pas permis do penser que la pression excreée pau une pelote agissant à la façon d'un massage léger, égal et prolongé, détermine des contractions réflexes du myocarde d'où augmontation de la pression artériolle, et par conséquent de la duries o(Abeo) — circulation meilleure — effet tonique général, et, enfin, à la longue, amélioration de l'état cardiaque?

Abée penso « qu'en relevant le eœur elle facilite la systole et la diastole et paro dans une certaine mesure aux accidents de la dilatation. »

⁽¹⁾ Medical Record, 22 avril 1900.

INDICATIONS

Ces faits montrent que cette ceinture donnera ses meilleurs résultats dans l'asthénie cardiaque avec hypotension artérielle.

Sas affets sout favorables toutes les fois que le cœur faiblit: soit par neurasthénie, soit par amyosthénie, soit par neuro-amyosthénie — il est souvent difficile de discerner la cause exacte de l'insuffisance cardiaque, en dohors des lésions bien définies: — dans les arythmies passagéres ou permanentes : dans certaines tachycardies et bradycardies avec hypotension; dans les dilatations cardiaques. Encore faut-il que le myocarde demenre excitable. Et je no saurais dire si cette ceinture est applicable aux cardiopathes chez qui la compensation n'existe plus; je ne l'ai pas cesayée chez ces malades. Peut-elle étre utile aux cardiaques à hypertension? Le l'ignore. A priori, je ne le pense pas. Les réactions qu'elle provoque ne seraient peut-être pas sans danger.

Cependant Hellendal recommande son appareil: dans les accès angineux (quels angineux 3), dans l'insuffisance mitrale, dans l'hypertrophie cardiaque consécutive au roin granuleux, dans la maladie de Basedow.

Une étude plus longue est nécessaire, je pense, pour trancher toutes ces questions.

Mais on peut conseiller la ceinture aux convalescents de certainos maladies graves pendant lesquelles le cœur a été touché et la pression abaissée, commo la fièvre typhoide, la pneumonie, l'influeuza, la scarlatine, etc.

On peut aussi la recommandor aux jenues gons à cœur délicat et irritable, qui, par goût ou par obligation, se livrent à des sports fatigants ou à des exercices forcés: bioyelistes, gymnasiarques, jeunes soldats, etc. Dans ces cas-là, enstimulant le myocarde et la pression, la ceinture peut prévenir les troubles du rythme et la dilatation.

MODE D'EMPLOI

Le modèle que j'ai adopté après des tâtonnements divers, me paraît léger, commode et pratique. La ceinture, en tissu très élastique, ne gène pas le rythme respiratoire; du reste une boucle placée sur le devant de la poitrine permet de la serrer et de la desserrer à volonté. L'emploi d'un bandage à ressort, comme fait Hellendal, me semble génant; je l'ai essayé; j'ai trouvé quo cette pression forcée, constante, exercée par le ressort, ctait faitzante et rapidement intolérable.

La pelote est peu volumineuse et se dissimule aisémentsous le gilet.

Pendant les premiers jours, le port de cet appareil génera sans doute quelques malades; l'habitude viendra vite (l'habitude n'est-elle pas nécessaire pour supporter les simples breteilles ?)

Il est inutile de porter cette ceinture la nuit. Durant la journée, il est bon de ne pas la porter sans cesse. On fera bien de la quittor pendant les repas, ou de la dosserrer de façon à ce que la pression soit nulle, la tension artérielle étant généralement augmentée par les repas et pendant les premières leures de la digestion. Au repos également, elle peut être mise de côté de temps à autre. D'une façon générale, il faut l'employer seulement quand elle est utile, soit pour faciliter l'effort pendant la marche ou pour un travail queloconque, soit au repos pour stimuler le myocarde, à la façon d'un tonique cardiaoue.

J'ai remarqué d'ailleurs que si elle est portée constamment, elle ne produit plus les bons effets qu'on en obtient en la quittant à propos: la tension artérielle qui avait été augmentée baisse de nouveau et l'asthénie reparait. Cela se peut expliquer par ce principe de physiologie: que toute excitation trop prolongée améne l'épuisement, principe que toutes les médications internes ou externes confirment chaque jour. D'autre part, on a prouvé récemment (Delbet, Soc. de chirurgié) que l'augmentation de la pression s'arrête quand clicet revenuc à la normale, et que, en aucun cas, elle ne sauarit aller au delà. Jo dirai plus: si, chez un individu à vasomoteurs instables, et par un procédé quelconque (injections de sérum, toniques) on veut pousser la pression au delà de la tension normale chez cet individu, cette pression baises subitement, et elle redevient nulle à l'instant précis où clie était la plus forte et produisait une sensation subjective de bienètre. J'ai fait souvent cette observation; Chéron l'avait faite aussi.

Il no faut pas croire que l'on puisse remonter à sa guise la pression artèriole d'un unalade. Ce n'est pas en imprimant à cette tension une impulsion brusque et violente, ou moins forte et continue, que l'on obtient un résultat durable. Il faut au contraire stimuler progressivement le système nerveux et par suite le système circulatoire, en procédant par des excitations courtes et espacées, car nous n'avons aucun moyen précis de discerner l'instant où une stimulation a atteint son maximum d'effet. J'ajoute que plus le malade est affaibli, plus les stimulations doivent être faibles et lentes, sauf dans les cas de shock orêvatoire.

Cette ceinture-pelote agissant — probablement — par excitation du myocarde, il est sage d'interrompre de temps cu temps l'excitation et, par conséquent, le port de la pelote afin de ne pas dépasser la résistance du malade. Cette pratique, qui donne pour l'hydrothérapie et le massage, par exemple, d'excellents résultats, doit servir de régle pour l'emploi de cette ceinture. L'excitation de notre périphérie sensitive n'est iamais chose indifférente.

Pour eeux qui ne peuvent s'habituer à cette ceinture, j'ai fait construire une pelote simple, sans ceinture ni bretelle. Elle offre cet avantage d'être très mobile, de pouvoir être mise en place et ôtée très facilement. L'effet thérapeutique est le même, car le principe de cet appareil étant la compression de la région cardiaque, est représenté par la pelote qui en constitue la partie essentielle. Mais clle a un inconvénient: maintenue par des vétements peu serrés, elle excree une compression médiocre et parfois insuffisante.

Il appartient aux médecins de choisir l'appareil qui produit les meilleurs résultats selon la tolérance du malade. Cela est question de détail.

J'ajoute qu'il est facile de faire soi même une pelote simple et peu coûteuse avec de l'ouate, du calicot et un morceau de carton.

J'ai à peine besoin d'ajouter qu'elle n'est pas utilisable chez la femme. Si le corset n'existait pas, il serait possible de créer un modèle spécial. Mais le corset étant une partie essentielle du vétement féminin, on pourra peut-être essayer — et faire tolérer — une simple pelote d'oute au-dessous du sein. D'ailleurs le corset exerce par lai-même une pression constante qu', si elle n'est pas exagérée, me semble favorable à la circulation et à la pression artérielle.

En résumé, cet appareil — qu'il s'agisse d'une ceinture ou d'une simple pelote — diminue l'hyperesthèsie de la paroi thoracique, renforce cette même paroi, facilite l'effort, augmente la pression artérielle: il est indiqué dans tous les cas d'astrènelle. Il agit à la façon d'un tonique cardiaque, à la condition d'être employé suivant les règles que j'indique. Sans empièter sur le domaine de la thérapeutique, il est un adjuvant utile et bienfaisant. Et je pense qu'il pourra prendre place parmi les agents physiques à côté des ceintures de soutien gastrique intestinal et-rénal, dont tout le monde aujourd'hui reconnaît Putilité.

J'appelle donc l'attention des médecins sur cet appareil, ou du moins, sur le principe de cet appareil. Il peutrendre, et il a rendu, de véritables services aux malades. J'espère que des observations plus nombreuses et plus variées que les miennes permettront d'en fixer les indications et les contre-indications. En thérapeutique il n'y a pas de quantités négligeables.

M. Frakmorr. — Je me souviens qu'il y a bien des années, à la clinique du D' Le Fort, j'ai entondu ee chirurgien raconter qu'il connaissait un prêtro qui portait une ceinture thoracique, grâce à laquelle il était parvenu à diminuer l'intensité et le nombre de ses accés d'astlune.

Communications.

 Des variations de la tension capillaire sous l'influence du traitement hydrominéral.

Par le Dr Boutonwié.

(Sera publié dans le numéro du 30 mai du Bulletin de Thérapeutique).

DISCUSSION

- M. LE GENDRE. M. Bouloumié croit-il quo la minéralisation des eaux de Vittol joue un rôlo dans l'hypertonsion provoquéo par l'ingestion de grandes quantités d'eau?
- M. BOULDUMÉ. Ce n'est pas mon avis: la quantité d'eau ingéréo jous soule un vide dans la genée de cette hypertension, qui du reste fait place à de l'hypotension vors la fin de la cure. Il est vrait que tous les jours, on enregistre une courte période d'hypertension due à l'introduction dans l'organisme de grandes quantités d'eau, mais la diurèse qui s'établit bientôt fuit disparaitre cotte tension exagérée.
- M. LE GENDRE. Ne conviendrait-il pas, pour éviter à des artérioscléreux cette période d'hypertension qui ne saurait leur

étre profitable, de fractionner davantage l'administration des eaux?

M. BOULDUME. — Je ne crois pas qu'en dehors de cas exceptionnels, cette précaution soit nécessaire. D'ailleurs, les malades qui doivent boire l'eau de Vittel en abondance sont ceux qui présentent de la gravelle ; et j'ai fait ressortir dans mon mémoire que ces malades n'offrent pas d'hypretension.

M. A. Robin. — Je me suis servi souvent de l'appareil de Gartner, avec M. Binet, au cours de mes recherches concernant l'arthritisme et la tuberculose: j'en ai été fort satisfait. Je rappollerai à ce sujet un fait curieux, c'est que ce sont les diabétiques qui présentent les cas d'hypertension les plus considérables (Rà 4) e centimétres de mercure.

M. Gallois. — Le fait m'a frappé aussi, car il semble à première vue que des malades éliminant beaucoup de liquide par leur appareil rénal devraient avoir de l'hypotension.

M. Bouloumé. — Il me semble que le chiffre de 19, cité par notre président, doit impliquer un propostic graye.

M. A. Robin. - Tel n'a pas été le cas pour nos malades, car nous sommes parvenus, grâce au traitement que nous prescrivons d'habitude, à faire disparaître le tout en peu de jours, mais l'hypertension est restée la même.

M. L. Genner. — Ces faits sont une confirmation des assertions de Bouchard, qui a signalé depuis longtemps déjà cette hypertension des diabétiques. L'arthritisme se caractérisant par l'hypertension artérielle, et le diabétique représentant un arthritique type, il ne faut donc pas s'étonner de cette constatation.

Chez le tuberculeux, la tension diminue au contraire, et on est parfois appelé à observer, qu'un arthritique qui se tuberculise perd peu à peu son hypertension, à mesure que l'infection bacillaire prend le dessus.

M. Bottouxit. — L'appareil de Gartner donne la pression artério-capillaire plutôt que la pression artérielle, aussi les recherches que j'ai entreprises ne se rapportent-elles pas exactement aux faits dont on vient de parler. Il arrive même parfois que les lésions aortiques nettement perceptibles à l'auscultation ne produisent pas dans la circulation artério-capillaire l'hypertension qu'on devrait s'attendre à y rencontrer.

M. A. Robin. — M. Bouloumié a-t-il trouvé quelque différence entre l'appareil de poche de Gartner et son appareil à tube?

M. Bouloumé. — Non, j'ai souvent comparé, chez un méme malade, les résultats fournis par les deux appareils, sans trouver de différences. En tous cas, la lecture des chiffres est plus facile avec l'appareil à tube.

Des résultats de l'analyse du sue gastrique.

Par le Dr Frémont.

M. Frémont n'ayant pu remettre à temps son travail, la publication en sera faite ultérieurement, avec celle de la discussion qui a suivi sa communication.

III. — Action du simarouba.

M. Bardet. — M. Frémont, au cours de son argumentation sur la sécrétion gastrique, parlait des accidents qu'il avait constatés après l'administration à des chiens d'une infusion de simarouba. A ce propos je crois qu'il ne serait pas inutile de rectifier un point de thérapeutique qui pourrait amener de regrettables erreurs.

Il est parfaitement exact que le simarouba est un médicament irritant et copendari il est rangé par la pharmacopée a côté du quassia, comme tonique amer de l'estomac. Or, notre collégue Adrian, qui on le sait a étudié le quassia, a voulu, guidé par les traités de matière médicale qui supposent génóralement et parfois méme affirment que le principe actif de cette plante est le même que celui du quassia, chercher avoe M. Bougarel à oxtraire les corps contenus dans le simaroub. Parmi ces corps, qui ont été apportés au laboratoire de M. Pouchet pour être étudiés, il en est deux qui sont intéressants, c'est une résine et un corrs actif : la simaroubine.

La résine est tellement irritante qu'il suffit d'un grain déposé sur la peau pour produire une vésication véritable; il n'eu faut pas plus pour expliquer les accidents arrivés à notre collègne Evément avec ses animaux

Quant à la simaroubine, loin d'être analogue à la quassine, c'est une substance qui, d'après une analyse élémentaire pratiquée par M. Trillat, possède exactement la constitution de l'aspidospermino du quebracho, comme elle en présente toutes les réactions, et pour ce elimiste il y a identité entre les deux produits. La simaroubine a-t-elle également les propriétés physiologiques de l'aspidospermino? C'est co qu'il faudra démontrer et M. Joannin, qui doit étudier le corps en question, pourra nous lo dire avant peu.

Dans tous les cas, il ost bien avéré par ces faits que le simarouba est absolumont différont du quansaia auquel on l'assimile souveut; il renferme une résino irritante ot c'est un médicament qui ne doit en aucuno façon étre assimilé au quassia annara.

M. Catillon. - Je suis étonné do voir M. Bardet tirer une similitude d'indication dans la juxtaposition de médicaments dans la pharmacopée, car ou met à la suite, dans ces ourages, des corps qui n'ont aucune ressemblance d'action. Les produits de la pomme de terre s'y trouvent, par exemple, avec ceux de la belladone, tout simplement parce que toutes deux font partie de la famille des solanées.

- M. Barbet. En disant pharmacopée j'ai voulu dire traités de pharmacologie, du reste je parle uniquement de l'assimilation qu'on a faite des doux médicaments au point de vue des applications, cela seul a de l'importance, pour mettre les médecins en garde coutre des accident des médecins en garde coutre des accidents.
- M. Le Genne. Je no crois pas que l'on puisse placer aussi facilement les médicaments cités sur la méme ligne, car lo quassia est considéré comme un tonique amer et le simarouba comme un tonique astringent. Pour mon compte l'ai plus d'une fois ordonné avec avantage le simarouba contre la diarrhée, or le quessia au contraire pourra être donné pour obvier à la parésie de l'intestin.
- M. Bardet. L'observation de M. Le Gendre confirmou nottement la différonciation des deux médiciaments et prover une fois de plus que notre collègue connait parfaitement les nuances d'action des agents thérapeutiques, mais il n'en est pas de même de tous les médecins, c'est pourquoi j'ai insisté et j'insiste encore sur ce sujet parce que le plus grand nombre des ouvrages de pharmacologie considerent le quassia et le simarouba comme dos analogues, à co point que l'on peut lire que lo principe actif du simarouba est la quassine, ce qui n'est pas, comme je viens de le démontrer.
- М. А. Robin. En Cochinchine, le simarouba est employé couramment contre la dysenterie et cela indique que l'ou pratique assurément la distinction dont ne parlent pas les ouvrages signalés par M. Bardet.

M. A. Robin présente le travail suivant :

IV. — Méthode du diagnostie précoce du terrain de prédisposition à la tuberculose pulmonaire par l'étude de la température moyenne de l'homme.

Par le docteur Joseph Tètau,

Ancien interne des hôpitaux de Nantes.

Si la température moyenne de l'espèce humaine est de 37°, cette température est variable pour chaque individu et oscille suivant les gens entre 36° et 38°.

La température du corps étant en somme la manifestation physique et palpable des réactions organiques, chimiques et vitales qui se passent en nous, elle présentera des différences suivant que ces phénomènes seront blus ou moins actifs.

La température moyenne d'un individu s'obtient en prenant le main à 7 heures et le soir à 5 heures pendant dix jours environ, la température axillaire, à condition que le sujet en observation ne modifie en rien ses habitudes, ni sou genre de vie : en un mot cette température doit être prise incognito. On divise le total de toutes ces températures par la quantité de fois que l'on a mis le thermomètre, et le quotient donne le chiffre cherché.

L'ensemble des résultats que nous avons obtenus nous a ameué à considérer trois cas pouvant se présenter :

1º Celui où les combustions internes sont trop actives : température moyenne de 37º à 37º5' et au-dessus sans dépasser 38º:

 $2^{\rm o}$ Celui où elles sont normales : température moyenne de 37° à 37°5′;

3º Celui enfin où elles sont ralenties : température moyenne au-dessous de 37º.

C'est dire que, s'il existe des maladies par ralentissement

de la nutrition au-dessous de 37°, il existe une maladie inverse chez ceux qui ont au-dessus de 37°5′: c'est la consomption... S'il y a des gens qui ne brûlent pas assez, il y a des gens qui brûlent trop.

Après une longue et patiente étude, l'expérience nous a appris à reconnaître quels étaient les tempéraments qui se rangeaient dans l'une ou l'autre de ces trois classes et nous en avons tiré trois lois, à savoir:

 $1^{\rm o}$ Tout individu dont la température moyenne est supérieure à $37^{\rm o}5'$ est un prédisposé à la consomption ;

2º Tout individu dont la température moyenne est de 37º à 37°5′ estun sujet à échanges organiques normaux;

3° Tout individu dont la température moyenne est inférieure à 37° est un arthritique, herpétique ou scrofuleux.

Do l'ensemble de ces lois que claren est à même de contrivier, nous avons peusé et l'expérience nous a prouvé que nous pouvions arriver à la connaissance du terrain de prédisposition à la tuberculose pulmonaire : car les nombreuses observations, disons mieux, tous les cas que nous avons suivis, dans une clientele stable, où l'on est à même de connaitre les familles, de les voir, de les observer, nous ont montré que la prédisposition à la réceptivité de la contagion tuberculeuse et la marche de la maladio étaient en raison directe de l'élévation de la température moyenne caractérisant les échanges et les réactions organiques.

Et d'abord, il faut s'entendre et ne pas faire du mot phtisie le synonyme de tuberculose pulmonaire.

La phtisie est une consomption, dit Hippocrate, et, sans remonter si loin, il n'y a que peu de temps (mars 1901), Albert Robin, dans une étude magistrale, montrait la constance de l'élévation des échanges respiratores dans toutes les périodes de la tuberculose, en même temps qu'il y avait une déminéralisation intense. Or, ce phénomène existe avant l'invassion du bacille; c'est dire en somme, que l'individu atteint de ces troubles organiques, caractérisés par

une température de 37°5 et au-dessus est phtisique, avant d'être tuberculeux.

Nous devons considérer dans la maladie de poitrine. deux éléments distincts : 1º un bacille qui crée la tuberculose pulmonaire; 2º un terrain qui engendre la phtisie : éléments, se rencontrant, la plupart du temps ensemble, mais pouvant cependant exister indépendamment l'un de l'autre.-Distinction subtile, dira-t-on? C'est vrai, mais d'une importance considérable au point de vue du pronostic à porter sur la marche de la tuberculose pulmonaire. - Distinction vraie : car si l'on voit des tuberculeux pulmonaires qui ne sont pas phtisiques, c'est-à-dire qui ne présentent pas de phénomènes de consomption, il existe aussi des phtisies au début qui ne sont pas encore tuberculeuses, et nous avons observé au moins trois cas de ce genre chez des jeunes gens de 14 à 17 ans, avant présenté pendant 5 ou 6 mois, une température de 37%, sans présenter aucun signe de tuberculose pulmonaire, ni toux, ni expectoration. Or, nous devous admettre ceci : « un malade qui ne tousse pas n'est pas un tuberculeux pulmonaire (Lasèque) », « C'est une loi presque absolue (Marfan) », -Traité de Médecine Charcot, Bouchard, article: Phtisie symptomes .- Eh bien, dans les trois cas que nous signalons, deux sont devenus tuberculeux (phtisie aigaē) vers le 10° mois, le troisième a guéri sans présenter autre chose qu'une diminution dans l'élévation de la température moyenne qui est descendue à 37°3.

N'enlevons pas au microbe le rôle indiscutable qu'il joue dans la tuberculose pulmonaire, mais reconnaissons au terrain celui qu'il joue, tant pour la réceptivité que pour la marche de la maladie.

Sur les nombreuses personnes de tout âge et de tout sexe, que nous avons soumises à nos examens, nous avons remarqué que celles qui contractaient la phisisé pulmonaire étaient celles qui, dans leur état de santé habituelle, avaient une température moyenne supérieure à 375. Cette règle est tellement vraie que nous ne craignons pas de dire que les 4/5 de celles que nous avons examinées dans ees conditions, avant les signes de tubereulose pulmonaire, ont eontracté cette maladie dans un délai variant de un à deux ans. Pour celles dont la température moyenne est inférieure à 37%, la prédisposition à la réceptivité est d'autant plus grande que leur température s'en rapproche davantage.

Cette connaissance intime de soi-même faeile à avoir avec le thermomètre, est d'une importance capitale au point de vue de la thérapeutique à appliquer.

La tubereulose, maladie spécifique estavant tout une maladie parasitaire plutôt que mierobienne; et quand nous disons parasitaire, nous entendons une maladie à évolution généralement lente, chronique dans sa marche, variable dans ses allures suivant l'endroit où olle se développe; tandis qu'une affection mierobienne est une affection aigué, à marche rapide et eyelique, à terminaison prompte : e'est l'orage qui passe.

Nous ne pouvons pas considérer la tuberculose comme une maladie microbienne, dans le sens que l'on s'accorde à donner à ce mot. La médecine est une science exacte (Lanceraux), et les mêmes causes dans les mémes conditions doivent toujours produire les mêmes effets. Or, dans la tuberculose que voyons-nous? Des effets variés et variables suivant les gens. Tel individu a une tuberculose osseuse (earie) articulaire (tumeur blanche), viscéralo (péritonite tuberculoses), ganglionnaire (humeurs froides), de la peau (lupus), etc., cnifa, pulmonaire, et là, nous voyons les uns emportés dans l'espace de 6 à 10 jours par une phitsie suraigné, d'autres, vivant un mois, six mois, un an; d'autres se conservant avec leur mal pulmonaire 5, 10, 20 ans et n'en finissant pas de mourir; d'autres onfin, guérissant à l'eneontro de toutes les prévisions.

Une telle maladie ne peut pas, ne doit pas être rangée dans la classe des maladies microbiennes ordinaires. Une inconnue existait pour expliquer ces incoliérences : cette inconnue c'était la connaissance du terrain.

Or, si l'on se reporte aux trois lois des températures que nous avons signalées, nous y trouvons l'explication simple et naturelle de tous ces cas à prime abord si différents.

Le germe parasitaire évolue différenment suivant le terrain sur lequel il se dépose. Il se développe d'autant plus vite et facilement que le patient présentera des combustions organiques plus vives; il agit, en somme, en activant cette déchéance naturelle de l'organisme humait

De là cette fréquence de l'invasion tuberculeuse à l'âge de la puberté, dans l'adolescence et la jeunesse, à ce moment où les fonctions de la vie sont le plus actives, à cette époque de la vie où chacun fait pour ainsi dire comme un pas en avant pour passer dans la classe des températures où son hérédité et son tempéramment auraient dù le faire classer.

De là les phisies aiguës chez les individus à température moyenne supérieure à 37-5, de la cette phisié iente ou plutôt cette simple tuberculose pulmonaire à forme fibreuse, chez les gens à température inférieure à 37-; cette tuberculose des rachitiques et des scrofuleux qui laisse les malades résister si longtemps, tant que leur température se maintient dans la rètele de la loi dont le tempérament fait partie.

De la les températures élevées que présentent les phtisies aigués, chez lesquelles les réactions organiques sont poussées au maximum, car cette flèvre de la phitsie n'est pas due, au moins dans sa totalité, à l'action du microbe, mais elle est un phénomène vital, une réaction spéciale du terrain, la preuve : c'est qu'il existe d'autres tuberculoses pulmonaires où la maiadie évolue sans flèvre appréciable. Inutile de chercher la diffèrence dans le plus ou moins d'activité du germe. Le germe est le même, la réaction du terrain seule est différente.

De là la raison pour laquelle les phtisiques sont si sensibles à l'action du froid et des rigueurs de l'hiver, c'est que pour que lours réactions organiques s'accommodent à une diminution de la température ambiante, ils sont obligés de brûler davantage emportés qu'ils sont par la suractivité de leurs échanges intimes: c'est pourquoi ils meurent l'hiver aux golées blanches.

De là l'explication de ces phénomènes bizarres. Ne voit-on nas, autant en ville qu'à la campagne, de ces phtisies à marche lente chez des individus vivant dans les conditions hygieniques les plus mauvaises, dans un taudis sans air, où le soleil ne pénètre que par l'étroite ouverture d'une fenêtre presque constamment fermée. Le malheureux est là avec son mal, respirant un air méphitique au milieu de la décomposition de ses crachats, résistant des mois, des années, attendant en vain une mort qui se fait continuellement attendre : c'est que dans cette retraite, il diminue lui-même l'activité de ses combustions trop vives, il économise ses réserves. Cependant que dans la classe riche on voit de ces phisiques qui, malgré tous les soins, tout le confort hygiénique possible, tous les traitoments plus ou moins bizarres auxquels on les soumet, meurent en moins de temps que les autres. Soyons francs! N'est-ce pas cette vue qui a rendu tant de médecins sceptiques, qui a fait naître cette théorie de ne rieu faire quand on se trouve en présence d'un phtisique, qui, décourage, dis-ie, le médecin encore plus que le malade ?

Les considérations que nous venons de faire sont capitales pour établir un traitement rationnel, il est vrai, encore ignoré. Mais si l'on se reporte aux trois lois ci-dessus, nous voyons déjà que le traitement sera variable.

Le traitement de la tuberculose no pent pas être un : c'est un traitement éclectique suivant les individus et suivant le terrain. Tous les traités de médecine classique signalent des cas oû les remédes les plus contraires ont produit des guérisons : c'est que pout-être, sans le savoir, le terrain, le germe et le reméde étaient faits l'un pour l'autre : mais, daus le cas contraire, on c'est pas le reméde qu'il fant accuser d'inaction, mais nous-mêmes qui n'avions pas roconnu le terrain qui convenait.

Or, ce terrain facile à connaître en ville, en employant le procédé de M. le professeur Albert Robin, nous rusterat-il donc inconnu à nous, médents de la campagne, exerçant loin des grands centres et des laboratoires ? Non, si l'on a soin de soumettre ceux que l'on observe à la connaissance de leur température movenne.

Co procédé, n'est-co donc riou? Que do fois ne vient-on pas nous consulter en disant: Mon enfant grandit et fatigue, il est pale, anemique, essouillé: ne craignez-vous pas, docteur, que ça lui tombe sur la poitrine? Et le docteur ausculte, palpe, percute, ne trouve rien et donne une parole rasurante... quand six mois plus tard se déclaro une tuberculoss nulmonaire à marche rapide:

Eh bien! c'est presque infaillible : prenez sa température moyenne, si elle est inférieure à 37° soyez sans crainte, c'est une anémie de croissance par défaut de réactions organiques; si elle est de 37° à 376 soyez prudents et observez quelques semaines; mais si cette température est supérieure à 37°6, c'est une anémie par combustions trop vives et échapses organiques exagérées et le pauvre enfant est déjà phisique en attendant que le germe de la tuberculose vienne donner le dérnier coup pour l'abattre; à moins, j'en ai l'espérance, que l'on découvre bientôt un reméde capable de ramenca la normale ces combustions organiques trop vives que le système nerezeux n'est plus à même do dirice.

Par co procédé si simple, si pratique, à la portée de tout le monde, chacun, connaissant sa vic organique dans son ensemble, sora à même de se prémuuir contre l'invasion d'un germe qui, une fois installé, ne cherche nullement à disparaites

Discussion.

M. BARDET. — Je crois qu'avant d'accepter les lois formulées par M. Tétau il est nécessaire do vérifier soigneusement sos expériences. Pour apprécier des fractions de degré centigrade, il faut d'abord des instruments justes et vérifiés souvent, et, d'autre part, il est expressément nécessaire de prendre la température rectale, attendu que la température axillaire ne peut fournir d'indicatons suffisamment stres. C'est donc avec une grande réserve que je crois devoir accepter les résultats de notre confrère, résultats qui sont des vues de l'esprit assurément intéressantes et ingénieuses mais très sujettes à discussion.

M. Le Gender. — Je crois aussi, de mon côté, devoir faire toutes réserves au sujet d'une des phrases citées par M. Tétau, et prise dans Laségue: « Un malade qui ne tousse pas n'est pas un tuberculeux pulmonaire. » Il peut, chez ce malade, exister de la tuberculose des ganglions péribronchiques; cette tuberculose peut provoquer de l'hyperthermie, et un sujet de ce genre ne doit déjà plus étre considéré comme un présipose, bien qu'il ne tousse pas eucore. En outre, je vois que M. Tétau a rangé parmi les hypothermiques les candidats à la scrofule c, on sait aujourd'uni que la scrofule est une tuberculose; il est donc difficile de concevoir que l'hyperthermie prédispose à la tuberculose pulmonaire, l'hypothermie à la scrofulos da scrofulos de la scroful

M. Aldert Roux. — Dans les recherches entreprises par Blinet et moi sur l'état des éclanges respiratoires dans la phtisie pulmonaire, nous avons constaté une anomalie apparente analogue: les éclanges respiratoires, augmentés clicz le phtisique, sont diminuée clicz le serofuleux.

M. Tétau aura du reste l'occasion de lire dans nos comptes rendus les objections qui lui ont été faites, et y répondra sans doute.

Étaient présents à la séance :

Titulaires: MM. Balzer, Bardet, Baudouin, Bocquillon, Brun, Burlureaux, Catillon, Champigny, Courtade, Crinon, Dalche, de Molènes, Duchesne, Dupont, Frémont, Gallois, Hirtz, Joanin, Le Gendre, Lépinois, Mathieu, Muselier, Patein, Pouchet, Riche, Albert Robin, Soupault, Vogt, Yvon.

Correspondants: MM. Brocchi, Bouloumié, Dubousquet-Laborderie, Rodet, Vidal.

La séance est levée à 6 heures.

Le secrétaire de service, Vogr.

REVUE DES TRAVAUX FRANÇAIS ET ETRANGERS

Maladies du système nerveux.

Sur la valeur alimentaire des matières albuminoïdes administrées par la voie sous-cutance (Soc. de biologie, avril 1900). - M. E. Laborde (de Toulouse). J'ai constaté que les injections hypodermiques de ces substances sous différents états moléculaires (albumines du blanc d'œuf, caséine, globuline, albumoses ot peptones) sont toujours suivies de lésions du rein; que les albumines du blanc d'œuf et la caséine sont mieux telérées par le lapin que la globine, les albumoses et les peptones; que, sous leur influence, l'élimination de l'azote, du soufro et du phosphoro urinaires augmonte, puis décroit généralement vingt-quatre heures environ avant la mort de l'animal. J'admets que ces injections produisent la destruction de l'albumine fixe, et que c'est à cette dernière cause qu'il faut attribuer l'augmentation dans l'élimination de l'azote urinaire. Je conclus que ces substances ne paraissent pas devoir réparer les pertes de l'organisme, et par suite ne sont pas susceptibles d'applications thérapeutiques.

L'Administrateur-Gérant: O. DOIN.

Imp. PAUL DUPONT, 4, rue du Bouloi, - Paris, 1er Arri, - 70.5.1901 (Cl.)



Changement de tenue du corps de santé militaire. -Hônital pour oiseaux. - La sérothérapie antidiphtérique. - La vente du lait à New-York. - Grève de médecins à Leipzig. - La revaccination des étudiants en médecine. - Abus de pouvoir. - Fracture comminutive de l'humérus traitée par la conservation.

On annonce qu'un changement de tenue va être bientôt prescrit pour les médecins militaires. Lo dolman sera remplacé par la tunique, comme la tunique fut remplacée par le dolman. Cette mesure sera diversement appréciée. Ils seront nombreux toutefois ceux qui regretteront les poches dont est doté le vétement actuel alors que la tunique en est totalement dépourvue.

Les hôpitaux ne sont pas faits pour les chiens, dit-on quelquefois; eli bien, voilà qui consacre une grande erreur. Les chiens ont leurs hôpitaux, même les oiseaux. Il existe à Londres en effet un hôpital fondé par lo Dr Vall pour la gent ailée, Cet hôpital comprend plusieurs bâtiments. Dans le premier se trouvo la salle de consultation, la pharmacie, le laboratoire où l'un des plus habiles pharmaciens anglais ne s'occupe que des médicaments nécessaires à l'hôpital, A côté de cette salle est celle des opérations ou M. Vall remet les ailes et les pattes cassées au moyen de certains appareils qui forcont la bête à rester complètement immobile, Souvent clicz les oiseaux comme clicz les autres animaux, une opération détermine la fièvre et alors comme l'oiseau refuse toute 48

TOME CXXXXI. 20° LIVE.

nourriture, les infirmiers s'ingénient à lui faire avaler des aliments par force.

Un autre bâtiment abrite les malades : pigeous, perroquets, oiseaux vares... Chaque matin les cages sont uettoyées et désinfectées. Une chambre à part est réservée aux maladics contagieuses. L'hôpital est toujours plein. Tous les jours, les propriétaires des oiseaux reçoivent un bulletin qui leur fait connaîtur l'état des malades.

Combien de pauvres gens voudraient avoir une modique partie des soins que l'on donne à ces heureux oiseaux!

. .

La simple comparaison entre la mortalité movenne des cinq dernières années et celles des années qui ont immédiatement précèdé la sérothérapie anti-diphtérique met en parfaite évidence le nombre de vies qui ont été épargnées grâce au nouveau traitement

De 1890 à 1891, il y a eu à Paris, chaque année, une moyonne de 1.432 décès causés par la diphtérie. En 1891 où la sérothérapie est employée particillement, la mortalité n'est plus que de 1.808 décès. Pour les années suivantes on trouve : 427 décès en 1895; 536 en 1895; 333 en 1899. Ce qui donne une mortalité annuelle moyenne de 351 décès ; la diffèrence entre 1.432 et 351 donne le gain dû à la sérothérapie.

. .

La quantité quotidienne de lait vendu daus la ville de New-York est de 1,221,2000 litres, Il frat y ajouter 20,000 litres de crème et 10,000 litres de lait condensé. Pour la surveillance et le contrôle la ville est divisé en districts, dent chacun est à la clarge d'un inspecteur. L'inspection est faite à l'arrivée des trains. Les wagons destinés au transport du lait étant spécialement amengés à cet effet et munis d'appareils de réfrégération on de chauffage pour prévenir le surissement en été et la congéclaion en hiver, et le transport se faisant à grande BULLETIN 753

vitesse, le lait arrive en général dans de bonnes conditions, même des régions les plus éloignées. A New-York nul n'est autorisé à vendre ou à distribuer du lait sans permis du bureau sanitaire.

* *

Les mèdecias de Leipzig viennent de se mettre en grève. Ils se plaignent que leurs honoraires se trouvent considérablement réduits par la création des krakenkussen (ou caisses de malades). Cette innovation a en effet réduit le prix de revient de leurs visites à sept pfennings on environ deux sous. Ils trouvent avec raison que c'est trop peu. Les malades ne pourront lutre à armes égales car il su e penseront pas à se mettre en grève à leur tour, ce qui serait le bon moyen. Les pharmaciens, dit-on, cherefhent un tervain d'entente.

*

Que signifie ce discrédit que l'on jette sur le médecin praticien? Croît-on que si on lui fournit du vaccin de l'Institut de la rue Ballu ou de l'Academic de Médecine, il n'est pas capable de faire une bonne inoculation? Alors pourquoi ne pas abroger cette incompréhensible circulaire du 31 janvieri 1891 derrière laquelle s'abrite le secrétairat de la Faculté pour considèrer comme dénués de valeur les certificats de revaccination établis par un praticien étranger à l'un ou à l'autre des deux établissements précités?

M. Jamin, président du syndieat des médeeins de la Seine, s'est adressé à M. le ministre de l'Instruction publique pour lui demander de faire cesser est état de choses.

Celui-ei vient de l'informer qu'il ne peut que maintenir la circulaire incriminée, mais que, pour certains cas, dans lesquels une interprétation littérale du règlement semble excessive, le doyen de la Faculté de médecine resterait juge de la question.

* "

Un conseil municipal de Corse avait eu l'étrange idée d'allouer à un médeein un traitement annuel à charge de soiguer tous les contribuables. Nombre de ces derniers qui n'avaient pas été commités protestérent et surtout doux mêdecins do la localité que ce nouveau privilége condaminit à mouiré de faim : le conseil d'Etat a annulé l'arrêté préfecterul approuvant la plus singulière des délibérations nunicipales.

* *

Une balle Lebel avait déterminé chez un soldat une fracture comminutive de l'humérns au tiers inférieur, déchiré les artères humérale et radiale et produit un éclatement de l'avant-bras. L'amputation du membre semblait tout indiquée a priori, M. Delorme so contenta cependant d'enloyer les esquilles libres, et après un pausement minutienx, immobilisa le membre dans un appareil. La fracture se consolida rapidement comme s'il s'était agi d'une fracture simple. Quant à la plaie de l'avant-bras, elle suppura abondamment; une partie des tissus so sphacéla. Pour combler la vaste brêche qui en résulta on eut recours à un rapprochement progressif des bords de cette brèche à l'aide de fils en anso placés ot serrés do plus en plus près de l'axe du membre. Et M. Delorme qui présente à la Société de chirurgie son malade montre que le résultat définitif est excellent et que cet homme, outre qu'il a échappé à l'amputation, possède un membre qui jouit de tous ses mouvements et qui lui permettra de roprendre une vie active.

HYDROLOGIE

Les stations hydro-minérales françaises et leur avenir par le D' Maurice Bixer.

chef du laboratoire municipal de thérapeutique à la Pitié, médecin à Saint-Honoré,

La France possède une richesse incomparable en Eaux minérales qui forment une gamme complète des sources employées en thérapeutique. Dans aucun pays du monde il n'existe des Eanx anssi abondantes, aussi variées, aussi efficaces.

Or. les Sources thermo-minérales ne sont pas seulement une ressource des plus précienses pour les malades. elles sont encore pour le pays, un élément de richesse, ear elles atttirent un grand nombre de baignenrs dont une partie importante vient de l'étranger. L'argent qu'ils y dépensent profite à toutes les branches de l'industrie et de la production nationales. Les chemins de fer et autres movens de transport, les propriétaires d'hôtels et de maisons, les établissements thermanx, les médecins, les agriculteurs qui vendent leurs produits alimentaires, etc., en sont les bénéficiaires. Cette manne se répand non seulement dans la localité, mais encore dans la contrée voisine dont les produits affluent dans la ville d'Eaux pour la nourriture, l'entretien, les plaisirs des baigneurs. Comme les stations sont souvent situées dans des pays pauvres, arides, déshérités de la nature, les habitants vivent presque exclusivement avec l'argent que les étrangers leur rapportent.

Ce bienfait s'étend au loin sur les départements voisins et même sur le pays tout eutier. En effet, un étranger venu en France pour se traiter aux Eaux, visite les principales villes; il dépense beaucoup en acquisitions de toute espèce, tenté par le goût et la qualité de nos créstions.

Il est difficile d'évaluer l'argent qui reste en Fiance de ce fait, mais c'est par centaines de millions qu'il faut le compter.

L'industrie thermale est donc loin d'être une quantité négligeable. Elle mérite, au contraire, de fixer notre attention et ne doit être indifférente à personne. Voyons donc quelle est sa situation à l'heure actuelle et demandons-nous s'îl n'y a pas quelque chose à faire pour résister à l'accaparement envahissant de nos voisins de l'Est.

En 1882, il y avait en France 1,027 sources exploitées, en 1898, 1,291. Actuellement nous possédons 349 établissements dont 294 comprennent des installations balnéaires, à savoir 6,155 baignoires et 388 piscines, saus varier des anoarciis à douches.

Ces établissements ont été visités, en 1891, par 290,000 malades, et en 1898, par 372,000. L'accroissement a donc été de 82,000, soit 28 0/0, près de 1/3.

En 1891, il avait été expédié des sources, 53 millions de bouteilles; en 1898, 70 millions : augmentation de 17 millions, soit 32 0/0. Sur ce nombre près de 14 millions ont été exportées pendant que nous importions 3 millions et demi d'Esny étrangères.

Ces chiffres ne comprennent pas ceux de l'Algérie où il v a 22 établissements thermaux.

En somme, dans ces dernières années, l'industrie thermo-minérale a progressé d'environ un tiers.

Devons-nous nous déclarer satisfaits de cerésultat? Non, car si nous jetons un coup d'œil sur les stations austro-allemandes nous voyons qu'elles ont acquis dans le même temps une énorme prospérité en faisant des progrès beaucoup plus grands que les nôtres.

Voici, en effet, quelques chiffres de l'augmentation accomplie en dix ans (1885 à 1895).

Autriche-Hongrie :

70 57 53	Gastein Voolsu Bad Gleichenberg	39 48
	70 57 53	91 0/0 Gastein

Allemagne:

Nanheim Wiesbaden		Kissingen	
----------------------	--	-----------	--

Soit une augmentation moyenne de 41 0/0.

On voit donc que l'accroissement de la clientèle des stations thermales a été bien plus accentué dans les pays de langue allemande qu'en France.

Or, c'est l'inverse qui aurait dû se produire, car nous possédons des Eaux infiniment plus variées, et mieux minéralisées et plus actives que les Allemands.

Avant de rechercher les raisons des succès de ces deruiers, il est important de noter que l'Allemagne et l'Autriche possòdent pou de bains de mer, que la population y a pris l'habitude d'aller en villégiature dans les villes d'Eaux, ce qui augmente beaucoup la population de ces demières, taudis qu'on France, les stations maritimes sont nombreuses et très fréquentées. Cela rétablit un peu l'équilibre. Maltrié cela nous ne pouvons nous déclarer satisfaits

et nous devons engager la lutte pour rétablir la suprématie à laquelle nous donne droit notre incontestable supériorité. Noblesse oblige.

Si nous voulons faire les efforts nécessaires, l'issue n'est pas douteuse. Nous vaincrons.

Les raisons du développement des stations allemandes peuvent se résumer ainsi :

1º Elles ont perfectionné tout ce qui a trait à la cure, au bien-être et à l'agrément des malades donnant un grand luxe à certaines installations.

2º Elles ont su faire valoir et prévaloir auprès du public national et étranger leurs qualités viaies ou fictives. Sont-elles done supérieures aux stations fiançaises? Non, car, parmi nos villes d'Eaux, les principales peuvent rivaliser comme attractions, luxe et confort avec les meilleures d'entre elles, et, au point de vue de l'emploi thérapeutique nos sources sont, en général, bien outillées. Notre tort, ecpendant, a été de nous borner souvent à l'utile.

Les stations germaniques sont loin, d'ailleurs, d'être toutes des modièce et le D' Warda, de Blankenburg, se plaignait au mois d'octobre dernier à l'assemblée de la Société balnéaire de Thuringe, que dans toutes les villes d'Eaux le sol n'était pas assaini, et qu'il n'y avait pas uartout d'égouts. Il signalait les dangers des ruisseaux géeouverts, de l'agglomération d'immondiecs, d'amas de fumier, etc.

Néanmoins ce serait un tort de s'arrêter à ces critiques. Nous devons regarder notre ennemi en face, le juger à sa valeur, et chercher à le vaincre en imitant et en perfectionnant ses moyens d'action.

La prospérité des Eaux françaises est entre nos mains, mais il faut pour l'accroître que ehacun s'y intéresse et y contribue.

1º Il faut que le publie ne refuse pas aux stations minérales l'argent nécessaire pour eréer les améliorations utiles, indispensables à leur développement.

Il faut qu'il sache qu'en aucun cas il n'a besoin de recourir aux Eaux allemandes, car toutes elles ont, en France, des similaires.

Exemple :

Royat est l'équivalent d'Ems ; Saint-Nectaire, de Wiesbaden ; Néris, de Schlangenbad; Bourbon-Lancy, de Nauheim;

Vichy, de Carlsbad;

Brides, de Marienbad;

Forges-les-Eaux et Bussang, de Schwalbach ; Châtel-Guyon, de Kissingen ;

Santenay, de Hombourg;

Lamalou, de Wildbad, etc.

Il faut qu'on se répète qu'il n'y a pas en Allemagne d'Eaux sulfureuses comparables au groupe des Pyrénées, d'Eaux arsénicales comme la Bourboule, le Mont-Dore, Saint-Honoré, des boues naturelles comme Barbotan, Dax, Saint-Amand auxquelles ne peuvent être opposées que des boues cultivées, etc. Il faut empêcher la clientèle des Eaux allemandes au détriment de celles de France et de son propre intérêt (1). Il faut aussi que le publie s'habitne à ne pas boire d'Baux étrangères. La plupart de celles qui sont importées sont des Eaux purgatives, mais n'avons-nous pas Montmirail qui les vaut toutes?

2º Les villes d'Eaux doivent faire un effort pour ame liorer leurs installations sanitaires, hygiéniques; pour retér; si elles n'en possèdent pas, des jardius, des parcs, des lieux de promenade dans les plus beaux sites, avec des chemins propres, sablés, avec des chalets de iendezvous, des abris couverts pour le mauvais temps, des lieux de réunions, de couversation, de lecture. Tout le

⁽¹⁾ Importance de la clientèle étrangère dans les villes d'eaux allemandes :

Porportion des baigneurs étrangers à Carlsbad, 63 0/0.

Ems. 30 0/0.

pays doit être aménagé pour la satisfaction des baignenrs, dont le nombre s'accroîtra avec le plaisir qui lour sera procuré.

Quant aux jeux, nons n'en sommes pas partisan. Ils sont pernicieux pour les stations, font fuir les familles et les remplacent par une clientèle de casino qui s'éloigne elle-même de la station quand la station décline. A noter que la prospérité des eaux allemandes a coïncidé avec la suppression des jeux en 1872. (Nauheim a crû de 16 00 2 Wiesbaden de 59 000.)

La contune, trop répandue d'affermer pour de longues années les thermes à des compagnies fermières est exclusive d'une amélioration régulière. Les compagnies ne s'engagent que pour des travaux déterminés d'avance; cenx-ci exécutés, on n'a plus rien à en exiger. Dès lors, les stations concédées ne peuvent plus se modifier lors-qu'il le faut. Les compagnies fermières n'entendent pas être dérangées dans leur jouissance. Si l'on veut absolument sortir de l'immobilité, faire quelque chose, if faut les dédommager et souvent elles n'accepteraient d'autre indemnité que la prolongation de leur concession.

Les bénéfices des sociétés exploitant les établissements thermaux sont versés aux actionnaires (1); ne scrait-il pas utile que ces bénéfices fussent consacrés en partie au perfectionnement et à l'aménagement de la station et non distribués intégralement aux actionnaires

⁽¹⁾ Dans les dix dernières années, les actionnaires de la compagnie de Vichy, constituée au capital de quatre millions, ont partagé un dividende de plus de vingt-deux millions de francs.

⁽Rapport de M. Lasserre, au nom de la Commission du budget; séance du 3 avril 1897.)

qui regrettent ensuite leur imprévoyance quand la clientèle baisse.

Il faut que les habitants des villes d'Eaux, les premiers intéressés à leur prospérité, consacrent tons leurs efforts an bien-être et an plaisir de l'étranger, qu'ils le reçoivent avec aménité, le guident dans son installation, ses distractions, qu'ils le séduisent et lui fassent aimer le pays.

3° 11 faut que ces efforts des particuliers soient seeondés par les pouvoirs publies.

Par les municipalités des hydropoles : par la création d'égouts, d'ombrages, de chemins bien entretenus, l'installation d'un bon éclairage, d'une sévère police sanitaire, par l'amélioration des services postaux, téléphoniques, ete.

Par les conseils généraux : par l'amélioration des moyens de communication, etc.

Par le gouvernement : par sa pression sur les compaguies des chemius de fer, par la création d'une chaire d'hydrologie dans les principales facultés de médecine, d'un eonseil supérieur des Eaux minérales, d'une surveillance effective de l'exploitation des stations.

Par le Parlement : par l'antorisation de percevoir une curc-tarc, c'est-à-dire un droit minime qu'on impose en Allemagne à tous ceux qui viennent jouir des avantages, du luxe, des installations d'une station thermale. C'est avec les ressources de la curc-taxe que les perfectionnements ont pu être introduits dans les villes d'Eaux allemandes.

Le Parlement devra aussi assurer par une loi la sécurité de l'exploitation des sources, de façon que le premier venu trouvant une source dans son champ près d'une station, ne puisse venir partager les profits acquis par de longs efforts.

Tous ces efforts combinés porteraient rapidement leurs fruits.

GYNÉCOLOGIE

Traitement médical de la Congestion Utérine (1),

par M. Paul Dalché, médecin de l'hôpital Tenon.

Ι

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

La congestion utérine après avoir absorbé une trop grande part de la pathologie utérine à l'époque des catarrhes, des celèmes, des engorgements de la matrice, a pour ainsi dire été baunie de la gynécologie si bien que dans plusieurs traités modernes c'est à peine si nous voyons eiter son nom. Dans un joli chapitre, mon collègue et ami Armand Siredey en a décrit « la grandeur et la décadence. »

La congestion utérine ne mérite pas un oubli aussi injuste; elle doit reprendre sa place dans le cadre nosogrà-

⁽¹⁾ Cet article est tiré des bonnes feuilles de la deuxième édition, en préparation, de la Gynécologie médicale, par Albert Robin et Paul Dalché.

phique, et, pour nous, elle donne des indications de traitement soit qu'elle se manifeste à l'état isolé, soit qu'elle vienne compliquer une affection récente ou ancienne de l'appareil génital.

Ces indications de traitement nous les trouvons dans la nature de la congestion utérine suivant que nous avons is osigner une fluxion vive et mobile mais douloureuse ou accempagnée de phénomènes inquiétants, ou au contraire une congestion à marche plus lente, presque chronique, suivant qu'elle est active ou passive, qu'elle est primitive ou secondaire à une lésion utéro-annexielle. Nous les trouvons eucore dans la prédominance de tel ou tel symptôme, dans l'étude des causes et jusque dans l'âge de la malade, la puberté, la ménopause impriment aux accidents une allure assez spéciale pour nécessiter des soins tout particuliers.

Laissez-moi emprunter à Courty un exemple de ces diverses indications dont nous aurons à tenir compte plus loin. Cet auteur, qui distingue avec beaucoup de sagacité « l'hypérémic passagère, réplétion plus ou moins brusque du système vasculaire, ct souvent déplétion aussi brusque, » e'est-à-dire la fluxion de la congestion « plénitude du système sanguin avec distension lente et continue des vaisscaux », fait remarquer que « les sangsues sur le eol provoquent la fluxion, tandis qu'elles dissipent la congestion ». Il y a là une distinction qui n'est pas aussi spécieuse qu'elle le paraît. Les émissions sanquines, nous le verrons, font merveille bien souvent, mais nous ne saurions les prescrire indifféremment et pour ainsi dire d'une façon systématique dans tous les eas, et les applications de sangsucs notamment sur le col de la matrice, à cause de leur trop petit nombre, ou bien à cause de la nature de la maladie; sont susceptibles d'exagérer certains mouvements fluxionnaires.

Nous n'avons pas à nous occuper ici de la séméiologie, je dois toutefois vons signaler très brièvement les symptômes principanx dont nons tirons les indications thérapentiones.

La doulcur est des plus variables : tantót simple sensation de plénitude pelvienne, de pesanteur périnéale et lombaire, parfois elle preud le caractère de coliques utérines pénibles, s'accompagnant de besoins répétés de miction et de défectation, et elle arrive même à la souffrance continue, gravative, pulsative que les malades nous supplient de calmer. Elle se complique encore de névralgies ifoe-lombaires et pelviennes, et chez les neuro-arthritiques (Richelot) la congestion chronique fait un gros utérns névralgique dont la sensibilité toujours vive s'accroît à chaque époque menstruelle.

Parmi les troubles de la menstruation, très fréquentes sont les ménorrhagies, règles profuses, d'une importance tont à fait inaccoutamée, ou simple éconlement qui traîne des jours et des jours, mais peu considérable, et même souvent peu coloré. Ne considéres pas l'aménorrhée congestive comme une rarréé, vous en rencontrerez des exemples au cours de toutes les différentes congestions : la poussée fluxionnaire n'implique pas fatalement l'issue du sang. Quant à la dysménorrhée je ne reviendatai pas sur ce que je vous eu ai dit à propos de son traitement.

Quand les menstrnes sont terminées, dans les périodes intercalaires, la congestion se traduit encore par des crises leucorrhéiques, pertes blanches filantes, peu épaisses, par des métrorrhagies dont l'abondance et la répétition nécessitent d'autant plus nos soins au'à la longue elles finissent par se confondre avec les règles, et que souvent, peut-être, on les a confondues avec les bémorrhagies d'une métrite.

L'état de l'utérus et en particulier du col nous aidera à éviter cette erreur, j'en reparlerai plus loin. Ici contentons-nous de trouver des signes de congestion, en dehors de la métrite, dans la tuméfactrion de l'organe, l'apparence rouge foncée du col sur lequel apparaissent des varicosités capillaires et qui saigne au moindre contact; plus tard l'augmentation considérable du volume du col, l'induration des tissus, nous apprennent qu'à la congestion chronique a succédé un certain degré de seléros-

TT

TRAITEMENT DE LA CONGESTION D'ORIGINE MENSTRUELLE

Prenons deux exemples tout à fait opposés : d'une part, la congestion qui suit une aménorrhée accidentelle, de l'autre, celle qui se traduit par une poussée menstruelle d'une violence tout à fait exceptionnelle.

AMÉNORRHÉE ACCIDENTELLE

Les règles, au moment où elles allaient s'établir ou au beau mineu de lenr flux, sont brusquement supprimées par une cause subite, froid, émotion vive, chute, etc.; il en résulte de nombreux accidents dont nous avons étudié le traitement au chapitre de la Médication emménagogue.

Mais parmi les accidents, le plus inévitable, le plus immédiat est la congestion utérine qui éclate aussitôt que les règles sont arrêtées, et c'est la seule des complications de l'aménorrhée accidentelle que nous envisageons ici, nous rapportant pour les autres indications thérapeutiques à ce que nous avons dit en d'autres endroits de ce livre.

La congestion se présente si nette, si indiscutable et si vive, que c'est elle que Bennett et Peter prennent comme type de la congestion utéro-ovarienne.

La malado sera mise au repos absolu, elle gardera le lit, toute futigue même légère devient susceptible de favoriser des troubles beaucoup plus graves de métrite, de salpingo-ovarite, péri-métro-salpingite, etc. On lui placera sur le bas ventre un large estoplasme laudanisé peu épais et peu lourd, et si elle se plaint de coliques utérines, survenant par crises, on pourra remplacer le cataplasme par une anction avec la pommude suivante :

que l'on recouvrira d'ouate et de flanelle.

Preserivez en même temps de longues injections émollientes opiacées ou bien narcotiques qu'il n'est pas nécessaire d'administrer très chaudes ; ne dépassez pas 38-40°, je me convaine tous les jours que nous avons trop négligé ou aéconul es effets de l'eau tiède pour user peut-être inconsidérément, d'une manière indistincte dans toute sorte d'affections, de l'eau, à très haute température 45°-50°.

Le soir vous ordonnerez un quart de lavement laudanisé à garder le plus longtemps possible, et un des jours suivants au matin une purgation légère avec 30 grammes d'huile de ricin ou un verre d'une eau minérale. Subordonnez eependant la purgation à la non-réapparition des règles, car il arrive encore assez souvent que le sung, après un arrêt de tois ou quatre jours, recommence à couler d'une façon plus ou moins abondante, et ce flux marque une détente des plus heureuses que nous ne devons pas risquer de contrarier par une évacuation intestinale susceptible, à ce moment critique, de créer une dérivation; ¿débarrassez alors le rectum au moyen d'un lavement elyvériné.

Les bains longtemps prolongés ont un effet séduif des plus maiqués; Trousseau et Peter disent avoir observé qu'un bain donné un peu ehaud au début des accidents est capable d'augmenter les douleurs; d'autre pait nous savons qu'un bain tiède ne favorise pas toujours la venue du sang, au contraire; je laisse volontiers passer quelques jours pour en preserire afin de permettre au flux menstruel de reprendre son cours sooutanément.

En attendant je conseille des émissions sangaines, pour défluxionner le petit bassin an moyen de dix à douze sangsues appliquées sur l'hypogastre, application que l'on renouvelle, quand on le juge nécessaire, soit sur le bas ventre, soit sur le haut des cuisses. Au bout d'une à deux semaines, si les aceidents douloureux et congestifs persistent, il convient de pratiquer les émissions sanguines directement sur le col; mais d'habitude heuneusement nous voyons céder la congestion assez vite, au moins lorsque les organes génitaux n'étaient pas préalablement malades.

Du reste cette congestion utéro-ovarienne reconnaissant une cause accidentelle bien déterminée, la suppression brusque du flux menstruel, n'a pas de tendance à se reproduire, et n'affecte pas la variabilité si caractéristique d'autres congestions de nature diathésique par exemple; cependant lorsqu'elle n'est pas entièrement dissipée dans le courant du mois, la venue des prochaines règles risque d'aggraver l'état de la matrice et de provoquer une légère rechute; plus que jamais la malade, à cette époque, gardera un repos absolu.

Il arrive aussi que la congestion cède et que l'aménorrhée continue; nous avons indiqué plus haut le mode d'emploi de la médication emménagogue, et les procédés à mettre en œuvre en pareil cas.

POUSSÉE PLUVIONNAIRE CATAMÉNIALE EXAGÉRÉE

Saus cause bien appréciable ou sous l'influence du froid. d'une fatigue inaccoutumée, une femme, de préférence une nerveuse ou une arthritique, d'habitude bien réclée et ne soutrant pas de la matrice, est prise de vives douleurs menstruelles, et le sang vient en grande abondance, quelquefois à flots ; d'autres fois les douleurs ne sont pas violentes, la malade accuse simplement de la pesanteur pelvienne, quelques coliques un peu pénibles, mais le flux hémorrhagique s'établit considérable d'emblée, ensuite il ne s'arrête pas, dépasse de beaucoup sa durée ordinaire, traîne, et assez longtemps après nous constatons encore un écoulement leucorrhéique teinté de sang avec des poussées de sang pur. Cette crise est la seule ou bien une à deux périodes suivantes montrent quelques troubles analogues, puis tout disparaît, les accidents ne se reproduisent pas, ou du moins ne se reproduisent qu'au bout d'un temps si éloigné que, dans l'intervalle, on s'est assuré à plusieurs reprises de la parfaite intégrité de

l'appareil utéro-ovarien. Il s'est fait là une de ces congestions qu'Armand Siredey appelle idiopathiques.

J'en ai observé un exemple chez une jeune femme qui, saus motif, eût un retard de huit jours dans la venue de ses règles; il ne pouvait s'agir de grossesse. L'écoulement du sang, accompagné de sonfirances, arriva avec intonsité, la durée en fut augmentée, les règles suivantes subirent des modifications semblables, mais depuis, comme auparavant, je n'ai été appelé à rien constater d'anormal.

Si cette congestion n'a pas de gravité par elle-même, la perte hémorrhagique abat et inquiète les malades déjà fatiguées par les douleurs; l'appétit disparait, l'estomac devient capricieux, la poussée catamémiale retentit sur le foie, le rein, surtout sur le rein déplacé et, sans nous acharner à preserire une thérapeutique des plus actives, nous ne pouvons pas non plus complètement négliger cet accident.

Au bout du quatrième ou du cinquième jour environ,

en nous guidant sur la durée accoutumée des règles chez notre malade, nous devons songer à arrêter la perte. Ici les longues irrigations d'eau chaude et très chaudeés-50-7, et leur action sur la contractilité de la matrice et des vaisseaux, trouvent une de leurs meilleures indications, puisqu'il convient de modèrer une réplétion, une distension rapide du système circulatoire qui s'est fluxionné brusquement; on en preserira deux ou trois par jour. Lorqu'il persiste un éconlement teinté de saus, plutôt qu'une véritable perte, à l'exemple d'Aran ordonnez quelques bains tièdes, que ne contre-indique du reste pas un flux plus sbondant.

Mais avant tout, vous avez mis votre malade au repos

absolu, avec une alimentation légère, quelques boissous fraîches, et si dès le premier jour la dysménorrhée s'est manifestée fort vive ou si d'emblée le sang a jailii d une taçon inquiétante, vous avez prescrit soit le sénecio, comme je vous l'ai expliqué, soit l'extrait fluide d'hydrastis canadensis, soixante gouttes par jour en trois fois dans de l'eau sucrée ; il vous semblera prudent, dans plusieurs cas, de prévenir le retour d'une pareille fluxion aux prochaines règles et vous continuerez l'usago intermittent de l'hydratis canadensis dans la période intercalaire ou mieux vous le reprendrez quelques jours avant la venue des menstrues.

CONGESTION MENSTRUELLE DE CAUSE EXTRA-UTÉRINE

Cette fluxion cataméniale exagérée, qui arrive comme un orage, ne se reproduit guère ou pas du tout, n'a pas pour nous l'importance de cette congestion tenacc, persistante, qui, procédant au début par une série de poussées fluxionnaires, finit par créer à la longue un état congestif chronique, et provoque même des lésions anatomiques. Crises do souffrances utérines, phases d'endolorissement de tout le pelvis, névralgies, dysménorrhée et aménorrhée congestives, ménorrhagies surtout se montrent tour à tour ou se combinent au long de la vie génitale, ontraînent des complications graves, si une thérapeutique s'adressant à la fois aux effets et à la cause ne vient enrayer les accidents. Ils commencent par une simple hypérémie variable d'intensité suivant les époques. diminuant ou disparaissant pour éclater avec une force nouvello; puis nous la voyons s'installer à demeure. amener des modifications dans la texture de l'organe. aboutir à la sclérose (Richelot), à moins que, favorisant une infection, elle ne conduise à une métrite ou une salnincite.

Cette congestion à répétitions, qui tend à devenir permanente, nous devons, pour chercher à la prévenir ou à l'atténuer, combattre tout d'abord les causes multiples dont l'influence préside à son évolution.

Aux femmes qui nous en paraissent menacées, nous recommanderons le repos au moment des règles; toute fatigue intempestive, veillée trop longue, grandes marches, sport de bicyclette ou d'équitation, station debout prolongée, danse, etc., sont nuisibles.

Dans la période inter-menstruelle, la vie doit être calme, les exercices modérés : je dirai plus loin qu'il est des cas où un peu d'exercice pratiqué modérément devient utile. Armand Siredev écrit avec raison que les repas copieux, l'abus des mets épicés, le séjour au bord de la mer ou dans certaines stations thermales sulfureuses, accroissent l'hypérémie utérine, de même les excès de coït, les excitations anormales ou prolongées. J'ai signalé à plusieurs reprises les effets du fioid, de vêtements trop légers, du corset, de corps étrangers, pessaires négligés et malpropres, et je n'insisterai pas ici de nouveau : mais une fois encore ie dois revenir sur les résultats néfastes qu'entraînent les suites de couches lorsque l'accouchée reprend trop tôt sa vie habituelle. a'observe aucune précaution, ne garde aucun ménagement ni pour sa fatigue, ni pour ses plaisirs.

Dans la partie de cet ouvrage qui traite des Fausses utérines, nous avons établi avec quelle fréquence survient chez ces malades la congestion de la matrice et des annexes. Les ménorrhagies et métrorrhagies si nombreuses, les dysménorrhées, les accès douloureux de la période inter-menstruelle, les crises de leucorrhée, traduisent le plus souvent une poussée fluxionnaire dont la réelle origine, le véritable point de départ réside dans un organe éloigné. La réplétion du système sanguin de l'utérns, les phénomènes vaso-moteurs obéissent à des excitations qui partent de zoncs anatomiques tout à fait étrangères à la matrice, et nous avons exposé les divers modes par lesquels est commandée l'hypérémic. Je dois cependant faire observer ici que pour les fausses utérines. métrorrhagic ne signifie pas toujours congestion; ce serait s'exposer à de gros mécomptes thérapeutiques que de traiter chez ces malades toutes les pertes sanguines comme si elles relevaient uniquement d'une poussée fluxionnaire : les altérations des vaisseaux et du sang par exemple, artério-sclérose ou leucocythémie, produisent des métrorrhagies qui ne ressortissent pas à la congestion. On a beau soigner l'utérus, taut que persiste la cause la congestion se reproduit, passe à l'état chronique, favorise les complications métritiques ou annexielles et la fausse utérine devient à la longue une néritable utérine

C'est pour éviler ces échecs que nous avons tant insisté (1) sur les précautions hygiéniques et les soins thérapeutiques à conseiller aux dyspeptiques, aux viscéroptosiques, aux hépatiques, aux rénales, aux cardiaques, aux nervouses, aux arthritiques, etc., éminemment sujettes à toutes les variétés de congestion, active ou passive, primitire ou secondaire, aigué ou chronique. Nous n'arriverons à un succès durable que si nous combinons

⁽¹⁾ Voir traitement des Fansses utérines.

le traitement de l'état général avec celui de la matrice; en négligeant l'un ou l'autre nous n'aboutirons qu'à un résultat incomplet et nos efforts demeureront inefficaces.

Vous connaissez le traitement des fausses utérines, je vous exposerai plus loin celui de la congestion, mais auparavant je dois m'arrêter sur quelques points.

La constipation habituelle, avec ou sans viscéroptose, est, d'un avis unanime, une des causes qui favoisent le plus la congestion utérine. Il faut donc la combattre méthodiquement; les malades s'y prêtent, mais presque toutes nous demandent : Dois-je me purger au moment de mes règles, un peu avant et pendant leur écoulement? Cette ouestion n'est mas à néclieer, car une évacuation

intestinale abondante au moment des règles est susceptible de contrarier leur éruption; et d'autre part toutes les femmes constipées savent par expérience que si leur intestin reste libre leurs douleurs menstruelles sont moins vives et les chances de perte plus éloignées. D'une façon générale, à l'approche des règles, il est prudent de n'administrer que des laxatifs légers, la poudre de réglisse composée dont j'ai donné la formule, quelques capsules d'huile de ricin, de la graine de lin ou de psyllium par exemple, que l'on peut aider au moyen de petits suppositoires glycérinés. Mais interrogez aussi la malade.

Il est des femmes, même de celles constipées ordinairement, qui, un ou deux jours avant leurs mois, accusent une petité diarrhée qui trahit la fluxion cataméniale de tout le petit bassin. Chez elles comptons sur cet effort naturel de l'organisme, que nous n'avons aucun avantage à exagéror, et suspendons les laxatifs un peu à l'avance. Chez les autres au contraire, ie n'ai iamais observé d'inconvénients en permettant leur purgation habituelle et légère, même pendant que le sang coule. Il n'en serait pas de même des grandes irrigations intestinales de un à deux litres d'eau chaude que nous preserivons dans l'entéro-colite, et qu'il convient de supprimer au moment des époques.

La constipation chronique, la coprostase garde donc dans l'étiologie de ces accidents utérins une importance que nous lui reconnaissons. Castan (de Béziers), qui regarde le flux menstruel comme un émonetoire, voit dans la congestion de la matrice et les hémorrhagies qui l'accompagnent, le résultat d'une intoxication de l'économie due à cette coprostase et produite par les ptomaïnes, l'indol, le phénol, le seatol, etc., d'origine intestinale. Cette pathogénie commande sans doute à un certain nombre de faits, mais nous ne saurions la considérer comme exclusive.

Dans ces derniers temps, Richelot a particulièrement insisté sur la congestion utérine des neuro-arthritiques; on lui a reproché d'avoir trop généralisé et d'englober dans la conception de cette catégorie des cas qui ressortiusent à une autre étiologie.

Cette critique ne paraît peut-être pas sans fondement, mais il n'en reste pas moins vrai que la description de Richelot répond à des faits très exactement observés, s'ils ne sont pas aussi nombreux qu'il le pense. Pour ma part j'en ai certainement vu des exemples indiscutables, et la lecture de son tuvail m'a expliqué des phénomènes qui m'avaient frappé autrefois sans que j'aie pu les élucider. « Il ya des jeunes femmes, dit Richelot, chez lesquelles la congestion utérine, violente au moment des règles ne cesse pas complètement ou se renouvelle à époques

variables, sans autre motif plausible qu'une action nerveuse, et s'accompagne de douleurs survenant par crises et n'avant pour prétexte aucune lésion provoquée. Avec la congestion et la névralgie, marche de pair le catarrhe utérin, une leucorrhée abondante », que n'explique aucune métrite. Cette congestion utérine commence à la puberté, et nous la retrouverons plus loin à ce sujet. Pendant la vie génitale, les crises de douleur, les ménorrhagies, les suintements sanguins irréguliers, les poussées leucorrhéiques inter-menstruelles trahissent une congestion qui, à la longue, provoque, « dans le tissu utérin une hyperplasie se traduisant par l'augmentation de volume de l'organe et l'agrandissement de sa cavité. Quand on examine ces gros utérus, le col est pâle, violacé, dur, glaireux, mais il n'offre ni déchirure, ni pseudoulcération, ni éversion de la muqueuse, ni muco-pus ». Cet état, ajoute Richelot, coïncide avec les déviations et le prolapsus, il s'étend du gros utérus, habituellement congestionné, mais de moyen volume, aux degrés extrêmes du gigantisme utérin, de l'utérus fibromateux sans fibrôme. Cette dystrophie utérine d'origine arthritique demande des soins très différents de ceux de la métrite avec laquelle elle demeure trop souvent confondue.

N'oublions pas cependant que cette variété morbide, débutant par la poussée fluxionnaire, pour aboutir à la congestion chronique, puis à la sclérose, et qui n'est pas sans présenter certaines analogies avec la congestion hypertrophique d'Aran reste susceptible à son tour de se complique de métrite.

Au point de vue thérapeutique, et cela nous intéresse le plus, les neuro-arthritiques sont sujettes à des crises de congestion utérine qui finissent par rendre la matrice grosse, névralgique, et provoquent des pertes hémorrhagiques, douleurs utérines et péri-utérines, leucorrhée, qui tour à tour, comme l'état local, réclameront notre attention

(A suivre.)

PHYSIOLOGIE CLINIQUE

Des variations de la tension capillaire sons l'influence du traitement hydrominéral,

Par le D' Bouloumié.

Depuis longtemps convaincu de l'importance des troubles circulatoires chez les goutteux, je me suis constaument précocupé de l'état de la circulation chez tous mes malades, arthritiques pour la plupart, et j'ai systématiquement examiné chez chacun d'oux l'état du cour et des vaisseaux; c'es je ainsi que, dés 1875, j'écrivais (1) la phrase suivante que je ne désavoue pas après 25 ans de plus d'observation : « On pourrait dire sans exagération que les lésions artérielles sont à la goutte ce que les lésions cardiaques sont au rhumatisme. »

J'ai successivement cherché à compléter l'examen fait par l'auscultation cardio-aortique par l'emploi du sphygmographe et des divers sphygmomanomètres, mais je n'ai jusqu'à présent obtenu d'aucun d'eux aucune satisfaction.

Le sphygmographe m'a donné des résultats assurément intéressants, mais l'interprétation des tracés, souvont com-

De la goutte, étiologie, formes, périodes, transformations et manifestations primordiales.

plexe, exige, plus encore que celle des résultats sphygmennnemétriques, qu'on fasse la part de l'organe central de la circulation aussi bien que des organes périphériques, do l'état anatomique aussi bien que de l'état fonctionnel de l'artère, de la réplétion même du système circulatoire. On ne peut donc appliquer spécialement le sphygmographe à l'étude cemplète de la circulation des goutteux, chez qui il importe surtout de saisir à son début le trouble fonctionnel qui, tôt on tard, doit aboutir à la lésion anatomique contre laquelle, il faut le recommitte, nous semmes sans grande action.

Les sphygmomanomètres des types l'otain et Verdier ne m'ont pas donné non plus toute satisfaction à ce point de vue. Leurs résultats m'ont paru teujours assez incertains et ne m'ont pas donné l'état de la circulation dans les dernières amifications de l'arbre circulatior là doi l'étément musculaire prédominant débute, l'artério-spasne qui aboutit à l'hypertension habituelle qui achemine vers l'artério-selevose. Je parlage à ce point de vue l'opinion émise par M. Huchard, à savoir que « tous les sphygmomanomètres cliniques sont défectueux, car ils ne donnett qu'une mesure appreximative et infidèle de la tension artérielle » et, de plus, qu'ils » ne permettent que de constater de grands écarts dans la pression artérielle. »

Aussi, lorsque par men confrère et ami le D' de Tymowski (de Vittel), jei eu cennaissance du tonomètre de Gartuer, qui mo paraissait devoir donner avec une exactitude suffisante l'état de la tonsion artério-capillaire, me suis-je promis de rexpérimente cliniquement. C'est lo résultat do mes recherches sur la tension artério-capillaire faites avec cet appareil que je vais avoir l'honneur de vous exposor. Je suppose l'instrument connu de vous et, pour le rappeler à ceux qui l'auraiont oublié, je vous le présente ici. Jo ferai remarquer seulement quo ce qui le distingue des autres sphygmomanomètres, y cempris le plus récent, colui de Riva-Rocci, c'est d'abord qu'il enrogistre la pression inter-asculaire nécessaire

pour rétablir la circulation dans une extrémité digitale préalablement anémice par compression centripète, tandis que les premiers curegistreut le dogré de pression nécessairo pour arrêter la circulation dans une artêre; en second lieu qu'il measure la tension dans les parties terminales de l'arbre circulatoireau lieu d'y measurer la tension dans des vaisseaux d'un certain calibre, radiale ou humérale. C'est pour cette dernière raison que je designe sous le nom de tension artériocapillairo la tension indiquée par lo tonomètre de Gartner, réservant celui de tension artérielle à celle indiquée par les autres sphygmomanomètres de même que j'appellerais volontiers tension cardio-artérielle celle qu'on obtiendrait avec un appareil qui permettrait de faire porter les recherches sur de gros troncs artériels; vous en saissisez les raisons saus que l'ais besoin d'vinsister.

Si je crois inutile de donner la description de l'appareil, je ne crois pas sans intérêt de dire quelles sont les conditions dans lesquelles il doit être appliqué et dans lesquelles doivent être faites les observations, pour que leurs résultats soient en même tomps précis et comparables entre eux, car il existe des causes nombreuses d'inexactitude et de différences dans les chiffres obtenns.

Conditions d'une bonne application de l'instrument et d'une bonne observation.

C'est après avoir fait un nombre considérable de recherches tonométriques et notamment au cours de la saison de 1900, sur 383 sujets dont 273 hommes et 110 femmes, que je crois pouvoir déterminer avec précision les diverses conditions d'application et d'observation.

Maniement et application du tonomètre.

il est important que l'anneau (le manchon de caoutchone n'étant pas gonflé) ne serre pas le doigt; s'il le serre, il gêne le rétablissement de la circulation et le chiffre de tension obtenu est infériour au chiffre réel et varie d'une épreuve à une antre,

Pour le même motif, il fant éviter de placer l'anneau exactement au niveau d'une articulation interphalangienne.

Il finit aussi éviter de le placer à un doigt porteur d'uno bagne le comprimant ou ayant été comprimé pendant longtemps par ane bague. J'ai plusieurs fois, dans ces conditions, constatio une diministion notable du chiffre de la tension constatée aux autres doigts. Les differences ont été le plus souvent de 0,50 à 1 degré (centimètre de mercure); elles out même été dans un cas, fisqué 33-50.

Il faut que l'extrémité digitalo an-dessous de l'ameau soit exactement amémiée par compression et, pour cela, l'emploi d'un tabe de caoutchouc enroulé à la façon d'une bande d'Esmark me parait préférable à celui du de garai de caoutchouc en de l'aumeau de caoutchouc de Gartner. Si l'extrémité digitale n'a pas été exactement anémiee, il reste une coloration qui empéche de saisir le moment exact du rétablissement de la circulation et la sensation de battement éprouvée en même témps au le suite n'est pas nette.

Il faut, en outre, dès qu'uno modification de coloration est perque par l'opérateur ou qu'une sensation est accusée par lo sujot, arrêter la décompression et attendre pendant quoi-ques secondos; celle-ci est sufiisante et si l'épreuve doit être considérée comme terminée, la coloration s'accuse progressivement et à la pâleur circuse du doigt succède une coloration roset très faciliement perceptible à l'ongle ot autour de l'ongle chez les sujets de raco blanche; sinon, il faut continuer la décompression, mais très lentement, sans saccades et l'arrêter à tout moment pendant encore quelques secondes.

Conditions de honne observation

Les conditions d'une bonno observation et surtout d'une ebservation dont les résultats pourront être comparables à coux qu'on obtiendra ultérieurement, tiennent à la connaissance de certaines modifications de tension qu'on peut appeler physiologiques.

Position du sujet.

La position du sujet couché, assis ou debout, a une influence manifeste et presque constante sur les résultats obtenus.

Chez l'individu ssin, la différence de tension indiquée par le tonométre appliqué successivement au même doigt dans ces diverses positions, vont de 1°,50 à 2°, les pressions les plus élevées correspondant à la position debout. — La position de choix est la position assise, le poignet du sujet étant appuyé sur la table, sensiblement à la hauteur du cœur, ou la position couchée. le poignet reposant sur le lit.

Dans le cas do tension hypo-normale, tension inférieure à 10°, les variations, chez l'homme du moins, m'ont paru osciller dans do moindres limites; l'écart n°a été dans ce cas, quo de 1° à 1°,25; il m'a paru au contraire atteindre son maximum dans le cas de tension au-dessus de la normale (au-dessus do 12° dans la position assise). Il y a là pourtant encore, uno inconnue à dégager dans l'intérêt du diagnostic précis et du traitement de certains troubles circulatories.

Choz la femme, j'ai trouvé moias de régularité dans les écarts de tension constatés, une fois même j'ai trouvé des chiffres paradoxaux; c'est ainsi que chez l'une (35 ans), j'ai trouvé 8',50 dans la position assise et 12° dans la position debout; chez une autre (53 ans), 11°,20 assise et 14° debout, tandis que chez une autre, j'ai trouvé 13°,50 dans la position assise et 12°,50 seulement dans la position debout et on renouvelant l'expérionee quelques jours aprês 11° 418',50 assise et 13°,50 dobout et finalement 13°, dans la position assise et dans la position debout. — Rien dans l'examen du cœur et des vaisseaux ne residait compte de cette anomalie.

Je n'ai pu trouver de rapprochement à établir entre ces diverses modifications do tension artério-capillaire et les modifications do fréquence du pouls que M. Achard a signalées comme so produisant assez régulièrement d'une manière invorse cliez les hypertendus et les hypotendus passant de la position couchée à la position debout et de la position debout à la position couchée. Jo suis porté à penser que la tension obtenue dant colle existant dans les petits vaisseaux, riches en fibres musculaires et soumis à des alternatives faciles de vaso-constriction et vaso-dilatation par le fait du système nerveux, il y a lieu de tenir compte de l'influence de celui-ci dans l'interprétation des différences constatées spécialement dans l'interprétation des différences constatées spécialement dans l'interprétation des différences constatées spécialement dans l'interprétation des différences constatées spécialement

Variations de la tension artério-capillaire à divers moments de la journée.

La tension artério-capillaire m'a paru être à son minimum lo matin au révoil et so maintenir aux envinos de ce cliffro jusqu'au moment du premior repas, pois se relever de 0,50 à 1° of parfois 2° chez l'horame, de 1° à 1°,25 habituellement et parfois de 2° et 2°,2° de local a femme pour restres resiblement au même point durant presque tout l'après-midi. Une certaine suré-lévation de tonsion parelt se produire habituollement après le repas du soir, mais ne pas dépasser généralement 0°,3 à 1°.

Variations de tension artério-capillaire eonstatées au cours d'une même séance.

Un fait important à connaître et dont je n'ose donner une oxplication, car elle serait tout hypothétique, ost la constatation au cours d'une même séance de tensions différentes, soit à différents doigts d'une même main, soit au même doigt lors d'éprouves successives, soit aux doigts correspondants des deux-mains. Il n'est pas labituel, mais il est assez fréquent pour méritor d'attirer l'attention ot obliger à prendre certaines précautions quand on veut arriver à des résultats précis et comparables; je l'ai noté dans 37 cas sur 273

chez l'homme (soit dans 14 0/0 des cas) et dans 18 sur 110 chez la femme (soit dans 16,36 0/0 des cas).

Ces différences sont établies pour une mêmo main clez. Phomme de 0°,20 à 0°,25 inclusivement dans 11 cas; de 0°,25 à 0°,50 dans 16 cas; do 1° dans 5 cas; ce 1°,50 dans 2 cas. Elles ont été plus étendues éhez la fomme, de 0°,20 à 0°,55 dans 3 cas; do 1°,35 à 0°,50 dans 7 cas; do 0°,50 à 1° dans 4 cas; de 1°,50 dans 1 cas; de 2°,25 dans 1 cas. Dans un cas onfin, ces différences ont oscillé d'un jour à l'autre, outre 0°,25 c 2°,50. Les différences notées à l'examen des doigts correspondants des doux mains on varié de 0°,25 à 1°,50 sans que de leur rapprechement on puisse concelure à une tension artério-capillaire habituelloment plus élevée d'un côté que de l'autre, car je trouve, en les additionants, 5 cas dans lesquels la tension a été plus élevée à gauche qu'à droite et 5 cas dans lesquels cllo a été moiss élovée.

On no peut nen plus trouver l'explication de ces différences, le détail des observations le démontre, dans les constatations faites à l'examen du cœur ou à la palpation des radiales.

Il y aurait lien de rechercher par l'examen sphygmo-manométrique pratique sur l'humérale et la radialo, si ces modifications de tension artério-capillaire correspondent ou non à des modifications analogues de tension artérielle et pour cela, d'avoir un appareil clinique et précis en même tomps, permettant de procéder successivement à ces dex x recherches on quelques minutes. — C'est un instrument de co gener que lo fais construire et dont notre secrétaire général vous a un peu trop précipitamment annoncé la présentation pour aujourd'hui. Il n'ext pas encore au point.

Comme conséquence clinique de ces diverses constatations, je dirai :

Faites vos recherches dans les conditions d'application indiquées ci-dessus, faites-les toujours sensiblement à la mêmo heure, sur la même main et sur le même doigt et dans la même position. Chistres de tension artèrio-capillaire constatés chez l'homme et chez la semme.

Les résultats de mes constatations tonométriques artériocapillairos faites sur mes malades, qui sont, je le répète, pour la plupart des arthritiques, m'ont fourni un pourcentage indiquant chez cux (indépendamment de l'âge et de la maladio comme les plus fréquentes, les tensions de 12- à 13-chez l'homme et de 11-12-chez la femme, comme tensions exceptionnelles, les tensions inférieures, à 7- et supérieures à 15- chez les hommes, les tensions inférieures à 10- et supérieures à 14- hez les femmes.

Envisagées au point de vue de l'àge, les tensions artérioeapillaires ne se sont montrées au dessus de 14º (sauf quelques eas entre 30 et 34 ans) qu'à partir de l'âge de 50 ans. A partir de eet âge il v a des tensions très différentes d'un suiet à un autre tandis que jusque là (sauf dans quelques eas) elle varient de 11 à 13; on pent done dire que d'une manière générale la fréquence des tensions hyper-normales s'accroît avec l'age. Toutefois chez les hommes àgés de 70 ans et au delà (13 eas) j'ai trouvé surtout des tensions artério-capillaires relativement faibles (de 10 à 12°,50) eliez la femme il y a très nettement une augmentation de tensions artério-eapillaires à partir de l'age de 50 ans et si, eliez celle-ei, on serre de plus près la question et on étudie les relations existant entre la menstruation et la tension artério-capillaire, on trouve sur 87 cas, dans lesquels la mention do l'état de la menstruation ou de l'époque do la ménopause est noté spécialement (elle est omise chez certaines jeunes femmes bien réglées et chez des femmes ágrees):

5 cas avec tension inférieure à 10°, tous les 5 chez des femmes réglées plus ou moins bien, dont 2 atteintes de neurasthénie et 1 d'asthénie post-grippale;

18 cas avec tension de 10° à 11°, sur lesquels 5 femmes

bien réglées et 6 mal réglées, dont 4 avec monstruation devancante et 7 femmes agées ayant plus ou moins dépassé l'époque de la ménopause;

23 avec tension de 11° à 12° sur lesquels 8 femmes bien réglées et 6 mai réglées, dont 3 avec des retards et 8 ayant plus ou moins dépassé l'époque de la ménopause;

13 eas avec tension de 12° à 13° sur lesquels 3 femmes bien réglées, 1 insuffisamment réglée, 3 en cours de ménopause et 6 avent dépassé la ménopause :

18 cas avec tension de 13° à 14° sur lesquels 2 seulement bien réglées, 2 irrégulièrement menstruées, 1 en cours de méno-

pause et 13 ayant plus ou moins dépassé l'époquo de celle-ci ; 6 cas avec tension de 14° à 15° sur lesquels 5 femmes ayant dépassé la ménopause et 1 bien réglée ;

4 cas avec tension de 15° à 18°, tous les 4 chez des femmos ayant dépassé la ménopauso.

Ces chiffres ne laissent pas de doute sur l'augmentation habituelle des tensions artério-eapillaires ehez la femme au cours de la ménopause et après la ménopause.

Tension et maladies

De la comparnison des chiffres de tension constatés clez nos malades et des chiffres donnés par Gartner on peut conclure que chez les arthritiques, toute autre condition égale d'ailleurs, la tension artério-capillaire est généralement élevée.

Chez les goutteux hommes, les teusions les plus fréquentes unt été les tensions de 12 à 12 et chez les femmes les teusions de 13 à 14 l. Il y a done dans les 2 sexes des teusions hypernermales dans la geutte. En ce qui concerne la différence notée entre les édux sexes il faut tenir compte de cofui que la fomme ne souffre gnére des manifestations articulaires nettos de la goutte qu'à la ménepause tandis que les hommes en sont affectés dans la grande majorité des cas avant 40 ans, d'où une influence de l'âge à ne pas négliger.

Chez les graveleux rénaux je n'ai trouvé aucune relation à établir entre la maladie et l'état de la tension artérielle.

Chez les malades atteints de celiques hépatiques, de lithiase biliaire, j'ai trouvé la tension artério-capillaire pen élevée généralement, abaissée même.

Si en effet on repreud les pourcentages des diverses tensions hez les gouteux, les graveleux rénaux et les lithiasiques biliaires et si on les groupe en 2 catégories de tensions, inférieures à 12° et supérieures à 12°, ou voit que dans les cas 12° l'emporte chez l'homme et chez la femme alors qu'il en est inversement dans la goutte et dans la gravelle. Si l'on tient compte de ce fait que dans ma statistique de cette année comme dans celle des années précédentes les femmes atteintes de coliques hépatiques au moment de la ménopause ou peu après la ménopause sout aussi nombreuses sinon plus que les femmes encore bien réglées, on peut dire que non-seulement la tension artério-capillaire chez les lithiasiques biliaires est faible mais qu'elle est abaissée par rapport à ce qu'elle est habituellement à cette période de la vie féminine.

Tension artério-capillaire et auscultation.

Les résultats comparatifs de l'auscultation et de la tension artério-capillaire montrent une fois de plus combien plus fréquents sont les troubles circulatoires, artériels surtout, chez les goutteux que les lésions cardiaques; de plus ils donnent la preuve qu'il y a un intérêt réel, pour apprécier exactement l'état de la tension artério-capillaire, à joindre l'examen tonométrique à l'auscultation, car s'il y a cofincidence fréquente, habituelle même, du retentissement aortique et d'exagération de tension, on treuve des cas encore assec.

nombreux tantôt de tension faible avec rotentissement aortique, tantôt de tonsion très forte sans rotentissement aortique.

C'est là encore une raisou pour étudier ou mémo temps que la lonsion artério-capillaire la tonsion artérielle et pour chercher à obtonir un instrumont permottant de fairo en peu do temps cette double recherche, car l'une est aussi utile que l'autre pour aboutir à un diagnostic complet et présis devant conduire à une thérapeutique rationnelle du trouble circulatoire constaté.

п

Variations de tension au cours et sous l'influence immediate du traitement par la boisson.

Eu eo qui concerne les effets immédiats et les résultats du traitement de Vittel, plusieurs faits sont intéressants à signaler.

1º Au cours du traitoment quotidien consistant spécialement on ingestion le matin à joun d'un certain nombre de vorres d'eau à intervalle de 12 à 20 minutes, l'absorption de l'eau cutrainc, avant que los mixtions no se soient établies ot n'aient été assez nombreuses et abondantes, une augmentation de tension artério-capillaire variant de 1º à 3º, tandis qu'au centraire la tension s'abaisse et tombe généralement après les émissions abondantes d'urino qui suivent l'ingestion de l'eau minérale au-dessous du chiffre le plus bas observé chez lo sujet.

2º Sous l'influence de ce traitement continué pendant un temps plus ou moins long, quelques semaines, c'est-à-dire sous l'influence de la eure hydro-minérale pure, la tension artério-capillaire habituelle s'est abaissée dans 58 0/0 des cas onviron, s'est élevée dans 22 0/0 des cas, est restée sans changement dans 22 0/0. L'abaissement de la tonsion s'est montré le plus souvent quand il y avait primitivement hypertension manifeste mais sans lésion natério-celérouse ou athéromateuse nettement appréciables. Dans ces derniers cas le résultat a été nul par la cure hydro-minérale employée sans adjonction de moyens accessières et il cut été funcste si le traitement n'avait été mitigé et dirigé avec des précautions spéciales.

L'augmentation de tension a été notée le plus souvent dans 70 0,0 des cas dans lesquels ladite augmentation s'est manifestée alors que la tension était primitivement au-dessous de la normale ou à sa limite inférieure (10°). Le résultat a donc été dans ces conditions eurore favorable.

Cos observations témoignent une fois de plus de l'état Intituel d'hypertension chez les arthritiques et montrent que si cotte hypertension impose une surveillance spéciale des malades et parfois l'emploi des moyens accessoires dostinés soit à agir directement sur l'hypertension, soit à seconder ot précipitor l'effet diurvitique des caux, elle est généralement modifiée faverablement par la cure de Vittel. Rilles montrent de plus que cette cure peut encore étre utile quand l'hypertension commence à abeutir à l'artério-selèrese mais, que lorsque l'artério-selèrese est confirmée et qu'il y a des lésions athèremateuses, elle est sans effet utile et peut ne pas être sans danger.

En pareil cas, même elle doit passer au secend rang, la part principale du traitement revenant aux moyens habituellement ompleyés comme adjuvants ou accessoires, tels que : bains, fréciens, massages généraux et locaux qui se donnent spécialement.

HOPITAL DE LA PITIÉ

THERAPEUTIQUE AU LIT DU MAI ADF (1)

Ŧ

N. i. - Traitement du vertige stomacal.

par Albert Roun

Voici une ménagère de 37 ans qui vient nous consulter pour des douleurs d'estonnec, et vous avez recomm avec moi le liableau habituel de la dyspepsie hypersthénique avec hyperchlorhytrie. Mais, il existe chez elle un symptôme surajouté, dont elle se plaint plus que de tout le reste, et qui est le vrai mobile de la consultation qu'elle nous demande : ce sont des vertiges fréquents, intenses, qui la génent dans son travait et la troublent dams sa vie. Il y a done là un élément symptomatique, je dirai même une complication importante qu'il va falloir traiter en même lemps que la dyspepsie qui l'a causée.

La commissance de ce vertige d'origine gastrique, est très importante i tidonne lieu, en effet, à des creurs de diagnostic et de traitement fréquentes et fort préjudiciables au matade; je ne vous en citerat qu'un exemple. Il y a quelques années, je fus appelé en consultation par MM. Isch-Wall el Pignol amprès d'un commerçant qui souffruit de vertiges terribles de incessants. Ceux-ci félant devenus assez forts pour l'oblige à se concher et à abandonner les occupations de son data. Comme c'était un nuclea syphilitéque, un premier consultant crit à une nenare de syphilis cérébrale et le soumit à un traitement, mercuriel intensif, qui ne fit, bien enlendu, qu'accroître les vertiges.

Je reconnus chez lui les symptômes d'une dyspepsie anté-

⁽¹⁾ Consultation recucillic par X. Gouraud, interne de service.

ricure, que les médorius irailants avaient déjà, d'ailleurs, diagnostiquée. Je le sonmis au trailement gostrique; après trois jours, il se levait; au bout de huit jours, il reprenait ses occupations, déburrassé de ses vertiges. Le trailement du vertige gastrique a été bien formulé par

Bretonneau, qui a été un maltre en lhérapeulique ; je n'ai fait que le compléter et le réglementer sur certains points.

Voici donc le traitement auquel nous allons soumettre notre malade:

Elle prendra, le matin à jeun, un verre à Bordeaux de macération de quassia amara ; il suffit de mettre, la veille, en se conchunt, 2 grammes de copeaux de quassia dans un grand verre d'eau ; le lendemain matin, la macération est prête.

Quelques estonnes ne peuvent pas supporter le quassia qui les irrite; j'emplois ators la quassiane cristallisée à la dosse d'un milligramme, el fais boire ensuite un verre d'une eur indifférente telle que l'eau d'Alel. Une demi-heure après Tabsorption de la macération de quassia, faites prendre la premier déjenner qui devra être ser, el se composer par exumple, d'un cent fa la coque, à peine cuit, d'un peu de pain grillé, et de fruits cuits. Il impo le que la malade ne boive pus à ce repas. An déjenuer et au diner, elle pourra boire, au contraire, à sa soft ; il faudra même qu'elle boive, pourvu que ce soit de l'eau pure, ou une cau indifférente comme Alel, Thomos, Bochemanre, etc.

L'alimentation aux repus doit être sévèrement réglée; mais cette sévérité n'exclut pas une certaine latitude.

La quantité ne nous inquiétera pas, car en général, les malades mangent peu à cause de leurs malaises; mais la qualité a une grosse importance. Toules les viandes sont permises, viandes ronges, viandes blanches, volailles, pourvu qu'elles soient bien euiles, suns sauce; permettez de même les poissons au court-bouillon, suns sance; les légumes seront entis à l'eau et l'on n'y ajoutera que sur la fable même un peu de beurre frais; les œufs seront permis à la coque; les fruits seront euits. On évitera dans l'alimentation: le beurre cuit, les sauces, les graisses, fritures, charcuterie, condiments, viandes maranées, conserves, poissons gras, pâtisseries, crudités, acides.

A la fin du repas, faites prendre une tasse à the d'infusion très chaude de tilleul, de menthe, ou de camonille. Binin, recommandation très importante, interdisez absolument toute nourriture, gâteaux, bonbous ou sucreries en dehors du moment des repas.

Voilà pour le régime; voyons les médicaments. Cinq minutes avant chaque repas, donnez IV gouttes de teinture de noix vomique dans un peu d'eau.

Après les repas et en se couchant, un des paquets suivants :

Môlez exactement pour 12 paquets.

En outre, si la malade a des crises de brûlures, du pyrosis, des tiraillements, en un mot quelques phénomènes indiquant l'hyperacidité du contenu gastrique, elle prendra dès le début de la crise un des paquets dont voici la formule:

Mêlez très exactement en un paquet.

Cette dernière médication est une médication occasionnelle, recomaissant pour indication les crises douloureuses tardives. Quant aux autres médicaments, gouttes de noix vonique et paquels à prendre après les repas et en se couchant, on les continuera pendant 4 jours, on les cessera pendant 4, et ainsi de suite, en augmentant peu à peu la durée de la période d'interruption. En cas de constipation, prescrivez un lavement d'eau tiède le matin au réveil, ou une pilule ante cibum avant le diner; car il importe de maintenir la régularité des garde-robes.

11

No 5. - Traitement des vomissements rebelles.

par M. Albert Robin

Vous vous rappelez ce malade ectuellement au n° 9 de la salle Serres, et que nous avons déjà soigné pour des crises d'hypershlenie paroxystique d'origine alimentaire. Voilà six nois qu'il avait quitté le service très amélioré. Mais il n'a pas voulte ou n'a pas pu suivre son régime, et il nous revient aujourd'hui en pleine crise; les douleurs gastriques sont revenues, et il vomit tout ce qu'il prend; depuis hier soir il a délà remoil deux cuvettes.

Co soul ces vonissements presque incessants, qui génent et affaiblissent le malade, qu'il nous faut truiter en ce moment. Telle est l'indication thérapeutique immédiate; plus tard nous traiterons la cause; nous ferons la thérapeutique pathogénique.

Un des premiers moyens que vous ayez à votre disposition pour traiter el supprimer ces vomissements répédés, est la cure de repos absolu. Je dis : repos absolu ; par conséquent il faut cesser foute alimentation, quelque légère, quelque minime qu'elle solt. Tout an plus pourrez-vous permettre queques pilutes de gluce, pour rafraichir la bouche. Pour faire tolèrer cette absence complète d'aliments, vous avez à votre disposition les lavaments qui doivent être de deux sortes : atimentaires, désaltérants.

Voici la formule que j'emploie pour les lavements alimen-

taires, formule qui réunit à peu près les principes d'unc alimentation ordinaire :

Il faut bien émulsionner le métange avant de l'employer. Vous administrerez un lavement alimentaire toutes les six heures, en le faisant pénétrer aussi toin que possible, à l'aide d'une sonde de Nélaton, le malade étant couché sur le côté. Pendant tout le temps de la cure, le repos au lit est indispensable.

Pour faire tolérer ces lavements, il faut évacuer le gros intestin : un lavement de 250 grammes d'eau bouille, doiné une deni-leure avant le lavement alimentaire, remplira cette indication Ces lavements d'eau bouille seront en outre des lavements désaltérants ; ils combattront utilement la soif qui tourmente certains malades.

L'amaigrissement perdant celte période doit être tout à fait minime. J'ai vu des malades rester jusqu'à quinze jours privés de toute dimentation, sans perdre plus d'une à deux livres; la perte la plus forte que j'aie observée était de 2 kil. 800 gr. Je n'irai d'ailleurs pes aussi loin que Tournier, de Lvon, qui ditt avoir vu engraisser ses malades.

En général, un repos de 3 ou 4 jours vous suffira, et vous pourrez ensuite reprendre graduellement l'alimentation.

Si ce premier moyen a échoué ou n'a pu être employé pour des raisons quelconques, failes poser un vésicatoire volant sur l'épigastre; au bout de quelques heures, soulevez la cloque qui s'est formée et pansez avec 0gr,10 de poudre d'opium brut. C'est un moyen qui réussit très bien, notamment dans les vomissements de la fièvre typhodie. Appelé un jour auprès de la femme d'un de mes anciens élèves, qui se trouvait dans un état d'une extrême gravité, par suite de vomissements au cours d'une fièvre typholde, je fus assez heureux pour les arrèter instantanément à l'aide du vésicatoire et de la poudre d'opium brut.

Le vésicatoire ne peut être employé toujours. Prescrivez alors, en même temps que le régime lacté absolu, une potion à la picrotoxine que je formule ainsi:

Ajoutez à cette teinture :

 Chlorhydrate de morphine
 02°,05

 Sulfate d'atropine
 05°,01

 Ergotine
 1 gramme

 Fau de laurier-cerise
 12

Filtrez. Cinq gouttes avant les prises de lait. Mais ne dépassez pas en tout vingt-cinq gouttes dans la journée, car la picrotoxine est un alcaloïde extrêmement toxique.

Recommandez de prendre le lait très lentement, par cuillerées à soupe. Joignez à tout cela les paquets de saturation à la magnésie et à la craie préparée, dont vous connaissez la formule, S'il y a des douleurs gastriques.

Un autre moyen fort intéressant consiste à faire respirer de l'oxygène. Ces inhalations ont été préconisées par Pinard dans les vomissements incoercibles de la grossesse; on peut bien les généraliser. Comment agissent-elles ? Je l'ignore, mais peu importe; ne retenez que l'effet thérapeutique qui est indubitable.

Il est une ressource à laquelle J'ai souvent recours quand tout le resie a échoué: ce sont les lavages de l'estomac. On a eu tort de faire du lavage de l'estomac une méthode universelle propre à guérir tous les maux d'estomac; mais ils reconnaissent un certain nombre d'indications, où leur efficacilé est certaine. Vous vous rappelez ce malade qui nous étant adressé par un chirurgien des hépitiaux pour des vomisse-

ments incoerebbes; nous avons essayé successivement chez lui la pierotoxine, le vésicatoire avec la poudre d'opium brut; le bénéfice a dié fort précaire. Jui alors instituté les lavages de l'estomac avec de l'eau bouillie, qui a grandement amélioré l'état de notre malade.

Vous étes déjà suffisamment armé avec tons ces moyens hérapeuliques: cure de repos absolu et lavements alimentaires, régime lacié en faisant précéder chaque prise de lait de goutles de laudanum ou de mixture composée à la pierotoxine, vésicaloire épiganstique saupondré de poudre d'opium brut ou de chlorhydrate de morphine, inhalations d'oxygène, lavages de l'estoniac. Mais vous en avez encore un certain nombre à votre disposition. Cest ainsi que lorsque le malade est déjà au régime lacté absolu ou à une diète rigoureuse, vous pourrez suivre le précepte de Beau qui recommande une alimentation graduellement plus substantielle.

Vous pourrez encore utiliser les formules elassiques, potion Rivière, potion de llaen, mieture de Hueleaud, etc., dont vous trouverez la composition dans tous les formulaires, ou avoir recours à l'un des moyens suivants : solution accide de Coutaret, jus de citron (Audhoui), poudre de Colombo (Debreyne), strychnine (Empis), acide phénique cristattise (Pécholier) (I. emplaire adhesi de Guienou de Mussy (2), appliqué au creux de l'estonne, injections hypodermiques d'éther pratiquées loin du creux énigastrique (Leven).

Vous voyez que les ressources de la thérapeutique sont

Acide phésique pur, déliquescent. 2 grammes.
 Gouttes noires anglaises 6 —

U. s. a. Prendre dans un peu d'eau sucrée 4 gouttes de cette mixture, trois fois par jour avant les repas. (Pécholier.)

F. s. a. emplátre. Appliquer au creux épigastrique. (Guencau de Mussy.)

nombreuses. Préférez cependant les médications que je vous ai citées en premier lieu aux vieux moyens, notamment à la potion de Rivière que j'ai vu rarement réussir.

REVUE DES TRAVAUX FRANÇAIS ET ÉTRANGERS

Maladies vénériennes.

Prophylaxie des génitalites non virulentes. — La destruction des microbes autochtones du vagin est nécessaire, si l'on veut éviter les génitalites post-matrimoniales; elle est possible et mêmo facile, si l'on a recours aux injections antiseptiques prinquées régalièrement et méthodiquement, de façon à exercer leur action sur toute l'étenduc de la muqueuse vaginale (F. Guinard, Soe. méd. dn L'Y arrond., séance du 8 novembre 1900). Il est indispensable, si l'on veut maintenir indéfiniment aseptique le conduit vaginal, de les répéter au moins une fois par jour. Des nombreuses substances qui peuvent être employées, aucune n'offre à la fois plus de sécurité et moins d'incorvainents que le sublimé. Ses propriètés bactéricides sont incontestables; il présente de plus sur beaucoup d'autres antiseptiques l'avantage de n'avoir ni odeur, ni content.

Comme appareil instrumental, il faut rejeter délibérément tous ces injecteurs dans lesquels le liquide est mis en mouvement par une poiro en caoutelouc, pour donner la préférence aux récipients qui utilisent la pression atmosphérique. Toute espèce de réservoir ou de lock en verre, en faieure on métal peut être adoptée, mais le plus simple est enrore une poche en caoutelouc d'une contenance de 2 litres, munie d'un couverçle qui en protège le contenu.

Pour préparer soi-même extemporanément la solution on

commence par remplir la poche avec de l'eau, on y ajoute ensuite 20 centimètres eules de la solution suivante :

	Sublime	20 grammes.
,	Alcool	Q. S. 1 litre

La technique des injections n'est pas, tant s'en faut, chose indifférente. Pour qu'elles réalisent l'indispensable imprégnation totale de la paroi du vagin, il ne suffit pas de déplacer la eanule, de l'incliner en divers sens, de l'enfoncer à des profondeurs variables, trop nombreux, trop irréguliers et trop profonds sont les plis du vagin pour qu'il soit possible de laver et de purifier chaeun des sillons qui les séparent; il faut, de toute nécessité, faire baigner la paroi vaginale dans le liquide de l'injection, en comprimant la vulve autour de la canule. Dés que la tension du liquide ainsi retenu dans le vagin se fait sentir, on cesse brusquement la compression vulvaire et l'on recommence ainsi jusqu'à ce que l'appareil se soit complètement vidé, en terminant, la femme doit laver et frietionner soigneusement la vulve, les grandes et petites lèvres, afin de compléter aussi parfaitement que possible le nettoyage aseptique des organes génitaux.

Traitement de la gonorrhée par le bleu de méthylène (Bulletin médicat du 20 juin 1900).— Le bleu de méthylène parnit avoir une action microbicide rapide sur le gonocoque de Neisser. Son ingestion en eap-ules gélatineuses de 6 centigrammes amène la guérison de la blennorragie en quatre à set j ours. M. Alan O'Neill fait prendre 3 à 4 espusles pendant les quatre premiers jours du traitement, et après le quatrème jour il réduit la dose à 2 cap-ules par jour, une main et soir.

Pour éviter de voir eette médication amener quelque inflammation de la muqueuse vésicale, il recommande de donner en même temps quelques eapsules de santal.

Maladies de la peau.

Le pyrogallol contre l'eczéma des enfants (Sem. Méd., ur 28). — Les éruptions eczémateuses humides ehez humides chez enfants étant souvent très rebelles, M. le Dr L. Leistikov (do Hambourg) emploie pour les traiter l'acide pyrogallique qui aurait contre elles une efficacité presque absolue. Notro confrère commonee par appliquer sur les parties atteintes une pommade contenant do 55 à 10 0 de pyrogallol, dont il augmento progressivement la proportion jusqu'à 2 0/0 et mèma 3 0/0 dans les eas graves.

L'acide pyrogallique employé de la sorte a toujours été bien supporté par les petits malades, même par les nourrissons, et n'a jamais provoqué de coloration foncée des urines, lesquelles, il va sans dire, doivent être surveillées attentivennent. Lorsque, sous l'imitence du médicamont, on voit survenir des érythèmes cutamés, il suffit de faire les onetions avec une pommade à l'oxyde de zine et à l'ichtyol pour revenir au bout de quelques jours, à l'usage du pyrogalloi. Les récidives de l'exeréma seraient rares après ce traitement et elles affecteraient le plus souvent la forme de placards maculo-squameux qui céderaient rapidement à de nouvelles applications étadie pyrogallique.

Traitement de l'ichtyese (Acad. de méd., avril 1900).

— M. Bouffé. Depuis 1833, 7 ainstitue élez deux iehtyosiques le traitement par l'orchitino. Une malade âgéo 27 ans était ichtyosique depuis l'âge de quatre à einq mois. Elle reçut 135 injections représentant 1,432 grammes d'orchitine en quotorze mois. Elle turêt radicalement.

Une femme de 42 ans, atteinte d'ielityose depuis l'âge de trois mois, reçut en 65 injections 810 grammes d'orchitino et guérit. 800

FORMULAIRE

Traitement de l'eezéma récidivant de la lèvre supérieure

(Broco)

On sait que, pour que le traitement de l'eczéma récidivant de la lèvre supérieure soit efficace, il faut traiter non seulement la lèvre, mais auss la partie antérieure des fosses nasales. Pour arriver à ce bat, M. Brooq preserti souvent le traitement suivant. Tout d'abord, on fait aspirer maint et soir, de manière à ce qu'elle pénètre profondément dans les fosses nasales, un peu de la pommade suivante ;

Thiol							
Acide boriq							5 gr.
Menthol							1 centigr
Vaseline pr	ire						30 gr.

Puis on fait laver la lêvre supérieure avec de l'eau boriquée aussi chaude qu'on peut la supporter. On touche ensuite les points malades avec de l'alcool camphré, et pendant la nuit on applique la pommade suivante :

Oxyde jaune d	yd	ra	rg	y	œ.			75	contigr.
Vaseline pure								20 §	gr.

Le jour, on applique une autro pommade telle que la suivante :

									10 centigr.
Acide sali	cy	lic	u	e.					25 —
Oxyde do	zi	ne	٠.						3 gr.
Lanoline.									
Vaseline.									12 —

Le Gérant : O. DOIN.



La lutte contre l'alcodisme. — Les aiguilles à injections hypodermiques. — Le nombre des médecin : en Angieterre. — Discrétion et commerce. — Inauguration de la chaire de clinique gynécologique. — L'alimentation insuffisante, le travail musculaire et les inhalations de poussières dans l'évolution de la tuberculose. — La fausse grossesse de la reine de Serbie.

Le maire de Lyon, D' Angagueur, usant de la faculté que lui donne la loi du 17 juillet 1889, a pris l'arrêté suivant :

- ARTICLE PREMER. Il est interdit d'ouvrir, dans la ville de Lyon de nouveax débits de boisson, cafés, cabarets, etc., à une distance de moins de deux cent cinquante mêtres (250 mètres) des cimetières, des hospices, des édifices consacrés à un culte quelconque, des écoles primaires, collèges ou autres établissements d'instruction publique.
- σ ART 2. Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. »

On doit vivement désirer que le maire de Lyon trouve des imitateurs.

٠*،

Il no fant pas jeter les aiguilles à injections hypodermiques, car elles peuvent facilement être mises à neuf si leur caual est obstruct. I suffit de les faire bouillir pendant dix minutes dans une solution de carbonate de soude: le précipité qui les bouche est dissous et l'extérieur est remis dans son brillant primitif. Il y a, à l'hieure actuelle, 23,023 médecins dans le Royanne-Uni, ce qui fait 1 médecin sur 1,938 labitants, A Londrey, il y a 6,102 médecins exerçant, soit 1 sur 803 labitants, alors qu'en 1881 il n'y avait que 3,837 médecins, soit 1 sur 4,007 labitants. Dans les autres grandes villes d'Angleterre, la situation est sensiblement la même : en 1881 il y avait pour chaque praticien 1,9.9 habitants; il n'yen reste plus maintenant que 1,657. Le nombre des femmes médecins n'est pas bien grand : en 1881, il n'yen avait que 25; en 1899, 336. Sur ce nombre, 92 excreent à Londres, 90 dans d'autres villes de l'Angleterre et 72 aux ludes.

On s'est étonné que les jonrnaux de New-York aient fait tout à coup le silence sur l'épidémie de variole qui sévissait dans cette ville. Or, on a appris que tous les commerçants de Broadway s'étaient veunie et concertés pour adresser aux journaux qui publiaient des informations alarmantes sur la grippe et les autres maladies contagieuses existantes une circulaire leur notifiant que, s'ils ne se taisaient, les négociants leur retireraient leurs annonces. Depuis lors les journaux n'ont plus soufié mot sur la santé publique et ce n'est que par la statistique du conseil d'hygiène, qu'on a su qu'en janvier il était mort trois mille personnes de l'influenza.

La chaire de clinique gyaécologique récemment créce à la Faculté de médecine sous les unspires du Conseil municipal de Paris, vient d'être brillamment inaugurée par son titulaire, le professeur Pozzi. L'amphithéêtre de l'hépital Broca, ancies hópital de Loureine, pouvait à peine contenir une très minime partie de l'auditoire composé de collègues de l'Académie de médecine et de la Faculté, d'anciens élères, de praticions de

* * *

la ville et d'amis du savant clinicien. Le reste se tenait massè tout autour des fenétres du pavillon largement curvertes. Cost que l'évènement avait une réelle importance, la symputhie toute particulière inspirée par le professeur se doublait de ce fait, qu'il consacrait officiellement un enseignement que la Faculté de médecine de Paris était presque seule à ne pas que la gynécologie n'y fut professée par des maîtres tels que Terrier, Tillaux, Duplay, Le Dentu, Bouilly, Richelot, Dolcris, Doyon et Segond, mais elle l'était d'une manière intermitente, disséminée qui en rendait l'étude suivie, singulièrement, difficile. Désormais, grâve aux elforts combinés de M. Pozzi et de tous reux qui l'ont vaillamment sontenu, la gynécologie sera considérée comme une branche distincte de l'enseignement.

Dans une leçon d'onverture du plus haut intérêt, le professeur a montré l'évolution rapide de cette nouvelle science, dont beaucoup do ceux qui l'évoutaient, a-t-il rappelé, ont pu suivre les plus importantes péripéties. Co n'est pas assez dit-il, de parler de changement, il faut employer le mot de transformation et de révolution pour caractériser la différence qui existe entre la gynécologie actuelle et celle des maitres illustres dont les noms sont inscrits au fronton des salles de service : Récamier, Huguier, Alphonse Gnérin. Et cependant les deux derniers ont été uos contemporains!

* * *

Complétant ses recherches antérieures relatives à l'influence exercée par le climat sur l'évalution de la tuberculose expérimentale, M. Lannelongue a récemment étudié au même point de vue l'action d'une alimentation insuffisaute, de l'inhalation de poussières et du travail musculaire. Pour cela it à inoculé, une culture de bacilles de Koch dans la plevre droite de 109 cobaves mâles répartis en dix groupes de poiss sonsiblement 804 BULLETIN

égal, dont les uns devaient servir de témoins, tandis que les autres étaient mis en expérience. Les tuberenlisés ont succombé d'autant plus facilement qu'ils étaient plus mal nourris, plus exposés aux poussières, plus surmenés par le travail, dans des cages écureuils. L'état de santé des cobayes témoins démontrait d'une façon irréfutable, le rôle depuis longtemps prévu des mauvaises conditions hygioniques ci-dessus signalèss dans la marche du precessus tuberenleux.

.*.

Comme il arrive dans tons les eas où la politique s'insinue dans les questions médicales, ou a dit sur la reine de Serbie les choses les plus extravagantes. S. M. la reine Drega était ouceinte, affirmait-on, elle allait très proclaimement accoucher; le tsar devait diver parraim... et voilà que le moment venu il n'y a rien!!! Le peuple serbe doit, pour cette fois, faire son deuil d'un bértier du sceptre royal!

Il n'en fallait pas davantage pour dauber sur le dos des médecins, pour publier les procès-verbaux de leurs consultations et reconsultations en cherchant à démontrer qu'ils n'étaient pas d'accord.

Mais qui donc avait affirmé la grossesse? Ce ne sont pas les accoucheurs, ce sont les politiciens qui ont, avec la facilité dont ils sont coutumiers, donné comme certain ce qui était simplement probable.

M. Caulet (de Paris), médecin de Mes veuvo Dagra Maschin avant d'être reine, fut consulté en septembre dernier pour dés malaises tels que survenant trente-cinq jours après le mariage de Leurs Majestés, il pat porter le diagnostic de « soupçon de grossesse». Ce ne fut semblet-til qu'un soupçon puisque au neuvième mois les professeurs W. Snéguireff, A. Goubaroff et Caulet constataient qu'il n'existait pas de grossesse à terme, ni même de grossesse avancée. Cette absence de grossessi disaient-lis, après les signes qui ont été notés eu septembre

dernier, peut s'expliquer soit par un défaut accidentel de développement du produit, soit par son issue prématurée à uno époque où celle-ci pouvait passer inaperçue.

On sait que dopuis, les professeur Wertheim (de Vienne) et Cantacuziene (de Buchareavi ont été appelés à Belgrade et que ce dernier a émis l'avis que : «Contrairement au diagnostic rendu par le D' Caulet en septembre 1900, qui déclarait constater un commencoment de grossesse, la roine présentait à cette époque tous les symptòmes de ce qu'on appelle la fausse grossesse ou grossesse nervesse. On ne se trouve en présence que d'un état maladif de nature à tromper la crime et ceux qui l'entocratient. « Mais le soupçon était parfaitement permis en septembre et la façon dont M. Cantacuzòno juge M. Caulet a licu de surprendre. Le diagnostic de grossesse nerveuse est facile à porter. Si l'accouchement ne se produit pas, c'est qu'il s'agissait d'une grossesse nerveuse 11 (Cest très simple... a nostéroir... » ansière...

Quant à M. Caulct, il cût assurément mieux fait de ne pas confier à la presse la relation intime de cette pseudo-grossesse, la science n'ayant rien à gagner à cette profanation du secret professionnel.

GYNÉCOLOGIE

Traitement médical de la Congestion Utérine,

par M. Paul Dalcué, médecin de l'hôpital Tenon.

(Fin.)

Moyens thérapeutiques. — Nos prescriptions ne sauraient être les mêmes suivant que la malade subit un paroxysme fluxionnaire, qu'elle souffre d'un état congestif permanent, ou bien qu'elle est affectée de sclérose.

Nous avous dé'à formulé plus haut le traitement de la poussée fluxionnaire. En face d'un état congestif permanent, les indications peuvent encore être bien diverses : chez une femme les pertes sanguines prédominent, chez l'autre, les phénomènes douloureux, etc., l'aspect de l'utérus, plus ou moins gros, plus ou moins dur ou mollasse, contribue aussi à nous guider dans cette série d'états d'une intensité variable. Nous ne reviendrons pas sur les recommandations à propos de l'hygiène alimentaire, des excitations sexuelles et du coït. Mais arrêtons-nous au sujet du repos à prescrire aux patientes. Au moment des règles il doit être absolu, mais dans la période inter-menstruelle les indications ne restent pas aussi formelles. Ce n'est pas sans inconvénient pour sa santé générale que, pendant des semaines et des semaines, nous maintiendrous au lit ou confinée à la chambre une malade dont la congestion utérine reconnaît une cause extra-génitale; cette claustration finira même par amener des résultats fâcheux pour l'état de la matrice. Aussi Aran, les auteurs du Compendium, conseillaient avec juste raison le grand air, le soleil, un exercice modéré, des promenades en voiture, la marche lente et sans fatigue. Nons pouvons nous guider sur les sensations 'qu'éprouve la malade : la douleur provoquée par la station debout ou la marche, la réapparition des crises névralgiques. la venue d'un flux hémorrhagique abondant nous invitent à la remettre dans l'immobilité

Il convient d'agir sur l'intestin.

D'abord la constipation entretient l'hypérémie de tont le petit bassin, et en outre la dérivation provoquée par une purgation amène toujours une certaine détente au niveau de l'appareil sexuel. Il faut éviter les médicaments, comme l'aloès, qui fluxionnent le rectum. Le plus simple est d'ordonner un ou deux verres d'une eau minérale purgative; chez les viscéroptosiques avec entérite glaireuse un peu d'huile de ricin; chez les hépatiques ou les cardiaous une doss de calomel.

Dans l'intervalle, le soir de préférence, la malade garde un grand lavement chaud dont l'action directe sur la matrice se combine très bien avec celle des injections vagrinales.

A la rigueur on a recours à une irrigation rectale chaude comme le préconise Reclus.

Ici les inicctions aussi chaudes que la malade est capable de les supporter, demeurent les plus efficaces par l'influence qu'elles exercent sur la contractilité de la matrice et surtout des vaisseaux qui, à la longue, se laissent passivement dilater et ont besoin d'être excités pour revenir sur eux-mêmes ; d'autant qu'elles luttent encore contre les métrorrhagies. Aran, Gallard, employaient surtout l'eau froide ; pour éviter des phénomènes réactionnels allant à l'encontre du but proposé et pour maintenir et conserver la déplétion vasculaire, ils se voyaient obligés d'user de l'eau froide d'une manière longtemps prolongée. Je ne nie pas que, dans certains cas ce procédé ne conduise à des succès indiscutables. surtout à des périodes très avancées de la congestion chronique, alors que l'utérus engorgé est dur, difficile à stimuler. Mais on ne peut oublier one la congestion s'accompagne très voloutiers de manifestations névralgiques qui, à la longue, s'isolent dans le complexus symptomatique, prennent une sorte d'individualité, persisteut entic les paroxysmes fluxionuaires et que cette

congestion naît de préférence chez des neuro-arthritiques; je pense qu'il faut être très réservé, et bien choisir les cas pour ordonner l'eau froide longtemps continuée, alors que l'eau chaude, employée même indifféremment, ne nous expose pas aux mêmes inconvénients. Je reviendrai sur ces restrictions à propos du bain de siège à eau courante.

Il est difficile de maintenir des cataplasmes pendant des semaines, aussi beaucoup d'auteurs préferent-ils, non sans avantage, l'application répétée de vésicatoires volants, ou les budigeonnages de teinture d'iode. Une pratique facilement acceptée par les malades consiste à placer pendant la nuit sur le bas-ventre des compresses imbibées d'eaux-mères de Solies de Béarn ou de Biarritz puis exprimées et recouvertes de bandes de flanelle. Albert Robin expose plus loin les effets sédatifs de ces eaux-mères chlorurées-magnésiennes.

Les grands bains apportent à notre thérapeutique un appui des plus salutaires. Non les grands bains chauds qui sont excitants, mais les bains tièdes, d'un effet sédatif, qui calment les douleurs, relâchent les tissus, détendent la turgescence circulatoire et qui réussissent du reste dans nombre ue maladies aiguës des organes génitaux. Nous avons l'habitude, pour augmenter les propriétés sédatives, de faire cussoudre dans le bain 250 grammes de gélatine de Paris et 250 grammes de sous-carbonate de sonde. La malade en prendra au moins un tous les deux jours, si l'on craint qu'elle éprouve un peu d'affaiblissement par leur administraton quotidierns.

Dans les cas où la matrice ne présente pas de paroxysmes fluxionnaires très douloureux, où nous la voyons dégagée de complications névralgiques, alors que repen-

52

dant une congestion d'allure torpide persiste rebelle à tout traitement, nous pouvons chercher une aide, parfois très utile, dans l'usage des bains de siège frais à eau courante. Pris de courte durée, leur action deviendrait excitante et irait à l'encontre du but que nous nous proposons; pour qu'ils acquièrent des qualités défluxionnantes, hémostatiques et sédatives, leur durée doit être prolongee de dix à vingt minutes. Gallard a bien précisé les conditions de ces bains de siège à courant continu : il recommandait de placer la malade dans le bain préalablement rempli d'eau froide, puis d'ouvrir le courant pour que, de la sorte, elle ne ressente pas le choc d'arrivée : la réaction ne se produit pas et l'utérus se décongestionne. Il combinait le bain ainsi preserit avec la douche vaginale, et défendait d'ouvrir les pertuis latéraux de l'appareil avant d'avoir rempli le bain, pour éviter à la patiente la flagellation produite par les jets latéraux et dont l'effet n'est plus sédatif et antiphlogistique, mais stimulant et excitant.

Les émissions sanguines, qui ne sont pas contre-indiquées par les hémorrhagies, comme si judicieusement le remarquait Aran, comptent parmi les meilleurs procédés auxquels nous nous adressons. On les pratique dans la période intercalaire, ou bien quelques jours avant l'epoque menstruelle, si l'on craint que la venue des règles n'aggrave la situation en se surajoutant à l'état morbide. On place dix à douze sangsues sur l'hypog-stie, la région périndo-vulvaire, dans les aines, mieux six sangsues sur le col utérin à l'aide d'un spéculum plein, le spéculum de Fergusson par exemple. L'ennui de maintenir un certain temps la malade dans une position mal commode pour appliquer les sangsues sur le col, l'obligation de rester pour surveiller qu'une sangsue ne pénètre pas dans le canal, portent à préférer des scarifications, mais leur effet demeure loin d'être aussi efficace; à défaut des sangsues nous ne les critiquons pas.

Entre les émissions sanguines, une ou deux fois par semaine, on met en contact avec le col un tampon glycériné qui provoque une certaine transalation séreuse. Je pratique fort volontiers une sorte de petite columnisation qui consiste à entourer le col, aussi bien sur les côtés qu'au niveau de son orifice, par une série de nouets d'ouate hydrophile, imbibés de glycérine, qui le compriment légèrement; je les maintiens en place en finissant de remplir le vagin avec de la gaze stérilisée, mais je ne tasse pas comme dans la vraie columnisation.

Les applications locales d'alun, de tannin, de ratanhia, si préconisées autrefois, ne me paraissent rendre aucun service évident.

Dans quelques cas d'engorgement mou de l'utérus, j'ai vu autrefois un de mes maîtres obtenir de bons résultats par l'administration de pilules d'ergotine pendant des séries de six à huit jours qu'il espacait suffisamment.

Enfin nous devons songer à l'électricité, au massage, et surtout à l'hydrothérapie plus à la portée de tout le monde, qui régularise la circulation tout en stimulant le système nerveux.

Quelques symptômes par leur prédominance réclament parfois une médication qui s'adresse particulièrement à eux.

Les métrorrhagies cèdent habituellement aux injections d'eau très chaude et au besoin aux longues irrigation continues d'eau chaude. L'introduction délicate. jusqu'au niveau de l'orifice cervical, d'une gaze imbibée de sérum gélatiné suffit parfois à les arrêter. Si elles ont une tendance à se reproduire, pour venir en aide à ces moyens on preserit à l'intérieur le chlorure de calcium, les pilules d'ergotine et de digitale, l'extrait fluide d'hydrastis, etc., et surtout le sulfate de quinine (1). Ce dernier médicament est le remède par excellence des hémorrhagies fluxionnaires et névropathiques (Lance-teaux) et on l'ordonne è la dose de 0 gr. 50 à 1 gramme et 1 gr. 50. Mais souvenez-vous qu'une hémorrhagie modérée fournit parfois une détente aux accidents congestifs et qu'il ne faut pas se hâter de la combattie.

L'aménorrhée congestive réclame avant tout les émissions sanguines.

Les douleurs hypogastriques sont calmées par des lavements et des cataplamses laudanisés, par l'application sur le bas-ventre de compresses chaudes et mieux de sacs d'euu chaude qui réussissent encore bien et sont d'un emploi fort commode contre les douleurs lombaires qui accompagnent si souvent les souffrances pelviennes. Les pommades à la jusquiame et à la belladone apaisent les coliques utérines, comme les surpositoires à la belladone ou à la morphine. Contre les souffrances de nature névralgique, nous aurons recours tantôt aux vésientoires simples ou pansés à la morphine, tantôt aux applications de satieglate de méthyle ou du mélange suivant :

> Essence de Wintergreen... 5 grammes. Huile stérilisée...... 10

F. S. A. mixture. Recouvrez largement d'ouate et de taffetas gommé.

P. Dalché. — Le sulfate de quinine dans la thérapeutique utérine, Eulletin de la société de thérapeutique, 1900.

spécial.

Enfin le chloral, l'opium, le sullonal, procurent aux malades un sommeil nécessaire. Lorsque la congestion chronique arrive à la phase de selérose on continue à mettre en œuvre les mêmes procédés thérapeutiques, mais les chances de succès diminuent beaucoup; tout au plus parfois arrive-t-on à pallier les accidents les plus pénibles. Richelot conseille la dilatation pour ouvrir le col et ramollir son tissu afin d'amener une détente, et le curettage contre les végétations polypeuses de cette resende-métrits.

Mais, d'une façon générale, abstenez-vous de toute therapeutique intra-utérine, elle exagère les douleurs et n'apporte pas de modifications heureuses à l'état local. Le traitement hydro-minéral si important et si efficace sera exposé plus loin par Albert Robin dans un chapitre

Puberté. — A l'époque de la puberté la congestion utérine intervient à chaque instant dans les dysménorrhées, les sensations et douleurs pelviennes multiples, les poussées leucorrhéiques, et surtout dans les hémorrhagies génitales. Le mouvement fluxionnaire, si actif et si puissant à cette période de la vie, prédomine dans la pathogénie des accidents de l'appareil sexuel. Mais n'exagérous rien; je ne saurais trop le répéter, ne confondons pas ménorrhagie ou métrorrhagie de la puberté avec congestion utérine, cela nous entraînerait à une thérapeutique des plus vicieuses.

Cette congestion utérine est provoquée et entretenue par de nombreuses causes qui nous fournissent autant d'indications de traitement. Vous connaissez déjà les idées de Castan sur le rôle que jouent les noisons intestinaux et les poisons de l'organisme en général. Richelot trouve déjà chez certaines jeunes filles, à la puberté, la tare du neuro-authritisme : « Elles ont. dit-il, des règles difficiles, irrégulères, tantôt profuses, tantôt insignifiantes; la congestion menstruelle les fait terriblement souffrir et le flux catarrhal paraît suppléer à la médiocrité de l'écoulement sanguin. Elles sont nerveuses et peuvent même avoir des attaques d'hystéric. »

Tout ce que nous avons dit nous-mêmes à propos des Fausses utérines s'applique à la puberté; laissez-moi seulement vous signaler la congestion passive du rétrécissement mitral.

Mais tenez compte surtout du travail local qui accom-

pagne le développement, les modifications si grandes de l'utérus à cette époque ; voilà une importante cause, la plus importante, d'irais-je volontiers, qui appelle, localise et fixe la fluxion, même lorsque cette fluxion naît sous d'autres influences. Nous connaissons des asystolies localisées. il v a aussi des concestions localisées.

Parmi ces influences je ne puis m'empêcher de croire que la sécrétion interne de l'ovaire soit au premier rang. Exerce-t-elle une action générale toxique ou anti-toxique? Cela me paraît encore discutable. Il est bien plus probable que sa seule présence suffit à exciter des phénomènes vaso-dilatateurs au niveau de la matrice; une sécrétion exagérée ou irrégulière produit l'hypérémie et la fluxion, de même qu'une sécrétion supprimée ou diminuée conduit à l'aménorrhée. J'ai indiqué plus haut les conclusions qu'on peut tirer de cette hypothèse pour la pathogénie de certaines chloroses d'origine génitale les unes unécorbaciques les autres aménorbhécules les sures aménorbhécules les autres aménorbhécules des sures proceptions.

tale, les uncs ménorrhagiques, les autres aménorrhéiques. Je n'ai pas à revenir sur l'hygiène de la puberté pour permettre sans accidents cette transformation de l'appareil génital et de tout l'organisme.

Lorsque la congestion utérine est déclarée, ordonnez le repos à la jeune fille ; elle doit même garder le lit tant que les phénomènes douloureux ou hémorrhagiques se manifestent.

Je vous ai déjà exposé le traitement des métrorrhagies et des dysménorrhées pubérales. Contre la congestion elle-même, dans l'intervalle des époques, prescrivez les grands bains sédatifs à la gélatine de Paris et au sous-earbonate de soude, des lavements chauds à prendre et à garder le soir. Pendant la journée faites appliquer sur le bas-ventre une centure de fianclle, la nuit quelques compresses chaudes, au besoin des cataplasmes. Mais évitez toute médication interne, pas de remèdes dits fortifiants, ils sont inutiles, plutôt nuisibles, et troublent les fonctions digestives; si la jeune fille perd beaucoup, en n'est pas par anémie. Insistez plutôt sur les pratiques d'hydrothérapie.

Et surfout rassurez les familles ; il est encore assex area que les aecidents engestifs ne e'dent pas lorsqu'on a institué une hygiène et une thérapeutique judicieuses. Les phénomènes se reproduisent pendant plusieurs menstruations consécutives, mais lorsque la transformation de l'utérus et des ovaires est bien aehevée, les règles apparaissent normales. J'ai suivi plusieurs jeunes filles qui ont souffort de ces aecidents congestifs; lorsque la période de transformation pubérale a été teminée, leur état s'est toujours amélioré, quand il n'est pas devenu absolument régulier. Il faut que cette évolution se fasse dans les meilleures conditions possibles de calme et de bien-être. Ménopause. — A toutes les causes précitées joignes, à la ménopause, l'influence des poussées fluxionnaires qui, à cet âge de la vie, se portent sur tous les organes et en particulier sur la matrice au moment de la défaillance des fonctions ovariennes.

La médication révulsive et dérivative reconnaît ici une de ses meilleures indications. Purgations fréquentes, bains de pieds sinapisés, ventouses sèches appliquées sur les reins, le dos, etc., et surtout les émissions sanguines combinées ou alternant avec l'opothéropie ovarienne, calment fort bien les malades. Je vous ai longuement parlé de ces divers moyens et de leur emploi à propos de la ménopause.

TTT

CONGESTION MENSTRUELLE ET AFFECTIONS UTÉRO-ANNEXIELLES

Le plus grand nombre des maladies utéro-annexielles apporte des troubles à la venue des règles, et provoque, au moins par périodes, de la congestion menstruelle. Ces phénomènes congestifs à leur tour aggravent les lésions génitales préexistantes; nous savons en outre qu'ils contribuent à faire éclater des accidents inflammatoires même quand l'appareil sexuel était demeuré sain jusque-là.

Nous devous donc nous préoccuper un instant de cette variété de congestion menstruelle, puisqu'elle joue un rôle important dans l'évolution des suites de couches, métrites, déviations, fibrômes, tumeurs, salpingo-ovarites, etc., soit qu'elle les reconnaisse pour cause, ou au contraire, qu'elle se greffe sur leurs symptômes et les exaspère.

D'une façon générale cette congestion se traduit quelquefois par de l'aménorrhée ou de la dysménorrhée congestires au cours des phlegmasies utérines et péri-utérines, souvent par de la leucorrhée et des hémorrhayies, et toujours par des douleurs. La congestion qui accompagne les tumeurs entraîne presque toujours des hémorrhauies.

Plutôt que d'entrer dans des détails au sujet de l'aménorrhée et de la dysménorrhée congestives, etc., dont vous connaissez le traitement, prenons plusieurs exemples.

Métrite. — « Chaque époque menstruelle, dit Bennett, aggrave presque invariablement l'état de la malade, et exaspère tous les symptômes. Le poids de l'utérus augmente, les déplacements s'exagèrent; j'ai même vu des cas où les déplacements, surtout la rétroversion, n'existaient que pendant les règles. Les douleurs utérines, ovariennes ou autres s'exaspèrent. Quant au flux cataménial, il est généralement; mais non toujours, moins abondant et irrégulier, dure plusieurs jours, cesse puis reparaît. Le sang s'écoule en caillots dont la sortie est précédée de coliques. Quand les règles ont cessé, l'utérus reste congestionné et gorgé de sang. »

Aussi dans la période interealaire, il ne survient pas de détente, métrite et congestion n'ont aueune tendance à rétrocéder.

Repos, bains sédatifs, irrigations chaudes, compresses avec des eaux-mères de Salies-de-Béarn ou de Binritz. compresses échauffantes, tampons glycérinés surtout, etc., vous mettez en œuvre tous les moyens thérapeutiques déjà énumérés contre la congestion utérine. Mais c'est ici que domine l'indication des émissions sanguines. Bennet les conseillait après les règles, Gallard les pratiquait un peu avant la venue des règles sous forme de sangsues appliquées sur le col, et je dois dire que j'ai vuette méthode lui fournir d'excellents résultats; de la sorte la fluxion menstruelle trouve un organe dégorgé et les phénomènes cataméniaux s'accomplissent d'une façon plus normale. Après les règles, et dans leur intervalle si la matrice reste molle et engorgée, on peut prescrire pendant quelques jours des piultes d'exposine et poser sur l'hypogastre un ou plusieurs vésicatoires volants. C'est encore dans ces cas que l'on doit envisager l'opportunité du bain de siège frais à cen courente.

Rétrodéviations. — La congestion utérine, par les modifications qu'elle apporte à la texture de l'organe, contribue à favoriser la production des déplacements. Mais, de plus, dans les rétrodéviations, et en particulier dans les rétroflexions, il arrive que la partie postérieure du corps utérin présente un état de congestion chronique, entretenu par la position vicieuse de l'organe et les troubles circulatoires qui en résultent; cet état est exaspéré à chaque poussée menstruelle, il en résulte une dysmémor-rhée des plus pénibles, la production de caillots dont l'expulsion produit des coliques et enfin des hémorrhagies à répétition fort tenaces. Eu tout temps le toucher du corps dans le cul de sac postérieur éveille une vive sousibilité.

Il faut être prévenu de cette complication possible, car je l'ai vu confondre avec de la phlegmasie rétro-utérine, paramétrite, adhérences douloureuses, etc. D'autre part elle ne contre-indique ni le redressement de la matrice, ni le port d'un pessaire, au contraire ces deux moyens contribuent à dissiper les accidents. Par excès de prudence je pratique d'abord le redressement manuel en soutenant les premiers jours l'utéros au moyen de tampons d'ouate, ce qui n'empêche pas de mettre en œuvre la médication sédative. Les lavements chauds en particulier produisent de hons effets dans cette circonstance, et on recommande à la malade de se coucher quelques minutes sur le ventre après avoir pris le lavement.

Ovarites. — Les ovarites chroniques retentissent souvent sur la matrice et provoquent à son niveau des phénomènes d'hypérémie.

C'est un des cas, où à la médication habituelle on peut associer le plus volontiers, les préparations d'ergotine, de sultate de quinine, de poudre de feuilles de digitale, etc., ou bien encore l'hydrastis canadensis ; en cas de résultats insuffisants on s'adresse à l'hamanelis virginica, au canabis indica, au viburnum prunifolium, au gossypium herbaceum, dont je vous ai exposé la posologie.

N'oubliez pas que dans un assez grand nombre d'observations, les phénomènes douloureux et hémorrhagiques ont été amendés au moyen de l'opothérapie ovarienne.

IV

CONGESTION UTÉRINE DE LA PÉRIODE INTER-MENSTRUELLE

La congestion menstruelle, vous le savez, persiste souvent après la terminaison des règles et va rejoindre la prochaine époque cataméniale. Mais de plus, toute la série des causes citées, utérines et extra-utérines, est susceptible, à un moment donné, de faire éclater des phénomènes congestifs au niveau de la matrice, en dehors de toute influence menstruelle. Nous avons déjà décrit es phénomènes à propos des Fausses utérines, de leurs hémorrhagies, de leurs douleurs pelviennes, de leurs cises leucorrhéiques, etc., il en est de même cèce les vériebles utérines.

Le plus souvent, dans ces cas, il s'agit d'une rechute qui survient d'une manière inopinée, et l'explosion des accidents en dehors des règles implique une certaine gravité de la maladie, pour qu'elle se constitue ainsi de toutes pières en dehors de la fluxion normale.

Aussi la thérapeutique doit-elle être vigilante, pour éviter le passage de l'affection à l'état chronique. Après les moyens habituels, après le massage, l'électricité, songez à toutes les ressources que nous offre l'hydrothérapie, et surtout le traitement hydro-minéral.

REVUE DE THÉRAPEUTIQUE ÉTRANGÈRE

Par le D' Léon LEBOVET (de Carsibad).

Sur les questions controversées relatives au traitement de la pneumonie.

Par le Professeur A. Buchwald (de Breslau).

Dans une séance récente de la Société médicale de Breslau, le professeur Buchwald a fait une très intéressante communication sur le sujet en question. L'auteur donne, tout d'abord, un coup d'œil sur les différentes formes de la pneumonie,

notamment sur la forme asthénique de Leichtenstern, sur les nombreuses sous-divisions faites par Finkler, aussi bien que sur les formes atypiques de différents auteurs, comme celles de Aufrecht, etc. Les résultats des recherches bactériologiques relatives à la pneumonie sont aujourd'hui généralement reconnus, mais M. Buchwald combat l'opinion de Jürgensen, d'après laquelle nous aurions affaire, dans le eas de la pneumonie eroupeuse à une infection générale et que des mesures de désinfection seraient indispensables à cet égard. Bien que maintes épidémies domestiques de pneumonie aient le earactère d'une maladie infectieuse, il n'en est pourtant pas de même quant au grand nombre des pneumonies qui sont observées dans les hôpitaux. M. Buchwald accepte les prescriptions diététiques générales des différents auteurs, mais il fait remarquer que lorsque la pneumonie a atteint son plus haut degré, aussi bien que dans le stadium de la résolution il n'est plus guère possible aux malades de réagir, à cause du callapsus qui survient souvent dans des eas pareils.

Etant donné le fait que nous ne possédons pas encore un remède spécifique contre la pneumonie et que la sérmuthé-rapie (Maragliano, etc.) n'a pas non plus donné de résultats satisfaisants jusqu'ici, nous sommes obligés de recourir à un traitement symptomatique, et, dans plus d'un cas méme, à un traitement purement expectatif. Comme le danger menace particulièrement de la part de l'appareil eireulatoire, il faut diriger la plus grande attention sur l'action du ceur et sur le pouls. Tous les remèdes qui affaibilissent l'action cardiaque sont décestables. Aussi ne doit-on pas ajourner l'usage des remèdes cardiaques jusqu'au moment d'urgence et il est préférable de commencer la médication à une date plus récents.

En dehors des stimulants diététiques, comme le thé, le eafé, le vin, etc., l'auteur préconise avant tout le sel double de la eaféine : dans les cas d'urgence il considère les injections de eamphre et de paraffine liquide comme la meilleure méthode.

Dans la plupart des eas l'auteur n'en prescrit pourtant pas
plus d'un gramme par jour aux adultes. M. Buchwald déteste l'usage de l'éther, d'abord à cause des douleurs qu'il
produit, puis à cause du danger de gangrine entanée et de la
paralysie des nerfs qu'on observe parfois après les injections
d'éther. L'usage interne du eamphre donne origine à des
hémorrhagies stomacales, plus ou moins intenses. L'auteur
preserti le bemoate de caféine et de sodium, ou bien le salicylate de caféine et de sodium dans la proportion de
2 grammes pour 100 grammes d'eau; à en prendre toutes les
deux heures une cuillerée à thé.

L'auteur attire l'attention sur le danger de quelques médicaments usités auparavant, comme la vératrine, la pilocarpiue, le tartrate d'antimoine et l'apomorphine.

M. Buchwald donne ensuite un apercu historique relatif a l'usage de la saignée, rappelle les erreurs de Broussais et de Bouillaud qui avaient recommandé la saignée, coup sur coup, et dans des quantités excessivement grandes, et montre, en s'appuyant sur le travail magistral de G. Sée, comment la saignée abaisse la pression sanguine, augmente le dierotisme, diminue la rapidité de la circulation (Wolkmann), amène l'hydrémie, altère les cellules sanguines, diminue la quantité de l'hémoglobine et exerce ainsi un effet nocif sur la respiration : la saignée produit surtout des troubles graves de la nutrition. La saignée est inutile parce qu'elle n'éloigne pas la cause de la maladie (le « quid ? » inconnu dHippoerate) et paree qu'elle ne décharge pas non plus la circulation d'une manière suffisante. La saignée est un remède affaiblissant du cœur, qui n'est d'aueune utilité même dans les eas d'œdème pulmonaire initial et de « pulsus suppressus ». Tout au plus on pourrait y recourir dans ees derniers cas rares, avec l'usage simultané des stimulants (camphre) et des infusions de sérum artificiel : mais la saignée devrait être pratiquée alors, dans ees eas, d'une manière modérée,

Le professenr Buchwald ne voudrait aueunement renoncer à l'usage de l'alcool. Il est indifférent pour lui de savoir si l'on doit considérer l'alcool comme un médicament d'épargne. ou comme source de chalcur, ou comme un stimulant. L'usage de l'aleool est indispensable pour les aleooliques et les malades affaiblis. Les malades que l'on traite par les bains froids ne peuvent pas se passer de l'aleool (Jürgensen). Il fant avoir vu, dit l'auteur, comment l'alcool, le champagne, etc., raniment les malades affaiblis, pour le considérer comme un remède ; il ne faut pourtant pas suivre l'opinion de Todd qui preserit 500 grammes de cognac par jour. L'auteur s'associe pourtant à l'opinion de Jürgensen, Les hommes bien portants et les malades se comportent différemment vis-à-vis de l'usage de l'alcool. Aufrecht et d'autres auteurs détestent l'aleool. Les déductions théoriques ne sont d'aneune stilité à cet égard ; c'est seulement l'expérience ; ou bien les recherches expérimentales de l'avenir qui pourront décider l'affaire.

Quant aux beins, M. Buchweild désire les restreindre au minimum; il ne partage pas à cet égard l'opinion de Jürgensen. Si l'on désire recourir à l'asage de l'eau, on p-ut tout au plus se servir de mesures hydrothérapiques modéries, comme les lavages froids. Les empaquettements, etc.

On ne saurait décider à présent si les opinions de Marchand et de Lassar sont justes, à savoir que le traitement avec les bains retarde la résolution de la pneumonie.

Les opinions des auteurs sont très variables sur la question de l'uasqué de la digitale. Est-telle un tonique cardinque ou un poison du cœur! Il faut d'abord prendre en considération qu'il y a différentes espèces de digitale et qu'en debors de cela les différentes, préparations de la digitale, telles que la pondre, l'infusion et la teinture de la digitale (alcolique ou chérée) ne possèdent pas la même valeur. Quant anx digitaline, digitaleine et digitoxine, on n'a pas encore pratiqu'en des recherches exates à ce suiet. L'auteur est d'oniniu au'en ne devrait pas preserire la digitale aux malades qui ne se trouvent pas sous le contrôle permanent du médecin, puisque l'effet cumulatif est extraordinairement grand. La digitale qui est considérée comme un tonique du cœur peut tout à coup devenir un poisson cardiaque.

M. Buchwald est d'avis que la digitale ne devrait être employée que chez les cardiaques qui sont atteints de pneumonie, mais que dans les autres cas de pneumonie son usage doit être proserii.

L'auteur fait remarquer que Petreceü qui est le partisan le plus enthousiamé de l'usage de la digitale dans la pueumonie, en a preserit jusqu'à 4 grammes par jour : Il est allé jusqu'à l'intoxication, car ses malades furent atteints de comissement ; leur visage devint pâle et froid; la pression sanguine s'était abaissée ; il y avait ralentissement du pouls, de l'arythmie, et la respiration fut accélérée, et les mulades se trouvaient dans un état de grande faiblesse, c'est-à-dire qu'il s'agissait dans les cas de Petreseä d'un collapsus provoqué! La mortalité dans ses cas était, en effe, petite, mais il faut prendre en considération qu'il avait affaire à des individus des plus robustes, à des soddats.

La plupart des auteurs, tels que Gerhardt, Talamon, Höpfel, etc., repoussent l'usage de la digitale tout à fait et ne lui attribuent qu'une valeur inférieure. M. Buchwald ne fait pas usage de la digitale dans les eas de pneumonie.

D'après M. Buchwald, on n'est pas en général obligé de recourir aux antipyrétiques dans le traitement de la pneumoine, puisque la fièvre atteint rarement des degrés excessivement grands, et paree que sa durée n'est pas assex longue. Il proseri la thalline, la kafrine, l'antifévrine; on peut se passer des salicylates et de l'antipyrine, qui du reste ne sont pas exempts de danger. Si l'on désire employer un médicament interne, on si l'on se trouve obligé d'y recaurir, il unt choisir le chlorhydrate de quinine, ou bien, selon Anfrecta, le tannate neutre de quinine, mais il vaut mieux

ne pas y ajouter l'oxyde de fer. On ne doit pourtant pas non plus preserire de grandes dosses de quinine, à cause du collapsus qui pourrait survenir, notamment pendant la période de la résolution critique de la maladie. Jürgensen recommande à peu près 2 grammes de quinine par jour pour des adultes. Au service de l'auteur la quinine fat dans la plupart des eas preserite à des dosses moins élerées.

Quant aux expectorants, on peut employer le sénéga, le chlorure d'ammonium, la liqueur d'ammoniaque anisée; l'auteur préfère en général une solution qui est composée de la manière suivante : 1 à 2 grammes d'iodure d'ammonium; 2 à 4 grammes de liqueur d'ammoniaque anisée sur 200 grammes d'eau. Il n'a pas observé de conséquences fáchouses après l'usage de l'iodure d'ammonium.

En ec qui concerne les sédatifs, le professeur Buchweid se sort de préférence de la poudre do Dower, et dans les cas de délire il fait usage do la paraldéhyde. Celle-ci est aussi employée par le docteur Hahn dans la maison des aliénés de Breslau.

L'hydrate de chloral ne saurait être recommandé à cause de son effet fâcheux sur le cœur.

REVUE DES TRAVAUX FRANÇAIS ET ÉTRANGERS

Médecine générale

Traitement de l'alcoolisme aigu par de hantes dones de digitales (Journ. of. Amer. med. Assoc., et Courrier méd., octobre 1900). — M. Loomis tire de son étudo les eonclusions suivantes:

1º L'emploi de hantes doses de digitale dans l'aleoolisme aigu est dangereux; 2º Les cas où l'on peut donner ce médicament sont ceux où le malade est robusto, jeune, où il n'y a pas de complications et où le délire est violent. Les résultats, seront très favorables. Les malades redeviennent calmes, ont un sommeil comme on n'en obtient par aucun traitement;

3º Si, après l'administration de treis doses, on ne constate pas d'effet narcotiquo, il ne faut pas continner;

 $4^{\rm o}$ Le médicament ne répond pas à l'attente dans les cas d'alcoolisme chronique, à un âge moyen ou avancé, chez des sujets anémiques, eachectiques ;

5º Quand les malades s'éveillaient de leur sommeil, ils étaient en un si bou état qu'ils pouvaient quitter l'hôpital, e'est là un fait à remarquer, car la convalescence demande habituellement deux ou trois iours.

L'eau exgénée centre l'épitaxis. (Rifaux, Sen. méd., nov. 1900). — Un certain nombre de chirurgiens qui ment couramment de l'eau oxygénée pour le lavage et le pansement des phies ont eu l'occasion de constater que ce liquide, en plus de son action antisoptique, est doné d'un pouvoir hémostatique. considérable. C'est ainsi que M. le docteur Rifaux (de Chalon-sur-Sañoe) a pu se couvaincer récemment que le peroxyde d'hydrogène est le médicament de choix de l'épistaxis. Il suffirait d'introduire dans la fosse masale d'où provient l'hiemorrhagie un tampon d'ouste imbibé d'eau oxygénée pour tarir les écoulements sanguins, même les plus graves.

L'invetropine dans les eystites. — Berthold Goldberg, de Cologne, public un intéressant article sur ce sujet (Centralist, f. Inn. Medic., 14 juillet 1900). Jusqu'à présent, tous les auteurs ont été unanimes à louer l'invotropine et à vanter les résultats obtenus dans différentes affections. Dernièrement, Grosglik, de Cracovie, est venu jeter une note discondante dans ce concert d'éloges. D'apres cet auteur (Nitzedante dans ce concert d'éloges. D'apres cet auteur (Nitzedante)

Oberlander's Centrabilatt., t. XI, nº 5, p. 236, l'unotropine ne posséderait aucune actiou utile dans les processus infectieux des voies uriusires; dans les affections chroniques, le médicament serait inutile. Cet auteur polonais appuie son dire sur 128 observations par lui réunies.

D'autre part, Nicolaier, le promoteur de l'urstropine dans la clinique, s'écrie (Zritorh, f. Klin. Medic., n° XXXVIII, p. 57): « L'urotropine est un remede utile dans les affections des voies urinaires, de quelque nature qu'elles soient. » Devant ces résultats contradictoires, l'auteur s'est décidé à expérimenter lui-même l'urotropine. Son expérience porte sur 60 cas.

Il a traité 6 cas de diathèse urique; mais il ne put suivre longtemps que deux malades atteints de cette affection, si bien que les résultats obtenus par lui ne peuvent avoir aucuno valeur sur ce point. Il eut à traiter 6 phosphaturiques, dont 2 furent favorablement influencès, en ce sens que pendant la duréa de la médiention. Les uripes étaient claives

Des recherches de l'auteur sur le traitement de la cystite, il ressort qu'une légère infection due à la gonorrhée est très améliorée par l'urotropine; le médicament est très utile si la cystite est occasionnée par des bactères qui l'euvalissent, si la cystite est primaire. Si au contraire la cystite u'est que secondaire, si elle est consécutive à une affection des reins, à une affection de prostate, etc., si en un mot elle n'est qu'un symptôme dans l'affectien dominante, l'auteur considère que l'urotropine ne peut rendre aucun service.

Tel n'est pas l'avis d'un médecin anglais Drake Brockman (30 juin, Lancet, 1900), qui considère l'urotropine comme un désinfectant des voies urinaires fort précienx. Cet auteur donne l'urotropine à tous les malades chez lesquels il doit pratiquer une opération sur les voies urinaires. Il rend ainsi l'urine aseptique. Il attire également l'attelhtion des praticiens sur ce point qu'il est utile, dans les cas de typhus, de

rendre la vessie aseptique. On obtient aisément ce résultat en donnant l'urotropine.

En ce qui concerne l'utilisation de l'urotropine comme dissolvant de l'acide urique, l'auteur considère également le remêde comme très utile. Il a obtonu de bons résultats dans des cas de goutte, de gravelle et de diathèse urique. Ses expériences in ritro ainsi que son expérience clinique lui permettent d'affirmer que l'urotropine peut rendre de grands services dans les cas où l'on veut empêcher la production de calculs. Bien entendu, le médicament n'empêchera pas la lithotritio ou la taille, mais il diminuera peut-être les occasions d'utiliser ces opérations. L'auteur se proposo d'ailleurs d'utiliser l'urotropino aux Indes. On sait combien est fréquent en ces contrées la production des calculs dans la vessie. Le Dr Brockmann termine son intéressante étude en constatant combien large est le champ d'opérations que l'on peut effectuer avec l'urotropine. Ce médicament ost peut-être trop peu connu; on ne peut que s'associer aux vœux de l'auteur anglais, qui désirerait voir les observations so multiplier sur ce suiet.

Maladies des enfants

Traitement de la broncho-pacumonie des cufants par les bains sianplèss. — Cette thérapeutique préconisée tout particulièrement par M. Lemoine (de Lille), a été employée avec un plein succés par M. Caillard (Bul. de la Soc. de méd. de lu Rochelle). Tous ses petits malades ont guéri rapidement. Le nombre des bains a été le plus souvent de un par heure au début, avec 250 grammes de farino de montarde pour chacun, un toutes les deux ou trois heures quand l'amélioration se moutrait

Los parents ont accepté d'autant plus facilement cette méthode que, dès le premier bain, ils pouvaient constater du mieux. Une des malades avait eu trois violentes poussées successives à quelques jours d'intervalle : à chaque fois, on reprit le traitement avec la même rigueur, et l'enfant a guéri.

En général, quarante-huit heures après le début du traitement, la bronche-pneumonie était enrayée : la température devonait raisounable, l'essoufflement se calmait, le bébé s'intéressnit de nouveau à ses jouets.

Aux bains, M. Caillard adjoignait une potion tonique à la caféine et des granules de brueino.

La guérison survenait dans les huit jours.

Gynécologie et obstétrique

De la rétention des membranes après l'accouchement.— Des accidents septiques parfois très graves, quelles que soient les précautions prises, peuvent résulter de la rétention totale ou partielle de membranes ou de simples débris membraneux arrès la délivrance.

Cotto opinion est basée sur une statistique de 142 cas obserées par M. Maygrier (Obstérique du 15 octobre 1900), aussi cet accoucleur estime qu'il ne faut jamais laisser-séjourner-dos mombranes ou débris membraneux dans l'utérus, l'extraction immédiate devant étre pratique dans la grande majorité des cas. Toutes les fois que M. Maygrier a ainsi procédé, il u'a iamais eu d'accidents à déplorer.

Le meilleur mode d'intervention est l'écouvillonnage de la cavité utérine, qui permet bien plus facilement que la main d'extraire les lambeaux adhérents.

Quand la rétention s'accompagne d'accidents, le traitement par excellence est le curage digital et l'écouvillonnage; en cas d'échec, on doit recourir au curettage instrumontal.

l'hystérectomie totale, dernière ressource, ne doit être pratiquée que si on est certain que l'infection est strictement localisée à l'utérus.

Maladies de la peau.

Traitement des verrues planes juvéniles par l'acide salicylique. — L'acide salicylique a fait depuis longtemps ses preuves dans le traitement des éruptions verruqueuses.

Il est actuellement empleyé dans le service de M. Gaucher sous forme de pommade au 1/30 ou au 1/40. On ordonne au malade d'aveir, teutes les nuits, à enduire de cette pommade les téguments où siègent les verrues.

On peut se servir de la formule suivante :

Acide salicylique	. 1 gramme.
Précipité blane	 5 grammes
Vaseline	10

La peumade à l'acide pyregallique est certainement plus active, mais elle présente deux incenvénients graves : elle tache le linge et elle est textique; il s'ensuit que, surteut chez les enfants, il faut d'aberd recourir aux préparatiens salicylées, et, en cas d'insucés seulement, preserire l'acide pyrogallique au 1/10 ou au 1/20 suivant les cas

Cure rapide des ampoules du pied. (Semaine médicale, septembre 1900.) — D'après M. le docteur H. Ward (de Louires), le meilleur traitement des gresses phiyotenes preduties par la marche consiste à exciser complètement aux ciseaux, les tissus épidermiques seulevés par l'épanchement séreux, à asséclier ensuite seigneusement la surface dénudée et à y appliquer plusieurs ceuches de colledion salicylé. On recouvre avec une rondelle de toile dépassant les berds de la parte de substance et fixée au meyen de quelques neuvelles couches de collodion salicylé. A-t-en affaire à des vé-i-culve conduse, il est mécassaire de renouveler ce paussement des qu'il commence à se détacher, ce qui se produit au bout de deux à treis ieurs. Le contact de l'etter avec la haie produit au bout de deux à treis ieurs. Le contact de l'etter avec la haie produit en louir de deux à treis ieurs. Le contact de l'etter avec la haie produit en louir de deux à treis ieurs. Le contact de l'etter avec la haie produit en louir de deux à treis ieurs. Le contact de l'etter avec la haie produit en louir de deux à treis ieurs. Le contact de l'etter avec la haie produit en louir de la contact de l'etter avec la haie produit en louir de leux à treis ieurs. Le contact de l'etter avec la haie produit en louir de leux à treis ieurs. Le contact de l'etter avec la haie produit en louir de leux à treis ieurs. Le contact de l'etter avec la haie produit en leur de leux à treis que le leur de leux à treis que le leur de leux de leux à treis de leur de leux à treis de leur de leux à treis de leur de leur

voque une légère sensation douloureuse, passagère d'silleurs, mais le pansement une fois en place, le patient peut continuer à marcher sans éprovere de gêne ni de douleurs. Lorsqu'on se trouve en présence d'une ampoule fortement irritée et témorrhagique, il est bon, avant d'instituer le traitement ci-dessus décrit, de calmer les phénomènes inflammatoires à l'aide de simples lotions antiseptiques continuès pendant un ou deux jours.

Maladies vénériennes.

Traitement de la blemorragie par le citrate de blemuth.

— Bu constant les heureux résultats obtenus par l'emploi
des sels d'argent, tels que le nitrate, le citrate, le protargol,
etc., dans le traitement de la blemorragie urétrale, M. Balzede
médecin de l'hôpital Saint-Louis, et M. Leroy, interne de
liôpitaux, ont pensé que d'autres sels métalliques solubles
pouvaient posséder des prorriétés comparables.

Dans cet ordre d'iddes, ils ont essayé un sel soluble de bismuth, le citrate, qu'ils ont employé en lavages urdrau, d'après la méthode de Janet, en débatant par une solution à 1 pour 2000 pour arriver dès le troisième lavage à une solution de 1 pour 500.

Ils ont constaté que dans tous les cas de blennorragie traités pendant la période aigué, le citrate de bismuth employé seul a été suffisant à procurer la guérison. Il ne donnait qu'une amélioration passagère, cossant peu d'heures après le lavaze.

Par contre, au déclin de la blennorragie urétrale, lorsque les gonocoques ont perdu de leur virulence, et que la muqueuse urétrale a eu le temps de réagir contre l'infection, il a suffi, dans tous les cas traités, de quelques irrigations pour amener la guérison rapidement.

C'est donc seulement pour ces derniers cas que MM. Balzer et Leroy recommandent les lavages au citrate de bismuth. Ils ont l'avantage de n'être pas irritants, mais, il faut le reconnaître, ils ne donnent pas de résultats supérieurs à ceux que procurent le permanganate de potasse ou les sels d'argent à doses faibles.

Maladies du larynx, du nez et des oreilles.

Le eyanure de mercure contre la rhinite fibrincuse. (Semaine médicale, septembre 1900.) - Comme l'a montré l'expérience de ces dernières années, la rhinite fibrineuse est assez fréquente chez les petits enfants. Cette affection qui se distingue cliniquement de la diphtérie par l'absence de fièvre et de tout écoulement purulent ou fétide, se traduit par l'apparition, sur les cornets inférieurs et moveus, sur la cleisen et parfois aussi sur le plancher nasal, de fausses membranes gélatineuses blanc grisûtre, très adhérentes et qui, en déterminant une occlusion complète du nez, empêchent le nourrisson de têter. Les moyens empleyes jusqu'ici pour combattre la rhinite fibrineuse n'ayant guére donné de résultats favorables, neus crovons ben de signaler que M. le decteur F. Peltesolm (de Berlin) a réussi à guérir très rapidement 12 cas de cette affection, au moven de tampons d'ouate imbibés d'une solution de cyanure de mercure à 4 0/m qu'on intreduit alternativement dans chaque narine et qu'on laisse en place pendant une lieure; pour la nuit, on tamponne à demeure une des fosses nasales. On voit bientôt, à la suite de ces applications, les fausses membranes se détacher et le nez redevenir perméable.

FORMULAIRE

Contre l'agrypine.

Extrait de belladone. da 25 centigr. de cannabis indica da 25 centigr. de sodium da 15 gr. llydrate do chloral da 15 gr. Sirop simple 100 —

A prendre le soir une à deux cuillerées à café. (Centralbl. f. Therapie.)

Teinture contre la dysenterle et les diarrhées d'origine diverse,

(M. GELPKE)

Ecorce de racine de grenadier . . / na 10 gr

Mèlez.

Faites macérer pendant vingt heures dans :

Eau-de-vie blanche. 750 gr.

F. S. Λ . — Λ prendre : de 6 à 8 cuillerées à bouche (à café ou à dessert chez les enfants, suivant l'âge) dans les vingt-quatre heures.

Cetto médication serait, d'après M. Gelpke (de Java), un moyen absolument sûr contre la dysenterie qu'elle guérirait en quatre à huit jours, même dans les cas les plus rebelles. Elle agirait aussi plus rapidement que les antres moyens dans les diarricées simples d'origine diverse, surtout dans les diarriches simplies et assivales.

L'Administrateur-Gérant: O. DOIN.



Le monocle de Néron dan de l'audis. — L'impôt sur les célibataires. — Ivresse et météorologie. — Feux de cheminées et suffure de carbone. — Prix moyen de la journée d'un malade. — Le service d'analyse et de chimie appliquée à l'hygiène de l'Institut Pasteur — La vie sans mérorbes. — Un sanatorium pour lépreux.

Il semblerati, d'après les historiens, que Neron, dont les yeux étaient bleus, avait la vue basse; qu'il assistait aux combats des gladiateurs du faite de l'avant-secine du cirque et que dans ces circonstances il se servait d'une émeraude. A quoi his servait ecté meraude? Avait-elle une forme concave et corrigeait-elle une myopie de l'empereur? On l'a prétendu. Cela ne parait pas probable à M. Pansier. D'après lui, Neron n'aurait employé cette émeraude verte que par genne et comme monocle, ou plutôt comme topique ayant une action adoucissante sur la vue. On sait quo de nos jours on a recours aux verres finnés pour atténuer l'effet des rayons du soleil et que jadis le scarabée vert jouissait d'une semblable vertu.

* .

L'État de l'ensylvanie a une loi pour l'encouragement au mariage. Elle édicte que tont citoyen mâle, âgé de plus de quarante ans, voulant rester édibataire, devra solliciter une dispense de mariage et payer un droit de 500 francs. Los sommes ainsi renceillies, serviront à l'entretieu d'une maison de vieilles filles au-dessus de quarante ans, qui n'auront pas eu une occasion favorable de se marier ou n'auront pas été demandées en mariage. En outre, tout homme, âgé de plus

de quarante ans qui prendra feunme en dehors de l'État de Pensylvanie, devra payer une amende de 500 francs pour l'offense aiusi faite aux jeunes filles de l'État!

. . .

Le froid et le claud, le see et l'humide, ont-ils une influence quelconque sur la manifestation de l'ivresse? Cela ne parait pas douteux à M. Dexter. Ce savant Américain aurait vu, en examinant la courbe des arrestations pour ivresse pendant une année, que l'alcoolisme exerce beaucoup plus de razge en hiver qu'en été. C'ette même courbe appliquée à la température donnerait cette indication que l'ivrognerie diminue à messarq que la température monte.

Le ministre de l'Instruction publique a transmis à l'Académie de médecine une sorte de consultation émanant du colonel du régiment des sapueurs-pompiers de Paris et résumant les diverses messures à prendre pour combattre aves succés, au moyen du sulfure de carbone, les feux de chenindos. Le ministre pense que sa vulgarisation dans les écoles peut être appelée à rendre de grands services dans la pratique. M. Trosta fait observer que l'emploi de cette substance, laissée entre les mains du public et d'enfants surtout, neut avoir des invonvénients.

: * :

Il est intéressant de savoir à combien s'élève le prix moyen de la jeurnée pour un malade dans les hôpitaux et hospiecs. Le calcul vient d'être fait :

Les dépenses imputables à chaque malade sont les suivantes : administration, 0 fr. 08; entretien des bâtiments, 0 fr. 17; traifement 1 fr. 16; nourriture, 1 fr. 20, chauffage et éclairage, 0 fr. 32; matériel, 0 fr. 54; frais accessoires, 0 fr. 23; total, 3 fr. 70.

Si l'on considère qu'une l'amille n'a nécessairement pas de

BULLETIN 835

frais d'administration, mais a par contre un loyer supérieur à la part imputable de ce chef à un malade d'hiopital, on peut estimer que les Sociétés de secours mutuols qui ne distribuent quo 3 francs à leurs adhérents malades sont au-dessous de la movenne nécessaire.

٠**

Récomment a eu lieu le premier hanquet de l'Association des dièves du nouveau service d'analyse et de chimio appliquée à l'hygiène de l'Institut l'Astenr, sous la présidence de M. Trillat, chef de ce service. Après les toasts d'usage, M. Trillat a exposé le but de l'organisation de ce nouveau service, comment les industries chimiques françaises, particifèrement les industries pharmacentiques et alimentaires, si importantes dans notre pays, pourront en tirer parti. Il a annoncé que, grâce à divers appuis, entre autres à celui de la Chambre de commerce de Paris, deux missions d'étude à l'étranger partiront rette année, missions dont la scionce comme l'industrie profiteront.

~ *

Peut-on vivre en dehors de toute intervention microbienne? Nuttal, Thierfelder, Schottelius et d'autres ont répondu par l'affirmative. Il a paru intéressant à M. Guillemonat de rechercher quelles modifications subit l'organismo adulte quand on lo place dans des conditions, relativement au tuoins, aseptiques : aliments stérilisés, air respiré filtré, cages a fermetures hydrauliques, à parois pleines flambées,.. Avant fait denx lots de 29 animaux chacun, il a vu que le premier soumis à la vie asentique donnait une proportion de 22 morts au bout de six à dix jours, taudis que le deuxième. vivant dans les conditions ordinaires tout en recevant, comme le précédont, une alimentation légèrement insuffisante, n'avait pour le même laps do temps que 11 pertes. En outre, l'amaigrissemont était plus accusé chez les premiers que chez les seconds, ils étaient également plus sensibles aux inoculations virulentos qu'on pouvait leur faire. Aussi l'auteur conelut-il dans la note récemment présentée à l'Académic des seiences que si on supprimo tout apport microbien en stérilisant l'au respiré, les atiments, les milieux, on abaisse la résistance de l'économie. On peut donc dire qu'à côté des mauvais il v. ade bons microbes!

. * .

La lepre ne serait pas si rare en France qu'en se plait à le croire, puisque l'idée est venue à dom Santon, bénédictin et doeteur en médecine, de proposer l'installation d'un sanntorium privé pour lépreux dans la commune de Ronceau, près Neufchâteau. Mais il fallait compter avec le Conseil municipal et le maire de la localité, le préfet du département et la population qui ont élèvé protestations sur protestations, si bien que le ministre de l'Intérieur, lui-nême, a été saisi et qu'il a posé à l'Académie de médecine ces deux questions : le y a-t-il utilité à instituer en France une léproserie; 2° est le feroserie, si elle était instituée, constituernit-elle un danger de contamination pour les populations environnantes?

M. Besnier, chargó d'y répondre, après avoir prouvé que la France n'est pas indenne de la lepre puisque dans le service de M. Hallopeau on compto 14 lépreux en truitement, alors qu'il y a une trentaine d'années encoror on et peut-être été bien embarrassé pour faire voir dans nos hópitaux un eas authentique, déclaro que la lépre, sans toutefois être devenue un péril, est incontestablement en augmentation dans notre pays, aussi est-il d'avis que l'utilité de sanatorium n'est pas contestable. Mais il est nécessaire que ces sailes soient l'objet d'une surveillance rigoureuse et réservés au traitement de nos seuls nationaux. Ce n'est, en effet, ajoute-t-il, que par un isoloment sévère, par une protection efficace contre toute nouvelle source d'importation et, partant de contagion possible, qu'on arrivers à l'extinction de la lépre on France.

THÉRAPEUTIQUE MÉDICALE

Le bain froid dans un cas grave de pneumonie double,

par le Dr C. LEGRAND, médecin-major au 157° d'infanterie.

Une plume autorisée, docile à l'équitable interprétation des faits cliniques, dégagée des exagérations doctrinales, traçait à cette place, il y a quelques semaines, le relevé de nos ressources dans le traitement des pneumoniques. M. Muselier, proclamait l'inanité des efforts tentés pour opposer une médication adéquate, spécifique à la pneumonie, ce processus idéalement cyclique, dont le caractère de régalarité vraiment schématique était bien fait pour légitimer tous les efforts.

Après tant de lances rompues depuis l'époque sanglaute où la lancette anémiait sans merci l'unanimité des pneumoniques, il semblait que la formule établie par M. Muselier devait avoir pour quelque temps la vie sanve. « Le médecin — dit-il — est appelé à joner un rôle de secouriste, auprès d'un malade atteint de pneumonie. »

Ces paroles de vérité et de sagesse s'étaient à peine fixées sur le papier que M. Talamon annonçait qu'il fallait étendre à la pneumonie les bienfaits de la sérothérapie antidiphtéritique. Ce même auteur, hier encore le champion de la médication symptomatique, se déclarait partisan d'un procédé systématique à appliquer à toutes les catégories de pneumoniques. Ainsi les meurs médicales n'ont pas vieilli et l'on verra longtemps encore dans l'aréopage des thérapeutes les leaders de l'opportunisme escalader de temps en temps les sommets de l'extrème-gauche.

C'est bien un traitement spécifique que préconise M. Talamon, puisqu'il a pu diminuer la durée du cycle pneumococcique; systématique, puisqu'il recommande de l'appliquer le plus tôt possible, alors qu'on ne saurait préjuger encore du caractère particulier de la maladie. Les succès obtenus par cette méthode curative ne laissent pas de surprendre un peu et de jeter quelque désarroi dans les notions acquises de thérapeutique générale. Leur interprétation est de nature à entamer la foi déià vieille en la spécificité de la sérothérapie antidiphtéritique, qu'on rende compte de l'efficacité de la méthode par une action directe sur la virulence de l'agent infectieux, ou, - plutôt, - qu'on l'explique par l'exaltation de la défense phavocytaire. Il se dégage de ces deux hypothèses, pouvoir antitoxique ou chimiotaxie cellulaire, comme une odeur de spécificité que vient chasser l'application thérapeutique inaugurée par M. Talamon. Mais peu importe le malaise des théoriciens : il faut espérer que les succès de M. Talamon seront confirmés et que sa méthode curative continuera longtemps de guérir.

Cependant l'histoire de la médication radicale de la pneumonie est tachée de tant de désillusions qu'il est sans doute prudent de continuer à amasser pour l'avenir les ressources de la thérapeutique symptomatique et à préciser leur emploi. Parmi cet arsenal du « secouriste » en matière de pneumonie, le bain froid a pris une place en vérité modeste, après avoir inutilement tenté d'y tenri le premier plan.

Après Bartholiu, il y a deux siècles, Campagnano en 1834, Vogel de Berne en 1850, Jurgensen traitait systématiquement la pneumonie par l'eau froide et publiait des statistiques très démonstratives, comme tout promoteur de méthode nouvelle. La solution du problème de la balnéothérapie antipneumonique, dont les prémisses se compliquaient de discussions sur l'antipyrèse, paraît définitivement acquise à l'opportunisme. On admet aujourd'hui que l'emploi du bain froid reste subordonné à certaines indications d'opportunité, par exemple : hyperthermie considérable mal supportée, asthénie nerveuse chez des malades où le collapsus cardiaque n'est pas à redouter. La balnéothérapie demeure une méthode d'exception, applicable à des circonstances cliniques dont le praticien sera seul juge, mais difficile à comprendre dans une formule thérapeutique.

L'observation suivante relate l'histoire d'un nalade atteint de pneumonie double d'une extrême gravité, chez lequel le bain froid, appliqué dans des conditions très spéciales, s'est montré remède héroique à une situation désespérée. L'alture particulière de la maladie, l'heure critique de l'application de la méthode réfrigérante, son influence nettement démonstrative et radicalement heureuse, ces circonstancés qui donnent à ce fait clinique un caractère quasi expérimental, méritent de ne pas rester dans l'ombre.

Le soldat P... maçon; un robuste garçon saus histoire médicale, incorporé à Compiègne au 54° régiment d'infanterie, en novembre 1899, est pris dans la nuit du 30 au 31 janvier d'un frisson violent, prolongé et d'un point de côté sous le mamelon droit. Il présente les jours suivants les signes classiques d'une pneumonie

Le 4 février le malade ressent un point de côté sous le mamelon gauche, la dyspnée s'accentue, les muquenses prennent un aspect cyanosé, la température restant autour de 40°. Le soir même on entend du souffie dans l'aisselle gauche. Le leudemain l'hépatisation est complète à gauche pendant que des râles sous-crépitants remplissent la base du pounon droit.

Le 6 février le poumon gauche redevient à son tour primable ; on entend de chaque côté des râles sous cripitants encore mêlés de souffle ; l'Oppression est moins grande. Le 7, la température est tombée de 39°,5 à 37°,2 et il semble que la maladie va toucher à la défervescence finale.

Le traitement avait consisté jusque-là en application de ventouses scarifiées, administration de quinine, craféine, digitale et chlorhydrate de morphine suivant les indications du moment.

Vers une heure de l'après-midi, les symptômes prennent une recrudescence nouvelle. Le thermomètre remonte à 38°,9, un point de côté violent réapparait sous les mamelous, la dyspnée est très vive, l'expectoration très difficile, formée de crachats blanchâtres, spumeux. Dans tonte la hauteur du ponmon gauche, on entend un mélange de râles sous-crépitants, râles muqueux et de bruits rouffants. Le nurmure vésiculaire est seulement eutendu vers la région du sommet; encore y est-il à peine perceptible. Dans le poumon droit, les mêmes signes sont observés, un peu moins généralisés. Le malade est très eyanosé, le pouls est plein, régulier, rapide. L'agitation est grande avec un subdélire intermittent.

La langue est rouge, vernissée sur les bords, recouverte d'un enduit jaunâtre en son milieu.

Les urines sont peu abondantes, sans albumine.

Des ventouses scarifiées et des inhalations d'oxygène sont prescrites au malade.

Le 8 février. L'état du malade s'est encore aggravé depuis la veille.

La dyspnée est extrême : 68 inspirations, la teinte asphyxique très prononcée ; l'expectoration est devenue presque impossible.

Les deux poumons sont gorgés en entier de râles de toutes sortes, au milieu desquels on perçoit un peu de souffle aux bases et du murmure vésiculaire à peine appréciable vers les sommets.

Le pouls très rapide (125) se maintient fort, régulier. Le malade a déliré toute la nuit.

Il n'y a pas d'albumine dans l'urine. On pratique une saignée de 200 grammes à 11 heures du matin. L'intensité des symptômes s'amende un peu, l'asphyxie paraît un instant diminuer.

A 2 heures de l'après-midi, les symptômes reprennent un caractère de la dernière gravité. Un point de côté très violent est ressenti sous les deux mamelons, l'oppression et la dyspnée sont extrêmes, la teinte asphyxique des muqueuses poussée au violet noir, l'expectoration est complètement tarie. Le malade dont la face colorée exprime une angoisse lamentable, se débat et pousse des cris. Sous le chaos confus du souffie, des râles, entendus partout à l'auscultation, il apparaît clairement que le poumon est presque entièrement soustrait à l'hématose et que l'asphyxie ne tardera pas à devenir complète.

TOME CXXXXI. 22° LIVE.

Le cœur continue à résister vaillamment, la température est de 38°.

Il y a nécessité urgente à modifier l'état des poumons et faciliter l'expectoration des mucosités qui les rendent imperméables à l'air et dont le patient n'arrive plus à se débarrasser.

Dans cette intention, le malade est aussitôt plongé dans un bain à 35° progressivement refroïdi jusqu'a 23°, pendant que des affusions froïdes sont faites en permanence sur la tête. Au bout de quelques instants, surviennent des quintes de toux violente qui réussissent à rejeter au dehors d'abondants crachats muqueux et muco-purulents d'un blanc grisatre. Le malade éprouve une sensation d'oppression, d'étreinte très doulourase; le pouls devient plus petit, plus fréquent mais reste régulier. Le bain a une durée de 10 minutes; le patient est immédiatement porté et roulé dans des couvertures de laine garnies de boules chaudes et prend quelque gorgées de champagne.

Après quelques minutes, la réaction se produit, le malade se réchauffe ; il continue d'expectorer très abondamment.

Le reste de l'après-midi, l'oppression est moins grande, les points douloureux moins violents, la dyspnée moins intense (55 respirations). La température est de 37°.

A 8 heures 1/2 du soir, un deuxième bain est donné dans les mêmes conditions et produit le même résultat.

9 février. Jusqu'à minuit le malade a été calme; puis les plaintes sont revenues avec agitation, insomnic. Température, 38°,2. Le matin, le point de côté persiste moins violent, la dyspnée est encore grande; l'expectoration a continué d'être aboûdante. L'asseultation révèle. toujours de nombreux râles dans toute l'étendue des deux poumons. Le pouls est un peu moins fort; on fait au malade deux injections de 0 gr. 30 de caféine dans la journée.

Deux bains de 22° à midi et à 8 heures du soir. L'immersion très pénible au malade continue de provoquer une abondante expectoration et laisse après elle une moindre dyspnée. Le soir, le pouls se relève. La teinte asphyxique des muqueuses déjà très atténuée disparaît pour plusieurs heures après le second bain.

10 février. La veille, vers 10 heures du soir, un point douloureux a reparu sous le mamelon gauche; une injection de 5 milligrammes de chlorhydrate de morphine l'a fait disparatire et provoqué le sommeil. Le matin la dyspnée est bien moindre (45 respirations). L'auscultation indique une amélioration très appréciable. A gauche et en avant on entend distinctement le murmure vésiculaire au millieu de râles sous-crépitants et muqueux, de même en avant du poumon droit et dans la totallité de son tiers supérieur. Dans tout le reste de l'organe persiste la cacophonie de la veille.

La température est de 38°,5.

Trois bains dans la journée de 23 à 24°: expectoration considérable pendant et après l'immersion.

Les jours suivants les signes et symptômes continuent à s'amender progressivoment. La dyspnée s'atténue et disparaît; râles et souffie diminuent d'intensité et d'étendue et les bronches et le parenchyme pulmonaire rodeviennent peu à peu perméables à l'air.

Le 14 février, il reste seulement quelques gros râles sonores en avant, quelques râles sous-erépitants mêlés de souffle aux deux bases. Le malade est apyrétique, peut se nourrir davantage. Les bains sont supprimés.

La convalescence s'installe franche, et le 20 février on ne perçoit plus aucun bruit anormal en aucun coin du poumon. Le malade est en état de guérison complète.

L'intérêt de ce récit clinique consiste à pouvoir mettre en évidence avec une clarté infiniment probante l'effet utile retiré de l'emploi du bain froid; l'ultime gravité des symptômes au moment où cette médication a été instituée, l'efficacité si rapidement observée de son action ne devront laisser aucun doute à cet égard.

La rechute du malade survenue au 9° jour de la maladie, après quelques heures d'apvrexie relative qui semblaient finir le cycle de la pneumonie a été caractérisée par les signes d'une infection probablement mixte. rapidement généralisée à tout l'arbre pulmonaire. Le syndrome stéthoscopique de la pneumonie s'est vu masqué par l'association des trois éléments : bronchite, congestion, hépatisation. Le parenchyme pulmonaire apparaissait presque entièrement soustrait à l'hématose et le malade asphyxiait comme dans un catarrhe suffocant sous l'encombrement par les mucosités des parcelles de poumon non hépatisé. Le cœur résistait vigoureusement, la température n'était pas très élevée (38°.5), la nature des urines n'indiquait pas une intoxication spécifique profonde : le péril était local, mais urgent, L'asphyxie faisait des progrès et ne tarderait pas à emporter le malade si, par un moven quelconque, secours n'était apporté immédiatement aux poumons encombrés. Le bain froid a remarquablement rempli ce rôle. La température de l'eau tombait à peine à 28°, 25° que le

malade, pris de quintes de toux, expectorait en abondance un flot de crachats muqueux et mucc-purulents. Cette expulsion libératrice augmentait à mesure que l'eau était refroidie à 24°, 22° et se continuait longtemps après le bain. La sensation d'angoisse très pénible éprouvée dans l'eau ne tardait pas à faire place quelques instants après l'immersion à un bien-être exempt d'oppression, de douleur pongitive que les quintes de toux venaients seules troubles.

Après le premier bain, le malade a véritablement paru renaître, la teinte asphyxique des muqueuses, poussée jusqu'au violet noir, s'est éclaireie pendant plusieurs heures.

Après le quatrième bain, une amélioration perceptible à l'auscultation s'établissait d'une facon durable.

L'efficacité de l'immersion dans l'eau froide semble tenir iei à deux ordres de eauses.

Pendant le séjour dans le bain, par un réflexe puissant, l'eau provoquait des quintes d'une toux énergique dont les seuls efforts du malade n'étaient plus capables, qui désencombrait les bronchioles pendant que le sang affluait dans les parties du poumon devenues perméables à l'air. Puis, au contraire, l'anémie du poumon, survenant sous l'influence de la réaction, devenait un sérieux

à l'air. Puis, au contraire, l'anémie du poumon, survenant sous l'influence de la réaction, devenait un sérieux obstacle à la production de sécrétions nouvelles. La succession rapide de ces deux phénomènes était éminemment apte à s'opposer à la stase pulmonaire, à faciliter la circulation sanguine et les fonctions d'hématose. En même temps, le malade bénéficiait des heureux

En même temps, le malade bénéficiait des heureux effets du bain froid qui n'étaient ici qu'indications secondaires; abaissement de la température, diurèse, stimulation de la nutrition générale. L'application de la méthode réfrigérante à des situations aussi graves exige évidemment les plus grandes précautions. La présence du médecin est nécessaire pour régler les conditions du bain et exercer une surveillance attentive du malade. Il importe d'employer là un doigté délicat auquel ne saurait suppléer l'intelligence du plus sélé des inférmiers.

Il nous a paru prudent de n'arriver que progressivement à la température de 23°, 22°. Ce minimum, jugé suffisant dans les circonstances présentes, aurait pu être dépassé avec avantage si l'hyperthermie du malade avait été ulus considérable.

L'état du cœur n'apportait pas ici de contre-indication à la balnéothérapie. La durée du bain n'a jamais excédé une dizaine de minutes. La réaction e'est toujours accomplie dans les meilleures conditions.

Ainsi le bain froid peut être chez les pneumoniques, ca dehors de toutes autres indications, un excellent moyen de combattre les signes pulmonaires si étendus, si désespérés qu'ils paraissent. Il s'est montré en une circonstance imposante de gravité un agent curateur merveilleux, quand tout semblait devoir être vainement tenté et il mérite de garder la confiance du médecin « secouriste » en présence de certains accidents redoutables de la nœumonie.

SOCIÉTÉ DE THÉRAPEUTIQUE

SÉANCE DU 22 MAI 1901.

PRÉSIDENCE DE M. Albert ROBIN.

Présentation.

 I. — Présentation de l'appareil de MM. Lortet et Genoud pour la photothérapie.

Par M. LEREDDE.

Directeur de l'établissement dermatologique de Paris.

Tai déjà ou l'occasion d'entretenur les mombres de la Seciété de la photothérapie et des résultats qu'elle donne, en particulier dans le traitement du lupus érythémateux. Cette nouvelle méthode thérapeutique offre un intérêt considérable puisqu'elle permet de guérir des dermatoses graves qui n'ont guéri par aucun procédé connu.

Il oxiste, et en grand nombre, des eas de lupus tuberculeux où l'emploi de la méthode de Finsen s'impose d'une mamère absolue, ce sont ceux qui ont résisté à la cautérisation, aux caustiques chimiques, à la scarification, à l'électricité de laute fréquence, otc. Avec les aspareits de Finsen, la guérison était de règle; copendant on ne pouvait oublier qu'elle était longue a obtenir, et dispendieuse pour boaucoup de maladles, en ruison des frais d'installation, de la consommation énorme d'électricité, et de la mécessité de faire tenir les malades au repos pendant une leure par un aide. La blochtéranie ne seubstituait donc pas complètement aux mêthodes thérapeutique anciennes dans le traitement du lupus de Willan.

Il n'en est sans doute plus de même maintenant, parce que MM. Lortet et Genoud ont inventé un appareil qui permet d'obtenir en quelques minutes des réactions inflammatoires, et sans doute des effets bactéricides identiques à ceux qu'on obtenait en une heure avec l'appareil de l'insen, et cela en n'employant cue 15 ampéres au lieu de 00 à 80.

L'appareil de Finsen se compose d'une lampe à arc contral, et de tubes en cuivre soutenant deslentilles en cristal de roche concentrant les rayons lumineux. Un grand nombre de rayons passent au-dessus, au-dessous des tubes, entre cux, et sont pordus : chaque tube ne reçoit du reste que le quart de la totalité des rayons utilisés. Dans l'appareil de Lortet et Genoud, au contraire, presque tous les rayons se réunissent sur la peau.

Cot appareil se compose d'une lampe à arc de 10-15 ampères. Les charbons sont inclinés l'un par rapport à l'autre, de manière que la plus grande partie des rayons est projetée en avant, en outre, un petit miroir concave situé en arrière réflechit les rayons compris dans l'angle formé par le charbon. Les rayons calorifiques sont éliminés: 1- au moyen d'une sorte de bouclier à double paroi, où circule de l'eau courante, ce bouclier présente un orifice central; 2º au moyen d'un appareil semblable au compresseur de l'appareil Finson, à double paroi de cristal de roche, où circule également de l'eau courante et qui forme l'orifice du bouclier. Le malade s'assied sur une chaise devant l'appareil et le point à traiter est appuyé sur le compresseur à double paroi que priens de décrire.

Le foyer lumineux étant situé dans le concavité du bouclier, le point traité se trouve à quelques centimètres seulement et regoit presque tous les rayons. Le verre compresseur est beaucoup plus large que ceux employés par Finsen ; on peut traiter ainsi des surfaces de deux centimètres de diamètre.

Les résultats de l'application de cet appareil sont les sui-

vants : en trois minutes avec 10 ampéres, on provoque sur la peau saine une réaction inflammatoire qui peut durer plus de buit à dix jours. En dix minutes la réaction inflammatoire anparente est beaucoup plus considérable que celle que produit une séance d'une heure avec l'appareil de Finsen. On comprend quel avantage donno cette économie de temps pour le traitement; on peut du reste dans les cas difficiles prolonger les séances, au moins jusqu'à une demi heure sans inconvénient et obtenir sans doute le résultat que donneraient 3 ou 4 heures d'application de l'ancien appareil. J'espère, grâce à l'invention de MM. Lortet et Genoud arriver à la guérison des cas de lupus érythémateux que je n'avais pu encore faire disparaître par la photothérapie. J'emploie depuis le commencement de mai le nouvel appareil et depuis chez tous mes malades les améliorations semblent beaucoup plus rapides qu'elles n'étaient autrefois.

La photothérapie devient ainsi une méthode extrémement pratique et maniable et ses applications médicales semblent devoir s'étendre en même temps que se préciseront ses indications et la manière dont elle doit être employée dans chaque cas particulier.

Discussion.

M. Albert Robin. — M. Leredde pourrait-il nous donner un court aperçu des principaux résultats obtenus par lui depuis l'an dernier dans d'autres affections que le lupus, dans l'épithélioma par exemple?

M. Lenedde. — Je remercie M. le président d'avoir posé cette question ; je parlerai d'abord du lupus. Le laps de temps écoulé depuis la guérison obtenue chez quelques-uns de mes malades est trop court pour que je puisse affirmer qu'ils sont à l'abri de récidives. J'ai une quinzaine de malades guéris que je revois tous les 2 ou 3 mois, les autres sont encore en tmitement. Mes résultats sont meilleurs que ceux de Finseu

parce que ce dernier a eu plusieurs fois à lutter contre des cas vraiment épouvantables, alors que mes malades sont moins gravement atteints.

Pour l'épithélione profond la difficulté est grande, à cause de la pénétration difficile des rayons chimiques. Mais avec l'appareil de Lortet et Genoud on arrivera peut-être à de meilleurs résultats, car on obtient avec lui autant en 1 heure qu'en 6 heures avec l'appareil de Finsen. Dans les épithéliomes superficiels, la méthode de Finsen est une excellente méthode curative.

Le næous vasculaire plan parait surtout intéressant au point de vue de la photothérapie. J'ai obtenu chez deux malades des guérisons sur les points traités.

M. BAUDOUIN. — A l'occasion de la très intéressante communication de M. Leredde, je demande la permission d'indiquer à la Société quelques points relatifs au même suiet.

Au laboratoire de radiographie de l'hôpital Saint-Louis, nous employons depuis le 18 avril, avec MM. Gastou et Chatin, l'appareil de MM. Lortet et Genoud, et je crois même que c'est là qu'il a fonctionné pour la première fois à Paris.

Depuis cette époque nous avons opéré sur un total de 66 malades qui se répartissent ainsi :

- 55 lupus tuberculeux.
- 5 érythémateux
- 3 pelades
- 1 chéloide
- 1 épithelioma de la face
- 1 tatouage

Ceci représente le nombre déjà imposant de 414 séances dont la durée a été de 15 minutes pour la plupart, de 20 minutes pour les lupus érythémateux seulement.

Je dois dire de suite que nous n'avons rien obtenu sur le tatouage qui n'a subi d'ailleurs que trois séances de photothérapie, 'ni sur la chéloïde. Cette dernière, consécutive à une brûlure entourant le poignet absolument comme un bracelet. Le traitement n'a pas provoqué à son niveau la moindre réaction.

Pour l'épithélioma, qui siège au-dessus de la lèvre supérieure chez un vieillard de 78 ans, nons ne pouvons rien dire, les rayons ne lui ayant été encore appliqués que deux fois.

Sur les trois cas de pelade, un seul montre aujourd'hui une légère repousse de cheveux; il est vrai qu'il a subi 24 séances tandis que les deux autres n'en ont eu qu'un petit nombre (six et une).

Pour le lupus je ne puis qu'appuyer ce qu'a dit ici M. Leredde.

Les lupus érythémateux réagissent lentement au traitement et leurs modifications, favorables d'ailleurs, apparaissent beaucoup plus tardivement.

Les lupus tuberculeux, au contraire sont notablement plus sensibles aux rayons chimiques et d'autant plus qu'ils ont été moins énergiquement traités antérieurement. L'un de nos malades n'a encore subi que 5 applications de cenouvelappa-reil, mais il avait résisté déjs, sans montre la moindre réaction, à 23 séances avec le grand appareil de Finsen: c'est, il est vrai, un vieux lupus qui remonte à 30 années et qui avait antérieurement été traité énergiquement par des scarifications. Ce fait, comme plusieurs autres que nous suivons en ce moment, vient confirmer l'observation de M. Leredde.

Sans délaisser les lupus anciens dont il y a grand intérét à entravor et à réparer, dans la mesure du possible, les horribles mutilations, nous recherchons aussi les lupus jeunes, nou encore traitès, par les procédés chirurgicaux du moins, sur lesquels les effets du traitement se montrent plus rapidement et avec plus de netteté. La première réaction des téguments s'y manifeste, en général, dans un délai de deux à six ou sept heures par une légère vésication qui séche rapidement. Chez deux enfants les lésions de date récente et limitées aux dimensions de quelques millimétres à un ou deux centimètres de diamètre, n'avavient subi aucun traitément antérieur : le

résultat de la photothérapie a été si rapide que nous avons dù la suspendre au bout d'un petit nombre de séances, dans la crainte qu'en en faisant de nouvelles elles ne fussent untiles.

Los obturateurs en forme de lentille, qui, dans les appareils de MM. Lortet ot Genoud, sont destinés à être appliqués directement sur la peau, ont une forme fixe dont les dimensions dépassent souvent celles des lésions. Pour éviter l'inconvenient qu'il y aurait à agir sur des parties de peau saine, J'ai recours au dispositif suivant : J'applique sur la région un norceau d'emplatre rouge au minium dans lequel J'ai préalablement découpé une fonétire correspondant exactement surfaces malades : les parties destinées à être impressionnées par les rayons chimiques restant seules découvertes sont soumises à leur action à l'exclusion de toutes les autres.

M. LEREDE.— Il est bon, je crois, de faire ici une remarque importante i les lupus qui nous arrivent après avoir dét truités aupanvant par toutes les méthodes connues jusqu'ici présentent des cicatrices formées d'un tissu sciéreux, dense ot les rayons pénétrent mai ; ceux-ci atteignent difficillement les lupomes profonds. Tout au contraire, les lupus n'agant jamas d'ét traités par d'autres méthodes donnet des résultats qu'on peut qualifier d'extraordinaires : la guérison complète est ranidoment obtenue.

M. BAUDOUN. — Dans certains cas, nous avons pu constator à Saint-Louis, qu'il se fait autour du point d'application des rayons, une zone d'irritation, une petite poussée inflammatoire.

M. Albert Robin. — M. Leredde a-t-il étudié la question du mode d'action des rayons sur la vascularisation de la peau ot sur la sécrétion des glandes sudoripares?

M. LERRDDE, — J'ai pu constater sur moi-même, à Lyon, qu'une exposition, pendant 10 minutes, aux rayons fournis par l'appareil de Lortet et Genoud, provoqua, 24 heures plus tard, une réaction marquée suivie de pigmentation. Les poils ont été conservés; les glandes sudoripares ne paraissent pas avoir été influencées. Il est probable que l'hypertrichose n'est pas justiciable de cette médication.

M. Albert Robin. — Quel est le mode d'action des rayons sur le nœvus?

M. Leredde. — Les lésions sont cortainement modifiées par oblitération vasculaire et non simplement par vaso-constriction.

M. Albert Robin. — La Société serait heureuse que M. Lereddo voulût bien lui présenter, au prochain jour, une note sur ce sujet des plus importants.

Communications.

Traitement de l'hypertrophie de la prostate par la méthode de Bottini.

Par le Dr E. Desnos Ancien interne des Hôpitaux.

Depuis un petit nombre d'années, los opérations portant sur la prestato l'upertropliée on trepris favour. Cetto tendance de la chirurgio reconnait des causes diverses dont la principale est une conception plus exacte de la nature et de l'évertation mémo de l'hypertrophio prestatique. Sans vouloir retracer les phases par lesquelles a passé la pathogénio de cette affection, jo rappellera inénumoins que, pendant les cinquante dernières années, les pathologistes ont été partagés entre les deux opinious émises l'une par Civiale, l'autre par Mercier; pour le premier, la dysurie des prostatiques était due 4 une atonie primitire de la vessio, tandis que Mercier y voyait l'aboutissant d'une lutte contre la tuneur prostatique, lutte

dans laquelle la vessie finissait par céder. Avec des variantes, los théories restèrent à peu près les mêmes jusqu'aux douze dernières années, époque à laquelle Launois, défendant l'opinion du Prof. Guyon, considéra le prostatisme commê une maladic générale qui n'était autre que l'artério-sellèrose frappant simultanément tous les organes de l'appareil urinaire, du rein à l'urêtre.

Cotte théorie brillamment défendue fit fortune pendant quelque temps et eut pour conséquence thérapeutique que l'ablation des timeurs prostatiques faisant saillie dans la vessie fut abandonnée. Il semblait illogique, en effet, de libèrer le passage de l'urine, alors que la vraie cause de la dysurie residait dans l'imonissance du muscle vésical.

Mais des faits contradictoires ne tardèrent pas à être apportés par Casper d'abord, puis Griffiths, Mansell-Moulin, etc.; enfin et surtout Motz, dans sa thèse, démontra que l'artério-scalèrose manquait chez un grand nombre de prostatiques et qu'elle jouait un role effacé dans la pathogénie du prostatisme. Je me suis convaincu pour ma part que la théorie de Launois est vraie, qu'elle répond à la réalité chez un certain nombre de prostatiques mais que coux-ci représentent une minorité. Il y a donc là un diagnostic à faire avant d'institure un traitement chirurgical.

Ce dernier n'est applicable que lorsque deux conditions primordiales sont réunies; il faut que la vessie ait conservé sa contractilité misculaire d'une part, et d'autre part qu'il existe au niveau du col une saillie prostatique suffisante pour faire obstacle à l'écoulement de l'urine. Dans ce cas, une opération à ciel ouvert, par le périnée ou par l'hypogastre permet de libérer complétement le col vésical et de incrétablir le cours de l'urine, opérations aujourd'hui bion réglées et dont les résultats ne sont pas contestables. Mais elle est d'une rételle importance et dans des cas que J'aurai à déterminer elle me semble pouvoir être remplacée par des manœuvres plus simples, c'est-d-dire par une section galvano-

caustique intra-urêtrale, ou méthode de Bottini. Cette méthode est déjà ancienne, car il y a prés de trente au que Bottini, professeur de clinique chirurgicale à Pavie, l'appliqua pour la première fois. Il se bornait alors à pratiquer une cautrisation de la partie saillante de la glande à l'aide d'un cathéter dont l'extrémité seule était portée à l'incandescence. Malgré des modifications et des perfectionnements dans son instrumentation, Bottini ne vit sa méthode se répandre que lentement; c'est à partir de Congrés de Berlin, on 1800, qu'elle parvint à forcer l'attention des chirurgiens, grâce aux nombreuses observations apportées par l'auteur. L'appui principal uli fut fourni par un chirurgien de Berlin, Freudenberg qui, on transformant l'instrument primitif par d'ingénieuses modifications, contribus à vulgariscr cette opération.

Bien que répandue désormais, surtout en Allemagne, en Russie et en Amérique, elle rencontre encore de sérieux adversaires, et des objections graves lui sout faites; on lui reproche de donner des résultats incomplets, d'exposer à des accidents difficiles à combattre et surtout d'agir d'une manière aveugle. J'avoue que pour mapart j'ai partage longtemps ces préventions, mais les communications publiées ou verbales que j'ai recueillies m'ont engagé à pratiquer à mon tour cette opération, et je n'ai eu jusqu'à présent qu'à in'en féliciter.

Avant d'aller plus loin vous me permettrez de donner une description de l'appareil et de la mèthode.

La technique de l'opération est simple; toutefois il ne faut pas se laisser prendre à l'apparence d'une simplicité et d'une facilité exagérées : c'est une opération délicate, avec laquelle des accidents sont possibles et résultent de la négligence des précatuions multiples qui sont à prendre.

L'appareil de Freudenberg (de Berlin), que je vous montre en ce moment, est à peu près le seul employé. Il est construit sur le modèle d'un lithotriteur; la branche mâle est terminée par une lame de platine iridié, mince et mousse; elle pénètre et peut être entièrement cachée dans la branche femelle qui ressemble à celle du lithotriteur; elle est canaliculée et les deux extrémités du conduit qui la parcourt sont en communication avec deux canaux de même dimension qui se continuent dans toute la tige; une circulation d'eau peut ainsi être établie et empécher que la température de l'instrument tout entier s'élève pendant le passage du courant.

La tige de l'instrument se termine par un pas de vis muni d'un volant qui actionne la branche mâle et lui fait exécuter les mouvements d'avancement et de retrait nécessaires à la manœuvre. A ce niveau sont fixés les fils conducteurs du courant qui est fourni par un accumulateur muni d'un ampéremètre qui en indique l'Intensité.

Si los voies urinaires sont aseptiques, il n'est pas besoin de traitement préparatoire et l'opération peut être pratiquée des que le diagnostic aura été prêcisé. Un léger purgatif sera administré la veille et un lavement le matin même de l'Opération. En cas d'infection, il n'en est pas de même, et la nécessité de soins antiseptiques préalables s'impose. Si la vessein se vide pas, le cathétérisme sera pratiqué plusieurs pris par jour, ou bien en laissera une sonde à demeure; très souvent, sous l'influence seule de cette évacuation, les urines redevienment limplées; ailleurs des lavages antiseptiques au nitrate d'argent à 1/1000 ou au protargol à 4/1000 ou au chlorure de sina seront nécessaires pendant quelques jours.

On commence par s'assurer du fonctionnement de l'appareil et ou optre la lame de platine au degré d'incandescence qu'on veut employer. Beaucoup de chirurgiens ne cruignent pas de la porter au rouge blanc; un grand nombre d'operations faites ainsi n'ont pas été suivies d'accident. le crois plus prudent d'agir avec une température plus basse et ne pas dépasser un rouge un peu vif. Quel que soit d'ailleurs le parti adopté, il importe de noter la division du cadran à laquelle s'arrête l'aiguille de l'ampérimètre lorsqu'on a obtenu la température voulue; un aide devra ne pas quitter des yeux cette aiguille

et, au moyen du régulateur, la ramener au point choisi dès qu'elle s'en écarte, car des variations surviennent au cours de l'opération.

La vessie est vidée, on y injecte, ainsi que dans l'urêtre prostatique une solution de cocaïne à 2 0/0 qu'on évacue au bout de trois minutes; puis elle est remplie d'une solution d'acide borique, ou mieux de protargol à 4/1000. L'instrument est introduit comme un lithotriteur : les mors sont renversés de facon que leur cavité embrasse la saillie prostatique. Suivant les indications fournies par le cystoscope, on le laissera en contact avec la partie de la tumeur prostatique à attaquer: ce n'est donc pas toujours sur la ligne médiane qu'on se tiendra. L'instrument est solidement fixé de la main gauche qui l'appuie sur la prostate, puis le chirurgien, en même temps qu'il fait établir le courant électrique et la circulation d'eau froide, actionne le volant; on le sent pénétrer dans le tissu prostatique. L'opération, est-il dit souvent, ne doit pas durer plus de deux minutes pour une section de 35 millimétres. Je pense qu'on ne peut établir un chiffre absolu qui dépend du degré d'incandescence et de l'épaisseur des tissus; on doit surtout porter son attention sur la résistance que rencontre le volant et accélérer le mouvement si la rotation s'accomplit très facilement. En général, deux à trois minutes suffisent. Avant de retirer la lame et de la faire rentrer dans la branche femelle, on la porte au rouge-blanc pour brûler les fragments d'eschare qui s'y attachent; puis on interrompt le courant.

Suivant les dispositions des lobes prostatiques, on se bornera à me seule incision, ou bien on la répêters sur chacune des parties saillantes; deux sont nécessaires, en général, lorsque l'hypertruphie porte sur les lobes latéraux; parfois il en faut pratiquet rois, toujours en observant les mémes précautions.

L'instrument est retiré, puis une sonde-béquille, introduite aussitôt, livre passage à une urine parfois sanguinolente, et entraîne de légers débris d'eschare noir-rougeâtres. Des lavages sont pratiqués: il est bon de les faire au nitrate d'argent s'il y a eu infection. Les suites sont, en général, des plus simples; dès le lendemain, les urines ne sont plus teintées; elles contieunent encore quelques filaments pendant les jours suivants, mais il est rare que la limpidité même de l'urine soit allavée.

Beaucoup de chirurgiens ne placeut pas de sonde à demeure et laissent la miction se faire normalement. Pestime qu'il n'y a aucun inconvénient à laisser à demeure, au moins pendant les vingt-quatre premières heures, une sonde qui confère une très grande sécurité au point de vue de l'infection et de l'hématurie et qui offre, de plus, l'avantage de supprimer les douleurs mictionnelles.

Avant de préciser les indications de cette opération et d'apprécier les résultats, je rapporterai ici cinq observations personnelles qui permettront de se rendre compte de ce qu'on paut attendre de catte opération.

Observations

Oss. 1. — M. D..., âgé de 61 ans, souffre depuis plusieurs années de troubles de la miction. Il ne présente aucun autre antécédent pathologique que des attaques de rhumatisme articulaire aigu dans sa jeunesse; il n'a pas eu de blennorragie: c'est vers 58 ans qu'il commença à être obligé d'uriner la nuit, mictions faciles d'abord, bientit plus lentes que de coutume. Peu de temps après, la fréquence se fit sentir pendant le jour, ce n'est que 18 mois après que la miction devint pénible et quelquefois douloureuse, non pas à la fin mais au dépar du jet. Il fut sondé à ce moment et quoique la vessie ne retint pas d'urinet que celleci en partit pas infectée, on pratiqua néanmoins des lavages de la vessie, sans aucun résultat.

Quelque temps après, les urines se troublèrent un peu et la miction terminale devint douloureuse. C'est à ce moment que je vis le malade choz qui je constatai l'étatsuivant : urine légérement trouble, tenant des filaments en suspension, canal libre, traversée prostatique courte, mais présentant au niveau du col un obstacle sur lequel bute l'explorateur à boule. La vessie retient 60 graumes environ d'uno urino un peu louche, à peine plus blanchâtro à la fin de la miction ; la vessie est sensible au contact, et intolérante à la distension : 150 grammes de liquide provoquent un besoin violent. La prostate, examinée par le rectum, paraît assez développée, parfaitement symétrique. Des instillations de protargol amendrent une amélioration manifeste, et les urines reprirent leur limidité.

Six mois après, l'infection vésicale avait reparu et une nouvelle série d'instillations ne donnèrent aucun résultat, la rétention était la même, mais les douleurs deviurent un peu plus vives. Une section galvano-caustique fut décidée et pratiquée le 23 ianvier 4901.

Le malade est anesthesié par le chloroforme, et la vessie étant lavée et aseptisée, l'instrument de Froudonberg est introduit; renversé do façon que la concavité du bec embrasse la saillie prostatique, il est fortement assujetit dans cette position. La lame est alors portée au rouge sombre et une section de 2 centim. 1/2 est pratiquée en 4 minutes. Après le retrait du prostatotome, une sonde-béquille est introduite; par elle s'écoule un liquide assez fortement teinté; après quelques lavages, le liquide revient à peine rosé. La sonde est maintenue à domeure.

Le soir, la température est de 38°2, l'état général bon ; une douleur vague, contusive reste au périnée. Le lendemain attenuation de cotto sensation ; température normale, urine un peu rouge. Le 23 janvier, température normale, urine limpide, la prostate examinée par le rectum n'est pas enflammée ni concestionnée.

La sonde est retirée le quatrième jour; les premières mic tions sont assez pénibles et douloureuses pour l'expulsion des dernières gouttes; un peu de sang s'échappe avec elles; il existe aussi une légère rétention, qui est réduite à 20 grammes; la situation ne se modifie pas pendant quatre ou cinq jours. A partir de ce moment, sans autre traitement qu'un lavage boriqué tous les jours, les urines redeviennent limpides et les douleurs cessent.

Six semaines après les mictions étaient devenues normales, larétention après une miction réduite à 10 grammes à peine, les urines normales. Cet état s'était maintenu le 2 mai, l'examen cystoscopique pratiqué ce jour-là montre une bréche profonde dans la saille prostatique, non pas médiane mais latérale comme si un des côtés seulement de l'obstacle avait étà détruit. La rétention est presque nulle; les mictions se renouvellent toutes les quatre heures et ne sont plus douloureuses à aucun moment.

Oss. II. — M. Cl..., 60 ans, avec une excellente santé gónérale, a un passé urinaire assex clargé, bien que ses accidents soient peu variés. Blennorragie à 20 ans, mal soignée, pendant laquelle de petites ruptures de l'urêtre ont dis se produire; depuis lors, l'urêtre n'a cessé de suppurer, avec des rémissions pendant lesquelles le canal paraissait presque sec, et des recrudescences rameant l'affection à l'état aigu. Depuis vingt aus euviron, le suintement est très peu prononcé mais les filaments de l'urine sont toniours abondants.

Rétréci dés 35 ans, il fut dilaté à plusieurs reprises et subit une urétrotomie interné à 45 ans. Depuis lors, son canal, régulièrement dilaté d'alleurs, est resté large. Des crises de cystite se sont montrées à diverses reprises, une fois suraigué avec hématurie terminale, le plus souvent légère: depuis l'urétrotomie, elles n'avaient plus reparu.

C'est il y a trois ans que la fréquence a repara, mais nocturne au lieu d'être plus prononce dans la journée comme autrefois : la progression de ce symptôme fut assez lente, mais au bout d'un an, des sensations douloureuses vinrent s'y ajouter. douleurs terminales prolongées pendant quelques socondes, parfois quelques minutes après la miction. Le 10 mars 1900, je constate l'état suivant : urines troubles peu abondantes, laissant un dépét blanc-gristère et mélangées de nombreux grumeaux; les mictions pénibles exigent des efforts, la nuit surtout, les dernières gouttes un peu plus chargées de pus. Par le toucher rectal prostato volumineuse, lobe droit un peu plus gross, pas de sensibilité exagérée, canal libre, traversée prostatique longue aveo un ressaut brusque au col vésical. La vessie éracuée aprés une miction retient à peine quelques grammes d'urine, plus purulenie que l'urino rendue spontanément : elle est intolérante et n'admet que 20 grammes environ du liquide qui est expulsé violemment par la sonde.

Un traitement antisoptique procure quelque soulagement, la vessie fut évacuée tous les jours et des instillations de nitrate d'argent pratiquées deux fois par semaine. Au bout d'un mois, les mictions étaient moins douloureuses, mais aussi fréquentes. Ce traitement ne fut plus suivi que d'une façon irrégulière jusqu'au mois de novembre, époque où on crut devoir placer une sonde à demeure. Celle-ci fut très mal supportée, relirée après quatre jours, l'irritation vésicale était plus prononcée qu'auparavant. De nouvelles instillations pratiquées régulièrement jusqu'au mois de jauviée aménet une diminition legère de la fréquence et la vessie devient un peu plus tolérante.

Pendant une cessation de 15 jours du traitement, l'état antirieur reparut, aussi le malade vint-il réclamor l'opération de Bottini dont je lui avais parlé. Un examen cystoscopique montra des dispositions favorablos, deux lobes latéraux, peu volumineux, étant rollés par une saillie transversale.

Le 19 juin, je pratique une section galvano-caustique de cette barre ; le malade étant chloroformé et la vessie remujie de liquide borque, l'instrument introduit est renversé, la concavité placée contre la barre prostatique qui est sectionnée de quatre centimètres en cinq minutes environ. Une sonde de gomme introduite donne issue à un liquide à peine teinté, mélangé de débris escharifiés rougeâtres, qui sont entrainés par un lavage. Le jour, température 37-5; douleur assez prononcée dans la région périnéale; au toucher, la prostate est congestionnée et un peu sensible.

Le lendemain, ces phénomènes avaient disparu. La sonde resta quatre jours en place; les urines, sans trace de teinte sanguine, étaient presque limpides.

La miction se fit normalement, sans douleur, mais avec une certaine fréquence. Celle-ci diminua cinq ou six jours après, puis au bout d'une semaine, les mictions étaient espacées de quatre à cinq heures; les urines étaient limpides.

A ce moment (10 mai) surviurent tout d'un coup des envies fréquentes et douloureuses, en mêmo temps que les urines se troublaient et abandonnaient un dépôt purulent épais au milieu duquel on recomaissait des débris sphacélés sanguinolents; le cathétérisme et le toucher rectal ne donnérent aucan renseignement; cet état dura deux jours environ et très rapidement les urines reprirent leur limpidité; la douleur et la fréquence disparurent. La prostate examinée à plusieurs reprires sen e présent famais de congestion ni d'infammation.

Depuis lors le bon état vésical ne s'est pas démenti; les mictions sont à peine plus fréquentes qu'à l'état normal et ne se font plus que toutes les trois heures ; toute douleur a disparu. Au cystoscope on voit la brêche faite par la lame galvanocaustique, sous la forme d'ume dépression à angles arrondis.

Ons. III. — M. V..., agé de 68 ans, ne présente aucune tare constitutionnelle, et on ne trouve pas chez lui de manifestécions diathésiques. Il n'est pas syphilitique; il a contracté de 20 à 25 ans deux ou trois blennorragies qui ne paraissent pas
avoir laissé de traces. Grand mangeur et grand buveur autrofois, il a fait certainment des excés alcooliques.

Ce n'est que vers 60 ans qu'il a commencé à éprouver quelques troubles dans la miction, qui devient plus fréquente vers la fin de la nuit : peu impérieuses dés le début, les besoins se répétèrent à des intervalles de plus en plus rapprochées si bien qu'au bout de deux ans, il fut forcé d'uriner toutes les heures environ. Les symptônes se bornaient à cette fréquence à ce moment: le départ du jet et l'expulsion étaient relativement faciles et il ne ressentait aucune douleur.

Il fut alors sondé et il semble que les préenutions nécessaires n'aient pas été prises car les urines se toublèrent bientôt après; la vessie s'infecta tout à fait et des douleurs mictionnelles assez violentes apparurent: la fréquence augmenta aussi; si bien que le malade reuonça pendant près d'une année à tout traitement local, temps peudant lequel les symbolmes restèrent les mêmes.

En juin 1806 il vint à Paris et je constatai l'état suivant : urines purulentes en masse et abandonnant un dépôt abondant; urêtre libre, traversée prestatique pas très longuo mais offrant une résistance brusquement franchie par un explorateur à boule; la vessie sondée immédiatenent après une miction contient 130 grammes d'urine retenue, purulente; elle n'est pas sensible au contact et presque pas à la distonsion puisqu'elle admet près de 300 grammes de liquido. Par le toucher rectal, on rencontro une prostato assez voluminouse, lisse, sans bosselures; les reins paraissent uornaux. Après trois semaines d'un traitenent consistant en trois évacuations vésicales par jour, lavages boriqués et lavages nitratés tous les deux jours, les urines redeviennent à peu près limpides, mais non assptiques : la rétention avait sensiblement diminué, revenant à 50 grammes.

Je restai prés de quatre ans sans nouvelles du malade qui vint me trouver au mois de janvier dernier. Il avait continué à se sonder mais au bout de six mois, les urines tout en restant à peu près claires, étaient émises avec des difficultés croissantes; dix-hui mois après, toute miction normale avait été supprimée. Depuis cette époque, il y a près de deux ans, M. V..., est en état de rétention complète; il se sonde assez régulièrement quatre fois par jour, avec beaucoup de facilité d'ailleurs et n'éprouve le besoin que douze à quinze heures

après un cathétérisme; à ce moment alors quelques gouttes s'échappent par regorgement.

Un nouvel examen me fit constater un volume peu considérable de la prostate, ansa sugmentation depuis quatre ans, et une rétention d'urine complète; par le cystoscope on voyait au col vésical une simple barre transversale, très saillante, et sur les côtés deux masses peu voluminouses. La contractilité vésicale était peu considérable mais non complitement absente. A prês dis-jours de lavages nitratés ello devint plus énergique; c'est alors que je proposai l'opération de Rottini.

Le 2 février la vessie ayant été longuement lavée et aseptisée, est anesthésiée, ainsi que la portion prostatique de l'urêtre, à l'aide d'une solution de cocaine à 2 0/0, puis remplie de 160 grammes de solution boriquée; j'introduis l'instrument de Freudenberg et la lame appliquée contre la prostate étant porte au rouge sombre, je trace une incision de 3 centimétres, en quatre minutes; aucun incident ne survint; le liquide vésical évacué par la sonde fut à peine teinté, quelques débris d'eschare seulement furent évacués. Le malade a accusé une dou-leur un peu vive dès le début, presque immédiatement atté-nuée.

Une sonde laissée à demeure fonctionna parfaitement et jusqu'au lendemain livra passage à une urine rouge très clair; le 4, elle s'éclaircit et resta sans teinte rosée à partir du 5. Pendant tout ce temps on ne constate aucune élévation de température, aucune sensation douloureuse, à peine un peu de gêne au périnée pendant la première journée, ainsi que de faux besoins d'uriner, rapidement calmés par un lavement d'antipyrine.

Lo 8 février la sonde est retirée : les deux jours suivants sans résultat fonctionnel, pas de miction volontaire, et le cathétérisme reste Décessaire ; mais le 11, le malade peut rendre 50 grammes d'urine par une miction normale. Les fours suivants, la quantité d'urine rendue varie pour chaque miction entre 40 et 50 grammes, et dans les 24 heures s'élève à 600 grammes environ.

Néanmoins le 20 février, la vessie contenait encore après une miction 200 grammes d'urine. Le malade quitte Paris, ne se sondant plus qu'une fois dans les vingt-quatre heures.

Il est revu le 15 avril; la situation est restée la méme, les mictions spontanées sont possibles mais la vessio retient encore 200 grammes environ d'urine, qui reste trouble, mais à un degré moindre qu'avant l'opération; les besoins se renouvellent toutes les deux heures environ. L'état général est excellent.

Oss. IV. — M. R..., 66 aus, offre d'assex nombreux antécdents pathologiques: fièvre patudéenne, rhumatismes, etc., qui paraissent n'avoir eu aucun retentissement sur l'appareil urinaire. De ce côté, il a cu des difficultés de mictions duces à une citroitesse congénitale du méat avec adhèrences balano-préputiales soumises à de nombreux traitements, sans sucoès définitifs jusqu'à une opération plus complète, consistant en une large excision: depuis ce moment, il y a dix ans, la miction est parficiement normale.

Ce n'est que depuis trois ans qu'il a de nouveau présenté des troubles mictionnels, consistant en une fréquence plus grande, mais bientôt il ent des douleurs terminales assex vives; des cathétérismes répétés, des lavages, n'amenèrent aucun soulagement.

Le 1st mars, les urines sont très légèrement troubles; les mictions se renouvellent toutes les heures environ, peut-être plus souvent la nuit, le départ du jet se fait assez difficilement et s'accompagne d'une sensation douloureuse. Par le rectum, prostate peu volumineuse assez esnesible à la pression. Le cathétérisme donne issue, après une miction, à 40 grammes environ d'urine; la vessie est contractile et tolère environ 180 grammes de liquide.

Au cystoscope on voit une saillie prostatique médiane se prolongeant en barre latéralement. Devant l'échee des traitements palliatifs déjà suivis, l'opération de Bottini est proposée, acceptée et pratiquée le 5 mars. La section de la saille prostatique se fit en trois minutes et immédiatoment après une sonde-béquille donna issue à un liquide à peine teinté; elle fut laissée à demeure pendant trois iours.

Des le lendemain du retrait de la sonde, le malade urina facilement sans avoir besoin de faire des efforts comme auparavant, l'urine est limpide avec quelques filaments. Une sonde introduite après une miction ne retire plus que 10 grammes d'urine environ.

Quinzo jours après l'opèration, le malade, qui n'a plus été sondé, a été pris de bosoins fréquents et impérieux, presque subitement et le lendemain les urines se troublèrent et restèrent elhargées d'une assez forte proportion de pus, puis trois jours après eet état diminan; la prostate, examinée par le rectum à co moment présente des signes de congestion légère et une épididymite se déelare; mais les uriues redevienment tout à fait elaires, la mietion normale et la rétention nullo.

Oss. V. — M. C..., 63 ans, ne présente pas d'autres antécédents que des blennorragies assez nombreuses; il aurait eu il y a une trentaine d'années un rétréeissement soumis à la dilatation.

Il n'a rien óprouvé du côté des voies urinaires jusqu'aux trois dernières années; à ce moment les besoins fuvent un peu plus fréquents et surtout la miction plus difficile, des efforts étaient nécessaires, la nuit surtout, et n'amenaient souvent qu'uno faible quantité d'urine. A ces difficultés se oliginit biontôt une douleur qui se prolongeait après la miction; très variable dans son intensité, quelquefois à peine appréciable, ailleurs violente. Les urines paraissent être devenues troubles vors la même époque.

Il y a un an il suivit un traitement local; on lui pratiqua des instillations de nitrate d'argent qui amenèrent une amélioration et tout au moins parurent rendre l'urine limpide, mais seulement pendant quelques semaines à peine; voilà sept ou huit mois que le malade reste dans la même situation, souffrant par intermittences, surtout tourmenté par des besoins d'uriner très fréquents.

Le 22 mars mon exploration me montre un canal libre, une traversée prostatique longue et régulière; un ressaut très net au col vésical; la vessie vidée par la sonde aussitút après une miction contient 40 grammes environ d'urine un peu blanche; elle se contracte vigoureusement et le liquide est chassé avec force par la sonde, propulsion qui contraste avec la faiblesse de la miction normale.

Le toucher rectal permet de constater une prostate peu considérable sans déformation. Par contre le cystoscope montre une saillie prostatique assez considérable, mamelonnée, presque médiane, un peu inclinée à gauche.

Le 28 mars je pratique une section galvano-caustique : la vessie étant aseptisée et anesthésie avec une solution de cocaine à 2 0/0, l'instrument de Freudenberg est introduit, renversé, et le bec tourné en bas et légèrement à gauche dans la direction connue de la saillie prostatique. La lame étant portée au rouge, trois minutes et denie suffisent pour la faire progresser de 4 contimétres. Une sonde introduite aussitôt après livre passage à un premier jet d'urine très rouge, coloration qui s'attènue; le lavage boriqué raméen un liquidé à peine coloré. Les sensations douloureuses ont été insignifiantes.

La sonde est laissée à demeure jusqu'au 31 mars, temps pendant lequel aucun incident n'est à signaler, sinon la température qui s'èlève à 38°3 le premier soir pour retomber à 37°. Une géne, douloureuse par instants, se manifeste au péri née.

Pendant le quatrième jour, retrait de la sonde, les mictions furent cuisantes, mais la fréquence diminua. Dès le sixième jour le malade urine à peu près normalement; à la fin une sensation légère de cuisson se manifeste. Explorée le 15 avril. immédiatement après une miction, la vessie se vide complètement, l'urine est limpide et paraît aseptique.

Le 3 mai la situation est devenue tout à fait bonne, le malade peut rester quatre heures sans uriner. Enfin le 15 mai un examen cystoscopique permet de constater que la saillie prostatique est divisée par une brêche à contours arrondis et que la muquesse vésicale est à peu près normale.

Les quelques faits que je vieus de rapporter n'auraient pas une grande signification, s'ils ne concordaient avec les résultats des nombreuses observations publiées à l'étranger; ils permettent, à mon sens, de dégager en partie les avantages et les indications de la section galvano-caustique de la prostaté.

La condition qui domine cette indication est, on l'a vu, la conservation de la contractilité vésicale; dans quatre de nos observations les résultats définitifs ont été bons, et médiocres dans l'observation III qui a trait à une rétention complète, à une vessie distendue depuis longtemps. Il ne faut pas conclure de la faiblesse du jet constaté à un premier examen à une abolition de la puissance musculaire; celle-ci peut se réveiller dans deux conditions : d'abord, quand le vessée habituellement distendue, est soumise à des évaceustions régulières; ensuite, quand les parois infectées sont l'objet d'un traitement qui les rend asseptiques ou en diminue l'infection. Après ce double traitement, on voit souvent entrer eu contraction une vessie oui en avait deouis lonztemes serdu la faculté.

Plus délicates sont à diagnostiquer les dispositions de la prostate qui sont justiciables d'une section galvano-caustique. Il n'existe pas de rapport absolu entre le volume de la prostate et la rétention d'urine: des malades urinent normalement et vident leur vessie, alors que le doigt introduit dans le rectum, y rencontre une volumineuse saillie prostatique. Au contraire, l'existence d'une glande de petites dimensions, coincide ailleurs avec la rétention d'une grande quantité d'urine.

C'est qu'ici les saillies plus ou moins pédiculées qui entourent le col vésical, jouent un rôle prédominant; or, elles peuvent se développer et acquérir un volume important même lorsque le corps de la glande augmente peu de volume. Enfin, les dispositions qu'elles affectent donnent l'explication de faits cliniques en apparence contradictoires; une simple saillie en forme de luette, une barre transversale jouent le rôle de soupane et oblièrent le col au moment de la miction.

La connaissance de la topographie de la région cervicale est donc de toute importance; un examen direct est indispensable, les explorateurs ordinaires donnent quelques indications, presque toujours imparfaites; l'usage du cystoscope est indispensable. Grâce à lui, on a la région tout entière sous les yeux et on est à même de décider, non soulement de l'utilité de l'opération, mais aussi d'en arrêter les détails opératoires.

La réunion de ces deux conditions ne suffit pas pour opérer, car un certain nombre de vieillards qui les présentent n'en souffrent pas et peuvent arriver ainsi à un âge avancé. Mais des que des symptômes certains du prostatismo se manifestent, que la fréquence apparait, que la réstention s'établit et augmente, que les douleurs et l'infection menacent, on est en droit d'intervenir et le plus tot sera le miestion.

J'aborde ici une question capitale, c'est l'age du malade qui tient le pronostic sous sa dépendance. Plus les observations se multiplient, et plus il devient évident que les seuls résultats excellents ont suivi des opérations pratiquées sur des sujets relativement jounes. C'est chez eux qu'on a vul a rétention diminuer, ou même disparaitre complétement, la fréquence s'attenuer et surtout que l'amedioration obtenue s'est maintenue. Et cela devait être si l'on considère les conditions pathogéniques : en avant d'une vessie fatiguée, s'élève et grandit un obstacle qui l'Oblige à des contractions plus puissantes; elle luttera pendant un temps d'autant plus long que le malade sera plus resistant, mais elle finir par succomber

et se laisser distendre. Un prestatique est alers comparable à un malade atteint de rétrecissement de l'urètre; il ne vieudrait à personne aujourd'hui la pensée d'abandenner ce dernier à lui-même et de ne pas lever l'obstacle; sans pousser trop loin l'analogie, il faut bien cependant reconnaître combien sont somblables les situations des uns et des autres. L'intervention semble même plus urgente auprès d'un prostatique dont la vessie moins jeune et moins résistante se laissera plus fecilement. forçei-

Aussi est-ce pour ces cas que l'opération de Bottini trouvo des indications particulières. Sans deute, une opération à ciel ouvert vise un résultat plus précis et plus complet. Mais en présence de ces cas de début, alors que les symptômes se réduisent à peu de chose, et qu'on cherche surtout à sauvegarder l'avenir, le chirurgion peut hésiter à pratiquer une taille hypogastrique ou périnéale, opérations d'une importance réelle. Au courtaire, l'opération de Bottini, faite sur des organcs aseptiques, chez un sujet résistant, est suffisante peur lever un obstacle léger et peu considérable, et empécher ainsi l'évolution du prostatisme, dans un grand nombre de cas

A l'étranger, les indications de l'opération semblent un peu différentes, et certains chirurgiens la pratiquent contre la rétention complète. Assurément, elle rend des services dans ces cas, en tant que méthode palliative; je pense cependant que lorsque les voies urinaires sent très infectées, il vaut mieux ouvrir largement la vessie, agir sur la prestate et ne pas refermer immédiatement la cavité vésicale. Laisser la plaie produite par le couteau galvanique en contact avec un liquide infecté dans une cavité clese me semble dangereux, et la plupart des accidents signalés reconnaisseut cette étiologie.

Des accidents sont en effet possibles, et l'innecuité de l'opération de Bottini est loin d'être absolue: l'hémorragie est rare; tout au moins atteint-elle rarement une importance notable. Le plus souvent, il s'agit d'infection: prestatite et périprostatite, pyélite et pyélonéphrite, accidents généraux d'intoxication urineuse, dont la nature vient confirmer les réserves que j'émettais à l'instant au sujet de l'incision galvano-caustique chez les sujets infectés.

Quoi qu'il en soit, l'estime que l'opération de Bottini mérite d'entre aujourd'hui dans la thérapeutique du prostatisme. Il ne faut pas en faire, ainsi qu'elle paraît être aux yeux de certains chirurgiens étrangers, une panacée, et ne pas lui reconnaitre de contre-indications; vouloir l'appliquer à tous les cas, indistinctement, est assurément le meilleur moyen de la déconsidérer.

Réservèe aux malades aseptiques ou peu infectés, à ceux chez qui la sonde passe difficilement, aux sujets d'un âge médiocrement avancé, aux petis cas et aux cas moyens en un mot, elle constitue une opération peu dangereuse, cflicace, facilement acceptée des malades, et dont l'application me paraît dévoir s'étendre, siones se chéralisser.

Discussion

M. Albert Robin. — M. Desnos voudrait-il communiquer à la Société son opinion au sujet du traitement médical de l'hypertrophie de la prostate?

M. Dissons. — Ce traitement consiste surtout en prescriptions hygieniques: l'iodure de potassium, prescrit autretois
sous l'influence des idées de Launois, ne donne pas de résultats appréciables. Les prescriptions hygiéniques sont conunes: éviter les excès de tout genre, les mets épicés, favoriser le fonctionnement du tégument outané. Mais il ne
faudrait pas croire que l'intervention chirurgicale constituét
pour cela le seul traitement à consciller: le cathétérisme
bien fait avec les précautions prises ou recommandées aujourd'hui par tous les médecins consciencieux, s'applique au
plus grand nombre de cas.

M. Albert Robin. — M. Desnos a-t-il eu recours au cataplasme local, jadis recommandé par Guillon? Je m'en suis souvent servi en incorporant à ce cataplasme de l'iodure de potassium ou de l'ergotine.

M. Desnos. — Parmi les malades traités par moi par cette méthode, j'ai eu une seulé amélioration : il est du reste difficile de conclure au sujet de tous les traitements de ce genre, car la maladie procéde par à-coups, et on est trop facilement tenté d'attribuer à la médication une accalmie éventuelle.

M. Albert Robin. — M. Desnos a-t-il employé les suppositoires d'onguent mercuriel ?

M. Dissos. — Ce topique est excellent pour enrayer les poussées congestives : il décongestionne, mais ne guérit pas. On peut en dire autant de toutes les opérations effectuées sur l'appareil testiculaire : on sait aujourd'hui, après une période d'entitousiasme, que les résultats remarquables obtenus ne sont qu'éphéméres : au bout de quelques mois, un an au ulus, le prostatisme reprend as marche.

M. Allear Rosm. — J'ai vu en outre Winternitz utiliser un appareil composè d'une canule introduite dans le rectum et munie d'une échancrure venant s'adapter sur la région prostatique : un courant d'eau froide ou claude, à volonté, parcourt la canule et vient agir sur l'organe l'opertrophié.

M. Desnos. — Je ne me suis pas servi de cet appareil, mais il doit évidemment exercer une action bienfaisante sur les troubles congestifs.

D' P. Bouloumé. — Pour apprécier à leur valeur les traitements médicaux et hygiéniques dirigés contre les troubles d'origine prostatique, il faut distinguer ceux qui sont liés à la congestion de l'organe, si fréquente chez l'homme ágé, de ceux qui dépendent de l'hypertrophie prostatique et il faut tenir compte do l'association de l'hypertrophie et de la congestion.

Parmi les traitements qui m'ont paru agir utilement sur les symptomes, douleur et dysurie accompaguant ces états figurent en effet les lavements-entaplasmes de Guyon, dont a parlé M. Albert Robin. Leur emploi est souvent utile surtout si on ajoute à la décection de graine de lin un antisoptique qui agit en partie comme tel, et en partie comme calmant de douleur. J'ai, en pareil eas, ebteun de bons résultats de l'ichthyol. L'association de ellorhydrate d'ammoniaque m'a jusqu'ici paru produire de bons effets. L'emploi de ces lavements-cataplasmes doit être prelongé et associé à celui do lavements-chauds, les premiers introduits de préférence lo soir au contener et couservée pendant toute la nuit, les seconds pris le matin pour débarrasser l'intestin et agir, par leur température, comme résoluités.

Je n'ai employé que chez un malade la canule en verre à circulation d'oau chaude, employée en Allomagne, contre les hémorrhoides et les engorgemonts prostatiques; je n'en peux d'aprés cela rien dire au point de vue thérapeutique, jo ne peux dire qu'une chose c'est que son application était particulièrement désacrésable au malade.

En ee qui eoncerno le cathétérisme, je vois qu'il faut, dans l'intérêt de tous, malades et médecins, faire quelques restrictions à ce qu'a dit M. Desnos.

J'ai va fréquemment des accidents causés par le cathéterisme chez des prostatiques et il en est beaucoup qui vont d'autant mieux qu'on les soude moins : les accidents traumatiques locaux étant fréquents chez eux par le fait de l'opération et l'infection survenant très facilement en pareil cas. Je crois devoir signaler, en outre, que si dans un certain nembre de cas on se treuve bien d'un eathétérisme pratiqué d'emblée avec un Beniqué d'un certain volume, il ue fast pas croire qu'on obtiendra des résultats d'autant meilleurs qu'on renouvellera davantage ce cathétérisme; souvent au contraire, des cathétérismes répétés ont fait disparaître les bous effets du premier.

Parmi les traitements internes, les eaux minérales peuvent revendiquer le succèss dans le traitement de certaines prostatiques, mais cen 'est que dans le cas de prostatités subaiguès ou de prostatites dont le symptome dominant est l'état catarrhal de la vessie. En pareli cas, soit par l'ingestion seule de l'eau qui agit comme boisson aseptique diurétique et résolutive, soit par l'adjonetion à l'usuge interne de l'eau, de meyens hydrothérapiques loeaux on arrive à de bons résultats mais sur l'hypertrophie prostatique elle-même on n'obtient rien de l'eau hydrominérale ni des médications internes.

M. Balzer. — Je demanderai à M. Desnos si en n'a jamais essayé des injections interstitielles, qui donnent de si beaux succès dans l'hypertrophie de la thyroide?

M. Desnos. — Heine a injecté de la teinture d'iode à six malades par ce procédé: il a eu doux morts. Pousson, de Bordeaux, a fait de l'électroponeture et il a eu des abcés de la prostate.

M. Balzer — Les accidents ont été sans doute causés par les dificultés inhérentes au milieu dans loquel on opérait. Ne pourrait-on choisir la voie périnéale pour éviter les chances d'infection?

M. Desnos. — Du moment qu'on se décide à opérer par le périnée, mieux vaut recourir à une grande opération.

Au sujet de la distinction entre les résultats intéressant l'état congestif seul ou l'hypertrophie elle-même, je répondrai à M. Bouloumié qu'un de mes malades, examiné au cystoscope avant et après l'opération de Bottini, présente aujourd'hui une encoche en V en un point où existait auparavant une saillie très marquée. Il ne faut pas oublier, d'un autre côté, que les poussées congestives sont entretennes et aggravées par l'obstacle prostatique; donc, en diminuant ou supprimant cet obstacle, on s'adressera en même temps aux poussées congestives et aux troubles de rétention.

M. Lerrede. — A-t-on essayé, dans les poussées congestives, des courants de haute fréquence ? l'ai vu un spasme de l'anus céder en quelques séances, sous l'influence de ces courants ; ce spasme avait résisté aux médications les plus variées.

M. Desnos. — Je me souviens qu'Apostoli m'a dit s'être trouvé bien des courants de haute fréquence, chez 2 ou 3 prostatiques, mais il n'a rien publié à ce sujet.

Etaient présents à la séance :

Titulaires: MM. Balzer, Baudouin, Bolognesi, Burlureaux Brun, Catillon, Cautru, Courtade, Créguy, Crinon, Dalché Desseyuelle, Delpech, de Molenes, Duchesne, Desnos, Dupont Gallois, Leredde, Patein, Picou, Albert Robin, Riche, Sevostre Triboulet, Vigufer, Vogt.

Correspondants: MM. Bouloumié, Duhourcau.

La séance est levée à 6 heures.

Le secrétaire des séances,

Vogt.



REVUE DES TRAVAUX FRANÇAIS ET ÉTRANGERS

Pharmacologie.

Le dormiol. — Le dormiol ou diméthyléthylearbinolchlora est une combinaison des hydrates de chloral et d'amylène.
Gest un liquide incolore, oléagineux, d'odeur campirree et de saveur à la fois frafche et brûlante. Il s'administre sous forme de solution aqueuse ou en capsules. Une dose de 0 gr., 50 est souvent suffisante, mais on peut suns inconvenients la porter à 3 ou 3 grammes. On s'accorde à fiser à 6 grammes la dose maxima. Ce médicament n'exposerait pas aux phénomènes d'accumulation. Les expériences de Méltzer out montré que, si le dormiol, est aussi taxique que le chloral, il est moins dangereux, sa résorption étant plus lente et donnant aux contrenoisons le termes d'ariri.

M. Ladislaus von Kelty, à la clinique de l'Université de Budapest, a expérimenté le dormiol chez 23 malades alités et chez 30 ambulants. Les premiers présentaient de l'insomnie de cause variée (hystérie, neurasthénie, chorée, affections cardiaques on pulmonaires, etc.). Il n'a en qu'un insuccès avec la dose de 2 grammes chez une hystérique pour laquelle les autres hypnotiques ont aussi échoué. O gr., 20 ont généralement suffi, et pour un ou deux malades il a fallu clever la dose à 1 ou 2 grammes. Le dormiol a été efficace dans des cas pour l'esquels les médicaments similaires avaient échoué.

Produit en 30 ou 40 minutes, le sommeil a été ealme, sans rêves et a duré de 4 à 6 heures. Rien de pénible au réveil ; pas de troubles de l'appétit ; pas d'accoutumance.

Mêmes phénomènes pour les malades ambulants, si ce n'est que l'on compte 5 insuceès (3 hystériques et 2 phtisiques). Les malades ont tous accepté volontiers le médicament (Therapie der Geanwart, août 1990). M. Dehis a pris le dormiol à la dose d'un gramme : sommeil rapide et ealme; réveil facile et sans inconvénients. Il l'a employé chez les malades atteints d'affections mentales; un seul a accusé la céphalalgie. Dans le jour, le dormiol ealme l'agitation sans produire de troubles moteurs comme le sulfonal.

Employé à hautes dosse (2 grammes deux fois par jour), il produit une accoutumance tardive. La dose de 2 grammes est toujours suffisante, mais on peut la porter à 3 grammes sans inconvénients. Dans les insomnies peu rebelles il suffit de 1 gramme.

Chez les épileptiques en état de mal, le dormiol paraît diminuer le nombre des accès (Psychiatrische Wochenschrift 1900, n° 3).

M. Frieser (de Vienne) ayant administré le dormiol dans 20 eas d'insomie rebelle, a eu des résultats prompts, siris, et auffisanta: le sommeil est survenn au lout de 15 à 30 minutes, a été calme et a duré de 6 à 8 heures. Le dormiol est aussi actif que le chloral et n'a pas ses inconvénients. Le dose de 0 gr. 50 est souvent suffisante; il emploie généralement 1 gramme à 1 gr., 50. En cas de douleurs on peut y ajouter 2 ou 3 centigrammes de morphine. Il ne semble pas se produire d'accoutumance. (Aextiliène Central Zeitung, 1900, n° 13.)

Pour M. Otto Dornblith (de Francfort-sur-le-Mein), les meilleures hypnotiques sont le trional et le dormiol. Le premier a l'inconvénient d'être lent à agir et d'être parfois toxique. Le dormiol agit vite, sûrement et ne laisse pas de traces le lendenain. La dose inférieure est 1 gramme; la dose habitaelle 1 gr., 50 à 2 grammes. Le sommeil survient parfois au bout de 10 minutes, rarement après plus de 30 et il dure plusieurs heures. Quand le sommeil n'est pas assex prolongé, on peut associer au dormiol 0 gr., 50 ou 1 gramme de sulfonal; s'îl est trop long à venir on fera prendre une heure plus tôt, la même dose de trional. Le dormiol a pu être

pris sans inconvénients plusieurs jours de suite à la dose de 2 à 3 grammes, (Aerztliche Monatschrift, 1901, n° 1).

Le tannate d'orexine. — Depuis quelques années, au chlorhydrate d'orexine que Penzoldt avait introduit dans la thérapeutique, à l'orexine basique qui l'avait d'abord remplacé, on tend à substituer le tannate d'orexine, préparation qui n'a pas les ineouvénients reprochés aux précédentes.

M. B. Laquer (de Wiesbaden) dit l'avoir expérimenté chez 20 malades, enfants on adultes, et il a suffi d'une expérimentation de 2 à 15 jours pour en constater les bons effets dans les 4/5 des cas. Son goût légèrement erayeux, son défaut d'odeur permettent de prendre le tannate d'orexine sous forme de poudre, par exemple, en suspension dans une euillerée de lait, que l'on administre une heure ou une heure et domie ayant les principaux repas.

Dans un eas de gastralgie nerveuse longtemps traité sans succès à Kissingen, le tannate d'orexine fit disparaître les douleurs d'une facon à peu près complète.

Chez les gens bien portants, il dissipe le sentiment de plénitude stouncale dù aux aliments indigestes, et l'on pourrait craindre que sa vulgarisation n'arrivât à permettre à nos contemporains les excès de table auxquels ils n'ont que trop de propension.

La dose utile est de 0 gr., 50 à 1 gramme pour les adultes, de 0 gr., 25 à 0 gr., 50 pour les enfants. On ne prendra aueun aliment entre le médicament et le repas. Les l'ésions anatomiques de l'estomac, telles que les niclères, etc., en sont une contre-indication. Le tannin qui entre daus la composition du produit, ne paraît pas causer de constipation (Medizinische Newigkeiten, 1900 nº 1).

M. Prüssian (de Wiesbaden) a expérimenté le tannate d'orexine d'une façon systématique elez 30 enfants de la polichinique appartenant aux elasses pauvres. Ces enfants, dont l'âge serait de 22 mois à 11 ans, étaient atteints d'anorexie avec ou sans autre altération pathologique; seules avaient été éliminées les lésions du tube digestif et les maladies aigués fébriles. Jusqu'à 6 ans, la dose a été de deux tablettes de 0 gr., 25 prises une heure et demie ou deux heures avant les repas; aux cufants plus grands, il a été donné 0 gr., 50 de poudre. Tous l'ont pris sans difficultés.

Si dans 7 eas le résultat a été nul (peut-étre par suite de la négligence des parents), dans 23 autres les bons effets ont été plus ou moins évidents. Parmi ces derniers on comptait 5 tuberneleux et 12 anémiques. En 15 jours, sous cette influence un tuberculeux de 4 ans a augment de 700 grammes et un autre de 6 ans de 900 grammes. Malgré des conditions matérielles défavorables, une jeune anémique de 13 ans, qui jusqu'alors maigrissait de plus en plus, a augmenté de 2,000 grammes en deux semaines.

L'effet de l'orexine tient surtout à son action locale sur la muqueuse de l'estomac, où elle détermine de l'hyperhémie et une sécrétion plus actire de sue gastrique. Ce mode d'action n'est peut-être pas exclusif, mais les observations faites sur les enfants permettent d'affirmer que la suggestion n'entre pas ici ni jeu. (L'eitechrift propriètiech Acretc, 1900, n° 16), n° 16).

Estimation de l'urée dans l'urine. — A. Jolies (Zeit. Annat. Chem., 1900, 137-145) a examiné les différentes méthodes employées pour l'estimation de l'urée dans l'urine, il trouve que celles de Pfläger et de Topper donnent des résultats identiques.

Voici ces méthodes: 1º Méthode de Freund et Topper. On mélange 5 centimètres eubes de l'urine avec 5 centimètres cubes d'alcool à 950/0. On évapore au bain-marie jusqu'à dessiccation. On extrait le résidu avec de l'alcool absolu, on filtre, et on distille. On traite le résidu avec de l'alcool absolu, on filtre, et on distille. On traite le résidu avec environ 70 centimètres cubes d'une solution éthérée d'acide oxalique. On filtre l'oxalate de l'urée précipité, on lave avec de l'éther pour débarrasser de l'acide oxalique, on dessèche à 70-80; puis on dissout dans l'eau et on traite la solution par de l'hypobromite alcalin dans un azotomètre.

Méthode de Pflager. — On méle 10 eentimètres cubes d'urine filtrée avec 30 eentimètres cubes d'eau et une solution d'acide chlorhydrique et d'acide phosphotungstique (100 centimètres cubes HCI et 900 centimètres cubes d'acide phosphotungstique à 1/10°). On chauffe au bain-marie pendant quinze minutes, on laisse refroidir pendant plusieurs heures. On complète à 100 centimètres cubes et on filtre sur un papier sec. On met 25 centimètres cubes de la solution dans l'azotomètre et on rend alcalin en ajoutant de l'hypobromite. En se servant de ces quantités de substances, I centimètre cube du N équivant à I gramme d'uvie pur litre d'urine.

Maladies du cœur et des vaisseaux.

Contribution au traitement des maladies cardiaques. — M. Hellendal propose (Ber. Med. W., 29 novembre 1909) l'emploi d'une pelote cardiaque destinée à soutenir et à soulever le cœur. Il a remarqué que ce soutien est particulièrement utile dans les cas de palpitations, de maladie de Basedow, de neurasthénie rardiaque, d'insuffisamee mitrale, d'hypertrophie cardiaque consécutive au rein granuleux, d'accés angineux. Dans cres cas, la pression sur la région du cœur, soulage le malade. Abbée avait déjà propose du napareil analogue. Le bandage de Hellendal se compose d'une pelote qui appuie sur la région par l'intermédiaire d'un ressort, elle est maintenure en place par une ceinture et des bretelles.

Le Gérant : O. DOIN



Les progrès du cancer. — Comment on entendait la tempérance au XVI* siècle. — L'hygiène au Palais-Bourbon. — Les métaits du corset. — Fécondité extraordinaire. — Encouragement à la repopulation. — Influence de la neau sur la coagulation du sang.

Les cas de cancer deviennent de plus en plus nombreux. Ainsi dans les sept principales villes américaines, il ne succombait au cancer en 1870 que 35,4 par 100,000 habitants, tandis qu'en 1898 co nombre se trouve presque doublé, et actuellement on peut compter en Amérique envirou 100,000 cancéreux.

Le même fait est signalé en Allemagne: le nombre de cancéreux qui n'était en 1877 que de 2,952 est monté en 1890 à 12,548, c'est-à-dire a quadruplé. En Allemagne il meurt annuellement du cancer 40,000 habitants.

Les faits ne sont pas plus encourageants en Russie: d'après les renseignements fournis au bureau de statistique de la municipalité de Moscou, en 1890 on a noté 411 cas de mort à la suite de cancer, et en 1896 ce chiffre est doublé, le cancer de l'asophage semble prédominer sur les autres localisations.

. 1

Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on lutte contre l'alcoolisme, témoin les statuts ci-après de la première société de tempérance que le comte palatin Frédéric V fonda en 1600;

 Engagement valable pour deux ans de s'abstenir de toute ivresse complète; — obligation de ne pas boire plus rome cxxxxi. 23° Livr. de sept coupes de vin par repas et plus de quatorze coupes par jour; — pour étancher le surplus de la soif, la bière et les eaux minérales étaient seules autorisées. — Autorisation de boire une seule coupe d'eau-de-vie ou autres boissons fortes, à déduire toutefois des quatorze coupes réglementaires. »

BULLETIN

C'était un commencement de tempérance! Combien de coupes devaient boire ceux qui n'étaient pas tempérants!!!

*

Les conditions hygiéniques du Palais-Bourbon sont, paraitil, déplorables. En termes très vifs, M. le Dr Lachaud exprime les griefs et le mécontentement de ses collègnes de la commission de l'hygiène publique. Naturellement l'honorable rapporteur a fait son rapport de statistiques et de descriptions telles que le plus sceptique est forcé de conclure que le Palais-Bourbon est rempli des microbes les plus dangereux. « Si on jette, dit-il, un coup d'œil sur la statistique mortuaire de la Chambre, on est frappé de voir que depuis 1898, sur 24 décès, près de dix députés de toutes les régions, presque tous jeunes, robustes, et dont on aurait pour ainsi dire acheté la santé, sont morts atteints par le même mal, emportés en quelques heures par des pneumonies infectieuses, dont ils ont pris les germes dans cette salle des séances, où non seulement es plus atroces variations de température prédisposent au mal, mais où les poussières de toutes natures contiennent les éléments de nombreuses affections, et comme le fait remarquer M. Trélat, ne permettent pas aux députés de pouvoir rester assis pendant plus de deux heures, sans qu'ils se livrent à des déplacements continuels, »

. *

L'accuse-t-on assez ce pauvre corset ? Depuis quelque temps on voit paraître non seulement des articles dejournaux, mais des théses, mais des livres pour bien faire ressortir tous ses mefaits. On prétend notamment que le corset occasionne la mobilité anormale du rein ou du moins y prédispose. Els bien, ce grief ne serait pas justifié au dire de M. Trekaki (d'Alexandrie) qui a rencontré l'ectopie rénale dans 43 0/0 des cas clece des femmes arabes qui ne portaient in corset, ni autre vôtement susceptible d'influencer la position du rein. L'ectopie rénale (roin mobile) serait donc plus l'équence clez les femmes qui ne portent pas de corset que chez les autres.

. .

Les journaux italions rapportent qu'une journalière des onvirons de Rome auvait, dernièrement, donné le jour à son soixante-deuxième enfant. Elle auvait eu ainsi 41 filles et 21 garyons en vingt-six ans. Elle est ágée de cinquante-ner ans. Maricé a vingt-luit ans, elle a cu successivement 1 fille, puis 6 garyons d'un coup, puis 5 garyons, 3 garyons, 4 filles et enfin une longue sério de jumeaux terminée, il y a quelques iours, nar une série finale de 4 garyons.

On ne dit pas combien il y a d'enfants vivants à l'heure actuelle.

. .

Tandis que l'Etat de Minnesota élabore un projet de loi tendant à empéchor le mariago d'individus atteints de tares hysiologiques, le Wisconsin se prépare de son côté à adopter deux bills pour encourager les unions et assurer le développement de la population. L'un de ces bills accorde une prime annuelle de 50 francs aux méres qui auront plus de six enfants, et cette prime est portée jusqu'à 175 francs pour douze enfants. L'autre projet crée une taxo de 50 francs sur less édibtaliers ágés de plus de trente aux de

. * .

En étudiant séparément le mode de coagulation de différentes gouttes do sang provenant de la même hémorrhagie, M. Miljan a pu constater que les dernières gouttes, et suriout celles que l'on obtient par pression après la cessation de l'écoulement sanguin, se coagulent beaucoup plus rapidement que les premières. Ils agit d'une sécretion de substance coagulate par la peau, dont les cellules ouvertes par la piqure laissent échapper leur contenu. La démonstration décisive a été fournie à M. Milian par ce fait que la coagulation de liquide d'ascite, non spontanément coagulables, se produit rapidement lorsqu'on y ajoute une petite dose d'extrait aqueux de peau.

Il résulte de ces notions nouvelles, que la technique actuelcement employée pour l'étude de la coagulation donne des renseignements sur le pouvoir coagulant de la peau et non pas sur la coagulabilité vraie du sang. Dans les muladies hémorrhagiques, il existe à côté de la crase sanguine une crastissulaire que modifierait peut-être une opothérapic approprée. L'hémophilié, en particulier, peut être distinguée en hémophilié locale tissulaire, la plus fréquente sans doute, et en hémophilié genérale sanaguine.

A l'opothérapie cutanée de faire ses preuves l

REVUE CRITIQUE

Des laits artificiels.

Par le De J. LAUNONIER.

On a beaucoup vanté, dans ces dernières années, un certain nombre de préparations, souvent à base de lait, mais parfois aussi fabriquées de toutes pièces à l'aide de matériaux purement chimiques, destinées à remplacer le lait de vache dans l'allatement artificiel des nourrissons. Ces diverses préparations sont en quelque sorte des laits artificiels, qui, tout en restant de composition théorique voisine, ne présentent plus cependant les propriétés organoleptiques du lait physiologique, ni même toujours ses qualités alibiles; elles diffèrent donc profondément, à ce point de vue, des laits complets simplement stérilisés qui ont gardé leurs propriétés essentielles ou même accru (digestibilité de la caséine, par exemple) certaines d'entre elles.

Ces laits artificiels ont fait l'objet de discussions passionnées, soutenues avec une égale ardeur par leurs promoteurs et par leurs détracteurs, et dont jusqu'à présent aucune lumière bien éclatante n'a jailli. Je n'ai point la prétention singulière, en quelques page, d'éclairer le problème, ni de trancher le différend. Mon but ici est simplement d'exposer l'état de la question, afin de permettre aux médecins d'apprécier la valeur pratique des différents procédés d'alimentation des nouveau-nés par les laits attificiels.

Le point de départ de la préparation des laits artificiels réside dans une idée juste que l'on a formulée humoristiquement, quoiqu'un peu grossièrement, de la manière suivante : « Le lait de vache n'est pas plus fait pour nourrir les petits enfants que le lait de femme pour nourrir les veaux ».

Et, en effet, en dehors des différences biologiques qui tiennent aux caractères mêmes des deux espèces, il y a, entre le lait de femme et le lait de vache, des différences assez notables dans la composition chimique brute, ainsi que l'indique le tableau suivant.

	LAIT DE	FENNE	LAIT DE VACHE				
	Yernois et Becquerel	Ferry	Vernois et Becquerel	Ferry			
Densité. Eau Matières fixes. Albumine et caséine. Beurre Lactose Mafières minérales.	1032,67 889,08 110,92 39,24 26,66 43,61 1,38	1033.5 900,10 133,40 10,52 43,43 76,14 2,11	1633,38 815,66 151,35 11,21 63,35 12,47 6,13	1033,5 910,8 123,32 98,12 31 52,16 6			

Etant données les différences individuelles, constatées par les analyses, des laits d'une même capèce, on admet. d'une manière générale, que le lait de vache est plus riche en caséine et en sels, plus pauvre en lactose que le lait de femme. Comme c'est au lait de vachc que l'on s'adresse ordinairement, et en dehors de toute indication spéciale, pour l'allaitement des nouvrissons auxquels on ne peut, pour une raison ou pour une autre. donner le sein, il faut donc modifier le lait de vache de manière qu'il se rapproche le plus possible du lait de femme, c'est-à-dire d'une part, le décaséiner et diminuer la proportion des sels, - ce qu'on obtient le plus souvent'en le coupant d'eau - et d'autre part le sucrer. Tel est le principe des coupages, employés empiriquement dans beaucoup de ménages, au cours des premières semaines après la naissance, quand l'enfant n'est pas nourri au sein.

L'utilité de ces coupages semble si évidente que l'on a cherché à les systématiser. Ainsi, d'après Uffelmann, il convient de diluer le bon lait de vache dans les propor-

Escherich, qui part de la quantité d'éléments nutritifs contenus dans le lait de femme, formule ainsi les dilutions.

En France, Marfan préconise le coupage par moitié pendant les 5 premiers jours, puis du 6° jour jusqu'à 6 mois le coupage est fait par un tiers d'eau seulement.

Dans tous les cas, l'eau de coupage peut être et doit être même additionnée de lactose, ou, à son défaut, de saccharose, dans la proportion de 8 à 12 grammes (2 à 3 cuillerées à café) par litre d'eau bouillie.

Le coupage du lait, pendant les premières semaines de la vie, empéche certainement la suralimentation (pas toujours cependant la surcharge gastrique par suite de l'excès du liquide ingéré sur la faible capacité stomacale du nouveau-nel), et les accidents plus ou moins graves qu'elle peut ultérieurement entraîner; elle évite cette dyspepsie du lait pur, qu'invoque Marfan pour repousser l'usage précoce du lait sans coupage, encore que cette dyspepsie me paraisse due, non à ce lait pur, mais bien au défaut de méthode rationnelle dans son administration.

En revanche le coupage avec de l'eau, sucrée ou non, diminue la proportion de graisse du lait de vache, déjà plus pauvre, sous ce rapport, que le lait de femme, si l'on s'en rapporte aux analyses de Gautrelet, de Ferry, etc.; en outre, et c'est là sans doute son plus grave inconvénient, il expose le lait à l'ensemencement ; dans les familles, il est rare que l'on prenne à cet égard toutes les précautions nécessaires et ces négligences, involontaires la plupart du temps, je le veux bien, justifient à mes veux, dans une certaine mesure, cette prescription du coupage du lait avec de l'eau de mauve, par exemple, tant reprochée à certains praticiens, qui savent cependant par expérience que c'est là le seul moyen sûr d'obtenir la dilution du lait avec de l'eau réellement bouillie. Au reste Marfan, si partisan qu'il soit du coupage, ne peut s'empêcher d'en reconnaître les dangers et c'est pourquoi il déclare « qu'il doit être fait, pour obtenir de bons résultats, par une personne particulièrement intelligente et soigneuse, que le médecin surveillera et dont il fera patiemment l'éducation ».

Cette condition si difficile à réaliser, ainsi que tout le monde le sait, est, comme le dit très bien Mauchamp, la condamnation pure et simple du coupage du lait dans la pratique ménagère; elle explique toutefois que l'on ait songé, depuis une vingtaine d'années, à livrer à la consommation, pour parer aux négligences, aux erreurs, aux difficultés de la correction, des laits industriellement coupés, des laits maternisés, humanieés, etc., préparés suivant une méthode rigoureuse. Depuis Enko, qui, en 1880, additionnait le lait de vache, de jus de viande ou de jaune d'œuf, puis ultérieurement, de 1/2 0/0 de peptone sèche de Kareef, un grand nombre de procédés pour la rectification ou la maternisation du lait ont été successivement proposés. Je ne puis naturellement les passer tous en revue; je me contenterai de citer les principaux, en groupant les laits qu'ils donnent sous trois chefs: 1º Laits coupés proprement dits; 2º laits centrilugés; 3º mélanges divers.

1º Laits eoupés. — Voici la méthode préconisée par Dufour, de Fécamp. Le lait pur de vache, placé dans un récipient de verre à robinet inférieur, est laissé au repos, dans un endroit frais, pendant 4 heures; au bout de ce temps, deux couches se sont formées, l'une de ce temps, deux couches se sont formées, l'une de cereme, à la partie supérieure, l'autre de lait bleu ou maigre à la partie inférieure. A l'aide du robinet, on retirie environ un tiers du lait bleu, que l'on remplace par une nême quantité. d'une solution contenant 35 grammes de lactose et 1 gramme de chlorure de sodium pour 1,000. On mélange intimement le tout, après avoir ajouté encore, si besoin en est, une ou deux cuillerées de crème fraîche. On met en bouteille et on stérillise au bain-marie ou de préférence à l'autoclave.

Tout récemment (1900), Eury, pharmacien à La Rochelle, a proposé un procédé analogue. Aussitôt après la traite, le lait est reçu dans un récipient approprié et soumis à la stérilisation au bain-marie pendant 3/4 d'heure, et ensuite abandonné au repos pendant 12 heures; au préalable, on a fait une prise de lait que l'on analyse pour déterminer la teneur en caséine. Au bout des 12 heures, les 3/6 au moins de la totalité du beurre sont accumulés à la surface sous forme de crème. D'après l'analyse préalablement faite, on détermine la quantité de lait écrémé à soutirer par siphonage, quantité qui est, pour les laits de vache moyens, de 40 0/0 environ du volume total ; ce siphonage fait, on ajoute au lait une quantité égale d'une solution de lactose à 70 0/00; on brasse, on met en bouteille et on stérilise à l'autoclave. Le lait ainsi préparé contient de 18 à 20 grammes de caséine et de 32 à 35 grammes de beurre par litre.

Le lait humanisé, de Vigier, est préparé de la manière suivante. La caséine du lait de vache avant été dosée. on sépare la masse du lait, aussitôt la traite, en deux parties, dont l'une doit contenir, à elle seule, une quantité de caséine égale à celle que contiendraient les deux parties réunies de lait de femme. La scconde partie abandonnée au repos dans un endroit frais, est écrémée quand la crème est suffisamment montée, et cette crème est ajoutée à la première partie. Cette seconde partie. ainsi écrémée, est traitée par la présure ; le caillot de caséine est retiré et ce qui reste, c'est-à-dire le sérum, est décanté et ajouté encore à la première partie. Cette première partie, qui contient à présent la presque totalité du beurre, du sucre et des sels, mais seulement la moitié environ de la caséine de la traite entière, est cnfin mise en bouteille et stérilisée à l'autoclave. Ce lait est donc. somme toute, du lait normal simplement dépouillé de son excès de caséine ; il y a copondant un léger déficit de graisse et de sucre, provenant de ce que le caillot de caséine a entraîné dans ses mailles. Au surplus, ce procédé ne paraît pas présenter toutes les garanties voulues relativement à l'asepsie du lait au cours des manipulations.

2º Laits centrifugés. - Parmi ces laits, on ne peut guère citer que le lait maternisé, de Gartner. Dans ce lait. l'excès de caséine est retiré par la centrifugation. la machine rotatoire (qui donne de 6,000 à 8,000 tours par minute) accumulant la crème au centre, et le lait maigre, ainsi que les impuretés, à la périphérie. Le lait soumis à cette opération est au préalable coupé avec une solution de lactose, de manière à ramener la teneur de la caséine à 20 0/00 environ. Le débit du robinet qui recueille le lait gras (au centre) est réglé pour obtenir 35 grammes de beurre par litre. On a de cette facon un lait tout uniment décaséiné, comme dans les méthodes précédentes, mais l'eau ajontée est séparée par le centrifugage. Dans ce lait, de couleur jaunâtre, le beurre est désémulsionné : il s'attache aux parois de la bouteille. maleré l'agitation qu'on doit lui faire subir, et n'est pas, par suite, consommé par l'enfant, ce qui constitue un réel inconvénient. On stérilise le lait maternisé avant de le livrer à la consommation. Voici sa composition pour 1.000.

Albuminoides.							17,60
Beurre							35
Sucre							60
Sels minéraux					¢		3

Cette composition est celle que l'on admet en Allemagne et en Autriche, où ce lait jouit d'une assez grande faveur. Mais, d'après Marfan, dans le lait fabriqué en France suivant la méthode de Gärtner, la teneur en caséine est un peu plus élevée (22 0/00 environ), circonstance qui ne saurait être du reste qu'avantagouse. 3º Mélanges divers. — Il y en a un grand nombre, auxquels il convient d'ajouter certaines préparations à base de lait qui s'éloignent des laits de coupage.

La formule de Meigs, de Philadelphie, fixe la composition du mélange préconisé par les médecins amériains et anglais, dans l'allaitement artificiel, mélange très voisin, comme composition du lait de femme, et dans lequel, avec l'addition d'eau de chaux, la caséine précinite en flocons très ténus. Voici cette formule:

Crème				2 parties.
Lait pur				1 —
Eau de chaux				2 —
Eau sucrée à 5 0/0	١			3 —

Morgan Rotch, de Boston, a singulièrement compliqué cette formule, car il modifie la proportion des éléments constitutifs du lait suivant les exigences individuelles de chaque enfant et les prescriptions particulières du médecin traitant. Ces laits artificiels se préparent, pour ainsi dire de toutes pièces, dans le laboratoire de Walcker-Gordon. Voici comment on opère. Le lait est dosé et centrifugé à l'aide d'un séparateur du genre Gärtner, faisant 6,800 tours à la minute. Le petit lait est titré, ainsi que la crème, dont on connaît ainsi exactement la teneur en beurre. La crème, le petit lait et une solution de lactose au vingtième sont versés, en proportions qui varient suivant l'ordonnance du médecin, dans les tubes d'une seule tétée, que l'on pasteurise ou que l'on stérilise ensuite. Le mélange est additionné ou non d'eau de chaux.

Il convient de remarquer que, dans les formules de Morgan Rotch, la proportion des matières albuminoïdes (1 0/0 jusqu'au 8º mois) est notablement inférieure à celle du lait de femme normal, qui en contient en moyenne 2 0/0, ce qui tend à discréditer des procédés complexes et coûteux, dont les résultats d'ailleurs semblent jusqu'ici plutôt problématiques.

La formule de Mac-Clenahan est une moyenne :

Crème .								87 gr	ammes
Lait pur								56,7	_
Eau								283,4	_
Eau de c	ha	u	s.			:		28,4	_
Lactore								97	

Les formules allemandes et les laits composés de même provenance sont un peu différents.

Le lait albumosé de Rieth, de Berlin, se fabrique de la manière suivante. Du lait de vache pur est coupé d'eau de manière que sa teneur en caséure siér égale à celle du lait de femme. La teneur en albumine proprement dite, en beurre et en lactose devenant de ce chef trop faible, on ajoute la quantité convenable d'albumose, de blanc d'œuf, de crème et de suere de lait, — quantité que le poids de l'eau ajoutée au début permet facilement de déterminer. La formule de J. Lehmann diffère très peu de celle de Rieth, mais le blanc d'œuf est simplement dilué, battu et passé. Ces mélanges doivent être administrés aux enfants aussitôt leur préparation, car ils s'altèrent vite et ne sauraient être convenablement stérilisés.

Le lait maternel de Lahrmann est peptonisé en partie. C'est un lait de vache bouilli que l'on coupe avec de l'eau lactosée et de la crème, de manière à lui donner une composition voisine de celle du lait de femme. On le soumet ensuite à la digestion paneréatique jusqu'à ce que la majeure partie des substances azotées ne précipite plus par les acides l'autre se coagulant en fins ficons. Cette préparation est d'un prix très élevé et elle ne paraît donner de résultats encourageants que dans certains cas d'atonie digestive extrême.

Le lait peptonisé de Löflund est une sorte de conserve de lait très et même trop riche en hydrates de carbone, mais qui cependant, suivant divers expérimentateurs, semble se digérer facilement dès les premiers mois de la vie (?) Les enfants du reste l'acceptent plus volontiers que la piéparation de Lahrmann. Sa composition est la suivante:

Maliose	 	 	. 33,8
Lactose	 	 	. 12,6
Dextrine	 	 ٠.	. 8,6
Albuminoïdes	 	 	. 9,8
Graisse	 	 	. 12,2
Matières minérales	 	 	. 2,2

Quant à la crème artificielle de Biedert, qui a fait quelque bruit, elle ne contient pas trace de lait et renferme 1 d'albumine pour 2,5 de graisse. Elle est formée, non de caséine, mais d'albuminates de potasse qui se peptonisent sans former de caillot. Pour les nouveaunés, cette crème doit être délayée dans 15 parties d'eau; on peut y ajouter ultérieuement du lait de vache en proportions croissantes.

Avant d'aller plus loin, remarquons eneore que ces maternisations, ces formules, ces mixtures ont été imaginées pour éviter les inconvénients et les difficultés du coupage à domicile et pour doter les petits nourrissons, privés du sein maternel, d'un aliment ayant à peu prèsla même composition et les mêmes propriétés physiologiques que le lait de femme.

Ce double but a-t-il été atteint? On peut bien dire que non. En effet, quelque voisines du lait de femme, au point de vue de la composition chimique brute, que soient certaines de ces préparations, il n'en est pas moins vrai que toutes s'éloignent, par les additions ou les soustractions qu'on leur fait subir, de cet état physiologique qui est la qualité essentielle du lait. Bien que nous n'avons pas actuellement le moven de préciser exactement ce qui les distingue, nous savons cependant que chaque caséine, par exemple, diffère suivant l'espèce qui la produit. Ce n'est pas en diluant une caséine A, en la manipulant de trente-six manières qu'on en fera une caséine B différente : ce n'est pas en ajoutant de l'eau et du sucre à du sérum de lait de vache, qu'on en fera du sérum de lait de femme, on s'en aperçoit du reste aux résultats de l'expérimentation et de l'observation clinique. Poursuivre par conséquent l'identité de composition chimique brute (c'est-à-dire de tant de C, de H, de O, de Az, de Cl, de P, de Ca, de Na, de Fe, etc.) entre le lait de femme, le lait physiologique, et les mixtures ou mélanges que l'on fabrique en partie avec des produits inertes, me paraît un leurre, car cela n'aboutit qu'à donner aux enfants un aliment dépourvu du pouvoir d'approximation mis en évidence par Y. Delage, de ces propriétés capitales isotoniques et assimilatrices, non seulement du lait de femme, mais même du lait de vache.

Ce n'est pas tout. En décaséinant le lait de vache, on ne lui enlève pas que de la caséine : on lui enlève aussi une partie de ses sels solubles et particulièrement, comme l'a fait remarquer Knöpfelmacher, du phosphore et du fer, — ce qui peut compromettre les progrès de l'ossification. C'est peut-être là ce qui explique l'évolution plus lente de la taille et du poids ches les enfants alimentés arce des laits artificiels. Aussi l'auteur précédent demande-t-il que l'on ajoute du jaune d'emf au lait décaséiné pour couvrir le déficit de phosphore et de fer yu'on y observe.

Enfin si la décaséination est poussée, comme il a été dit précédemment, souvent beaucoup trop loin (jusqu'à moins de 1 0/0 dans certaines formules de Morgan Rotch), on a. cn revanche, une tendance à exagérer singulièrement la proportion du sucre (jusqu'à 9.4 0/0 dans le mélange de Soxhlet). Croit-on vraiment que des préparations ainsi composées puissent être capables de remplacer, en quelque circonstance que ce soit, même chez les atrophiques, les entéritiques ou les athrepsiques. le lait naturel, fût-il de vache? Il m'est impossible de l'admettre, d'autant plus que la susceptibilité des nourrissons n'est réellement très grande qu'à l'égard précisément de ces mixtures artificielles dans lesquelles l'excès ou le déficit minimes de tel ou tel principo entraîne presque fatalement des troubles de l'assimilation et de la croissance. A l'égard des laits physiologiques au contraire, ils montrent une facilité d'adaptation beaucoup plus grande, puisqu'ils supportent très bien, comme Morgan Rotch le montre, d'après les analyses de Harrington, des teneurs en caséine qui varient, dans le lait de femme, de 1,2 à 4,2 0/0. Aussi Variot dit avec raison : « J'admets avec la majorité des chimistes que le lait de vache, en général, est un peu

plus riche en caséine que le lait de femme. Mais, je ne saurais trop le répéter, si les organes du nouveau-né ont une assez grande souplesse pour digérer le lait de femme contenant 4 0/0 de caséine, pourquoi ne pourraient-ils pas supporter un lait de vache qui ne contient guère que 3 à 4 0/0 de cette même substance? », étant donné surtout la modification moléculaire très heureuse que la surchauffe de la stérilisation fait subir à la caséine du lait de vache qui lait de vache.

Evidemment le grand écueil dans l'alimentation du nouveau-né est de donner à l'enfant une nourriture trop abondante, relativement aux dimensions de ses organes. à ce qu'il peut réellement utiliser, et beaucoup des troubles les plus graves de cette première période vieunent uniquement des excès répétés commis dans ce sens. Mais un autre écueil non moins dangercux est de ne fournir à ces petits êtres, sous prétexte de ne pas les gaver, qu'une nourriture insuffisante, trop diluée, qui leur permet tout juste de vivre, sans croître, sans augmenter de poids. — quand encore ils sont capables de résister à cette inanisation. Et c'est là malheureusement le résultat trop fréquent des coupages mal compris, de l'ingestion de ces mixtures chimiques, de ces laits artificiels, soi-disant, par ironie sans doute, maternisés. Chavanne explique de la sorte par exemple l'énorme mortalité (19 sur 20) de petits enfants assistés, allaités artificiellement avec du lait coupé, et fait remarquer que ces enfants sont morts rapidement, avec un amaigrissement considérable, sans présenter de vomissement, de diarrhée, ni de troubles digestifs. Les mêmes phénomènes s'observent chez les nourrissons que nous savons pertinemment être insuffisamment alimentés, la mère avant

un lait pauvre et rare. Monti, Popper et Laumonier pour le lait; Gărtucr, Budin, Variot et d'autres cliniciens pour différents laits maternisés et coupés sont arrivés aux mêmes conclusions.

Escherich va encore plus loin. Escherich, qui a été l'un des premiers expérimentateurs du lait centrifugé, à la clinique de Gratz, reconnaît que la contre-indication la plus formelle de ce lait est la gastro-entérite avec diarrhée, attendu que, dans ce cas, l'affaiblissement de la fonction pancréatique diminue ou abolit le pouvoir absorbant de l'intestin à l'égard des corps gras. On est donc conduit à repousser ces produits pour les circonstances précisément où ils paraissaient théoriquement devoir agir le plus efficacement. Aussi Heubner et Hofmann se sont-ils empressés de proposer une nouvelle formule, dans laquelle tout ou partie du beurre du lait de vache est remplacée par une solution de lactose à 6 0/0. Il n'est pas besoin de faire remarquer que, en de telles circonstances, le sursucrage du lait augmente les fermentations digestives et entrave, comme l'ont montré Pfeiffer, Rubner et Escherich la peptonisation de la caséine.

En résumé, si les laits coupés, décaséinés, maternisés, etc., conduisent à l'amaigrissement, à l'inantiton, les petits nourrissons déjà physiologiquement affaiblis ; si ces mêmes laits sont contre-indiqués dans les cas de troubles digestifs, de gastro-entérite avec diarrhée, il ne leur reste plus en réalité comme indication que les enfants sains. Or, comme l'a montré Budin et comme le reconnaît Marfan, ces derniers n'augmentent pas aussi vite de poids avec ces laits artificiels qu'avec les laits physiologiques. Qu'en induire, sinon que ces mixtures ont un pouvoir d'approximation plus faible, de moindres qualités assimilatrices?

Cette revue rapide nous conduit done à dire, on manière de conclusion, qu'il faut préfèrer aux laits artificiels, pour les nourrissons qui ne peuvent être élevés au sein, et sauf eas tout à fait exceptionnels, le lait stérilisé industriellement, qui n'exige aucune manipulation, est beaucoup moins coûteux, et a conservé une grande partie de ses propriétés physiologiques primitives ou en a acquis de nouvelles au point de vue de la digestibilité, à la condition toutefois qu'il soit administré méthodiquement, conformément aux indications de l'état, de l'âge et du poids.

REVUE DE THÉRAPEUTIQUE ÉTRANGÈRE

Раг М. Ввогець.

Le Traitement de l'asthme.

Les médocins se préoccupent toujonrs à juste titre du traitement dostiné à combattre les crises d'asthme. Nous rénnissons ici les travaux dos différents auteurs qui se sont récemment occupés de la question.

Globuloff (Centralls. f. d. Cesam. Therapic., 1500, n° 25) préconise l'emploi, pendant l'attaque, d'une injection hypoderniquo de morphino. Cependant, si la sécretion bronchique est abondante, il ne fant pas employer ce palliatif qui empletie l'expectration de so produiro. Daus ce cas il faut omployer lo chloral à fortes doses. Malbeureusement il se orbe une accoutumance à ces deux rendedes ot bientit on est orbe une accoutumance à ces deux rendedes ot bientit on est

ebligé de recourir à d'autres movens. Le nitrite d'amyle a une action bien fugace, les autres moyens thérapeutiques elassiques, fumigatiens de stramoine ou de cannabis indica, etc., ne sont pas toujours suivis de succès. Les enveloppements chauds des jambes, les emplatres de farine de moutarde, etc., sont des moyens un peu tombés en désuétude et qui ne sont oas bien fidèles. Dans les cas où il y a irritation manifeste de la muqueuse nasale, on doit badigeenner cette muqueuse avee une solution de eceaine. Quand la erisc est passée il faut tâcher d'augmenter les sécrétiens en faisant usage des expectorants (ipéea, senega, etc.). On peut aussi faire usage de l'iodure de notassium (057.60 à 157.20), mais en ayant soin d'attendre un certain temps après la crise. Comme meven préventif Globuloff recommande l'emploi du sulfate d'atropine à la dose de 1 eu 2 milligrammes pris au moment de se coucher; mais il ne faut pas en user plus de 4 ou 5 jours de suite. Pour ce qui est du traitement causal de l'astlime, l'auteur recommande de traiter l'état général du malade : rhinite, goutte, anémie ou neurasthénie.

Faulkner (Journal American Medical Assoc, 1900, I., 1251) dit avoir obtenu d'excellents résultats au moment des attaques en employant la contre-irritation du nerl' pneume-gastrique. Il emploie également les injections intra-laryugotrachéo-bronchiques de strychnine à la dose de 1 à 1,5 milligramme. Il est assez difficile de comprendre que le sulfate de strichine puisse agir localement comme vaso-constrictour ainsi que le prétend l'auteur. On ne voit pas bien comment l'injection intra-trachéale de strychnine diffère de la méthode hypodermique généralement empleyée. Horatio-Wood (Amer. journal of. Méd.Sc. 1., XI, 1900), fait même remarquer que la seule action que peut aveir le remède ainsi administré, est une violente irritation de la muqueuse laryngée. L'application directe de la eccaine sur la muqueuse nasale, est tout à fait condamnée par Faulkner. Le traitement qu'il emploie principalement est le traitement hygiénique, spécialement la gymnastique médicale et plus particulièrement l'exercice portant sur les muscles trapèze et pectoraux, en un mot le travail des muscles auxiliairesde la respiration.

Godman (Wiener. Med. Wochens, 1869, 1900) fait remarquer avec raison que le traitement le plus rationnel de l'astlume est le traitement par les inhalations de substances médicamentouses (lobelia, stramone, nitrite de sodium, nitrate de potassium, que la platramacie allemande a décoré du nom de « Poudre de Neumeier ») Quant à Jackson (Merck's Archices, 1809, 503), il emploie la formule suivante:

Poudre	de nitrate de potassium	15	grammes.
_	de stramoine	5	
	de lobelia	6	
-	do belladonne	3	
	de grindelia	G	_
	d'hydrastis canadensis	1	

destinée à produire un mélange que l'on brûle à la dose de une cuillerée à café dans une petite chambre.

Quant au traitement des attaques, Jackson indique l'iodure et le bromure de potassium qu'il faut alterner à la dose de fois centigrammes par leure. Dans l'intervalle des attaques, il a vu que l'ielthyol ajouté aux iodures n'était pas inutile (de 6 centigrammes à 12 centigrammes toutes les trois ou quatre heures).

S. Solis-Cohen. a étudió l'emploi des capsules surrémales dans le traitement de l'asthme. Cet auteur (Journal American Medical Association, 1900), l. 1164) pense qu'il y a deux espèces d'astlme, qu'il y a un type congestif et un type anchique comme c'est le cas pour la migraine, il y aurait donc soit spasme, soit parésie des vaso-moteurs. Si l'on accepte ecte théorie, on peut accepter le traitement que chacune de ces variétés d'astlme réclame. Dans les cas du type congestif, qui survient chez des sujots dont l'appareil cardio-vasculaire est facilement troublé, la substance des capsules surré-

nales est très indiquée. Il ne fant cependant pas s'attendre à une cure brillante dans les attaques aiguës, mais à uno amélioration lente et progressive que l'auteur attribue à l'augmentation du tonus vasculaire.

Cette explication ne plait pas beaucoup à Wood (loc. cil.) qui fait remanquor que l'épinéphrine est élininée plus rapide ment qu'il ne faut pour que l'estomac l'absorbe et qu'elle n'a aucune action sur la pression sanguino lorsqu'on l'administre par la bouche (Olivier et Schefer). Wood propose une autre explication; selon lui l'épinéphrine possèdo la propriété de détruire certaines substances toxiques, parmi lesquelles la neurine, produit du catabolisme nerveux, et il semble plausible que considérant l'origine nerveux de l'asthme on puisse supposer que l'épinéphrine agit comme antitoxique sur le sanz.

Parmi les produits pharmaceutiques récents que l'on a employès dans le traitement de l'asthme, il conviont de citer les dérivés de la morphine, la dionine et l'héroîne, puis le paraldéhyde.

Mac Greyor (Lancet, 1899, I, 363) l'a utilisé dans 11 cas d'asthine et avec grand succès. On peut déguiser facilement le mauvais goût de ce médicament avec de la teinture d'écoree d'orange. Le paraldehyde agit, paralt-il, très rapidement.

Gayle (Merch's Archives, 1899, 505) recommande l'emploi du Quebracho; il le donne sous forme d'extrait fluide à la dose de 0°,90 à 1°,8.

Frese, enfin, a employé avec succès l'iodipine (Münch. Med. Woch., XVI, 213), dans 13 cas d'asthme. Il prescrivait ce remède à la dose de deux à trois cuillerées à café.

Récents travaux sur le traitement du diabète.

Saundby (British Medic. Journ., 1900, I, 1420), rappelle les symptômes du diabète et les différentes formes de cette affection, mais il s'attache surtout à la valeur des différents aliments et doune des tables très intéressantes à ce propos. Un homme exécutant un exercice lègre pred environ 35 calories par kilog. de son poids. Dans le diabète il faut ajouter la valeur des calories employèes pour le sucre qui est oxerété dans les urines, ce qui représente, dans les cas moyens, environ 400 calories par jour. Les hydrates de carbone représentent environ 4 calories par graume, les graisses environ 9, l'albumine 4 et l'alcool 7. Le régimo suivant représente environ 2.400 calories et contient très peu d'hydrates de carhone.

180 gr. viande	210 uni	tés de chaleur
60 gr. jambon gras	540	_
Deux œufs	150	-
60 gr. crème	120	_
90 gr. beurre	720	
180 gr. lėgumes verts	50	_
280 gr. pain brun de Collard	50	
60 gr. whisky	210	_
Claret 25 cc	50	

D'après Saundby, presque tous les pains pour diabétiques sont mauvais, sauf le pain brun de Collard (6,7 d'amidon) et le pain protéinique (2,7 0/0). Il prescrit le lait en petite quantité à cause de la lactose.

Parmi les fruits, les prunes, les groseilles, les cerises, les oranges ont peu de sucre et peuvent être tolèrées. Les pommes de terre contiennent 15 0/0 d'amidon tandis que le pain en contient 50 0/0.

L'urine ne doit pas être le seul guide qui doive servir à renseigner le médecin. La question importante est celle-ci. Le malade assimile-t-il une proportion suffisante des carboltydrates qu'il consomme?

A cet effet, Kraus (New-York Medical Record 1900, 1, 80), recommande de prescrire un régime comprenant, par exemple, 100 gr. de pain, soit environ 60 gr. d'amidon, et de mesurer le sucre excrété en 24 heures.

S'il est excrété moins de sucre qu'il n'en est donné, en peut augmenter un peu la dose d'amidon. Si, au contraire, la quamité de sucre trouvée dans l'urine dépasse 60 gr., il faut diminner la quantité d'amidon et faire de nouveaux essais jusqu'à ce qu'on arrive à l'équilibre.

Harrington (Journal of the Boston Society of Med. Sciences. 1897-98, II, 131), a examiné à peu près tous les pains proposés aux diabétiques. Il a constaté que presque tous les pains soi-disant pour diabétiques ne sont ni meilleurs ni pires que le pain ordinaire. Dans les pains de Gluten, il y a de 20 à 70 0/0 d'amidon, Sandmeuer (Berlin, Kin, Woschens, oct. 1900). écrit que les aliments gras ne sont pas facilement digérès et qu'ils finissent par dégoûter les malades; que le lait n'est pas indiqué à cause du sucre qu'il contient, que la crème renferme beaucoup de graisse, qu'elle serait meilleure que le lait, sans la lactose qu'elle contient. On a proposé un lait artificiel pour diabétiques comprenant : Graisso, 9.98 0/0, albumine, 2.290/0. matières minérales, 0,178 0/0 et pas du tout de sucre. Suivant Meyer (Berl. Klin. Woch, 1898, 35), il somblerait que ce lait est fabriqué en séparant les parties constituantes du lait (caséino, lactose, graisse, etc.), puis en les remélaugeaut ensuite dans les proportions désirées. Sandmeyer a employé avec succès ce lait dans 50 cas de diabète. Saundbu recommande les pommes de terre ; dernièrement, M. Massé a traité cet intéressant sujet dans ce journal. Parmi les médicaments récemment vantés dans le traitement du diabète, on a beaucoup parlé en Amérique de l'arsenauro, c'est un bromure double d'or et d'arsenic.

Sheridan (New-York Med. Journal 1900, LXXI, 236), convamou de l'origine bactérienne du diabéte, s'est préoccupé de uit trouver un reméde spécifique. Après avoir essayé sans aucun succès le bichlorure de mercure, le chlorure de sodium et l'or, il a utilisé l'arsenauro, et il rapporte 4 cas de diabète améliorés par ce médicament.

Barney (New-York, Med. Journ. 1990, LXXI), a également employé l'arscaurc, qui, suivant lui, agit sur le système nerveux, restaurant les fonctions des centres glycogèniques. C'est, paraît-il, un régulateur puissant des vasomoteurs, un tonique général qui augmente la nutrition. Cet auteur rapporté trois cas de diabète dans lesquels le sucre disparut de Purine sous l'influence de l'arsenauro.

Slern (Journ. American Med. Assoc. 1900, I), a employé l'éosolate de chaux, qui a semblé, dans einq cas de diabeta, amener une amélioration assez notable, en ce qui concerne surtout l'apparition du sucre dans les urines. M. Estay apublié dans le Butletin de l'hérrepeutique de 1898 ses cais avec le bleu de méthylène. Roget et Balcay (Lyon Medical, 1898), ont traité avec succès des diabétiques au moyen des injections de sêrum artificiel salé à does massives.

W. Niessen (Therap. Monatsh 1900, n° 8), a utilisé dans le diabète insipide l'hydrate d'amylène à petites doses (1 à 2 gr., pro die) et a constaté souvent une amélioration dans la condition de ses malades. Pour corriger le goût du médieament, il conseille de le mélanger avec du vin ou de la bière ou de preserire l'hydrate d'amylène sous forme de capsules.

Sur la recommandation d'Ekstein, qui avait améliore un diabétique en lui administrant du salol, le Dr Teschemacher a traité de la même façon huit malades atteints de diabéte suerè (Therapeut. Monatsk., janvier 1901). Ebstein faisait prendre à son malade 20 gr. de salol en cinq jours, divisés en doses de 1 gr. à prendre, quatre fois par jour. Teschemacher opère de la mème façon, sauf dans deux cas où il preservit le salol trois fois par jour à la dose de 197, à perndre trois fois par jour pendant cinq jours. Comme inconvénients secondaires, il n'eut rien à observer, même pas de bourdonnements d'oreilles. Sur ces huit cas de diabète, il y en avait trois qui etaient graves et que le salol n'influença pas. Les cinq autres malades furent, par costre, améliorés par cette médication. Après la prise du salol, le taux du sucre dans les urines, qui était pour deux malades de 1,5 0/0, pour les autres de 1,3 0/0 et 0,6 0/0 tomba à 0 et à 0,1 0/0. Dans un cas, il s'agissani d'une dame qui avait une énorme quantité de sucre dans les urines, 4 0/0 environ. Le résultat du salol fut remarquable, puissu'il fit tomber le sucre de 4 0/0 à 0,1 0/0.

L'abaissement du taux du sucre semble se produire assez rapidement.

Dans un cas, l'auteur vit le sucre baisser de 0,6 0/0 cn six jours; dans un autre cas, de 0,9 0/0 en quatorze jours. Il semble donc que nous possèdions dans le salol un remède capable de rendre de grands services dans le cas du dinbête sucré de movenne intensité.

Pour remplacer le sucre dans l'alimentation des diabétiques, W. Frieser (Artzl. Central. Zeitung, Vienne, 1900, nº 41), recommande la crystaliose. Cette substance, à condition d'être pure, donne aux aliments un goût agréable et très doux.

Nous citerons pour terminer l'article de Williamson L'ancet, 4 août 1900), qui a étadié une réaction du sang dans le diabète sucré. Cet auteur a montré que le sang des diabètiques a la propriété de décolorer une solution alcaline chaude de méthylène alors que lo sang des personnes en bonno santé n'amène aucune réaction. Il indique comme suit, le mode opératoire de cette expérience. Dans un tube à réaction on mel environ 4 ce. d'amo puis 20 enma. de sang que l'on prétève sur lo malade, on y ajoute 1 ccm. d'une solution aqueuse de bleu de méthylène (1:6000), puis enfin 40 cmm. de liqueur de carbonate de chaux.

Dans un second tubo on a placé 20 cmm. de sang normal avec les mêmes proportions des réactifs. Les deux tubes contiennent donc un mélange de coloration bleuâtre foncée. On porte alors pendant quelques instants les deux tubes à réaction sur un bain-marie (4 minutes). Au bout de co temps, on constate que la solution qui a reçu le sang diabétique est décolorée et devenue d'un jaune sale, alors que l'autre est restée intacte.

Williamson a obtenu ainsi un résultat positif choz 43 diabétiques.

Cette réaction semble n'avoir qu'un intérêt clinique assec faible; elle peut, il est vrai, servire d'aignostie dans certains cas de coma diabétique où la vessie ne contiendrait pas d'urine. Müller a rapporté un cas analogue (Münch. Med. Hollam., 1987, n° 25). La réaction se prolonge de longues heures après la mort, et comme l'autopsie d'un cadavre mort de diabéte ne donne pas de signes apparents on pourrait, à la rigueur, employer la réaction de Williamson en médecine légale.

Le dernier venu des médicaments destinés aux diabétiques est probablement le glucosolvol (Pharmac, Rundsch, 26 ianvier 1901); cette substance est obtenue en faisant agir simultanément l'acide oxypropionique sur de la peptono chimiquement pure et une combinaison de théobromate de soude sur la zymogène de la trypsine (principe composant du suc pancréatique). Le glycosolvol possède, paraît-il, la propriété de transformer en produits de séparation assimilables les bydrates de carbone. Le produit est, en outre, un bon médicament stomachique, et en sa présence tous les aliments contenant des matières albuminoïdes sont utilisés en bien plus grande proportion par les diabétiques; il en est de même pour une proportion relativement élevée des hydrates de carbone. Le Dr Dahne qui a employé le glycosolvol a vu le remêde réussir chez un grand nombre de diabétiques, L'auteur ne donne pas, malheurcusement, de détails sur les obscrvations qu'il lui a été donné de faire, ni sur le desage de ce nouveau et brillant médicament. Un autre auteur allemand. le Dr Steinberg, n'est guère plus explicite (même journal. 3 mars 1901), il déclare cependant qu'il a vu chez des malades soumis au glycosolvol, le taux du sucre tomber de 4,6 0/0 à 2,7 0/0 pendant que lo poids spécifique de l'urine tombait de 1.032 à 1029. Stofer (de Baden) arrive sensiblement aux mêmes conclusions et recemmande le nouveau remède.

REVUE DES TRAVAUX FRANÇAIS ET ÉTRANGERS

Maladies vénériennes.

Injections hypodermiques de composés Iodés contre la syphills. — Lorsque l'iodure de potassium n'est pas toleré par l'estomes, le docteur Lang, privat-docent de dermatologie et de syphiligraphie à la Faculté de médecine de Vionne, conseille do l'administrer en injections hypodermiques. La solution qu'il propose set la suivante :

lodure de petassium	5 gr.
Eau distillée	5 —
Chlorhydrate de codéine	5 à 10 centigr.

On injecte chaque jour 1 à 3 centimètres cubes de cette solution. L'addition de la codéine a pour but d'empêcher l'opération d'être deulourouse.

On peut remplacer cette solution par une préparation diodoferme:

Iodoform	e	 ٠.	 ٠.		• •	5	gr.
Vaseline	liquide.		 			6	gr. 5

Avec ce mélange on fait tous les jours ou tous les deux jours une injection de 1/2 à 1 cent, cube.

L'iodoforme donne d'excellents résultats centre certaines

infiltrations syphilitiques, surtout contre les tuméfactions ganglionnaires dont il ramène rapidement la résorption quand il est fait dans lour voisinago. (Gaz. des hôp., 4 octobre 1900.)

Médecine générale.

L'eucaine B dans l'anesthésie médatlaire. (Gaz. méd. de Bordeaux, nov. 1900.) – L'anesthésie par injection de conteniure intra-rachidienne et sous-arachnoidienne dans la région lombaire, pratiqué par Bier on Allenagne et par Tuffier en France, a donné une série de succès que sont venus corroborer les nombreuses observations de de Rouville à Montpellier, de Doléris à Paris, de Villar à Bordeaux.

Un expérimentateur allemand, Fritz Engelmann, a voulu s'assurer par lui-même de l'innocuité de ces injections, mais au lieu de ses soumettre à l'injection ordinaire, celle qui a largement fait ses preuves, il a voulu se faire injecter dans le canal rachidien de l'eucaine B et il a sub un insuccès.

Le récit de son expérience est relaté ainsi qu'il suit dans le Munch med. Woch., nº 44. Si Eugelmann n'a pas employé la cocaine, c'est qu'il espérait obtenir le même résultat avec l'eucaine B qui est bien moins toxique.

• Le 19 juillet, à sept heures du soir, il se fit injecter, avec toutes les précautions routues, un centigramme d'eucaine à la région lombaire de la moelle. L'injection ne fut pas douloureuse. Peu aprèc, il eut un sentiment d'engourdissement des deux pieds, mais pas d'anestlesies et aucune diminution de la sonsibilité à la douleur. Une demi-heure après l'injection, il ressenait vers le sacrum de légores douleurs linecinantes, qui s'accrurent ensuite à tel point, que vers dix heures il ne pouvait plus rester assis. Vers la méme houre, il éprouva un malaise général et vomit abondaument. Puis il eut huit ou dix frissons et un violent mal de tête. Le pouls de 56, était petit et irrégulier. Au lit les douleurs sacrales de 56, était petit et irrégulier. Au lit les douleurs sacrales

disparurent, mais la céphalalgie était insupportable; il s'y ajouta de la dyspuée, de l'anxiété précordiale et de l'agitation. Vers minuit, la température était de 3877 et le poulou. 85. Une injection d'un centigramme de morphine fit disparaitre ces symptômes; sueurs aboudantes, sommeil entrecouné.

» Le lendemain, à luit heures du matin, température à 37%, pouls à 65; céphalalgie d'intensité moyenne qui n'empécha pas M. Engelmann de faire son service à la policilinique. Toute la journée, il eut des douleurs sacrales et de la céphalalgie. Cette dernière persista huit jours et ne fut pas modifice par les antinévralgiques usités; le repos scul le calmait. Elle ne disparut que le neuvième ou le dixième jour. »

En somme, c'est là un insuccès complet.

Maladies infectieuses

Traitement de la tuberculose pulmonaire (Wells. Bulletin yén. de thérap, du 23 juillet 1900). — Le D' Ed. Wells couseille de donner aux phthisiques des cachets contenant clacun:

Hyposulfite de chaux... 1 à 3 centigrammes.
Sulfate de strychnine... 1 milligramme.
Acide arsénieux.... 1 à 2 milligrammes.
Orme pulyérisé... 25 centigrammes.

Le malade prend 1 ou 2 de ces cachets trois fois par jour. L'élément auqueil le D'wells donne le plus d'importance dans ce mélange, c'est l'hyposulfite de chaux, qui, en se décomposant dans l'estomac, degage l'hydrogène sulfuré. Absorbé par les veines de l'estomac, l'acide sulfhydrique va s'éliminer par les poumons, et il a sur l'organe malade une action qu'a suffisamment mise en relief le D'Bergoon lorsqu'il a préconisé l'emploi des lavements d'hydrogène sulfuré dans le traitement de la tuberculose pulmonisry.

La poudre d'orme empêche la décomposition de l'hyposulfite de chaux dans les cachets en les maintenant à l'état sec. Elle rend aussi un peu plus lent lo dégagement de l'acide suffrydrique dans l'estomac.

Le persulfate de soude dans le traitement de la tubereulose (Presse médicale). — Parmi les substances récemment introduites dans la thérapeutique, le persulfate de soude mérite d'attirer l'attention du praticien. C'est un sel qui paraît exercer une influence remarquable sur l'appétit et les fonctions digestives.

M. Nicolas (de Lyon) a employé ce médicament à la dose do 15 à 30 entigrammes par jour, le matin à joun et assez longtemps avant le repas, chez un grand nombre de malades dont quelques-uns ótaient des convalescents de maladies agurs, la plupart des sujets attoints de tuberculose chirurgicale ou médicale. Chez tous ces malades le porsulfate de soude a augmenté l'appétit, facilité les digestions et amené une augmentation de poids qui a pu atteindre jusqu'à 7 et 9 kilogrammes en quelques semaines. M. Nicolas est donc convaincu qu'à la dose de 15 à 30 centigrammes le presulfate de soude est un excellent apéritif et un cupeptique qui peut améliorer l'état général et la nutrition des malados.

Les mêmes faits sont encore constatés chez des tuberculeux, par M. Garel (de Lyon), qui attribue une importance de promier ordre à la façon dont le médicament est administré.

Le sel doit toujours être pris à joun, au moment on l'estomac est absolument vide d'aimonts. Il doit en outre diver ingéré environ une heure et demie avant le repas. Il est pris simplement dans un quart de verre d'eau pure, à la dose do 20 contigrammes cher l'adulte. Une seule dose est suffisante pour vingt-quatre heures. La solution n'a aucune saveur, et tous les miades l'acceptent facilement.

Le médicament doit être continué pendant trois ou quatre samaines. On le reprend de nouveau si l'appêtit vient à faiblir. 919

FORMULAIRE

Pommade contre les syphilides impétigineuses du cuir clievelu

(M. L. PAILLIPS)

Môlez. - Usage externe.

Mixture contre la constipation consécutive à l'anachiorhydrie stomacale

(M. Einhorn)

Mèlez. — A prendre : 20 gouttes dix minutes avant chacun des trois principaux repas.

En outre, on instituera un régime dans lequel prédomineront les substances alimentaires d'origine végétale.

Formule de Hebra pour l'acné

(HEBRA)

Lotionner la peau.

Le Gérant : O. DOIN.



Présidence de M. le Professeur Destrace, de Bruxelles.

Le procès-verbal de la dernière séance, lu et mis aux voix, est adopté.

Communication

I. Action thérapeutique d'un nouveau diurétique

Par M. DESTRÉE (de Bruxelles)

Les divers composés méthylès de la xanthine ont fait dans ces derniers temps l'objet de travaux expérimentaux intéressants. Von Schreder, Adu et Albanese out étudié ces corps au point de vue de leur action diurétique, mais malgré ces études il n'en est pas moins vrai que de tous ces composés la théobromine reste le meilleuraux yeux des cliniciens. Comme diurétique, la théobromine est supérieure en effet à la caféine parce qu'elle ne présente pas les effets vasculaires et cardiaques de cette dernière, et elle est supérieure à la paraxanthine, à la théophylline, aux monométylxanthines, produits d'ailleurs mal etudiés encors.

Le grand défaut de la théobromine réside dans son peu de solubilité, qui rend naturellement sa résorption incertaine et son action inconstante. On a cherché à remédier à ce défaut en dissolvant la théobromine dans une l'essive de soude et en constituant ainsi une théobromine sodée, sel soluble dans l'eau, mais ayant des propriétés caustiques.

Vous le savez, Messieurs, Gram (de Copenhague) a voulu remédier à cette causticité et a fait un alliage de la théobromine sodée et du saiicylate de soude, sel double qui se décompose dans ses solutions et que nous utilisons en clinique d'une façon courante sous le nom de diurétine.


Un de mos anciens éléves, le D' Impens, s'est demande quel avantage il y avait à cette adjonction du salieque de tou de la théobromine sodée. Il a reconnu que cette adjonction n'avait d'autre utilité que d'amoindrir la causticité de la théobromine sodée et a recherché dès lors à dotenir le même résultat en remplaçant le salicylate de soude, non dépourvu de défauts, par des sels sans aucune toxicité et doués cux-mêmes de propriétés diurétiques. Dans cet ordre d'idées il s'est sorvi successivement du citrate, du tartrate, du succinate, du malate, de l'acétate et du nitrate de sodium.

Son choix s'est finalement fixé sur le nitrate et surtout sur l'acétate de sodium. Il a obtenu ainsi un sel double de théo-bromine sodée et d'acétate de sodium, auquel il donne le nom d'agurine, se présentant sous forme d'une poudre blanche, hygroscopique, se dissolvant blen dans l'eau, ayant une réaction fortement alcaline. Ce sel double tend aussi à se décomposer dans ses solutions comme la diurétine, mais à côté de cet inconvénient M. Impons insiste sur quelques qualités du sel double qu'il préconisé.

C'est tout d'abord, grâce au poids moléculaire restreint de l'acétate, la proportion plus grando de théobromine, principe actif, que le nouveau diurétique contient à poids égal.

C'est ensuite la diminution considérable du pouvoir caustique de la théobromine sous l'influence de l'adjonction de l'acétate de soude. Ce pouvoir est diminué en effet de 50 0/0 tandis que le salicylate de soude ne diminue la causticité que de 25 0/0.


Le D'Impens ayant reconnu le pouvoir nettoment diurétique du sel double qu'il préconise en expérimentant sur les animaux, J'ai cru intéressant de rochercher si ses prévisions théoriques et ses résultats expérimentaux se vérifiaient en clinique. Je me permettrai de vous indiquer très brièvement ici les quelques essais que j'ai faits avec ce nouveau diurétique dans mon service hospitalier à l'hôpital Saint-Jean, de Bruxelles.



Les deux premiers essais ont porté sur des cas où l'intégrité des reins était certaine et où aucun signe ne permettait de soupçonner une altération du côté du cœur.

1º eas. — Il s'agissait d'un homme de 51 ans qui à la suite d'un traumatisme présentait une névralgie du sciatique gauche avec troubles trophiques du membre inférieur correspondant.

Une moyenne fixée sur trois jours d'observation nous don-



nait, avant toute administration d'agurine, 1,450 grammes comme quantité d'urine émise en vingt-quatre heures. Ces 1,450 grammes d'urine renfermaient 17,80 urée, 17,2 de chlorure et 3,9 de phosphates.

1 gramme d'agurine donné pendant trois jours fournit une moyenne eu quantité 1600; urée 17,69; chlorures 17,6; phosphates 5,2.

1gr,50 d'agurine donne une moyenne quotidienne:

	Quantité.	Urée.	Chlorures.	Phosphates.
Les 3 premiers jours de. Les 3 jours suivants	1700 2115 2100 4100	21,40 18,00 19,25 21,6	15,10 13,25 22,5 21,8	7,00 7,80 6,5 5,1

Ainsi 1gr,50 d'agurine pendant 12 jours a augmenté quotidiennement en moyenne:

La	quantité	d'urine de 14,50 à 27,30 soit de	88	0/0
La	quantité	d'urée de 17,8 à 20,80 soit de	17	0/0
		de chlorures de 17,2 à 18,29 soit de.	5,3	0/0
La	quantité	de phosphates de 3.9 à 6.6 soit de	70	070

Nous supprimons alors l'agurine et nous obtenons :

	Quantité.	Urée.	Chlorures.	Phosphates.
Les 3 jours consécutifs à la suppression Les 3 jours suivants	4050 4050	19,00 18,80	17,75 15,3	2,8 2,6
	1425 1780	13,9 16.2	7,96 12,7	2,2 1,75
	1100	,.	,.	1,10

On remarquera que les effets de l'agurine se maintiennent pendant six jours après la suppression du médicament, ce qui est évidenment un avantage. On remarquera aussi d'après ces premiers résultats l'effet obtenn sur l'exerviton des produits soildes de l'urine, urbe, chlorures et phosphates, (°e n'est pas soulement la quantité d'eau disponible dans l'organisme, la quantité d'eau mobile, comme on l'a désigné, que le médieament tend à éliminer, eomme cela se passe quand on emploie l'urbe par exemple, mais aussi les produits exerémentitiels. L'effet paraît être celui d'un véritable diurétique éliminateur exagérant la fonction constante des cellules actives du rein.

2º cas. — Il s'agit d'une femme de S8 ans, atteinte de neurasthénie dyspeptique avec hyperehlorhydrie et constipation. Comme dans le cas précédent, le régime est maintenu dans des limites fixes et, autant qu'il est possible de l'assurer dans un hòpital, la quantité de liquide ingéré reste la même pendant tout le temps de l'essai.

Voici les résultats obtenus :

Moyenne quotidienne.	Quantité.	Urée.	Chlorures.	Phosphates.
Urines avant tout médi- cament	1130 1280 1830 2710 2270 2800	12,30 9,29 12,75 19,50 15.6 32,8	5,50 7,2 9,3 17,28 16,20 21,40	2,8 2,8 2 1,40 2,20 5,52

La dose de 157,50 agurine amène donc les modifications que voiei :

La quantité d'urine s'élève de 1,150 à 2,800, soit de 143 0/6; — d'urée — 12,30 à 32,8 — 166 6/9; — de chlornres — 5,40 à 21,4 — 296 0/0; — de phosphates 2,8 à 5,52 — 97 0/0.

On remarquera que des doses très faibles paraissent avoir une action (0sr,25 à 0sr,50),

Frappé de la faible dose, à laquelle il paraissait, d'après les essais précèdents, que le médicament agissait nous avons

cherché à obtenir des effets avec des doses très petites pour préciser davantage les limites de son activité.

3º cas. — Homme âgê do 69 ans, atteint de tuberculose pleuropulmonaire avancée et d'artériosclérose généralisée. Cet homme arrivé à la période ultime do son mal présente de l'œdème des membres. Sous l'influence de l'agurine on no perçoit aucune modification du pouls. L'action diurétique so manifeste dèjà sous l'influence de 0,25 centigranmes.

Moyenne de 3 jours.	Quantité.	Urée.	Chlorures.	Phosphates.
Avant le traitement 0,25 d'agurine 0,50 —	-1000 -1000	8,11 13,57 21,1	6,00 10,50 7,95	1,30 1,10 1,45

Convaincu par ces trois premiers essais de l'action du médieament à des doses sonsiblement inférieures aux doses habituelles de la théobromine et de la diurétine, nous avons employé à dose relativement faible le nouveau diurétique dans quelques cas que nous résumerons brièvement.

4º cas. — Homme agé de 61 ans. Œdéme énorme des membres inférieurs avec gangréne du membre inférieur gauche. Athérome aortique, péricardite chronique avec synéchie cardiaque.

Résultats : Pas de modifications du pouls.

0¢r,50 font monter la quantité d'urine de 500 à 1,000 gr. en un jour.

1 gramme fait monter la quantité d'urine de 1,000 à 1,400 grammes en trois jours.

 $5^{\rm o}$ cas. — Homme âgé de 33 ans. Alcoolisme aigu, catarrhe aigu de l'estomac.

Résultat obtenu : Moyenne pendant 3 jours	Quantité	Urée	Chlorares	Phosphates
Avant médication	2,300	12,18	20,78	1,93
	3,800	21,6	15,2	3,91
	3,920	18,25	15	6,02
	4,450	20,89	20,9	5,8
	3,900	16,55	17,1	5,6

On remarquera ici encore deux faits : la persistance de l'effet pendant six jours après la suppression du médicament et l'exagération de l'excrétion des produits solides de l'urine, plus particulièrement des phosphates.

La quantité de produits médicamenteux, qui était en notre possession, étant restreinte, nous n'avons pur poursuivre nos recherches. Nous nous sommes contenté de rechercher encore quelle influence pouvait avoir un médicament agissant bien évidemment sur les éléments cellulaires sécréteurs du rein, sur des lésions rénales préexistantes.

Nous avons donc utilisé l'agurine dans divers cas d'affection du rein.

6° cas. — Homme de 47 ans. Saturnin, rein granuleux, athérome généralisé, signe de Potain.

Résultat : Moyenne de 3 jours	Quantité	Urée	Chlorures	Phos- phates	Albumine 0/00
Avant la médication 0.25 0.59 0.75 1.25 0	2,200	19,26	15,5	2,51	0,25
	2,430	16,49	14,7	,49	0,25
	2,250	19,42	15,8	,43	0,75
	2,800	17,53	23,4	5,40	9,75
	2,700	15,68	15,3	2,19	0,76
	3,050	15,04	15,8	2,8	0,50
	2,400	15,60	16,8	1,93	0,50

Conclusion : Aucun effet bien marqué sauf sur l'excrétion

des phosphates qui est augmentée. Effet très peu marqué sur la quantité d'albumine.

7º cas. — Homme de 62 ans. Gödeme généralisé. Cœur gras. Insuffisance mitrale. Albuminurie. Aucun effet houreux obtenu par la digitale, le strophantus, la caféine, la diurétine (à l'autopsie rein cardiaque à parenchyme congestionné, cyanosé).

Résultats	Quantité	Urće	Chlerures	Phes- phates	Albumine 0/00
0,50 0,75 Suppression	1.750 1.509 1.050 780	23,17 20,67 19,75 15,75	17,5 15 7,5 2,5	3,5 3,2 2,3 1,5	4 3,5 4,5 7,25

Conclusion : Aucun effet heureux. Paraît avoir augmenté la quantité d'albumine dans l'urine, mais cette augmentation deut être due à l'évolution normale de la maladie.

8° cas. — Homme de 46 ans. Saturnin, tuberculose avancée, rein amyloide, foie amyloide, cedeme généralisé.

Résultats	Quantité	Urée	Chlorures	Phos- phates	Albumine 0/00
Avant administration	1.500	11,76	5,4	1,8	7
1r,50 agurine	1,600	11,8	5,2	0,95	

De ces trois essais faits sur des cas variés d'affection rénale, nous pouvons conclure que l'agurine ne paralt pas très nocive, mais que comme tout autre diurétique dans ces cas elle reste d'effet aléatoire, parce qu'on ne peut préjuger de la quantité d'éléments cellulaires qui conservent neorre leur intégrité physiologique et leur activité dans le rein altéré. En résanté, d'après les résultats que nous avons oblenus et que malheureusement nous n'avons pu étayer sur un plus grand nombre d'essais par suite de la petite quantité do médicament mis à notre disposition, nous croyons pouvoir conclure :

- 1º Que le sel double de théobromine sodée et d'acétate de soude (agurine) est un ben diurétique;
 - 2º Qu'il est bien supporté, grâce à sa faible causticité;
- 3º Qu'il agit à des doses relativement faibles, ses effets pouvant déjà se manifestor à la dose do 0 ° .25 à 0 ° .50 par jour ;
- 4º Que ses effets ne se portent pas soulement sur la quantité d'eau éliminée, mais aussi sur les éléments solides excrétés par le rein :
 - 5º Que les effets persistent plusieurs jours (souvent ure semaine) après la cessation de son administration;
- 6º Que l'élimination de phosphates de l'urine est surtout accrue sous son influence, et qu'à ce titre le médicament doit être rejeté quand il y a phosphaturie;
- 7º Que ses effets sont inconstants dans les affections rénales et peut-être même nocifs.
- Telles sont les quelques conclusions que je voulais soumettre à votre Société.

Discussion

M. HUCHARD. — La communication do M. le D' Destrée m'a beaucoup intéressé, mais J'ai à relever un point qui ne me semble pas conorder avec mes observations. Notre collégue nous a parlé de la « causticité » de la théobromine; or, je n'ai jamais constaté d'effet caustique à la suite de son emploi. Quoi qu'il en soit, la possibilité d'obtenir, avec lo sel double dont nous a parlé M. Destrée, des effets diurétiques à la dose de 0, gr. 25, constitue une nouveauté thérapeutique des plus intéressante.

La diurétine me paraît en revancho uno médiocre prépara-

tion et je ne m'en sers jamais, car elle irrite le rein. Cet effet est dù au salicylate de soude qu'elle contient.

Pour la théobromine, j'ai pu donner jusqu'à 7 gr. en un jour de ce produit, mais je ne conseille pas ces doses extremes et je me contente de prescrier 1 à 3 gr. nar jour en moyenne. L'effet diurétique est constant, on n'observe jamais aucun inconvénient, et la théobromine est certainnement, après le lait. l'idéal du diurétique.

M. Derriér. — Je me suis sans doute mal exprimé, une partie de ma communication orale ayant été improvisée. Mon mémoire a trait à la théobromine sodée qui est préférable à la théobromine parce que cette dernière ne pénétre pas dans l'organisme d'une façon constante, il arrive parfois qu'elle n'est pas totalement absorbée; on fait agir sur la théobromine de la lessire de soude, on obtient alors la théobromine dode, beaucoup plus soluble, mais qui a l'inconvénient d'être caustique comme je l'ai dit. C'est pour remédier à cet inconvénient que, J'ai chierché à obtenir un sel double, à la fois plus actif et aussi inoffensié que la théobromine.

Les trois hypertensions,

Par H. HUCHARD.

La question que je veux traiter sommairement aujourd'hui, constitue comme un châpitre de pathologie et de thérapeutique générales, une introduction à l'étude clinique d'un grand nombre d'états morbides, des maladies du systéme circulatoire na particulier. Il s'agit des trois hypertonsions: artérielle, pulmonaire, portale, considérées dans leurs conséquences cliniques et leurs déductions thérapeutiques. On verra quelle haute valeur pratique il convient de leur accorder.

I, - HYPERTENSION ARTÉRIELLE

Dans beaucoup de maladies, principalement dans celles du système circulatoire, l'hypertension artérielle ou aortique constitue un danger que les anciens avaient pressenti, quand ils parlaient de « pléthore sanguine », de « violence de l'impétus de sang » et quand Valsalva imaginait son traitemen un pen harbare des anévrysmes par une diéte rigoureuse, des saignées si répétées et si copiouses, que les maladres devaient arriver à l'impossibilité de levor les bras hors du lit.

Prémisses physiologiques. — Autrefois, règne de la pléthore, la thérapeutique, s'appuyant sur nne physiologie trop clémentaire, vissit la masse sanguine. Double erreur: d'abord, parce que d'autres étéments, autrement puissants, agissent pour augmenter la tession artérielle; ensuite, parce qu'il a été démontré par de nombreuses expériences, en parteulier par celles de L. Fredèrici (de Liége, en 1881), qu'apreix une saignée, l'abaissement de la tension artérielle est un phésomène transitoire, inconstant, et que pour le rendre plus sensible et durable, il faudrait enlever chez l'homme deux à trois litres de sang, ce qui serait dangereux et impraticable.

L'augmentation de la tension artériello sous l'influence de l'impulsion cardiaque est certes démontrée deux fois : par la physiologie, au moyen de l'excitation des norfs accélérateurs du cœur, et par la clinique qui la mesure d'après l'importance du débit ventriculaire. Mais ce n'est pas encore au moteur central de la circulation que revient le rôle prépondérant.

La tonicité des artères, effot immédiat de leur elasticité o surtout de leur contractifile, doit étre principalement invoquée et incriminée. L'élévation de la tension artérielle par le fait de l'augmentation du tonus vasculaire et des résistances situées à la périphérie du systéme circulatoire, est démontrée expérimentalement, par la ligature de l'aorte, par l'excitation des norfs vaso-constricteurs et des centres vaso-moteurs. Ces résistances périphériques, sorte de freins vasculaires, sont môme nécessaires pour une bonne circulation, comme l'a démontré Cl. Bernard: « Dans une artère, la pression qui vient du centre trouve un obstacle daus la uression onu vient du centre trouve un obstacle daus la uression onu vient du centre trouve un obstacle daus la uression onu vient

de la périphérie; si ces deux pressions étaient égales, le sang ne circulerait pas, mais il n'en est pas ainsi. « A ce sujet, on me permettra de reproduire quelques paragraphes du chapitre où j'ai étudié (1) déjà les conséquences de l'hypotension et de l'hypertension artérielles.

• En refléchissant aux résultats produits par les ligatures ou compressions de l'aorte, on peut émetire cet axiome : toutes choses égales d'ailleurs et la masse sanguine ainsi que l'impuision cardiaque restant normales ou invariables, la seule augmentation des résistances périphériques es est capable d'élever la pression vasculaire; bien plus, ces résistances périphériques agissants sur le moteur central dont elles renforcent la puissance systolique, et aussi sur la masse sanguine dont elles augmentent le volume dans la partie située au-dessus de l'obstacle. Par conséquent, l'intervention du seul facieur, augmentation des résistances circulatoires périphériques, inct en jeu les deux autres, et c'est ainsi que la plus grande part, dans la production de l'hypertension vasculaire, revient à l'état de la circulation artérielle. »

C'est en s'appuyant sur l'importance attribuée au système artériel et déjà sur la physiologie, qu'à l'avant-dernier siècle, en 1749, Sénae regardait les artères comme de « vrais cœurs sous une autre forme «, que Hunter et Henle ont admis, même pour la circulation normale, un état permanent de contraction de ces vaisseaux, état désigné sous le nom de « tonus vasculaire », que Cl. Bernard a pu dire: « Un double appareil préside au mouvement du sang: l'un placé à la périplierie, régulateur des résistances; l'autre au centre, créateur et régulateur de l'impulsion sanguine. «

Conséquences eliniques. — Alors, s'inspirant de la physiologie, la elinique est intervenue. Elle a vu l'importance du cœur périphérique sans méconnaitre toutefois celle du cœur central; elle a vu quo souvent celui-ci est « plus entrainè

⁽¹⁾ Traité des maladies du cœur, 3º édit. Paris 1899-1901.

qu'entraîneur », et à coté des cardionathies valvulaires ou des myocardites chroniques qui commencent par le cœur pour finir aux vaisseaux et dans lesquelles les troubles hydrauliques prennent une place prépondérante avec leurs nombreuses sta-es sanguines, elle a fondé, d'après nos recherches, il y a près de dix-sept ans, le groupe considérable des cardionathies artérielles qui commencent par les artères pour finir au cœur gauche, et dans lesquelles prédominent l'ischémie des organes avec los nombreux accidents toxiques dus à l'insuffisance précoce du foie et du rein. Pour les premières cardiopathies, marche continue, quoique souvent accidentée, vers l'hypotension artérielle et vers l'asystolie avec leurs conséquences bien connues; pour les secondes, longue phase d'hypertension avec tendance presque fatale vers l'intoxication. Là, indication toni cardiaque, toni-vasculaire, hypertensive; ici, indication éliminatrice, antitoxique, hypotensive.

Déductions thérapeutiques. - Voilà ce qui explique pourquoi, dans les affections du cœur, la thérapeutique a du changer son orientation et son outillage. Elle n'est plus sculement basée sur la présence, sur l'intensité et l'attaiblissement d'un souffle valvulaire, que recherchent trop exclusivement quelques médecins, sans doute par « révérence de l'antiquaille »; elle ne se contente point de voir un cœur à fortifior, elle voit un cœur à soulager; elle no considère pas seulement le cœur central, elle vise le cœur périphérique, et s'il est malheureusement vrai que nous ne parvenons pas à guérir les vasculites chroniques et les scléroses valvulaires définitivement constituées, nous pouvons, au début, par un changement de tactique médicamentouse, en arrêter l'évolution progressive, et obtenir sinon des guérisons anatomiques. au moins des guérisons fonctionnelles. A cc sujet, qu'il me soit permis de reproduire les passages suivants où j'exposais, des 1889, dans mon Traité des maladies du cœur, certains principes de cardiothérapie :

« Quand un obstacle siège dans une machine, l'ouvrier, s'it

ne le trouve pas dans le jeu des soupapes, dans le piston ou le corps de pompe, s'empresse de le chercher dans les tubes de conduite ou de canalisation. Jusqu'ici le médecin n'avait, dans les maladies du cœur, qu'uno préoccupation presque constante: la recherche des lésions orificielles et la localisation des souffles valvulaires.

« Dans les cardiopathies artérielles, l'obstacle n'est pas au

cœur central, mais au cœur périphérique, aux confins du courant circulatoire. C'est là qu'il faut le chercher pour lo vaincre de bonne boure. A cette période, vouloir tonifier le cœur par la digitale serait aussi illogique que si l'ouvrier pour triompher d'un obstacle situé à la périphérie, voulait exercer une forte pression sur le piston de sa machine. Pour être de bons ouvriers en cardiothérapie, nous no devons pas nous contenter de constater un obstacle; il faut aussi en discerner la nature et surtout le siège. Or, au début de la maladie et dans tout son cours, lo cœur central dout l'antitude fonctionnelle est déià diminuée par insuffisance nutritive due à l'endartérite coronarienno, va être obligé d'augmenter son travail pour vaincre les obstacles périphériques caractérisés par la vasoconstriction et l'hypertension artérielle consécutive. C'est là un cercle vicieux, d'où l'on ne peut sortir qu'en agissant directement sur le cœur périphérique, représenté par les vaisseaux. Par là, on soutient déjà, on fortifie indirectement le cour central, parce qu'on facilite son travail en desserrant le frein vasculaire.

Depuis plus de quinze ans, des observations très nombreuses ont démontré que les lésions de l'artériosclérose sont précédées pendant des semaines ou des années par une phase de troubles (préselerose) consistant dans un état plus ou moins accusé d'hypertension vasculaire due à des causes diverses (infectieuses, diathésiques, toxiques), parmi lesquelles le régime alimentaire carné intensif tient la première place. A cette période, la thérapeutique réellement efficace a pour but de combattre cette sorte de surmenage artériel et de prévenir

les altérations anatomiques consécutives qui, une fois constituées, deviennent trop souvent irrémédiables. Sans doute. cette opinion n'est pas généralement admise, et on objecte, sans jamais en fournir la preuve, que l'hypertension sanguine est l'œuvre et l'indice de lésions vasculaires déjà constituées et latentes. Nous vivons dans un temps où on ne peut concevoir une malagio sans lésion, et cette objection est bien naturelle, puisqu'elle traduit un état habituel d'opinion, et parce qu'il est toujours difficile de rementer un courant. Or, je ne saurais trop dire avec Alb. Robin que, si la fonction fait l'organe, la maladie de la fouction fait souvent la maladie de l'organe. Cette doctrine qui n'attend point les lésions pour les combattre avec l'insuccès que l'on sait, mais qui cherche à les prévenir en s'appuyant sur la pathogénio, devient la base de la thérapeutique préventive de l'artério-sclérose en général, des cardiopathies artérielles en particulier : et cette thérapeutique préventive puise sa principale indication dans la médication hypotensivo, comme je viens de le démontrer, une fois de plus, par une communication faite dans une autre enceinte (1).

L'importance do cette médication hypotensive est démontrée par la simple énumération des nombreux états morbides où l'hypertension artérielle, constituant un danger, doit êtrecombattue sans retard et sans relàche:

Au stade prémonitoire de l'artério-sclérose, que j'ai étudis sous le nom do preselérose et qui, en l'absence encore de lésion vasculaire, est caractérisée par la simple augmentation de la tension artérielle, celle-ci étant cause et non toujours effet de la sclérose; dans l'angine de potitrine coronarienne et dans une catégorie de douleurs cardiaques dues à la distension du cour par angiospasme périphérique; dans l'artérimé, l'acide urique étant un agent puissant de vaso-constrio-

La médication hypotensive. Académie royale de médecine de Belgique, 27 avril 1901.

tion périphérique, ce qui explique la fréquence des congestions viscérales : dans la goutte, qui est aux artères ce que le rhumatisme est au cœur; dans l'aortisme héréditaire, qui peut apparaître dés le plus tendre âge comme prédisposition précoce aux maladies artérielles : dans le tabasisme, enfin toutes pour cause de vaso-constriction et d'artério-hypertension consécutive : dans la néphrite interstitielle l'une des maladies qui élèvent au plus haut degré la tension artérielle, d'où la fréquence des ruptures vasculaires, des hémorrhagies cérébrales : dans la suncope locale des extrémités, dans la maladie de Stokes-Adams, dans les anévrusmes; enfin à la suite de l'alimentation earnée intensive, l'une des causes les plus fréquentes de l'artério-sclérose et des cardiopathies artérielles. Riche en toxines vaso-constrictives, le régime alimentaire de nos jours est plutôt un empoisonnement alimentaire continu. fou, répété; cela, je ne cesse de le dire, de le redire encore, de le prouver depuis nombre d'années.

Cotte énumération, déjà longue, n'est pas close, comme jo ria déjà dit dans un travail récent sur l'emploi d'un nouveau médicament, le tétranitrate d'érythrol (1). Mais on peut voir par-là les nombreuses indications et applications de la médication livpotensive, et pour un groupe important d'affections cardiaques, au cours des cardiopathies artérielles qui commencent par une intoxication et finissent souvent par l'intoxication, celle-ci aboutissant à un état presque permanent de vaso-constriction, où comprend que l'indication thérapeutique consiste, non pas à s'adresser au cour central, déjà plus ou moins atteint dans sa force contractile, mais à tout le courn périphérique, au système artériel, dont il importe de combattre sans cesse la contraction exagérée pour soulager et faciliter le travail du coru central.

Pour les anéorysmes, je n'ai qu'à reproduire ce que j'écrivais il y a deux ans au sujet de leur traitement : « Sans doute, la

⁽¹⁾ Académie de médecine et Journal des Praticiens, 1901.

coagulation intra-anévrysmale par les injections gélatineuses ou tout autre moyen est le but vers lequel deivent tendre les efforts de la thérapeutique médicale, et de tout temps on a voulu la réaliser par des procédés divers. Mais il faut chercher en même temps à écarter toutes les causes capables de retarder, d'empêcher même cette coagulation, et parmi clles il n'en est pas de plus active et de plus dangereuse on même temps que l'hypertension artérielle dont sont atteints quelques anévrysmatiques. Un anévrysme n'est jamais si près de se rompre que lorsqu'il existe en même temps de l'artériosclérose généralisée, ou accidentellement une néphrite interstitiello, maladio où l'hypertension artérielle est à son maximum (1). » Il en résulte que le pronostic d'un anévrysme artériel ne dépend pas toujours de son volume, mais de l'état de l'hypertension vasculaire, et que chez les scléreux et athéromateux, par exemple, la gravité est toujours plus grande, le danger de rupture plus imminent que dans les cas où la dilatation partielle de l'artère constitue un simple accident local et sans complication de sclérose artérielle plus ou moins généralisée. Les faits suivants, presque des expériences sur l'homme, démontrent l'importance de cet élément de propostie :

En 1878, un médecia de Dantzig, Scheele, considérant que les anévrysmes de l'aorte floracique descendante sont souvent latents dans la zone comprise entre la bronche gaucho et le diaphragme, avait imaginé un signe de diagnostic fondé sur l'augmentation de volume de la tumeur et sur la production ou l'exagération des douleurs thoraciques à la suite de la compression des fémorales. Pratique déplorable : car, l'année suivante, un auteur anglais, Saundby, après une compression de dix à quinze secondes sur les artères crurales, qui aboutissait rapidement à l'exagération de la tension aortique, a produit en moiss de vingt-quatre heures la mort

¹⁾ Académie de médecine, 1900.

par rupturo du sac anévrysmal, terminaison observée également dans deux faits rapportés par le médecin de Dantzig.

Les capsules surrénales sécrétent une substance douée de propriétés vaso-constrictives énergiques, et j'ai vu un anévrysme prendre subtiement un grand accroissement avec menace de rupture chez un malade qui avait absorbé inconsidérément, pendant une quinzaine de jours, trois à quatre cansules d'extrait surrénal.

Depuis plus de douze ans, j'insiste sur les méfaits nombreux de l'alimentation carnée intensive, c'est-à-dire de tous les aliments riches en toxines dont la puissance vaso-constrictive est considérable, de sorte que l'une des causes les plus fréquentes de l'artério-sclérose réside dans ce régime alimentaire. C'est pour cette raison, ai-je dit encore, que dans la cure des anévrysmes on doit so préoccuper, non seulement du contenu, c'est-à-dire du sang à coaguler, mais aussi et surtout du contenant, c'est-à-dire de la poche elle-même. dont la distension suit assez exactement les progrès de l'hypertension artérielle. C'est elle que la thérapeutique doit viser et combattre sans relâche ni trève, si l'on veut que les autres traitements aient leur plein effet, si l'on veut, comme l'a dit Hogdson, « aider la nature dans ses méthodes curatives ». Alors, s'imposent l'alimentation lacto-végétarienne et la médiention vaso-dilatatrice et hypotensive par divers agents thérapeutiques.

Les malades atteints d'angine de poitrine coronarienne présentent souvent, au moment des accès douloureux, une augmentation subite de la tension artérielle, et c'est ainsi que depuis longtemps les inhalations de nitrite d'amyle font disparaitre en quelques instants les crises les plus sévères et les plus menaçantes. Mais souvent aussi, l'hypertension artérielle persiste en deltors des accès, de sorte que ces malades sont presque toujours en imminence de crises sténocardiques. Alors, s'imposo la médication hypotensive par l'alimentation lacto-végétarienne, par les iodures, la trinitrine, le tétranitrate d'érythrol.

Dans les maladies infectieuses, on a cru souvent voir une myocardite aiguë là oi elle n'est pas, et la dilatation aiguë du cœur peut étre due à l'action d'une forte hypertension sanguine. C'est ainsi que Federn (de Vienne), en 1889, a constaté une élévation de la tension artérielle dans la scarlatine par suite de l'action vaso-constrictive de certaines toxines, d'où augmentation des résistances périphériques toxines, d'où augmentation des résistances périphériques tachyendrie et cardiectaise aigué. Alors, dans ce cas, comme dans d'autres maladies infecticuses, où l'on abuse du diagnostic de myocardite, la médication ne doit pas être cardiaque, mais vasculaire.

La médication artério-hypotensive est réalisée par les inhalations de nirite d'angle, quand il s'agit d'obtenir un effet prompt et presque immédiat; par la trinitrine, le tétranitrate d'érythrol, parfois par le cératrum ciride, toujours par régime alimentaire lacto-cépétarien qui a pour résultat de supprimer les obstacles périphériques créés à la faveur de l'alimentation carnée par l'angiospasme.

La circulation périphérique est encore favorisée par le massage, et pour se convaincre de son importance, on n'a qu'à se rappeler l'action physiologique des contractions musculaires. Celles-ci fout passer dans le muscle eu travail une quantité de sang beaucoup plus considérable, cinq fois plus qu'à l'état de repos, et même neuf fois d'après divers expériphérie, elles soulagent le cœur, facilitent son travail sans l'augmenter, produsent les effets d'une saignée dépléuve sans en avoir les inconvênients, et comme s'il s'agissait d'une saignée interne. Les vaisseaux sont les auxiliaires de cœur, et les muscles par leurs contractions sont les auxiliaires de vaisseaux. D'autre part, le massage musculaire est antitoxique, puisqu'il favorise la disparition de nombreux déchets organiques qui l'intoxiquent, comme Zabiudowski l'à démontré en

faisant remarquer que eltet l'homme, un repes de quinze minutes après un travail fatigant, réussit à peine à restaurer la force musculaire, tandis que le massage, pratique à temps égal, double la quantité de travail que peut fournir le muscle. Il y a une part de vérité dans eette idée exprimée par le vulgaire, au sujet de l'affaiblissement eausé par un repos au lit prolongé. Les malades s'affaiblissemt réellement, ils sentent la fatigue, parce que leurs muscles ne se débarrassent pas suffisamment de leurs déchets de désassimilation, et le meilleur moyen de leur faire récupterer quelques forces, éest de désintoxiquer leur système musculaire par des pratiques de massage.

Il est une médication que je ne puis qu'indiquer aujourd'ui et sur laquelle j'ai commencé déjà quelques recherches. Elle s'appuie sur l'action physiologique des glandes dont les unes seraient hypertensives, comme les eapsules surrénales, le corps pituliaire, la rate, les glandes paretides, le rein, le corps thyroide d'après Livon (de Marseille), et les autres hypotensives : foie, thymus, paneréas, testicule, ovaire (1). En administrant quelques extraits de ces derniers organes et surtout du thymus, j'ai réussi parfois à diminuer l'hypertension artérielle, et c'est ainsi que l'en pourra trouver dans l'organothérapie une nouvelle ressource pour la médication hypotonsive.

II. - HYPERTENSION PULMONAIRE

L'hypertension pulmonaire est connue depuis longtemps, et c'est une raison peur laquelle ju n'insisterai pas à son sujet. Elle se traduit surtout à l'auscultation par le retentissement du second brut du cœur à gauche du sternum, au niveau de l'orifice de l'artère pulmonaire. Elle est un symptome habituel des affections mitrales (insuffisance et rétréeis-sement), mais surtout du rétrécissement, et dans cette der-

Livon (de Marseille). Action des sécrétions internes sur la tension sanguine. Congrès de Montpellier, 1898.

nière maladie elle atteint un haut et sévère degré d'intensité lorsque la thromboso auriculaire vient la compliquer.

Dans les affections gastro-intestinales et hépatiques à rotentissement cardiaque, l'hypertonsion pulmonaire est un phénomène beaucoup plus rare qu'on a voulu le dire. En tous cas, elle n'arrive jamais à produire des accidents capables de compromettre l'oxistence.

Ello devient, au contraire, un grand danger dans certains états morbides, et particulièrement dans les cas où, survenant subitement au tours de la selérose aortique et rénale, elle arrivo à produire un adème suraigudu poumon contre lequel une large saignée, faito hâtivement, peut conjurer un péril mortel.

Parfois, la double hypertension - aortique et pulmonaire - se trouve réunie choz le même suiet, co qui donne liou au syndrome très rebelle de l'arythmie palpitante. C'est dans le rétrécissement mitral des artério-scléroux, décrit par nous pour la première fois, en 1895, au Congrès do Lyon, que ce syndrome apparaît parfois dans toute son intensité. Il s'explique par l'énorme travail que le cœur est obligé d'accomplir en raison do l'hypertension artérielle produite par l'artériosclérose et par la néphrite interstitielle souvent concomitante. et do l'hypertension pulmonaire qui est l'œuvre du rétrécissement de l'orifico auriculo-ventriculaire; d'où une arythmie palpitante et angoissante que la digitalo, surtout à doses élevées et prolongées, peut singulièrement aggraver. Car, une cause fréquente do la faiblesso du cœur est dans la disproportion entre la résistance insuffisante du myocarde et les obstacles qu'il doit vaincre : obstacles au niveau do la petite circulation dans tout le réseau vasculaire du poumon dont l'état de contracture forme comme un barrago au-devant du cœur droit : obstacles dans la grande circulation, dans tout l'arbre aortique, où l'hypertension sanguine forme un autre barrago au-devant du cœur gauche. Aux confins des deux systèmes circulatoires, les deux freins vasculaires sont trop serrés et le

cœur lutte contre eux par les palpitations et la tachycardie. jusqu'à ce qu'il commence à donner, par l'arythmie, le signe de son épuisement contractile. En hydraulique, en mécanique, quand les freins sont trop serrés, on les relâche, et on ne pense pas un instant à augmenter le pouvoir moteur de la machine, surtout si celui-ci est déià affaibli. En thérapeutique cardiaque, nous avons souvent le tort de vouloir toujours agir directement sur le cœur et de prescrire inconsidérément la digitale. La médication des symptômes a fait son temps; il faut s'élever plus haut, jusqu'à la cause, à la pathogénie. Celle-ci nous enseigne que chez les malades menacés par les deux hypertensions combinées, le travail du cœur n'a pas besoin d'êtro toujours renforcé, mais allégé; ce n'est pas le cœur central que doit viser la thérapeutique, c'est le cœur périphérique; ce n'est pas la palpitation, élément et condition de la lutte, qu'il faut modérer ou accroître, c'est la cause que l'on doit atteindre dans son modo de production. Ainsi, chez les chlorotiques et les nerveux, il y a certaines palpitations dues à l'angio-spasme que la trinitrine et tous les médicaments hypotenseurs parviennent à vaincre, mieux que tous les médicaments cardio-toniques.

Il y aurait encore beaucoup do choses à dire sur l'hypertension pulmonaire et ses conséquences; mais j'ai hâte d'arriver à l'étude encore sommaire de l'hypertension portale, tombée injustement dans l'oubli.

III. - HYPERTENSION PORTALE

Il y a dans la cavité abdominale nue circulation veineuse abondante sur laquelle il faut agir de bonne heuro, parce quo la, une stase sanguine, favorisée d'ailleurs par des conditions anatomiques et physiologiques trés défavorables, peut avoir des conséquences d'autant plus graves qu'elle reste longtemps latente et méconnue. La maladie commence par le système voineux et surtout par le système voineux intra-abdominal, co grand égout collecteur de l'organisme. Pendaut des mois et des années, il y a stase énorme et permanente dans les veines mésaraiques dont la dilatation progressive amoindrit la contractilité, et c'est ainsi que la « pléthore abdominale » des anciens, de Stahl en particulier, mérite d'être réliabilitée, si l'on s'inspire des recherches plus récentes, parmi lesquelles il couvient de citer celles de Ladwig (de Leipzig) et de Heger (de Bruxelles), qui ont appelé l'attention sur la fonction antitoxique du foie, en constatant d'abord la disparition de la nicotine dans cet organe (i).

Les veines mésaraïques et la veine porte charrient lentement les toxines dont elles sont encombrées (vena porta, porta malorum); le foie, insuffisant à la tâche, se congestionne (foie gastro-intestinal, non cardiaque), et neutralisant incomplétement les poisons venus du tube digestif, il les laisse pénétrer dans le cœur droit, dans les poumons qu'ils irritent, congestionnent et enflamment, C'est ainsi que l'on voit de ces malades à circulation portale retardante, congestifs pour la plupart, regardés souvent comme arthritiques, chez lesquels l'hyperémie passive avec stase veineuse se traduit par tous les signes de la pléthore abdominale : par un gros foie et par des troubles gastro-intestinaux, conséquence de l'état congestif de la muqueuse digestive; par des bronchites et congestions pulmonaires à répétition et devenant ensuite presque inamovibles; par un cœur prompt à la dilatation avec contractions molles et insuffisantes: par un facies rouge et tous les symptômes de congestion encéphalique; par un rein torpide avec urines rares, sédimenteuses et chargées d'urates ; par les fluxions hémorroidaires, souvent par l'aboudance du tissu adiqueux. Telle est l'hupertension portale avec ses conséquences, les maladies par ralentisse-

⁽¹⁾ HEGER (Expérience sur la circulation du sang dans les organes isolés (Thèse inaug, de Bruxelles, 1873. Congrès périodique international des sciences médicales, Bruxelles, 1875. Journal de médicine, de chirurgie et de pharmacologie de Bruxelles, 1877. Association britannique pour l'aganacement des sciences, 1881.

ment de la nutrition, commençant toujours par le ralentissement de la circulation veineuse.

Prémisses physiologiques. — L'hypertension et la stase portales ont été réalisées d'une façon rapide par diversos expériences qui ont démontré la production de trois ordres de symptômes — anémiques, hypotenseurs, toxiques — d'où dérivont tous les autres.

Naguère. Boerhaave avait eu l'idée de pratiquer la ligature de la veine porte sur un animal et il avait naturellomont vu une coloration violacée se produire dans tous les organes d'où cetto veino tire son origine. Claude Bernard avait judiciousement fait remarquer qu'après cette ligature expérimentale, « tout le sang s'accumule dans l'intestin où les artères l'apportent sans cesse, sans qu'il soit emporté ensuite. Le cerveau et les organes devionnent alors oxsangues. » En 1873, Tappeiner lie la veine porte, puis Picard (de Lyon), en 1880, et ils constatent, comme Ludwig et Thiry l'avaient déià remarqué, uno diminution considérable de la tonsion artérielle, une accélération très marquée des contractions cardiaques qui s'affaiblissent rapidoment, comme s'il s'agissait d'une hémorrhagio abondante, et c'est bien ainsi que les choses so passent. Comme si elle n'était plus, une masse considérable do sang so trouve immobilisée dans la portion sous-diaphragmatique du corps, et alors les centres uerveux, les muscles respiratoires et le cœur so trouvent dans les conditions où on aurait placé ces appareils, si ce sang immobilisé avait été soustrait à l'organisme par uno grosse hémorrhagie.

Les symptômes d'anémie, ceux d'hypotension artérielle sont donc bien démontrés par les faits expérimentaux et cliniques. Nous allous voir apparatire les accidents toxiques avec la célèbre expérience de Eck (en 1877) renouvelée par Halin, Manein, Nencki et Pawlo, et qui réaliso la suppression fonctionnelle du foie. Elle consiste dans l'abouchemont de la veino cavo inférieure avec la veine porte, après ligature préalable de celle-ci. Les animaux meurent alors en 24 ou 48 heures au milieu d'accidents texiques les plus rapides et les plus graves lorsqu'ils ont êté nourris avec de la viande, tandis quo ceux qui ont été alimentés avec du lait, c'est-àdire avec une alimentation beaucoup moins riche en toxines alimentaires vase-constrictives, ont une survio beaucoup plus longue. Ce fait important neus servira tout à l'aveure pour la thérapeutique de l'hypertension et de la stase portales.

Conséquences cliniques. - Les résultats de ces expériences sont réalisés en grande partie en clinique, dans la pyléphlébite, dans toutes les obstructions eu compressions de la veine porte, à la dernière phase de la eirrhose atrophique eu l'on obscrve seuvent une chute considérable de la tension artériello avec tachycardie, dans les affections du cœur arrivés à la décompensation, à la période du foie eardiaque avec stasc des veines intra-abdominales. Les accidents cardie-vasculaires sent tellement prédominants qu'on peut creire alors, au ceurs d'une cirrhesc atrephique, cemme dans un cas mémorable cité en 1878 par Chuquet et Rigal à la Société anatemique, à une complication cardiaque, à une myocardite intercurrente, alors que les accidents (hypotension artérielle considérable, tachycardie, battements du cœur tumultueux et faibles avec pulsations avertées, etc.), étaient imputables à la thrembese d'une des veines mésaraïques, censtatée à l'autopsie.

D'autre part, nous comprenous pourquoi certaines scléreses artérielles tirent leur origine de cette stase portale lersqu'elle se prelonge, au lieu de survenir rapidement, comme dans les premières expériences ou comme pour les faits eliniques d'obstruction subite et totale de la veine porte. Alors, la stase chrontique dans les veines intra-abdominales aboutit
lentement, mais súrement à l'insuffisance hépatique, et par
suite de la diffusion dans l'organisme de toxines vaso-constrictives, incomplètement arrétées eu neutralisées par le foic
insuffisant, l'état merbide entre dans une seconde phase caractérisée par un phénomène teut contraire: l'Hypertension arté-

rielle avec l'une de ses conséquences les plus immédiatos, l'artério-sclérose.

Donc, la physiologie et la clinique démontrent les faits suivants: hypotension artérielle, comme conséquence immédiate de l'hypertension et d'une staso portales suraigués ou aigués; hypertension artérielle et sclérose vasculaire consécutive, comme effets éloignés de l'hypertension et de la stase portales prolongées ou chroniques.

L'hypertension portale s'observe assez fréquemment à l'époque de la ménonause chez la femme, d'où certains accidents cardiaques, tels que la tachycardie dont la pathogénie et les indications thérapeutiques ont été souvent mal comprises. En 1866, Dochambre et Vulpian avaient remarqué la production fréquente de l'adipose à la suite des saignées répitées et abondantes auxquelles on soumettait les suiets à l'époque de Broussais, comme on a remarqué aussi le développement du tissu adipeux chez les femmes atteintes de fortes et nombreuses métrorrhagies. Or, nous avons dit quo la staso portale équivalait à une hémorrhagie, et c'est ainsi que l'on doit expliquer certaines adiposes à l'époque de la ménopause, des hommes à la cinquantaine, des gros mangeurs, des goutteux, des uricémiques, de sorte que l'obésité doit être parfois alors combattue dans sa cause prochaine. la stase et l'hypertension portales.

Déductions thérapeutiques. — Pour la combattro, il y a deux moyens principaux : l'alimentation et le massage abdominal.

L'alimentation doit être surtout lacto-végétarienne, ce qui se comprend d'après l'expérience même de Eck, puisque la quantité de toxinos est augmentée ou accumulée par suite de la stase portale, et que la puissance antitoxique du foie est amoindrie ou insuffisante en raison même de la surabondance et de l'accumulation des toxines d'origine gastro-intestinale.

Quant au massage abdominat dont les excellents effets ont été exposés par nous, il y a quelques années, à l'Académie de médecine, à la suite de recherches faites dans notre service de l'hôpital Necker et signalées d'une facon remarquable par M. Cautru, il a une réelle importance. Le massage abdominal abaisse et régularise la tension artérielle, ce qui en fait un moven thérapeutique d'une valeur incontestable dans certaines sténocardies coronariennes compliquées de stase portale : il semble agir sur la diurése par le même mécanisme que la digitale, puisque l'augmentation des urines coıncide, par l'emploi de ces deux moyens, avec la vaso-dilatation et la diminution de la tension artérielle succédant promptement à un état de vaso-constriction et d'hypertension artérielle: il agit non seulement sur la quantité des urines, mais encore sur leur compesition chimique, ce qui est comme la signature de la désintoxication de l'organisme, et c'est ainsi que l'on peut noter parfois, après plusieurs massages abdominaux, l'augmentation de l'acide phosphorique, des chlorures et de l'urée, avec la diminution consécutive de l'acide urique. On peut se demander alors, comme l'a fait si bien remarquer mon interne Piatot, dont la thèse inaugurale est si instructive (1), si « des produits de déchets, véritables poisons dans un organisme en souffrance et dont les émonctoires sont plus ou moins encombrés, si ces 'produits tels que la créa: tine, la créatinine, etc., ne sont pas capables d'élever la tensien artérielle. Si oui, comme ces produits de désassimilation des matières azotées s'oxydent mieux sous l'influence du massage, - ainsi que le montrent les examens des urines leur transformation en urée aurait pour résultat de diminuer la vaso-constriction due aux poisons, »

C'est ce qui explique pourquoi, ce massage est souvent un agent de renforcement pour l'action des médicaments. Ainsi, des expériences entreprises døns mon service ent démentré le fait suivant : chez un malade atteint de stage portale, les

A. Piator, Traitement des maladies du cœur par l'hygiène et les agents physiques. (Thèse inaug. de Paris. Un volume de 212 pages. Steinheil, éditeur, 1898)

urines ne dépassent pas le chiffre de 400 à 500 grammes par jour, malgré l'administration de la théobromine ou de la digitale; mais elles montent rapidement à 1,500, 2,000 et même 3,000 grammes par la combinaison de deux agents thérapeutiques: digitale ou théobromine, et massage abdominal.

IV. - Hypertensions combinées

Dans la notion des trois hypertensions, il y a une source féconde d'indications thérapeutiques que je ne puis qu'indiouer ici.

Les hypertensions peuvent être combinées chez le même sujet, et nous l'avons déjà vu pour l'arythmie palpitante, pour le rétrécissement mitral des artério-scléreux (hypertension artérielle et pulmonaire) et pour l'ædème aigu du poumon. Dans le rétrécissement mitral artério-scléreux avec hypertension portale concomitante, les trois hypertensions sont réunies, et alors le danger est grand, de tons les instants, si l'on ne sait pas agir en temps utile sur l'une des hypertensions la plus accessible aux moyens thérapeutiques. J'ai contribué à démontrer (1) que la pneumonie des obèses goutteux est extrêmement grave, lci, la maladie trouve le terrain mal préparé pour la défense, en raison de la coexistence des trois hypertensions qui retardent et immobilisent en quelque sorte le cours sanguin, et l'indication consiste à combattre énergiquement cette sorte de harrage circulatoire généralisé. Je n'insiste pas davantage sur ce sujet, ayant l'intention de complêter un jour ces considérations pratiques. Qu'il me suffise de dire que, dans les affections du cœur, par exemple, arrivées à la dernière période de leur évolution. l'impuissance des médicaments et de la digitale ou de la théobromine en particulier, ne vient pas - je ne cesse de le répéter - de l'intensité de la dégénérescence myocardique; elle est due, le plus ordinairement, à l'existence de barrages circulatoires

⁽¹⁾ Journal des praticiens, 1900.

plus ou moins nombroux que la thérapeutique doit s'attacher à combattre de bonne heure. Lorsque chez un cardio-artériel, les trois hypertensions se trouvent réunies, le pronostie devient grave, le danger imminent, puisque l'action médicamenteuse devient impuissante. C'est alors qu'en se montrant bon tacticien en thérapeutique, en cherchant d'abord à diminuer la stase et l'hypertension portales, on arrive à renforcer cette action médicamenteuse et à sauver bon nombre de malades d'une situation extrémement périlleuso.

En résuné, trois hypertensions — pulmonaire, portale, aortique — réclament une thérapeutique hátir oet spéciale. Nous sommes mal outillés contre la première, plus puissants contre la seconde, fortement armés contre la troisième, an sujet de laquelle f'ai plus particulièrement rinsiste, parce que la lutte engagée contre elle devient une médication précentice de l'artério-sclérose et des cardiopathies artérielles, parce que j'ai vouls faire la démonstration suivante, ainsi formulée pour la derpière fois dans une autre enceinte (1)

Dans les maladies du cœur, et mémo dans des états motivales divers, l'insufficance cardiaque ne vieut pas seulement du moteur central ni de ses lésions dégénératives ou de sa faiblesse, elle est encore souvent en rapport avec les obstacles périphériques que le myocarde parvient difficilement à surmonter, et il suffit de détendre le frein vasculaire trop sorré pour faire disparairet l'imminence d'accidents redouts-bles. Alors, au moyen de la médication hypotensive, réalisée par le raigne alimentaire, par le massage et certaine gromatique musculaire, par les éthers nitriques, parmi lesquels la trinitrine et le tétranitrol occupent la première place, peut-cire par l'organothérapie, le cœur périphérique vient au secours du cœur central, après on avoir troublé et entravé le fonctionnement.

Le secrétaire des séanees, Vogt.

⁽¹⁾ Académie de médecine de Paris, 5 mars 1901.

REVUE DES TRAVAUX FRANÇAIS ET ÉTRANGERS

Pharmacologie.

Emploi de l'ergetine cemme tonique vasculaire. — M. Rosenbach, dans un travail récent, a montré que l'ergetine devait être considéré comme un véritable tonique vasculaire et qu'à ce point de vue son emploi est susceptible d'un certain nombre d'indications nouvelles.

C'est ainsi qu'il la recommando d'abord dans les cas do dilatation cardiaque » idiopathique » qui est duo presque toujours à une incapacité des parois vasculaires à conserver l'impulsion systolique. De même M. Rosenbach croit que Pergotine est indiquée dans l'artério-selvose prononcéo où des troubles analogues existent et aussi dans l'insuffisance aortique.

Sous l'influence de l'ergotine, l'impulsion cardiaque se régularise, le pouls devient plus plein, mieux frappé, plus lent; les intermittences disparaissent. Parallèlement les troubles respiratoires diminuent, la dyspnée disparait.

Chez les malades ayant de l'œdème généralisé avec lésions organiques manifestes sur les valvules, l'ergotine resto sans action.

Mais dans ces cas encore, on peut essayer l'association de l'ergotine et de la digitale qui a paru utile. M. Rosenbach fait do la digitale un tonique diastolique tandis que l'ergotine est un tonique systolique. Voici quelques-unes des formules qu'il recommande.

> Nº 1. Infusion do seigle ergoté 10 à 15 p. 100 Ether sulfurique...... 3 — Acide chlohydrique..... 1 —

2 cuillerées à bouche toutes les 2 ou 3 heures.

2 à 3 fois par jour une euillerée à bouche.

Pour 50 pilules. 2 à 3 pilules toutes les 2 heures.

Gynécologie et obstétrique

Contribution à l'étude clinique du traitement de l'infection puerpuérale, par Nicolas N. Gheorghin (G. Steinhei).— Corclusions : I. Avant d'instituer un traitement local de la fièvre puerpuérale, il faut d'abord explorer la cavité utérine.

II. Suivant les données de cette exploration, faire des injections intra-utérines ou un curage digital suivi de l'écouvillonage.

III. Il faut pratiquer un véritable curettage gynécologique avec la curette tranchante, la curette mousse étant avantageusement remplacée par les doigts de l'opérateur.

IV. Il ne faut faire l'hystérectomie qu'après l'échec des moyens précédents de traitement de l'infection puerpuérale.

V. Il ne faut pas oublier le traitement général qui devra surtout consister en toniques et reconstituants.

TABLE DES MATIÈRES

DU TOME CXXXXI

Α

Acconchem ut (De la rétention des membranes après l'), par MAYGRIEN, 823. Accontumence à la morphine (Sur les causes de l'), par FAUST, 477. Acctopyrine (L') par BOLOGRÉSI, 437.

Acide usmique (Noto sur le traitement du cancer par l'), par Hénand ne BESSÉ, 729.

Acide phénique (Du traitement des végétations vulvaires par l') par Cogent.Le, 438.

Acid: phosphorique (Sur l'importance de l'hypodeidité urinaire et son traitement par l'), par Barner, 4. Acide salicylique (Traitement des verrues planes juvenilus par l'), par Garcinen, 829.

Garchen, 829.

Acidité urinaire (Contribution à l'étude de l') chez l'homme sain et chez les malades, 500.

Acué (Fermule de Bébra pour l'), par lléans, 912. Adénopothies cerrico-faciales (Les) d'ari-

gine dentaire, par Maineux, 31.

Annax. L. V. Possingie.

Affections entonies (La photethérapie et ses applications à la thérapeutique

des), par Lebenne, 429.

Ayrypine (Contre l') 832.

ALAN O' NEILL V. B'en de méthylène, gonorrhée.

Albaninoides (Sur la valeur alimentaire des matières) administrées par la voie sous-entanée, par E Lanonne,

Albaninuric (L') produite par l'antipyrine. Inconvénients de l'antipyrine chez les albuminuriques, par Albert

ROBIN, 466.

Albaminurique (Une mère) pent-elle allaiter, par Commandeun, 637.

Albuniusriques (Considérations sur le régime des) par A. Bobn, 211. Alcoolisme oign (Traitement de l'), par de hautes doses de digitale, par

Loomis, 824.

Atrodicus (Contribution à l'étude des rapports de l') et de la paralysie générale par Changemelle, 430.

générale par Chantemelle, 430.

Alimentation (Le riz dans l') des sujets .

porteurs d'uleère de l'estomae, par

Bounger, 31.

Alimentation normale (Du régime de transition entre le régime lacté absoln et l') chez les dyspeptiques hypersthèniques avec hyperchtorhydrie, par A. Robin, 710.

dre, par A. Robin, 710.

Allanvendiantz V. Éponchements sérenz, gnotacol. hémorrholdes, hydrocèles, parices, varioscèles.

Amenoration (L'hypodermoelyse ferrique dans le traitement de l'), par lienno-

TAY, 27.

Ampan'es du picd (Cure rapide des),
par Wann, 232,829

Analgésie chirurgieste (Méthodes et procédés d'), par E. LAVAL, 677.
Anesthésie chirurgieste (La cocamisation des gres treacs nerveux commo méthode d'). par Jahoulax, 391.

Anesthésic medullaire (L'eucaine-B duns l'), par ENGELMANN, 909.

Antipprine (L'Albuminurio produito par l'). Inconvenients de l'antipyrino chez les albuminuriques par A. Roms, 406.

486.
Antiscplie intestinale (L') chez les enfants par F. Fede, et J. Galle de Tomast, 77.

Antiseptique intestinut (Le phènol camphré comme) dans la flèvre typhoido par D. English, 716.

Anus (L'excision de la fistule à l') sans section du sphinter, par P. Barcz, 5tt.

Appendenc (Le chiothydrate d') en injections hypodermiques contre la constipation, par flaviant et Berrin, 671.

Apporcil circulotoire chez les neurastheniques au point de vue du régime alimentaire et du traitement), par

M. de Fleuny, 376.

Apporeils inomovibles en celluleide
(Nouveau procedé de confection d'),

par F. Hersing, 237.

Appendicite à répetition; (Opération à ticid, ver intestinal vivant dans l'appendice,) par Guinare, 235.

pendice,) par Guinard, 235.

Arscule (Intoxication par I'), par Bankut, 346.

 (Fer ou enivre duns la Chiorose) par Lieggois, 394.
 Arthrites blennorrugiques (Note sur les injections intranuscutaires de calomel dans les), par Themas, 700.

calonici dans les), par Inchas, 700.

Asthme (Lo traitement do l') par
BROCCHI, 899.

AUDERENT, V. Sa'aphène, traichèrs atè-

rines.

Arartement artificiel (L') prevequé par l'injection intra-utérine de teinture d'iode, par Ocursentages, 717.

В

Bain fraid (Le) dans un cas grave de pneumenie double, par LEGRAND, 837. Bains solés chauls (Les) contre les trou-

bles de la menopause, par Gottschalk, 26.

Baias sinopisés (Traitement de la broncho-pneumente des enfants par les),

par Cailland, 827.

Balzen. V. Citrote de bismath, bleunarragie. Eonquel offert au professeur J. RENAUY, à Lyon, 175.

BABBARY, V. Ithino-pharyngite. BARDET (G.), V. Acide phusphorique, di-

gestion, formine, goulde, hearmethyieneitstrumine, ipponeidité arivaire, piperazine, pyramidon, rhumatisme,

BARGE (P.). V. Anns, fistu'e. BARKER (V.). Arsenie, intoxic tiod. BERNARD (U.). V. Delire salientique.

BERTHERAND (L.). V. Pyramidon.
BEURNIER (L.). V. Metrites.

Bibliographie, 314, 234, 386, 422, 472, 573, 627.
Bicarbonate de soude (Action du), 586.

Bicarbonote de saude (Action de l'ean, du sel, du bouilien, du) sur l'estomac, par V. Furmenr, 575.

BINET. V. Stotions kydro-minérales, Inberculose.

Bismuth (Citrate de) (Traitement de la blemorragie par le), par Balken,

830.

Bleuxorcagie (Traitement de la) par le citrate de bismuth, par Balzen, 830.

Blen de méthylène (Traitement de la go-

norrisce par le), par ALAN O'NLLL, 793.

Boleonési (A.). V. Actiopyrine, citro-phene, himorrhoides, hontin.

Boxo (K.). V. Huile de croton.

Bosc. V. Fièrre typhoide, injections, siram artificiel.

Boxxy (Ricardo). V. Poresthésie larynyée?

Bouffe, V. Ichtyase.
Bouillon, 583.
— (Action de l'eau. du sel, du) du
blearbonate de sonde sur l'estomac),

par V. Frienont, 573.

Bouillous ourriers of restaurants populaires par J. Laumonier, 283.

Bouldoumer. V. Hydro-minéral, tension

copillaire. Bornser. V. Atimentotion, estomac, périlyphlite.

BRACN. V. Bronchites, thiocol, tuberculose. Brooq. V. Eczéma.

Broakydrate d'hysseine (Le) contre les accidents consécutifs à la cocamisation de la moelle, pars. Marx, 223. Bromure de stroutium (Traitement de

l'épilepsie par lo), par Tounaille, 429. BROECEAFRT. V. Biphtéric, sérothéra-

pic.

Branchites (Traitement du coryza et des) choz les tuberenleux,par KxcPr,

228.
Branchites chroniques (Le thiocol dans

le traitement de la tuberculose et des) par Braux, 718. Broucho-pneumonie (Traitement de la) des enfants par les bains sinapisés,

par Cailland, 827. BUCHWALD. V. Pacumonic.

BUDIN, V. Sérrétion-lactée.

Bulletia, 1, 33, 81, 413, 461, 493, 211, 273, 321, 353, 401, 433, 431, 513, 561, 503, 611, 673, 721, 733, 801, 883, 831.

BIRLUBEAUX. V. Gueodylates, fer, gunia-col, magnesie, quinine, soude.

CABANES. V. Poissous.

Carodulate de soude (Traitement d'un cas de péritonite tuberculeuse par les injections de) et les lavements d'eau saturée de sulfure de carione),

par Schmitt, 703. Carcelylate de soule (de magnésie, de guaiacol, de for et de quinine), par BUBLUREAUX, 521.

CAILLAND. V. Bains, broncho-pneumo-Hie.

Culcanéum (Fracture da) par arrachement; suture, guerison), par Po-THERAT, 236. Calcinu (chiorure de), Note sur le tral-

tement des hemorrhagies intestinales de la flevre typhoïde par les lave-ments chauds et le), par A. Mathiev, 433.Calouel (Note our les injections intra-

musculaires de) dans les arthrites biennorragiques, par TROMAS, 700. Calonel (Emplatre au) à demeure dans

la syphilis de l'enfant, par GILLET, 558. CALOT. V. Tuberculose.

Cancer (Note sur le traitement du) par l'acide osmique, par lléraro de Bessé, 729 Cancer de la tête du paneréas (Du trai-

tement de la rétentien bitiairn au cours du), par PLATEL, 390. Carbone (Sulfure de) (Traitement d'un cas de péritonite tuberculeuse géné-

ralisée par les injections de cacodylate de soude et les lavements d'eau saturce de), par Schwiff, 763. Cascara (Laxatif au), par Desesquelle

240. Cutaracte séaile (Recherches sur la

nes atteintes de), par FRENKEL, 430. Catarrhe utérin fétide (Chez une me agée), par Paul Dalgué, 381.

perméabilité rénale chez les person-Ceinture hygiénique (Un appareil de soutien cardiaque), par Descuamps, 731.

Celtulaide (Nouveau procédé de confection d'appareils inamevibles en par F. HEBSING, 237.

CERVELLO. V. Hémoglobine, métaur townls.

Chalazion (Traitement du), par Staze-MINSKI, 352. CHALEIX, V. Dystocie

Chalcurs radiunte lumineuse (La) en therapeutique. Les appareils Dowsing, par P. Guyexor, 633. Chancre simple (Traitement du) par

HALLOPEAU of LEREBDE, 159. CHANOZ, V. Tri-acetylmorphine. CHANTEMILLE. V. Alcoolisme, paralysic

générale. Cilorel (Liniment ae) contre la sciatique et le lumbage, par A, LAFOND-

GREALETY, 230. Ch'orkydrate d'apocoddiae (Le) en in-jections hypodermiques contre la constipation), par RAYLART et BERTIN,

Chierese (Fer, arsenic ou enivre dens la), par Liencois, 384.

Chlorure de calcium (Note sur le traitement des hémorrhagies intestinales-de la flevre typhoïde par les grands lavements chauds et le), par Albert MATHIEU, 453.

Chlorare de sodism (Action du) sur la sécrétion de l'estomac, 581. CHTAMPKÉ. V. Ean oxygénée, gynécologie

Citrate de bismuth (Traitement de la blemorragie par le), par Balzen, Citrophène (Le) par Bougonési, 502,

Coraine (La) el son antidote rationnel, par Lenox, 635. Cocsine (Intoxication par la), par lienz, 357.

Cocurnisation (La) des gros trones nerveux comme méthode d'anesthésie chirurgicale, par Janoulay, 391. Collures contre les kératites ulcéreuses.

par R. WILLIAMS et PUECH, 432. COMMANDEUN. V. Albuminurique. Concestion atérine (Traitement médical

de la), par Dalché, 764-805. Constipution (Le chiorhydrate d'apoco-déine en injections hypodermiques contro la), par liaviant of Bertin,

Constipution consecutive (Mixture contro

la) à l'anachlorbydric stomacale, par Ennionn, 912. Constipation hobituelle (La levaro de

blère contro la), par E. Roos, 138.
Coquelucke (Traitement do la), 718
Coquille, V. Aride phénique, régétations

rairoires.
Corning (J. L'onard). V. Sommeil, ribrutions musicoles.
Corps étrangers (Extraction des) du con-

duit anditif. par Lermovez, 683. Correspondance, 81,365,448, 729. Corysa (Traitement du) et des bronchites chez les taberculeux par Knopp.

228.

Coryza chronique (Solution contro le)
par Morell-Markenzie, 210.

COTTON (S.). V. Eva oxygénée, sauy. COURTADE (A.). V. Otite mogenne. Grâne (Plaie pénétrante du) par balle de revolver; trépanation; extraction do la ballu logeo dans le cervean;

gnérison), par Monestin, 235.

Grane fotal (Perforation du) et guérison
par L. Pernice, 719.

Creton (Buile de) par K. Boxp, 80.

Cairre (For, arsenie ou) dans la chlorose, par Liéckors, 391. Cyanute de mercure (Le) dans le traitement do la rhinite fibrigeuse, par

Pelitesoun, 233, 831.

Gynoylosse (Traitement des ulcérations malignes par Je), par Isacona s et

POULOPONTOS, 672.

Cystites (L'arotropine dans les), 825.

Ð

Daleine (Paul). V. Galarrhe utériu, congration utérine, sulfole de quinine, en thérapeutique utérine. Décubilus ventral permanent (Lo, dans

letraitoment de la fistule vésico vaginalo par J. Vitrace, 76.

Bélire (Sur lo) dans le cours dos mala-

dies infecticasos, par L. Silvagu. 636. Délire aign (Traitement du) par Huchang. 352.

Délire salicylique, par R. Bernaud, 565. Deliriam tremeus (L'opium dans le traitement du) par VILLERS, 231.

DESCHAMPS. V. Ceinlure. DESESQUELLE. V. Lazalif un cascara.

macale, par Desnos. V. Hypertrophie de la pros-

DESTRÉE. V. Diurétique. Diobèle (Récents travaux sur le traite-

ment du), 902.

Diabete (La glycosurie et le) d'origine

dyspeptique. Symptomes, diagnostic et traitement, par A. Rours, 538. Diamanthengen, V. Guniarolizotion, taberculour.

Biarrhèrs (Teinture contre la dysentrie et les) d'origine diverse, par GELPEE, 832.

Digration (Qualques faits relatifs & l'artion de la) sur la réaction des urines, par G. Bander, 183. Digitale (Quand faut-il administror la)

par Mantinet, 713.

Digitales (Traitoment de l'alcoolisme aigu par de hantes doses de), par

Loomis, 824.

Diphtérie (La sérothérapio dans la), par
BROSCKAERT, 224,

Biphterie (Succès de la sérothérapie dans les cas de), par Otto Jelinck, 333.

Discours de M. A. Robin, prononcó au banquet offert à M. J. RENAUT, à Lyon, 178.

Lyon, 178.
Distrique (Action thérapeutique d'un nouveau), par Desruée, 913.
Dormiol (Le), 876.

DUBOIS (S.) V. Ties conrulsifs. DUBOURGEAU V. Zomothéranie.

Roun, 710.

**Despessie hypochlorydrique (L'elixir do Stougton dans la), par Liedeois, 30.

**Descalerie (Teinturo contro la) et les diarrhées d'orgino diverse, par GELINE, 832.

Dystorie (La manœuvre de Bonnairo dans la), par rigidité anatomique du col, par CHALEIX, 27.

E

Ess (Action de l'), du sel, du bouillon. du bicarbonate do soude sur l'estomae, par V. Farmont, 575.

East distillée (Action do l') sur l'ostomae, 577. Eure minérales (Le traitement de la tuberculose pulmonaire par l'emploi des), par F. Gannigev, 356-404. Eun arygénée (L') contre l'épitaxis, par

RIFAUX, 825.

— (Emploi do l') en gynécologie, par CHTAMPAÉ, 720

- (Traitement des hémoptysies par l')
par A. Jousser, 29.

 (Action de l') sur le sang. Moyen facile de différencier le sang de l'homme de celuf des animaux, par S. Cotton, 334.

Eclampsic (Le traitement de l'), par STROGONOV, 399. — (Lavements calmants centre l'), par

Popescel, 400.

Eeséma (Traitement de l'), récidivant de

 Eczéma (Traitement de l'), récidivant de la lèvre supérieure, par Baocq, 80).
 (Lo pyrogallol contre l') des en-

fants, par L. Leistikow, 799. Einhonn. V. Constipution. Elections, 21, 448, 670.

Elixir de Stoughton dans la dyspepsie hypochlorydrique, par Liebens, 30. Elixir polybromuré, 432.

EMÉRY-DESBROUSSES. V. Injections, létanos, quinine.

English. D. V. Antiseptique, fièere typholde, phénot ramphré. Enterites (La levure de bière dans lo

traitement des), par Therecella, 380. Entéroptose (De l'influence favorable de la grossesso sur l'), par H. Mail-Lard, 638.

Epanchéments séreux (Traitement des) par le guaïacol, par Allahverbianiz, 207. Epaule (Luxation ancienne de l'); rè-

duction sangtante; blessure de l'artere axillaire suivie de suture; guérisen, par licand, 236. Epilepsie fouctionnelle (De l'), primitivo et héreditaire particulierement de

et héreditaire particulièrement de cause et d'origine alcoeliques, de son traitement médical par le bromure de stroutium et un régime adjuvant approprié par Tounanie, 429. Epitasis (L'eau exgenée contre l'), par

Erystine (Emploi de l') comme tenique vasculaire, par Rosenbach, 942.

vasculaire, par Rosenbach, 942.

Estomac (Le riz dans l'alimentation des sujets porteurs d'ulcéro de i'), par Bounger, 31.

 — (Action du chlorure de sodium sur la sécrétion de l'), 581.

 — Action de l'eau distillée sur l'), 577.

Action de l'eau distillée sur l'), 577.
 Action de l'eau, du sel, du bouillen, du bicarbenate de soude sur l'), par V. Framont, 575.

 (Classification des dyspepsies et chimisme de l'), par Francer, 16.
 (L'hyperchlorhydrie comme contre-

indication de la morphine dans les affections douloureuses de l'), par F. Riegel, 388.

Enemine (L') dans l'anesthésio médullaire, 909.

F

FASANO, V. Thiocol, taberculose pulmonaire.

Faust. V. Accoutumance, morphine. Fede (F.). V. Antiseptic.

FEILCHENFELD. V. Narcose, Femmes enceintes (Les végetations chez

les), par LEFEN, E.

Fer, arsenic ou cuivie dans la chlorose
par Ligogous, 394.

- (Cacodylate de), par BURLUREAUX, 521. Ferropyrine (Posologie de la), 480.

Fières (Sur le traitement des), par A. Roma, 321. Fièrre typhoide (Les injections de sérum artilleiel dans le traitement gé-

rum artilleiel dans le traitement général de la), par Bose, 475. — (Note sur le traitement des hémor-

rhagios intestinales do la) par les grands lavements chauds et le chlorure de calcium, par A. Marmeu, 433.

(Traitement de la) par le pyranidon, par Gérray of Ricor, 319.

- (De la sérothérapio de la), par
Lagniffact, 392.

- (Le phènel camphré comme antisep-

— (Le phènol camphrè comme antiseptique intestinal dans la), par D. Excursu, 746. Fistale à l'auus (L'excision de la) sans section du sphinter, par P. Bange,

Fistule resico-raginale (Le décubitus ventral permanent dans le traitement de la), par J. Virnac, 76. FLEURY (M. do). V. Appareils circula—

toires, nearusthéniques.

Formiste de soude (Le) dans le traitement de la pneumonic, par A. Pols-

xov, 227,
Formine (Avantages the rapeutiques do
la base hexamethylenetetramine ou),
par G. Bander, 3:1.

Fracture du calcanéum par arrachement; suturo, guérison, par Porne-RAT, 256.

FRENKEL. V. Calaracte, perméabilité. FREMONT (V.). V. Bicarbonate de sonde, bouillon, dyspepsies, eau, estomac, set. Gallo de Tomasi (J.), V. Antisepsic. Garnault (Paul). V. Injections d'orthoforme, tuberculose, riande erue. Gannigov. V. Ease minévales, tuber-

ralose pulmonaire.
GAUBE (J.). V. Minéralogie.

GAUGHER. V. Acide salicytique, verrues. GELPKE. V. Diarrhées, dysenterie.

Génilalites (Prophylaxie des) non virulentes, par F. GUINARD, 797.
GERYST. V. Flèrre, typhoide, pyrami-

GREGIGIES. V. Infection prespérale.

GHLET. V. Calouel, syphilir.
Glycourie. (La) et le dialiète d'origine dyspeptique, symptomes, diagnostie et traitement, par A. Roben, 528.

Gonorrhée (Traitement de la) par le blen de méthylene, par Alan O'NEILL,

Grossesse triple (De laj, 557.

GOTTSCHALK. V. Bains salés chouds, ménopurse.

Gontte (L'histoire de la) et du rius-

matisme à propos du livre de M. Armand Delpeuch, par A. Romn, 35.

- (Traitement de la) et du rhumatisme gentieux par le sidonal on quinate de pipérazine, par G. Banper, 518.

Grossesse. De l'influence favorable de la gressesse sur l'entéroptese, par MAILLART, 638.

Guainest. (Cacodylate de), par Brille-BEAUX, 625.

— (Varices, hémorrhoides, varicoceles, hydroceles, épanchements séroux, leur nouvean mode de trai-

traitement par le), par Allahvendiantz, 207.

Granucatisation intensive (De la) dans la unbereniese pulmonnire, par Weil

la tubereniese pulmounire, par Weil. et Diamanthengen, 228. Guinand (F.). V. Appendicite, génitati-

les.
Guyenov (P.). V. Chaleur.
Glucosurie alimentaire (De la) chez les

Gynécologie (Emploi de l'eau oxygènée en), par Chyampas, 720. HALLOPEAU, V. Chancre, HERNA, V. Acué.

HELLENDAL. V. Meladica cordinques.

Hémoplobine (Influence des métaux lourds sur la formation de l'), par CERVELLO, 92. Hémoplysies (Traitement dos) par l'eau

nemopiques (transment des) par l'éau oxygènes, par Jorsser, 29. Hémorrhagies bronchiques (Traitement des) par le sèrum gelatiné, par Null-

MANN, 431.

Hémorrhagics intestinales (Note sur le traltement des) de la flèvre typhoïde par les grands lavements chands et

le chlornre de calcium, par A. Ma-THIST, 473.

Hémorthodes (Traitement des) par le gnañacel, par Allanyendantz, 207.

— (Traitement chirurgical des), par

A. Bologersi, 56.

— (Nouveau procédé d'extirpation des), par Potherat, 391.

HENROTAY. V. Aménorrhie, hypodermoelyse. HÉBARD DE BESSÉ. V. Acide osmique, concer.

Hennandez (C.). V. Injections, sablimé, syphilis.

1. Appareils inemoribles en celluloide.

en celluloide.

Benz, V. Cocaine, intoxication.

Bezaméthylénetétramine (Avantages

therapentiques de la base) ou formine, par Bander, 371. Hartz (Ed.), V. Perzulfale de zonde. Honlin (Le), par A. Bolonnes, 721. Honovitz, V. Mclan, tophyse.

Hermand, V. Bélire aign, hypertensian, Haile de croton, par K. Bond, 80. Hydrocite (Traitement de l') par le gualicol, par Allanyamiantz, 207.

Hydro-minéral (Des variations de la tension capillaire sons l'influence du traitement, par Bornormit, 778.
Hancoire, ita la malvidente d'a contro

Hysscine (i.e brombydrate d') contre les accidents consécutifs à la corarnisation de la meelle, par S. Manx, 229.

Huscrchistagirie (i.') comme contre-

indication de la morphime dans les affections douloureuses de l'estomac par liegel (F.), 388. Hepertensions (Les trois), par II. IIr-

GHARD, 922.

Hupertrophie de la prostate (Traitement

de l') par la méthode Bottiai, par E. Desnos, 853,

E. DESNOS, 853.

Hypoaeidité urinaire (L'importance de 1') et son traitement par l'acide phosphorique, par Barder, 4.

phorique, par Barder, 4.

Hypodermoelyse [ecrique (L') dans le
traitement de l'aménorrhée, par HEX-ROTAY, 26.

I

1

Ichtysse (Traitement de l'), par Bouffé, 790.

Infections puerpérales (Injections de sérum artificiel dans les), 76. Infection puerpérale (Contribution à

l'étude clinique du traitement de l'), par N. Gheorghy, 913. Influenza (Le traitement de l') chez les

enfants, par A. Jacobi, 559.

Infections de carodylate de soude (Traitoment d'un cas de péritonito tuberquiouso par les) et les lavements d'eau

saturco de sufturo de carbone, par SCHMITT, 703. Injections hypodermiques Le chlorhydrate d'apocodòino en) contre la constipa-

d'apocodolilo en contre la consupation, par Raviant et Bertin, 671. — de composés iodés contre la syphilis,

 de quinine (Tétanos et), par EMERY-DESHROUSSES, 647.

(Notes sur les) dans les arthrites blennorrhagiques, par Thomas, 700.

Injections intrateachènies d'orthoforme (Traitement de la tuberculose par la viande crue et par les), par Paul

GARNAULT, 269.

Injection intra-atériue de teinture d'iode
(L'avortement artificiel provoque par

l'), par GEIRSCHLAGER, 717.

— intra-veineuses de sublimé dans lo traitement de la syphilis, par C. Hen-

nandez, 479.

— de sérum artificiet dans les infections
puerpérales, 76.

 dans le traitement général de la flèvre typhoïde, par Bosc, 475.
 Intazicution aigué pur le plomb, par Zinn,

346.

— chronique par le latton, par Murray,

346.

— par l'arsenie, par Banken, 346.

— par la cocaine, par Henz, 347.

— par la cocaine, par Henz, 347.

— par l'opium, 348.

— par la paraphénylènediamine, 348.

— par ta phénylhydrazine, par Kaminen, 348.

348.

ISACONAS. V. Cynoglosse, uleératious.

1

Janoulay. V. Anesthésie, Cocuinisatiou. Jacobi (A.). V. Influenca. Jolles (A.). V. Urée, Urine.

Josias (A.). V. Scrum muscutaire, Tubercutose palmonaire. Jousset. V. Ean oxygénée, Hémoninsies.

К

KAMINED, V. Interication, Phinutku-

drazine.

Kératites ulcéreuses (Collyres contro les), par R. Whliams of Pueca, 432.

Knopp. V. Bronchites, Goryza, Tuber-culeuz.

L

LABESSE. V. Trombidiose, LABONDE (E.), V. Albaniusides.

LAFOND-GRELLETY (A.). V. Chloral, Lumbago, Scinlique. LAGRIFFAUL. V. Fièrre typhoide, Séro-

thécapie.

Laitou (Intoxication chronique par lo),
par MURRAY, 346.

Laits artificials (Des), par J. LAUMO-NIER, 884.

Laumonier (J.). V. Boxillons ourciers, Laits artificiels, Restaurants populatres.

Laval (Ed.). V. Analgésie.

Lavant antithermique pour enfants,
480.

Lavants calmants contre l'éclampsie,

par Perescu., 400.

Lavements chauds (Note sur le traitement des hémorrhagies intestinales de la fièvre typholde par les) et le chlorure de calcium, par A. MATRIEU, 453.

Larements 'd'esu saturée de sutfure de carbone (Traitement d'un cas do péritonite tuberculeuse par les injections de cacodylate de soude et les), par Schmitt, 703. Laratif an cascara, par Desesouelle. 9.50 Lecteurs (A Ros), 721.

LECTOURE, V. Listérine.

LEFER. V. Femmes enceintes, Végétations.

LEGNAND (C.). V. Bain froid, Pneumonie, Variole. LEISTIKOW (L.). V. Eczema, Purogatiol, LEMOINE, V. Neurasthénie, Phosphate de soude.

LENOX. V. Goearne.

LEREDDE. V. Affections cutanées, Chanere, Lupus érythémateux, Photothéranie.

LERMOYEZ, V. Corns étrangers. Lerares (Action des) sur la virulence

du bacillo de Lœffier et sur la texino diphtérique, par L. Nopécornt. 318. Lerure de bière (La) contre la constination habituelle, par E. RRos, 138. Lerure de bière (La) dans le traitement

des entérites, par Tuiencelin, 389. LIFGEOIS. V. Arsenic, Chlorose, Cuirre, Dyspepsie hypochtorhydrique, Elixir de Stonghton, Fer, Liqueur den tei-

guenz. Liquear des teigneux, par Liggeois, 320. Listérine (La), par Lecrovne, 110. LOOMIS. V. Alcoolisme, Digitales.

LUCE (A.). V. Otorrhée. Lumbago (Liniment an chlora; contre la sciatique et le), par A. LAFOND-

GRELLETY, 230. Lupus érythémateux (La euro photothérapique du), par LEREDDE, 97. Luxation ancienne de l'épante ; réduction

sanglante; blessures de l'artère axillaire suivie de suture; guérison, per RICARD, 236.

М

Magnésie (Cacodylate de), par BURLU-REAUX, 524.

MAILLART (II.), V. Entéroptose, Grassesse. MAILLAUD. V. Orthoforme. MAINGUY. V. Adénopathies.

Maladies eardiaques (Contribution au traitement des), par Hellendal, 880. Maladies de l'extomac, diagnostie et traitement (A propos du livre de M. A. Robin sur los), 422.

Maladies infretieuses (Sur le délire dans

lo cours dos), par L. Silvagni, 636,

MARTINET. V. Digitale.

Manx (S.). V. Brombydrate d'hyoscine, Martle MATHIET (A.). V. Chlorure de calcium,

Hemorrhagies, Lavements, MAYGRIER. V. Acconchement.

Médication apéritise, par A. Robin, 631. Métau (Le), topique nouveau pour les plaies, par Horovitz, 427.

Ménopgane (Les bains salès chauds contre les troubles de la), par Gorr-SCHALK, 26.

Mercure (Le cyanure de) contre la rhinito librineuse, par F. Peltesohn, 831. Mereure (Le cyanato de) dans le traite-

ment de la rhinite fibrincuse, par PELTESOHN, 238. Métaux lourds (infinence des) sur la formation de l'hémoglobine, par Cen-

VELLO, 92. Métaranate de sonde (Action apéritive du persuifate de soude et du), par A. BRBIN, 190.

Méthylène (Bleu de) (Traitement de la genorrhée par lo), par ALAN O'NEILL, 758.

Métrites (Traitement des), par L. BEUR-NIER, 38. Métrites cervicules (Contribution à l'é-

tude dos), par Pozzi, 398. Minéralogie biologique (Cours de), par J. GAUBE, 705.

Moetle (Lo bromhydrato d'hyoscino contro les accidents consécutifs à la cocalinisation de la), par S. MARX, 229. MORELL-MACKENZIE. V. Coryza.

MORESTIN. V. Crane, Trepanation. Morphine (L'hyperchlorhydrie comm contro-indication do la) dans les affections douloureuses de l'estomac. par F. RIÉGEL, 388.

- (Sur les causes de l'accoutumance à la), par Faust, 477. MURRAY. V. Intozication, taitou.

MUSELIER, V. Pneumonies. N

Narcose chloroformique (Prophylaxie des

accidents de la), par FEILCHENFELD, 234 Neurasthénie (Lo phosphate do soudo dans le traitement de la), par Le-

MOINE, 231. Neurosthéniques (L'appareil circulatoire ehez los) au point de vue du régime alimentaire et du traitement, par M. DE FLEURY, 376. NICOLAS. V. Persulfate de soude, tuber-

culose.

Nonécount (P.). V. Levures.

Nonécount (Pe) la glycosurje alimen-

tnire chez les), par Terrien, 78.

Rutrition (Rôle de philothion dans le niécanisme de l'action des niédicaments spéciaux de la), par J. de Rey Pallitabr, 85.

0

CEMISCHLAGEN. V. Arortement, injection, teinture d'iode. Opium (L') dans le traitement du délirium tremens, par VILLENS, 231.

- (Intoxication par 1), 318.

Orexine (Le tannate d'), 878.

Orthoforme (Le traitement de la tubereulose par la viande erue et les in-

jections intratrachéales d'), par Paul Garnault, 260. — (A propos des accidents attribués à

 (A propos des accidents attribués à l'), par Maillaub, 342.
 Ottle mogense aigué (Traitement de l') par les insufflations d'air, par A.

COURTADE, 461.

Otorrhée (Traitement de l'), par A.

LUCAE, 239.

OTTO JELINEK. V. Biphtérie, sérothéra-

pic.

P

Patteirs (L.). V. Syphilides.

Paneréas (Du traitement de la rétention biliaire au cours du cancer de la tête du), par Platel, 380.

PANNE. V. Séram antipueumonique. Paruldékgde (L'association du trional et de la), par Ropttear, 222. Parulysie générale (Contribution à l'étude

Paralysie générale (Contribution à l'étude des imports de l'alcodisme et de la), par GRANEMILE, 439. — (Traitement de la), par A. Robin,

587.

Puraphénylénediamine (Intoxication par la), 31%.

 la), 31%.
 Paresthésie larguyée (Pathogènio et traitement de la), par Ricanno-Borey, 79. Peltesonn (F.). V. Cyanure de mercure, rhinite fibrineuse.

Péritonite tuberculeuse (Traitement d'un ens de) par les injections de cacodyiate de soude et les lavements d'ean saturée de sulfure de carbone, par SCHMITT, 703.

Pérityphlite (Le traitement médical de la), par Bounger, 630. Permanganate de potasse (Emplei du)

comme antidote de la strychnine, 100.

Perméabilité résale (Recherches sur

Ia) chez les personnes atteintes de cataracte sénile, par PRENKEL, 130. PERNICE (L.). V. Crásc.

Persulfale de soude (Action apéritive du), par Edgard Ilinzz, 517. — (Action apéritive du) et du métavanadate de soude, par A. Itonix, 190.

 Dans le truitement de la tuberculose, par Nicolas, 913.

Petrosalfol (Le), par Eurmann, 221.

Pharyugites chroniques (Traitement des), par Savoire, 639.

Phémacétine (Action physiologique de la), par II. C. Woon, 235. Phémal comphré (Le) comme antiseptique intestinal dans la fievre ty-

phoide, par D. English, 746.

Phiny/hydrazine (Intexication par la), par Kaminen, 228.

Philothem (Rôle du) dans le mécanisme de l'action des médicaments spéciaux de la nutrition, par J. de REY-PAILMADE, Si. Phamphale de saude (Le) dans le traitement de la neurasthémic, par LEMOINE,

231.
Photothérapique (La cure) du lupus érythémateux, par Lebedde, 97.
— (Présentation de l'appareit de MM.

LORTET et GENOFD, par LEBEDDE, 817. — (La) et ses applications à la thérapentique des affections entances, par

Proérasine (Traitement de la gontte et du rimmatisme gentteux par le sidonal ou quinate de), par G. Bander, Els. PLATEL V. Gancer, pancréas, rétention

LEREDDE, 129.

belinire.

Plomb (Intoxication aigue par Ic). par
Zuxx, 346.

Paramonic (Sur les questions controversites relatives an traitement de la), par Buchwald, 819.

- (Traitement des), par Musetter, 116,

- (Le formiate do soude dans le traitoment de la), par A. POLÉNOV, 227. Pneumonie donble (Lo bain froid dans um cas grave de), par G. Legrand,

Poisons (Los) dans l'histoire, par Gaba-NES, 195-304. POLÉNOV (A.). V. Forminte de soude, pacumonie.

Popescut. V. Eclampir, tarements.

Posologic (Sur une nouvelle méthode
de) pour les medicamonts tres actifs,
par L. Admin, 276.

par L. Abrian, 276.
Possologie de la ferropyrine, 480.
Potasse (Les indications de la saignée
et le rôle de la) dans l'uremie, par A.

ROBIN, 414.

Potusse (Permanganate de) (Emploi du)
comme antidoto de la stryclinine, 109.

POTHERAT. Y. Fracture du cateanéam,
hémorthoides.

Poulopontos. V. Cynoglasse, uleéralions. Pozzi, V. Métrites cervicales.

Proxiate (Traitement de l'hypertrophie de la) par la méthode de Bottini, par E. DESNOS, 853.

PUEGE. V. Collyres, kératites. Pyramidos (Action antithermique du), par G. Bander, 367. — (Contribution à l'etude du) et de ses

sels, par L. Bentherand, 243.

— (Traitement de la flèvre typhoïde par le), par Génest et Ricor, 359.

Pyrogallol (Le). contre l'eszèma des enfants, par L. Leistikow, 799.

Q

Quanine (Tétanos of injections hypoderniques de), par EMERY-DESEROUSSES, 647.

 (Cacodyinto do), par Burlumeaux, 524.
 (Le sulfato de) dans la tiérapeutique utérine, par Paul Dalené, 12.

R

RAVIART. V. Injections.
Regune lacté (Du réginée de transition entre le) et l'alimentation normale

chez les dyspeptiques hypersthèniques avoc hyperchlorhydrie, par A. Rosta, 710.

Restaurants populaires (Bouillons ou-

vriers et), par J. Laumonien, 285.
Rétention biliaire (Du traitement de la)
au cours du cancer de la tête du pancréas, par PLATEL, 390.

REV-PAILMADE (J. dc). V. Natrition, philothion.

Rhinite fibrineuse (Le cyanure de mer-

enre contre la), par F. Peltesonn, 831. —{Le eyanate de mercure dans le

traitement de la), par Pelteson, 239. Rhino-pharyngite typhoidique, par Barmany, 468.

Rhumatisme (L'histoire de la goutte et dn), à propos du livre de M. A. Del-PECCH, 35.

Rhumatisme goutteuz (Traitement de la goutte et du) par le sidonal ou qui-

nato de pipéràrine, par G. Barder, 518. Bicard. V. Epaule, luxation. Biecel. (?.). V. Estomae, hyperchlorhy-

drie, morphine.

httpaxx. V. Ean, épistazis.

httor. V. Fièrre typhoide, pyramidon.

hous (A.). V. Albuminarie, alimentation normele, antipyrire, diabete,
dyspeptiones, fièrres, youtle, glycosarie, médication apéritie, metaumadair de noude, persufuite de soude,
yotane, rôjume latete, rhamatisme, sayotane, rôjume latete, rhamatisme, sa-

polasse, régime lacié, rhamatisme, sai gaée, thérapeutique, twberoulose, urémie, bertige, romissements. Boos (E.), V. Constipation habituelle, lesure de biere. Bopytra, V. Paraldéhyde, trional.

ROSENBACH. V. Ergotine, tonique vascutaire.
ROUX (Ch.). V. Sérum musculaire, tuberenlose pulmonaire.

S

Saignée (Les indications de la) ot to rôle de la potasse dans l'urémic, par A. Robes, 414.

Salophène (Traitement des tranchées utérines par le), par Atterment, 318. Sang (Action de l'ean oxygénée sur le). — Moyen facilo de différencier le sang de l'homme de celui des aninaux, par S. Gottx, 33. Savone, V. Pharyacites.

- Schmitt. V. Cacodylate, injections, larements, péritonite, sulfure de curba-
- Sciatique (Liniment au chloral contre la) et le lumbago, par A. LAFOND-GRELLETY, 230.
 - Sécrétian de l'estomae (Action du chle-rure de sodium sur la), 581. - lactée (Ouelques considérations sur
 - lu) chez les femmes, par Bunin, 397. Sel (Action de l'eau, du), du bouillon, du bicarbonate de seude sur l'estonec, par V. FREMONT, 575.
 - Scrothérapie (De la) de la fièvre ty-phoïde, par Lagriffaul, 392. - (La) dans la diplrtérie, par BREEC-
- (Succès de la) dans les cas de diplitérie, par Otte JELINCE, 383. Sérum anti-pucumonique (Action théra-peutique du), par PANNE, 475.

KAERT, 224.

- artificiel (Les injections de) dans le traitement géneral de la fièvre
- typhoide, par Bose, 475. - artificiet (Injections de) dans les
- infections puerperales, 76. - gélaliné (Traitement des hémorrhagies bronchiques par le), par SPILL-MANN, 431.
- museulaire (Essai sur le traitement de la toberculose pulmonaire chez les enfants par les, suivant le procédé de Ch. RICHET et HÉRIGOURT,
- par Jostas et Reux, 249. SILVAGNI, V. Délire, maladies infectieu-200
 - Simarauba (Action du), 741. Saciélé de Thérapeutique. Séance du
 - 28 décembre 1990, 4.
 - Séance du 9 janvier 1901, 84.
 Séance du 23 janvier 1901, 182.
 Seauce du 13 février 1901, 242.
 - Séance du 27 février 1961, 366.
 Séance du 13 mars 1961, 448.
 - Séance du 27 mars 1901, 524. Séance du 17 aeril 1901, 645.
 - -- Séance da 8 mai 1901, 729. -- Séance da 22 mai 1901, 847 - Séanre du 12 juin 1901, 913.
- Sodium (Chlorure de) (Action du) sur la sécretion de l'estonzac, 581. Sommeil (Emploi des vibrations musicules avant et après le), par J.-L. COUNTING, 28.
- Soude (Bicarbonate de) (Action du), 586. (Action de l'euu, du sel, du bouillon, du) sur l'estomac, par V. Fuémont, KTE
- (Cacodylate do) (Truitement d'un cas do péritouite taberculeuse générali-sée par les injections de) et les lave-

- ments d'ean saturée de sulfure de carbone, par Schwiff, 703. - par Bunluneaux, 524.
- (Le formiato de) dans le traitement de la pneumonie, par A. Polénov,
- 227. - (Métavanadate de) (Action apérilive du persulfate et du), par A. Robin,
- 190 (Persulfate de) (Action apéritive du), par Ed. Birtz, 517.
- (Persulfate de) (Action apéritive de). et du métavanadate du soude, par
- A. ROBIN, 190. (Le perselfate de) dans le traitement de la tubercelose, par Nicolas, 911. — (Le phosphatu de) dans le traitement
- do la neurasthésie, par LEMOINE, 231. SPILLMANN, V. Hémarragies, sérum gélatiné.
- Stations hydro-minirales françaises et leur avenir, par Binet, 756. Striogonov, V. Eclampsic.
- Strontiam (Browner de) (Traitement de l'épilepsie par le), par Tounanae, \$29. Strychnine (Emploi du permanganate
- de petasse commeantidete de la), 109. STRZEMINSKI, V. Chalazian. Sublimé (Les injections infravoincuses de) dans le traitement de la syphilis,
- par C. Hennandez, 479. Sulfate de quinine dans la thérapeutique utérine, par Paul DALCHE, 12. Sulfure de earbone (Traitement d'un cas
 - de péritonite tuberculeuse par les injections de cacodylate de seude et les lavements d'eau saturée de), par SCHMITT, 703.
 - Syphilides impétigineuses (Pourmade contre les), du cuir chovelu, par L. PAILLIPS. Syphilis (Emplatre au calomel dans la).
 - de l'enfant, par GILLET, 538. - (Injections hypodermiques de composes iodes contre la), 908.
 - Les injections intraveineuses de sublimé dans le traitement de la), par C. HERNANDEZ, 479.

T

Tanuate Forexine (Le), 878. Trinture contro lu dysenterio et les diarrices d'origine diverse, par GELPKE, 832.

- Civile (L'avortement artificiel provoqué par l'injection intra-utérine de). par (EIILSCHLAGER, 717.

Tension capitlaire. (Des variations de la) sons l'influence du traitement hydreminival, par Bouloumis, 738. Tennien. V. Gigeourie alimentaire, nourrissons.

nourrissons.
Telanos et injections hypodormiques de quinine, pur EMERY-DESUROUSSES, 647.

Tetau (J.). V. Tuberculose puimoacire. Thérapeutique (La) un lit du malado, nar A. Rontx, 631.

Therapestique utérine (Le sulfate de quinine dans la), par Paul Dalcué, 12. Tuinnenis. V. Entérites, levure de

bière.

Thiorol (Le) dans le traitement de la tuberculose et des bronchites chroniques, par Braun, 718.

Thiocol (Le) dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, par Fasano, 396.

Thomas. V. Arthrites, calomel, injections.

Ties convulsifs (Traitement des) par la

rééducation des centres moteurs, par 8. DUBOIS, 617. Tonique resculaire (Emploi de l'orgetine comme), pur ROSENBACH, 912.

Topique noureur peur les plaies « Le Melan », par Honovitz, 427.

Tourante. V. Browne de strontium, épilepsie. Traccices stérises (Traitement des)

par le salophene, par Audenent, 318.

Trimunation. Plaie pénétrante du crâne

par balle de revelver; extraction de la balle legée dans le cerveau, par Monestin, 235.

Tri-acctylmorphine (Etude de la), par CHANOZ. 345. Trional (L'association dn) et de la paraldéhyde, par ROPITEAU, 222.

Trombidiose (Traitement de la), par La-BESSE, 233, Tuberculenz (Traitement du ceryza et des bronchites chez les), par Knopp.

228.
Tubrevulose (Traitement de la) par la viande crue et par les lajections intratracheales d'orthoforme, par Paul

Ganautt. 259.

Taberculose (Le thiocol dans le traitemont de la) ot des bronchites chroniques, par Braun, 718.

Tuberculose (Le persuifate de seude dans le traitement de la), par Nicolas, 111. Tuberculose externe (Traitement local

de la), par Calor, 426.

Teberculose pulmonaire (Essai sur le traitement de la) chez les eufants par le sèrum musculaire, suivant le procèlé de M. Ch. Richet et Héricourt, par A. Jostas et Ch. Roux, 249. Teierrulose pulmonaire (Traitement de

la) par Ed., Wells, 910.

Taberculose pulmonaire (Méthode du diagnostic précoce du terrain de prédisposition à la) par l'étude de la température mossage de l'homme.

disposition à la) par l'étude de la température moyenne de l'homme, par J. Tétau, 741. Teberculose pulmonaire (Les conditions et le diagnostic du terruin de 'e',

et le diagnostie du terrain de '9', par A. Romin et M. Biner, 483. — (Le traitement de la) par l'emploi des caux minerales, par F. Garrigov, 356-304.

— (Le thiccol dans le traitement de la), par Fasano, 296. — (De la grafacelisation intensive daus la), par Weil et Diamanyberger, 228.

U

Ulcérations maligaes (Traitement des) par le cynéglosse, par Isaconas et Poulopontos, 672.

Ulcère de l'extomac (Le riz dans l'alimentation des sujets perteure d'), par Bourger, 31.

Urée (Estimation de l') dans l'urine, par A. Jolles, 879. Urémie (Les indications de la saignée

ot le rôle de la potasse daue l'), par A. Roben, 414. Urine (Estimation de l'urce dans l'), par A. Jolles, 879.

 Quelquee faits relatifs à l'action de la digestion sur la réaction des), par G. Barner, 183.
 Urotrapine (L') dans les cystites, 825.

37

Varices (Traitement des) par le guaïacel, par ALLANVERBIANTZ, 207. Varicecèle (Traitement de la) par le guaïacel, par ALLANVERBIANTZ, 207. Variété. Guérison miraculeuse de maladies d'apparence organique. Rôle

du systèmo vaco-meteur, 381. Variole (Remarque sur le traitement de la), par LEGRANB, 217.

Végétations (Les) chez les femmes enceintes, par Leren, 25. l'égétations vulsaires (Du traitement des) par l'acide phénique, par Co-OUILLE, 428.

CHILE, 129.

Verrues (Traitement des), planes Juvé-niles par l'acide salicylique, par Gaucines, 829.

Vertige atomacat (Traitement du), par A. Roists, 780.

Viande crue (Traitement de la tubercu-lose par la) et par los injections in-traitement de la companya de la companya de la traitement de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya del

GARNAULT, 269. Vibrations musicales (Emplo) des) avant

et après le sommeil, par J.-L. Con-NING, 28.
VILLERS. V. Delirium tremens, opium.
VITRAG (J.). V. Décubitus, fixtule.

Vomissements rebelles (Traitement des), par A. Robin, 793.

w. z

Ward (II.). V. Ampoules, Well. V. Guaiscolisation, tuberculose. Wells (Ed.). V. Tuberculose pulmonuire.

muire. Williams (R.). V. Collyres, kératites. Wood (H.-C.). V. Phénacétine. Zinn. V. Intoxication, plomb.

Zomothérapie (A propos de la), par Du-HOURGAU, \$49.

L'Administrateur-Gérant: O. DOIN.

imp. PAUL DUPONT, 4, rue du Bouloi. - Paris, 1er Arri. - 75.7.1901 (Cl).